

**LISTADO SISTEMÁTICO, SINONÍMICO Y BIOGEOGRÁFICO DE LOS
ÁCAROS ORIBÁTIDOS (ACARIFORMES: ORIBATIDA) DEL MUNDO
(Excepto fósiles)
(13^a actualización)**

LUIS S. SUBÍAS

Departamento de Zoología. Facultad de Biología. Universidad Complutense. Madrid 28040. E-mail:
subias@bio.ucm.es

(Publicado originalmente en *Graellsia*, 60 (número extraordinario): 3-305 (2004). Actualizado en junio de 2006, en abril de 2007, en mayo de 2008, en abril de 2009, en julio de 2010, en febrero de 2011, en abril de 2012, en mayo de 2013, en febrero de 2014, en marzo de 2015, en febrero de 2016, en febrero de 2017 y en enero de 2018)

ÍNDICE

<i>ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DE FAMILIAS Y GÉNEROS</i>	1-16
<i>LISTADO SISTEMÁTICO DE ESPECIES</i>	17-480
<i>ÍNDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS (Y SUBGÉNEROS) DE ORIBÁTIDOS</i>	481-494
<i>ÍNDICE ALFABÉTICO Y BIOGEOGRÁFICO DE ESPECIES (Y SUBESPECIES) DE ORIBÁTIDOS</i>	495-605

ORDENACIÓN SISTEMÁTICA DE FAMILIAS Y GÉNEROS

[163 familias, 1.278 géneros y subgéneros (+ 441 sinonimias), y 11.036 especies y subespecies (+ 1.551 *sinonimias*):
3.863 Paleárticas, 1.116 *Neárticas*, 1.870 *Etiópicas*, 2.470 *Orientales*, 1.500 *Australianas*, 138 *Antárticas* (y *subantárticas*) y 2.238 *Neotropicales*]

ORIBATIDA Dugès, 1834

PALAEOSOMATA Grandjean, 1969

Acaronychoidea Grandjean, 1932
Acaronychidae Grandjean, 1932

- **Acaronychus** Grandjean, 1932
- **Archeonothrus** Trägårdh, 1906
- **Loftacarus** Lee, 1981
- **Stomacarus** Grandjean, 1952
(=**Amuracarus** Lange, 1975)
(=**Andacarus** Grandjean, 1958)
- **Zachvatkinella** Lange, 1954
(=**Himalacarus** Sheals, 1965)

Palaeacaroidae Grandjean, 1932
Palaeacaridae Grandjean, 1932

- **Palaeacaroides** Lange, 1972
- **Palaeacarus** Trägårdh, 1932
(=**Traegardhacarus** Zachvatkin, 1945)
Ctenacaridae Grandjean, 1954
- **Beklemishevia** Zachvatkin, 1945
- **Ctenacarus** Grandjean, 1939
(=**Gradjeanacarus** Zachvatkin, 1958)
- **Gilarovella** Lange, 1974
- **Neoctenacarus** Moritz, 1974
Adelphacaridae Grandjean, 1954
- **Adelphacarus** Grandjean, 1952

- **Aphelacarus** Grandjean, 1932

PARHYPOSOMATA Balogh y Mahunka, 1979

Parhypochthonioidea Grandjean, 1932
Parhypochthoniidae Grandjean, 1932

- **Parhypochthonius** Berlese, 1904
Gehypochthoniidae Strenzke, 1963
- **Gehypochthonius** Jacot, 1936
Elliptochthoniidae Norton, 1975
- **Elliptochthonius** Norton, 1975

ENARTHRONOTA Grandjean, 1947

Brachychthonioidea Thor, 1934
Brachychthoniidae Thor, 1934

- **Brachychthonius** Berlese, 1910
(=**Brachychochthonius** Jacot, 1938)
- **Eobrachychthonius** Jacot, 1936
- **Liochthonius** Hammen, 1959
- **L. (Afroliochthonius)** Mahunka, 1995
- **Mixochthonius** Niedbala, 1972
- **Neobrachychthonius** Moritz, 1976
- **Neoliochthonius** Lee, 1982
(=**Moritzichthonius** Pereda e Iturrondobetia, 1990)
(=**Paraliochthonius** Moritz, 1976 *nom. praeoc.*)
- **Papillochthonius** Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992
- **Poecilochthonius** Balogh, 1943

- **Sellnickochthonius** Krivolutsky, 1964
- **Synchthonius** Hammen, 1952
- **Verachthonius** Moritz, 1976

Heterochthonioidea Grandjean, 1954

Heterochthoniidae Grandjean, 1954

- **Heterochthonius** Berlese, 1910
- **Neovochthonius** Judson, 2009
(= **Neochthonius** Karppinen, 1984 *nom. praeoc.*)
- **Ovochthonius** Rjabinin, 1977
Trichthoniidae Lee, 1982
- **Gozmanyina** Balogh y Mahunka, 1983
(= **Marshallia** Gordeeva, 1980 *nom. praeoc.*)
- **Nipponiella** Gordeeva, 1980
- **Trichthonius** Hammer, 1961
Arborichthoniidae J. y P. Balogh, 1992
- **Arborichthonius** Norton, 1982
Nanohystricidae Norton y Fuangarworn, 2015
- **Nanohystrix** Norton y Fuangarworn, 2015

Cosmochthonioidea Grandjean, 1947

Cosmochthoniidae Grandjean, 1947

- **Cosmochthonius** Berlese, 1910
- **C. (Nanochthonius)** Subías y Gil-Martín, 1995
(= **Microchthonius** Kahwash, Subías y Ruiz, 1989 *nom. praeoc.*)
- **C. (Nortonchthonius)** Jorrín, 2014
- **Krivolutskiella** Gordeeva, 1980
- **Phyllozetes** Gordeeva, 1978
Haplochthoniidae Hammen, 1959
- **Amnemochthonius** Grandjean, 1949
- **Haplochthonius** Willmann, 1930
(= **Tetrochthonius** Hammer, 1958)
- **H. (Senilochthonius)** Mahunka, 1992
Pediculochelidae Lavoipierre, 1946
- **Paralycus** Womersley, 1944
(= **Pediculocheilus** Lavoipierre, 1946)
Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947
- **Similochthonius** Mahunka, 1985
(= **Sphaerochthonius** Mahunka, 1985)
- **Sphaerochthonius** Berlese, 1910
(= **Sphaerochthoniella** Mahunka, 1985)

Atopochthonioidea Grandjean, 1949

Atopochthoniidae Grandjean, 1949

- **Atopochthonius** Grandjean, 1949
- **Phyllochthonius** Travé, 1967
- **Pterochthonius** Berlese, 1913

Protoplophoroidea Ewing, 1917

Protoplophoridae Ewing, 1917

- **Arthrophlophora** Berlese, 1910
(= **Neoprototritia** Shereef, 1978)
(= **Triplophora** Mahunka, 1977)
- **Bursoplophora** Subías y Pérez-Íñigo, 1978
(= **Csibiplophora** Mahunka, 1984)
- **Cryptoplophora** Grandjean, 1932
- **Grandjeanoplophora** Balogh y Mahunka, 1979
- **G. (Tauroplophora)** Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1998
- **Hauseroplophora** Mahunka, 1977
- **Protoplophora** Berlese, 1910
- **Prototritia** Berlese, 1910
(= **Aedoplophora** Grandjean, 1932)
- **P. (Siciliophora)** Bernini, 1983

Hypochthonioidea Berlese, 1910

Hypochthoniidae Berlese, 1910

- **Eohypochthonius** Jacot, 1938
(= **Afrhypochthonius** Balogh, 1958)
- **E. (Neoatrichosus)** Fernández, 1984
- **Hypochthonius** Koch, 1835
- **Malacoangelia** Berlese, 1913
- **Nothrolohmannia** Balogh, 1968
Eniochthoniidae Grandjean, 1947
- **Hypochthoniella** Berlese, 1910
(= **Arthrochthonius** Ewing, 1917)
(= **Eniochthonius** Grandjean, 1933)
Psammochthoniidae Fuangarworn y Norton, 2013
- **Psammochthonius** Fuangarworn y Norton, 2013

Lohmannioidea Berlese, 1916

Lohmanniidae Berlese, 1916

- **Annectacarus** Grandjean, 1950
- **Bedolohmannia** Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
- **Cryptacarus** Grandjean, 1950
- **Dendracarus** Balogh, 1961
- **Haplacarus** Wallwork, 1962
- **Heptacarus** Piffel, 1963
(= **Neotrichacarus** Hammer, 1973)
(= **Pseudocryptacarus** McDaniel, Norton y Bolen, 1979)
- **Javacarus** Balogh, 1961
(= **Tongacarus** Hammer, 1973)
- **J. (Euryacarus)** Woolley, 1966
- **Lepidacarus** Csiszár, 1961
- **Lohmannia** Michael, 1898
(= **Michaelia** Haller, 1884)
- **L. (Carolohmannia)** Norton, Metz y Sharma, 1978
- **Meristacarus** Grandjean, 1934
(= **Javalohmannia** Hammer, 1979)
- **Meristolohmannia** Balogh y Mahunka, 1966
- **Mixacarus** Balogh, 1958
(= **Hamacarus** Hammer, 1977)
- **M. (Phyllolohmannia)** J. y P. Balogh, 1987
- **Nesiacarus** Csiszár, 1961
- **Ozacarus** Colloff y Halliday, 1998
(= **Austracarus** J. y P. Balogh, 1983 *nom. praeoc.*)
- **Papillacarus** Kunst, 1959
- **P. (Vepracarus)** Aoki, 1965
- **Paulianacarus** Balogh, 1961
- **P. (Millotacarus)** Balogh, 1961
- **Reptacarus** Pérez-Íñigo y Peña, 1995
- **Strinatacarus** Mahunka, 1974
- **Thamnacarus** Grandjean, 1950
(= **Asiacarus** Krivolutsky, 1971)
- **Torpacarus** Grandjean, 1950
- **Ululohmannia** Mahunka, 1987
(= **Austracarus** Mahunka, 1984)
- **Xenolohmannia** Balogh y Mahunka, 1969

Mesoplophoroidea Ewing, 1917

Mesoplophoridae Ewing, 1917

- **Apoplophora** Aoki, 1980
- **Archoplophora** Hammen, 1959
- **Dudichoplophora** Mahunka, 1982
- **Mesoplophora** Berlese, 1904
(= **Phthiracarus** Berlese, 1920)
- **M. (Parplophora)** Niedbala, 1985

MIXONOMATA Grandjean, 1969

DICHOSOMATA Balogh y Mahunka, 1979

- Nehypochthonioidea Norton y Metz, 1980
 Nehypochthoniidae Norton y Metz, 1980
 - **Nehypochthonius** Norton y Metz, 1980

- Perlohmannioidea Grandjean, 1954
 Perlohmanniidae Grandjean, 1954
 - **Holoholmannia** Kubota y Aoki, 1998
 - **Perlohmannia** Berlese, 1916
 - **P. (Apolohmannia)** Aoki, 1960
 (=Neolohmannia Bulanova-Zachvatkina, 1960)
 Collohmanniidae Grandjean, 1958
 - **Collohmannia** Sellnick, 1922
 (?=Embolacarus Sellnick, 1919 [+])
 (=Phthiracaroides Štorkán, 1923)

- Eulohmannioidea Grandjean, 1931
 Eulohmanniidae Grandjean, 1931
 - **Eulohmannia** Berlese, 1910
 (=Arthronothrus Trägårdh, 1910)

- Epilohmannioidea Oudemans, 1923
 Epilohmanniidae Oudemans, 1923
 - **Epilohmannia** Berlese, 1910
 (=Lesseria Oudemans, 1917)
 (=Sinolohmannia Balogh y Mahunka, 1979)
 - **E. (Neoepilohmannia)** McDaniel y Bolen, 1989
 - **Epilohmannoides** Jacot, 1936

EUPTYCTIMA Grandjean, 1967

- Euphthiracaroidae Jacot, 1930
 Oribotritiidae Balogh, 1943
 - **Austrotritia** Sellnick, 1959
 (=Macarotritia Pérez-Íñigo, 1986)
 - **Indotritia** Jacot, 1929
 - **I. (Afrotritia)** Mahunka, 1988
 - **I. (Zeaotritia)** Mahunka, 1988
 - **Maerkelotritia** Hammer, 1967
 - **Mesotritia** Forsslund, 1963
 (=Entomotritia Märkel, 1964)
 - **M. (Perutritia)** Märkel, 1964
 - **Oribotritia** Jacot, 1924
 (=Berndotritia Mahunka, 1987)
 (=Philotritia Mahunka, 1988)
 (=Plesiotritia Walker, 1965)
 (=Tritia Berlese, 1883 *nom. praeoc.*)
 - **Paratritia** Moritz, 1966
 - **Protoribotritia** Jacot, 1938
 - **Sabacarus** Ramsay y Sheals, 1969
 - **Terratritia** Ramsay y Sheals, 1969
 Euphthiracaridae Jacot, 1930
 - **Acrotritia** Jacot, 1923
 (=Rhysotritia Märkel y Meyer, 1959)
 - **Bukitritia** Mahunka, 1990
 - **Euphthiracarus** Ewing, 1917
 (?=Hummelia Oudemans, 1916 *gen. inq.*)
 (=Niedbalaia Mahunka, 1999)
 (=Parapocsia Niedbala, 2014)
 (=Pseudotritia Willmann, 1919)
 - **E. (Brasiliotritia)** Märkel, 1964
 - **E. (Pocsia)** Mahunka, 1983
 - **Microtritia** Märkel, 1964
 - **Sumatrotritia** Mahunka, 1989
 Synichotritiidae Walker, 1965
 - **Apotritia** Norton y Lions, 1992
 - **Sabahtritia** Mahunka, 1987
 - **Synichotritia** Walker, 1965

- **Temburongia** Mahunka, 1990

- Phthiracaroidae Perty, 1841
 Phthiracaridae Perty, 1841
 - **Atropacarus** Ewing, 1917
 (=Helvetacarus Mahunka, 1993)
 - **Hoplophorella** Berlese, 1923
 - **H. (Kakophthiracarus)** Mahunka, 1992
 - **Hoplophthiracarus** Jacot, 1933
 - **Notophthiracarus** Ramsay, 1966
 (=Arphthiracarus Niedbala, 1994)
 - **N. (Besuchetacarus)** Mahunka, 1985
 (=Neokakophthiracarus J. y P. Balogh, 2002)
 - **N. (Calyptophthiracarus)** Aoki, 1980
 (=Hauserophthiracarus Mahunka, 1982)
 (=Phrathiracarus Niedbala, 1994)
 - **N. (Phthirarica)** Mahunka, 1982
 - **N. (Protophthiracarus)** Balogh, 1972
 (=Austrophthiracarus Balogh y Mahunka, 1978)
 (=Fuegoplophora Mahunka, 1980)
 (=Notophthiracarus Balogh y Mahunka, 1967 *nom. praeoc.*)
 (=Sturmacarus P. Balogh, 1984)
 - **N. (Steganacarellus)** Mahunka, 1986
 - **Phthiracarus** Perty, 1841
 (=Ginglymacarus Ewing, 1917)
 (=Hoploderma Michael, 1898)
 (=Hoplophora Koch, 1836 *nom. praeoc.*)
 (=Peridromotritia Jacot, 1923)
 - **P. (Archiphthiracarus)** Balogh y Mahunka, 1979
 (=Archiphthiracarella Mahunka, 1996)
 (=Microphthiracarus Mahunka, 1982)
 (=Paraphthiracarus Aoki, 1980)
 - **P. (Metaphthiracarus)** Aoki, 1980
 - **P. (Neophthiracarus)** Balogh y Csiszár, 1963
 (=Antarctoplophora Mahunka, 1980)
 (=Neoprotophthiracarus Mahunka, 1980)
 - **Rhacaplacarus** Niedbala, 1986
 (=Plonaphacarus Niedbala, 1986)
 - **R. (Mantigueracarus)** Balogh y Mahunka, 1992
 - **Steganacarus** Ewing, 1917
 (=Niedbalacarus J. y P. Balogh, 2002)
 (=Trachyhoplophora Berlese, 1923)
 - **S. (Rafacarus)** Niedbala, 1981
 (=Neosteganacarus Balogh y Mahunka, 1992)
 (=Nortonacarus Balogh y Mahunka, 1992)
 - **S. (Tropacarus)** Ewing, 1917
 (=Calhoplophora Berlese, 1923)

HOLOSOMATA Grandjean, 1969

- Crotonioidea Thorell, 1876
 Trhypochthoniidae Willmann, 1931
 - **Afronothrus** Wallwork, 1961
 - **Allonothrus** Hammen, 1953
 (=Parallonothrus Badejo, Woas y Beck, 2002)
 - **A. (Pseudonothrus)** Balogh, 1958
 - **Archezogetes** Grandjean, 1931
 - **Mainothrus** Choi, 1996
 (=Altrhypochthonius Weigmann, 1997)
 - **Mucronothrus** Trägårdh, 1931
 - **Trhypochthoniellus** Willmann, 1928
 (=Hydronothrus Aoki, 1964)
 - **Trhypochthonius** Berlese, 1904
 (=Albonothrus Tseng, 1982)
 (=Trilohmannia Willmann, 1923)
 (=Tumidalvus Ewing, 1908)

- Malaconothridae Berlese, 1916
- **Malaconothrus** Berlese, 1904
 - **M. (Trimalaconothrus)** Berlese, 1916
(=**Zeanothrus** Hammer, 1966)
 - **Tyrphonothrus** Knülle, 1957
(=**Fossonothrus** Hammer, 1962)
 - **T. (Cristonothrus)** Subías, 2004
Nothridae Berlese, 1896
 - **Nothrus** Koch, 1836
(=**Angelia** Berlese, 1885)
(=**Gymnonothrus** Ewing, 1917)
(=**Vigilmicrozetes** Tseng, 1982)
 - **Novonothrus** Hammer, 1966
 - **Trichonothrus** Mahunka, 1986
Crotoniidae Thorell, 1876
 - **Austronothrus** Hammer, 1966
 - **Camisia** Heyden, 1826
(=**Uronothrus** Berlese, 1913)
 - **C. (Ensicamisia)** Kunst, 1971
(=**Ivarsia** Karppinen y Krivolutsky, 1987)
 - **Crotonia** Thorell, 1876
(=**Acronothrus** Berlese, 1916)
(=**Westwoodia** Cambridge, 1875 *nom. praeoc.*)
 - **Heminothrus** Berlese, 1913
(=**Paulonothrus** Kunst, 1971)
 - **H. (Capillonothrus)** Kunst, 1971
(=**Ovonothrus** Kunst, 1971)
(=**Paracamisia** Olszanowski y Norton, 2002)
 - **H. (Platynothrus)** Berlese, 1913
(=**Neonothrus** Forsslund, 1955)
(=**Sigmonothrus** Chakrabarti y Kundu, 1978)
 - **Holonothrus** Wallwork, 1963

BRACHYPYLINA Hull, 1918

PYCNONOTICAE Grandjean, 1954

Nanhermannioidea Sellnick, 1928
Nanhermanniidae Sellnick, 1928

- **Bicyrthermannia** Hammer, 1979
- **Cosmohermannia** Aoki y Yoshida, 1970
- **Cyrthermannia** Balogh, 1958
(=**Linothrus** Tseng, 1982)
- **Dendrohermannia** P. Balogh, 1985
- **Masthermannia** Berlese, 1913
(=**Phyllonothrus** Sellnick, 1959)
(=**Posthermannia** Grandjean, 1954)
- **Nanhermannia** Berlese, 1913
- **N. (Nippohermannia)** P. Balogh, 1985
- **Notohermannia** P. Balogh, 1985

Hermannioidea Sellnick, 1928
Hermanniidae Sellnick, 1928

- **Galapagacarus** P. Balogh, 1985
- **Hermannia** Nicolet, 1855
- **H. (Heterohermannia)** Woas, 1992
- **H. (Phyllhermannia)** Berlese, 1916
(=**Lawrencoppia** Jacot, 1936)
- **Neohermannia** Bayoumi y Mahunka, 1979

Hermannilloidea Grandjean, 1934
Hermannillidae Grandjean, 1934

- **Akansilvanus** Fujikawa, 1993
- **Ampullobates** Grandjean, 1962
- **Baloghacarus** Mahunka, 1983
- **Bullibates** Subías y Shtanchaeva, 2012
- **Hermannilla** Berlese, 1908

- **Hermannobates** Hammer, 1961
- **Issaniella** Grandjean, 1962
- **Mahunkobates** Călugăr, 1989
- **Sacculobates** Grandjean, 1962
(=**Bruneiella** Mahunka, 1997)
(=**Dicastribates** J. y P. Balogh, 1988)
Plasmobatidae Grandjean, 1961
- **Malgachebates** Fernández, Cleva y Theron, 2011
- **Orbiculobates** Grandjean, 1961
- **Plasmobates** Grandjean, 1929
- **Solenozetes** Grandjean, 1931

Neoliodoidea Sellnick, 1928
Neoliodidae Sellnick, 1928

- **Neoliodes** Berlese, 1888
(=**Liodes** Heyden, 1826 *nom. praeoc.*)
(=**Udetaliodes** Jacot, 1929)
- **Platylidodes** Berlese, 1916
- **Poroliodes** Grandjean, 1934
- **Teleliodes** Grandjean, 1934

Plateremaeoidea Trägårdh, 1926
Plateremaeidae Trägårdh, 1926

- **Allodamaeus** Banks, 1947
- **Balogheremaeus** Arillo y Subías, 2006
- **Calipteremaeus** Paschoal, 1987
- **Lopheremaeus** Paschoal, 1988
- **Paralopheremaeus** Paschoal, 1987
- **Plateremaeus** Berlese, 1908
Pheroliodidae Paschoal, 1987
- **Lopholiodes** Paschoal, 1987
(=**Octoliodes** Paschoal, 1987)
- **Lyrifissiella** Paschoal, 1989
- **Malgacheliodes** Fernández y Cleva, 2010
- **Nooliodes** Paschoal, 1989
- **Pheroliodes** Grandjean, 1931
(=**Andesperuviella** Paschoal, 1989)
(=**Hammeriella** Paschoal, 1989 *nom. praeoc.*)
(=**Neonooliodes** Hunt, 1996)
(=**Paschoalia** Subías, 2004)
(=**Pedrocortesia** Hammer, 1958)
Licnodamaeidae Grandjean, 1954
- **Flammaeremaeus** Balogh, 1968
- **Hexachaetoniella** Paschoal, 1987
- **Licnodamaeolus** Covarrubias, 1998
- **L. (Nacunansella)** Fernández y Cleva, 1998
- **Licnodamaeus** Grandjean, 1931
- **Licnoliodes** Grandjean, 1931
- **Novazelandiella** Paschoal, 1989
(=**Darthvaderum** Hunt, 1996)
(=**Labiogena** Hunt, 1996)
- **Pedrocortesia** Hammer, 1961
(=**Acupedicellus** Hunt y Lee, 1995)
Licnobelbidae Grandjean, 1965
- **Flabellobelba** Pérez-Íñigo, 1995
- **Licnobelba** Grandjean, 1931

Gymnodamaeidea Grandjean, 1954
Gymnodamaeidae Grandjean, 1954

- **Adrodamaeus** Paschoal, 1984
(=**Heterodamaeus** Woolley, 1957 *nom. praeoc.*)
- **Arthrodamaeus** Grandjean, 1954
- **Gymnodamaeus** Kulczynski, 1902
(=**Donjohnstonella** Walter, 2009)
(=**Heterodamaeus** Ewing, 1917)
(=**Johnstonella** Paschoal, 1983)
(=**Odontodamaeus** Paschoal, 1982)

- (=Pleodamaeus Paschoal, 1983)
- **Jacotella** Banks, 1947
- **Joshuella** Wallwork, 1972
- (=Nortonella Paschoal, 1982 *nom. praeoc.*)
- (=Paschoalia Özdikmen, 2008 *nom. praeoc.*)
- (=Roynortonella Walter, 2009)
- **Plesiodamaeus** Grandjean, 1954
- Aleurodamaeidae Paschoal y Johnston, 1985
- **Aleurodamaeus** Grandjean, 1954
- (=Trichodamaeus Mahunka, 1984)
- **Austrodamaeus** Balogh y Mahunka, 1981
- (=Idiodamaeus Paschoal, 1984)

Damaeioidea Berlese, 1896

Damaeidae Berlese, 1896

- **Acanthobelba** Enami y Aoki, 1993
- **Belba** Heyden, 1826
- **B. (Caenobelba)** Norton, 1980
- **Belbodamaeus** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- **B. (Lanibelba)** Norton, 1980
- **B. (Protobelba)** Norton, 1979
- **Damaeus** Koch, 1835
- (=Hypodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957)
- **D. (Adamaeus)** Norton, 1977
- **D. (Epidamaeus)** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- **D. (Eudamaeus)** Pérez-Íñigo, 1987
- **D. (Kunstidamaeus)** Miko, 2006
- **D. (Paradamaeus)** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- **D. (Spatiodamaeus)** Bulanova-Zachvatkina, 1957
- **Dameobelba** Sellnick, 1928
- **Metabelba** Grandjean, 1936
- **M. (Neobelba)** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- (=Pateribelba Mourek, Miko y Bernini, 2011)
- **Metabelbella** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- (=Allobelba Kunst, 1961)
- **Nortonbelba** Bernini, 1980
- **Parabelbella** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- (=Akrodamaeus Norton, 1979)
- (=Heterodamaeus Mihelčič, 1964 *nom. praeoc.*)
- (=Mirobelba Pérez-Íñigo y Peña, 1994)
- **P. (Nododamaeus)** Hammer, 1977
- (=Dasybelba Woolley e Higgins, 1979)
- **P. (Tectodamaeus)** Aoki, 1984
- **Porobelba** Grandjean, 1936
- **Subbelba** Bulanova-Zachvatkina, 1967
- **S. (Dyobelba)** Norton, 1979
- **S. (Quatobelba)** Norton, 1980
- **Tamdamaeus** Miko y Ermilov, 2017
- **Weigmannia** Miko y Norton, 2010

Polypterozetoidea Grandjean, 1959

Polypterozetidae Grandjean, 1959

- **Polypterozetes** Berlese, 1916
- Podopterozetidae Piffel, 1972
- **Podopterozetes** Aoki, 1969

Eutegaeioidea Balogh, 1965

Compactozetidae Luxton, 1988

- **Cepheus** Koch, 1835
- (=Pelonia Grube, 1859)
- **Compactozetes** Hammer, 1966
- **Conoppia** Berlese, 1908
- (=Balzania Jacot, 1929)
- (=Phyllotegeus Berlese, 1913)
- **Eupterozetes** Berlese, 1916
- (=Diodontocephus Mihelčič, 1958)
- **Hypocephus** Krivolusky, 1971

- **Ommatocephus** Berlese, 1913
- **Oribatodes** Banks, 1895
- **Pilocephus** Pérez-Íñigo, 1992
- **Protocephus** Jacot, 1928
- **Reticulocephus** Vasiliu y Călugăr, 1977
- (=Cubacephus Balogh y Mahunka, 1979)
- (=Geocephus Sitnikova, 1979)
- **Sadocephus** Aoki, 1965
- (=Hamotegeus Balogh y Mahunka, 1969)
- **Sphodrocephus** Woolley e Higgins, 1963
- **Tereticephus** S. y F. Bernini, 1990
- **Tikizetes** Hammer, 1967
- **Tritegeus** Berlese, 1913

Cerocephidae Mahunka, 1986

- **Bornebuschia** Hammer, 1966
- **Cerocephus** Trägårdh, 1931
- **Dicrotegeus** Luxton, 1988
- Eutegaeidae Balogh, 1965
- **Atalotegaeus** Luxton, 1988
- **Birotegeus** Luxton, 1988
- **Dudichella** Balogh, 1970
- **Eutegaeus** Berlese, 1916
- **Neoeutegaeus** Aoki, 1964
- **Neseutegaeus** Woolley, 1965
- **Pareutegaeus** Woolley, 1965
- **Porrhotegeus** Balogh y Mahunka, 1966
- **Pterozetes** Hammer, 1966
- Salvidae Özdikmen, 2008
- **Salvus** Özdikmen, 2008
- (=Brazilobates Koçak y Kemal, 2008 *nom. praeoc.*)
- (=Pterobates Balogh y Mahunka, 1977 *nom. praeoc.*)
- Nodocephidae Piffel, 1972
- **Nemacephus** Aoki, 1968
- **Nodocephus** Hammer, 1958
- Tumerozetidae Hammer, 1966
- **Tumerozetes** Hammer, 1966

Gustavioidea Oudemans, 1900

Astegistidae Balogh, 1961

- **Astegistes** Hull, 1916
- (=Cultrozetes Sellnick, 1922)
- **Cultroribula** Berlese, 1908
- **Furcoppia** Balogh y Mahunka, 1966
- **F. (Mexicoppia)** Mahunka, 1983
- **Furcoribula** Balogh, 1943
- **Lamellozetes** Covarrubias, 1967
- **Maorizetes** Hammer, 1966
- **Monofurcoppia** Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995
- **Quadroribula** J. y P. Balogh, 1992
- **Sulcoribula** Hammer, 1971
- Multoribulidae Balogh, 1972
- **Multoribula** Balogh y Mahunka, 1966
- **Peloptoribula** Mahunka, 1984
- Ceratoppiidae Kunst, 1971
- **Amazoppia** Balogh y Mahunka, 1969
- **Austroceratoppia** Hammer, 1979
- **Ceratoppia** Berlese, 1908
- (?=Notaspis Hermann, 1804 *gen. inq.*)
- **Ceratorchestes** Balogh y Mahunka, 1969
- **C. (Paraceratorchestes)** Ermilov y Kalúz, 2012
- **Comeremaes** Hammer, 1962
- **Dendrozetes** Aoki, 1970
- **Macquarioppia** Wallwork, 1964
- (=Macquariella Wallwork, 1963 *nom. praeoc.*)
- **Metapyroppia** Woolley, 1969
- **Negropia** Vasiliu y Călugăr, 1977
- **Notoppia** Balogh y Mahunka, 1966

- **Paraceratoppia** Rjabinin, 1982
- **Parapyroppia** Pérez-Íñigo y Subías, 1979
- **Pseudoceratoppia** Hammer, 1962
(=**Hauseroceratoppia** Mahunka, 1980)
- **Pseudopyroppia** Rjabinin, 1987
- **Pyroppia** Hammer, 1955
- **Trichoppia** Balogh, 1961
Metrioppiidae Balogh, 1943
- **Ceratoppiella** Hammer, 1977
- **Metrioppia** Grandjean, 1931
(=**Peloppia** Sellnick, 1931)
- **Paenoppia** Woolley e Higgins, 1965
Gustaviidae Oudemans, 1900
- **Gustavia** Kramer, 1879
(=**Neozetes** Berlese, 1885)
(=**Serrarius** Michael, 1883)
Liacaridae Sellnick, 1928
- **Adoristes** Hull, 1916
- **A. (Gordeevella)** Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010
- **Birsteinus** Krivolutsky, 1965
- **Liacarus** Michael, 1898
(=**Leiosoma** Nicolet, 1855 *nom. praeoc.*)
(=**Leuroxenillus** Woolley e Higgins, 1966)
(=**Stenoxenillus** Woolley e Higgins, 1966)
- **L. (Dorycranosus)** Woolley, 1969
- **L. (Procorynetes)** Woolley, 1967
- **L. (Rhaphidosus)** Woolley, 1969
- **Opsioristes** Woolley, 1967
- **Planoristes** Iturrondobeitia y Subías, 1978
- **Scarabacarus** Shtanchaeva y Subías, 2010
Xenillidae Woolley e Higgins, 1966
- **Choixenillus** Subías, 2016
- **Neoxenillus** Fujikawa, 2004
- **Xenilloides** Pérez-Íñigo y Baggio, 1989
- **Xenillus** Robineau-Desvoidy, 1839
(=**Banksia** Oudemans y Voigts, 1905)
(=**Dinoxenillus** Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)
(=**Kochia** Oudemans, 1900)
(=**Pseudocephus** Jacot, 1928)
- **X. (Stonyxenillus)** Woolley e Higgins, 1966
Tenuialidae Jacot, 1929
- **Ceratotenuiala** Aoki y Maruyama, 1983
- **Hafenferreffia** Jacot, 1939
(=**Hafenferrefiella** Sellnick, 1952)
- **Hafenrefferia** Oudemans, 1906
- **Peltenuiala** Norton, 1983
- **Tenuiala** Ewing, 1913
- **Tenuialoides** Woolley e Higgins, 1966

Niphocephoidea Travé, 1959
Niphocephoidea Travé, 1959
- **Niphocephus** Balogh, 1943

Zetorchestoidea Michael, 1898
Zetorchestidae Michael, 1898
- **Belorchestes** Grandjean, 1951
- **Litholestes** Grandjean, 1951
- **Microzetorchestes** Balogh, 1943
(=**Diorchestes** Grandjean, 1951)
- **Saxicolestes** Grandjean, 1951
- **Strenzkea** Travé, 1967
- **Zetorchestes** Berlese, 1888
(=**Leptorchistis** Canestrini y Berlese, 1885 *nom. praeoc.*)
(=**Phyllorchestes** Mahunka, 1983)

Eremaeoidea Oudemans, 1900
- **Anderemaeus** Hammer, 1958
- **Caleremaeus** Berlese, 1910
- **Cristeremaeus** Balogh y Csizsár, 1963
- **Epiereumus** Berlese, 1916
(=**Carabodoides** Jacot, 1937)
- **Luxtoneremaeus** J. y P. Balogh, 1992
- **Megeremaeus** Higgins y Woolley, 1965
- **Veloppia** Hammer, 1955
- **Yungaseremaeus** Balogh y Mahunka, 1969
Aribatidae Aoki, Takaku e Ito, 1994
- **Aribates** Aoki, Takaku e Ito, 1994
Kodiakellidae Hammer, 1967
- **Kodiakella** Hammer, 1967
Eremaeidae Oudemans, 1900
- **Asperemaeus** Behan-Pelletier, 1982
- **Carinabella** Hammer, 1977
- **Caucaseremaeus** Subías y Shtanchaeva, 2006
- **Eremaeus** Koch, 1835
- **Euereumus** Mihelčič, 1963
(=**Kartoeremaeus** Higgins, 1979)
- **Tricheremaeus** Berlese, 1908
Oribellidae Kunst, 1971
- **Kaszabobates** Balogh, 1972
(=**Gobiella** Balogh y Mahunka, 1965 *nom. praeoc.*)
- **Oribella** Berlese, 1908
(=**Infernobates** Karppinen y Poltavskaja, 1990)
- **Pantelozetes** Grandjean, 1953
- **P. (Montizetes)** Kunst, 1971
- **P. (Oribellopsis)** Kunst, 1971
(=**Gemmazetes** Fujikawa, 1979)
- **Proteremaeus** Piffel, 1965
(=**Sibiremaeus** Rjabinin y Krivolutsky, 1975)

Ameroidea Bulanova-Zachvatkina, 1957
Ctenobelbidae Grandjean, 1965
- **Ctenobelba** Balogh, 1943
(=**Elapheremaeus** Grandjean, 1943)
- **C. (Aokibelba)** Subías y Shtanchaeva, 2013
- **C. (Berndamerus)** Mahunka, 1977
- **C. (Bifurcobelba)** Subías y Shtanchaeva, 2010
- **C. (Caucasiobelba)** Subías y Shtanchaeva, 2010
Amerobelbidae Grandjean, 1961
- **Amerobelba** Berlese, 1908
- **Hellenamerus** Mahunka, 1974
- **Mongaillardia** Grandjean, 1961
- **Rastellobata** Grandjean, 1961
- **Roynortonia** Ermilov, 2011
Eremulidae Grandjean, 1965
- **Austroeremulus** Mahunka, 1985
- **Caveremulus** Mahunka, 1983
(=**Berndbella** Mahunka, 1985)
- **Eremulus** Berlese, 1908
- **Mahunkana** Koçak y Kemal, 2008
(=**Fenestrella** Mahunka, 1987 *nom. praeoc.*)
- **Pseuderemulus** Balogh y Mahunka, 1968
- **Reteremuloides** Mahunka, 1989
- **Reteremulus** Balogh y Mahunka, 1966
Damaeolidae Grandjean, 1965
- **Caudamaeolus** P. Balogh, 1988
- **Damaeolus** Paoli, 1908
- **Fosseremus** Grandjean, 1954
- **Gressittolus** Balogh, 1970
(=**Fijirella** Hammer, 1971)
Hungarobelbidae Miko y Travé, 1996
- **Costeremus** Aoki, 1970
- **Hungarobelba** Balogh, 1943

- Eremobelbidae Balogh, 1961
- **Eremobelba** Berlese, 1908
- Heterobelbidae Balogh, 1961
- **Furcodamaeus** Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
 - **Haplobelba** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Heterobelba** Berlese, 1913
- Basilobelbidae Balogh, 1961
- **Basilobelba** Balogh, 1958
 - (=**Hammatum** Grandjean, 1959)
 - **Xiphobelba** Csiszár, 1961
- Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957
- **Amerus** Berlese, 1896
 - **A. (Neamerus)** Willmann, 1939
 - **Andesamerus** Hammer, 1962
 - **Caenosamerus** Higgins y Woolley, 1969
 - **Ctenamerus** J. y P. Balogh, 1992
 - **Haplamerus** J. y P. Balogh, 1992
 - **Hymenobelba** Balogh, 1962
 - **Pteramerus** Balogh, 1964
- Oxyameridae Aoki, 1965
- **Oxyamerus** Aoki, 1965
- Platyameridae J. y P. Balogh, 1983
- **Gymnodampia** Jacot, 1937
 - (=**Cristamerus** Hammer, 1977)
 - (=**Defectamerus** Aoki, 1984)
 - **Platyamerus** J. y P. Balogh, 1983
- Staurobotidae Grandjean, 1966
- **Staurobotes** Grandjean, 1966
 - **Stauroma** Grandjean, 1966
- Spinozetidae Balogh, 1972
- **Grypoceramerus** Suzuki y Aoki, 1970
 - **Iberoppia** Pérez-Íñigo, 1986
 - **Spinozetes** Piffel, 1966
 - (=**Mirus** Kulijev, 1967)
 - **Yambaramerus** Aoki, 1996
- Oppioidea Sellnick, 1937
- Arceremaeidae Balogh, 1972
- **Arceremaeus** Hammer, 1961
 - **Tecteremaeus** Hammer, 1961
- Machadobelbidae Balogh, 1972
- **Machadobelba** Balogh, 1958
 - **Ramogneta** Karppinen, 1966
- Rioppiidae Balogh y Mahunka, 1977
- **Rioppia** Balogh y Mahunka, 1977
- Decoroppiidae Mahunka, 2009
- **Decoroppia** Mahunka, 2009
- Autognetidae Grandjean, 1960
- **Austrogneta** Balogh y Csiszár, 1963
 - **Autogneta** Hull, 1916
 - **A. (Conchogneta)** Grandjean, 1963
 - **A. (Rhaphigneta)** Grandjean, 1960
 - **Cosmogneta** Grandjean, 1960
 - **Eremobodes** Jacot, 1937
 - **Parautogneta** Golosova, 1974
 - **Triautogneta** Fujikawa, 2009
- Thyrisomidae Grandjean, 1953
- **Banksinoma** Oudemans, 1930
 - (=**Thyrisoma** Grandjean, 1953)
- Oppiidae Sellnick, 1937
- Antilloppiinae* Mahunka, 1985
- **Joboppia** Ruiz, Mínguez y Subías, 1988
 - **Neoppia** Bhattacharya y Banerjee, 1981
 - (=**Antilloppiinae** Mahunka, 1985)
- Paternoppiinae* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000
- **Paternoppia** Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000
- Lanceoppiinae* Balogh, 1983
- **Acutoppia** Balogh, 1983
 - **Basiloppia** Balogh, 1983
 - **Chavinia** Hammer, 1961
 - **Cycloppia** Balogh, 1983
 - **Drepanoppia** Balogh, 1983
 - **Geminoppia** J. y P. Balogh, 1983
 - **Globoppia** Hammer, 1962
 - **Laminoppia** Hammer, 1968
 - **Lanceoppia** Hammer, 1962
 - **L. (Baioippia)** Luxton, 1985
 - **L. (Bicristoppia)** Subías, 1989
 - **L. (Convergoppia)** Balogh, 1983
 - **L. (Hamoppia)** Hammer, 1968
 - **L. (Lancelalmoppia)** Subías, 1989
 - (=**Radamoppia** Mahunka, 1994)
 - **Loboppia** Balogh, 1983
 - **Membranoppia** Hammer, 1968
 - (=**Nesoppia** Luxton, 1985)
 - **M. (Pravoppia)** Luxton, 1985
 - **Operculoppia** Hammer, 1968
 - **Otoppia** Balogh, 1983
 - **Polyoppia** Hammer, 1968
 - **Processoppia** Balogh, 1983
 - (=**Rhaphoppia** Balogh, 1983)
 - **Pustuloppia** Mahunka, 1994
 - **Setoppia** Balogh, 1983
 - (=**Tectoppiella** Mahunka, 1984)
 - **Trematoppia** Balogh, 1964
- Nosybelbinae* Mahunka, 1994
- **Nosybelba** Mahunka, 1994
- Oppiinae* Sellnick, 1937
- **Aeroppia** Hammer, 1961
 - (=**Paraeroppia** Sanyal, 2009)
 - **Aethioppia** Balogh, 1983
 - **Afroppia** Koçak y Kemal, 2008
 - (=**Xenoppia** Mahunka, 1982 *nom. praeoc.*)
 - **Amerioppia** Hammer, 1961
 - **Coetzella** Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2107
 - **Erioppia** Balogh, 1983
 - **Exanthoppia** J. y P. Balogh, 1983
 - **Fusuloppia** Balogh, 1983
 - **Goyoppia** Balogh, 1983
 - **Heteroppia** Balogh, 1970
 - **H. (Tanzoppia)** Mahunka, 1988
 - **Laroppia** Subías, 1989
 - **Lasiobelba** Aoki, 1959
 - (=**Cilioppia** Balogh, 1983)
 - **L. (Antennoppia)** Mahunka, 1983
 - (=**Daedaloppia** Hauser y Mahunka, 1983)
 - **Lemuroppia** Mahunka, 1994
 - **Neoamerioppia** Subías, 1989
 - **N. (Amerigloboppia)** Subías, 1989
 - **Niloppia** Balogh, 1983
 - **Oligoppia** Balogh, 1983
 - **Oppia** Koch, 1836
 - (=**Dameosoma** Berlese, 1892)
 - **Paroppia** Hammer, 1968
 - **Plurित्रichoppia** Subías y Arillo, 1989
 - **Pseudomultioppia** Subías, 2018
 - **Quinquoppia** Tseng, 1982
 - (=**Damaeoppia** Ohkubo, 1995)
 - **Sphagnoppia** J. y P. Balogh, 1986
 - **Taiwanoppia** Tseng, 1982
 - (=**Vietoppia** Mahunka, 1988)
 - **T. (Paragloboppia)** Subías, 1989
 - **Tectoppia** Wallwork, 1961
- Multioppiinae* Balogh, 1983

- **Anomaloppia** Subías, 1978
- **Condyloppia** Balogh, 1983
- **Cryptoppia** Csiszár, 1961
- **Cubaoppia** Balogh, 1983
- **Graptoppia** Balogh, 1983
(=**Frondooppia** Mahunka, 1983)
- **G. (Apograptoppia)** Subías y Rodríguez, 1985
- **G. (Stenoppia)** Balogh, 1983
- **Helioppia** Balogh, 1983
- **Intermedioppia** Subías y Rodríguez, 1987
- **Javieroppia** Mínguez y Subías, 1986
- **Multioppia** Hammer, 1961
- **M. (Furculoppia)** Balogh, 1983
- **M. (Hammeroppia)** Vasiliu e Ivan, 2009
- **M. (Multilanceoppia)** Subías, 1989
- **Octoppia** Balogh y Mahunka, 1969
- **Paramusella** Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
- **Pseudoamerioppia** Subías, 1989
(=**Minoricoppia** Pérez-Íñigo Jr., 1991)
- **Pulchroppiella** Balogh, 1983
- **Ramonoppia** Morell, 1990
- **Ramusella** Hammer, 1962
(=**Alcioppia** Balogh, 1983)
(=**Amolops** Hull, 1916 *nom. praeoc.*)
(=**Bioppia** Mahunka y Paoletti, 1984)
- **R. (Insculptoppia)** Subías, 1980
- **R. (Insculptoppiella)** Subías y Rodríguez, 1986
- **R. (Rectoppia)** Subías, 1980
- **R. (Sabahoppia)** Mahunka, 1987
- **Ramuselloppia** Subías y Rodríguez, 1986
- **Sceletoppia** Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
- **Tainsculptoppia** Subías y Shtanchaeva, 2011
- **Uroppia** Balogh, 1983
Pulchroppiinae Balogh, 1983
- **Multipulchroppia** Subías, 1989
- **Pulchroppia** Hammer, 1979
Arcoppiinae Balogh, 1983
- **Arcoppia** Hammer, 1977
(=**Chuoppia** Tseng, 1982)
- **Basidoppia** Mahunka, 1983
- **Mimoppia** Balogh, 1983
- **M. (Dysarcoppia)** Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
- **Porrhoppia** Balogh, 1970
- **Similoppia** Mahunka, 1983
- **S. (Reductoppia)** P. Balogh, 1984
- **Wallworkoppia** Subías, 1989
(=**Wallworkella** Balogh, 1983 *nom. praeoc.*)
Brachioppiinae Subías, 1989
- **Austroppia** Balogh, 1983
- **Brachioppia** Hammer, 1961
- **Brachioppiella** Hammer, 1962
(=**Ugandoppia** Mahunka, 1988)
- **B. (Gressittoppia)** Balogh, 1983
(=**Jermymia** Mahunka, 2002)
- **Brassoppia** Balogh, 1983
- **B. (Plaesioppia)** Balogh, 1983
- **Ctenoppia** Balogh, 1983
- **Gittella** Hammer, 1961
- **Kokoppia** Balogh, 1983
- **Leptoppia** Mahunka, 1997
- **Pletzenoppia** Balogh, 1983
- **Setuloppia** Balogh, 1983
- **Trapezoppia** Balogh y Mahunka, 1969
Medioppiinae Subías y Mínguez, 1985
- **Congoppia** Balogh, 1983
- **Discoppia** Balogh, 1983
- **D. (Cylindroppia)** Subías y Rodríguez, 1986
- **Medioxyoppia** Subías, 1989
- **Microppia** Balogh, 1983
- **Miroppia** Hammer, 1968
- **Multimedioppia** Subías, 1991
- **Quattoppiella** Hugo-Coetzee, 2014
- **Ramuloppia** Balogh, 1961
- **Rhinoppia** Balogh, 1983
(=**Kunoppia** Mahunka, 1987)
(=**Medioppia** Subías y Mínguez, 1985)
- **R. (Paramedioppia)** Mahunka y Mahunka-Papp, 2000
(=**Bipectinoppia** Subías y Shtanchaeva, 2011)
- **Serratoppia** Subías y Mínguez, 1985
- **Solenoppia** Hammer, 1968
- **S. (Campbelloppia)** Luxton, 1985
Oppiellinae Seniczak, 1975
- **Abchasiella** Gordeeva y Tarba, 1990
- **Belloppia** Hammer, 1968
- **Berniniella** Balogh, 1983
- **B. (Canaloppia)** Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
- **Dissorhina** Hull, 1916
(=**Cosmoppia** Balogh, 1983)
- **Elaphoppia** Balogh, 1983
(=**Parasyntoppia** Aoki, 1983)
- **Hypogeoppia** Subías, 1981
- **Kulievia** Vasiliu e Ivan, 1999
- **Lauroppia** Subías y Mínguez, 1986
(=**Ctenoppiella** Gordeeva y Karppinen, 1988)
- **Liacaroppia** Subías y Rodríguez, 1986
- **Moritzoppia** Subías y Rodríguez, 1988
(=**Moritzella** Balogh, 1983 *nom. praeoc.*)
(=**Tetroppia** Gordeeva, 1999)
- **Neostrinatina** Mahunka, 1980
- **Neotrichoppia** Subías e Iturrondobeitia, 1980
- **N. (Ancestroppia)** Subías y Rodríguez, 1986
- **N. (Confinoppia)** Subías y Rodríguez, 1986
- **Oppiella** Jacot, 1937
- **O. (Moritzoppiella)** Gordeeva, 2000
(=**Dentoppia** Gordeeva, 2001)
(=**Drukoppia** Gordeeva, 2001)
- **O. (Perspicuoppia)** Pérez-Íñigo, 1971
- **Pseudobrachioppiella** Tseng, 1982
- **Ptiloppia** Balogh, 1983
- **Tripiloppia** Hammer, 1968
(=**Autoppia** Golosova y Karppinen, 1983)
- **Tuberoppia** Golosova, 1974
Oxyoppiinae Subías, 1989
- **Acroppia** Balogh, 1983
- **Baloghoppia** Mahunka, 1983
- **Foraminoppia** Subías y Arillo, 1998
- **Fossoppia** Mahunka, 1994
- **F. (Multifossoppia)** Subías, 2017
- **Foveolattoppia** Mahunka, 1988
- **Lineoppia** J. y P. Balogh, 1983
- **Mahunkella** Balogh, 1983
- **Oxybrachioppia** Subías, 1989
- **Oxymystroppia** Subías y Shtanchaeva, 2011
- **Oxyoppia** Balogh y Mahunka, 1969
- **O. (Aciculoppia)** Subías y Rodríguez, 1986
- **O. (Dzarogneta)** Kulijev, 1978
(=**Fineoppia** Khanbekyan y Gordeeva, 1991)
(=**Pectinoppia** Subías y Rodríguez, 1986)
- **O. (Oxyoppiella)** Subías y Rodríguez, 1986
- **Oxyoppioides** Subías y Mínguez, 1985
- **Sacculoppia** Balogh y Mahunka, 1968
- **Separatoppia** Mahunka, 1983
- **Subiasella** Balogh, 1983
- **S. (Dividoppia)** Mahunka, 1987

- **S. (Lalmoppia)** Subías y Rodríguez, 1986
(=Cassioppia Poltavskaya, 1994)
(=Pararectoppia Mahunka, 1987)
- **S. (Lucioppia)** Mahunka, 1985
- **S. (Paralalmoppia)** Subías y Shtanchaeva, 2012
Mystroppiinae Balogh, 1983
- **Cheloppia** Hammer, 1971
- **Corynoppia** Balogh, 1983
- **Karenella** Hammer, 1962
- **K. (Glabroppia)** Subías y Rodríguez, 1986
- **K. (Stakarenoppia)** Subías y Rodríguez, 1986
- **Mystroppia** Balogh, 1959
- **Rugoppia** Mahunka, 1986
(=Mahnertella Mahunka, 1997)
- **Stachyoppia** Balogh, 1961
- **Striatoppia** Balogh, 1958
Epimerellidae Ayyildiz y Luxton, 1989
- **Enisella** Ayyildiz y Luxton, 1989
- **Epimerella** Kulijev, 1967
- **Luxtonia** Mahunka, 2001
Lyropiidae Balogh, 1983
- **Lyropia** Balogh, 1961
Granuloppiidae Balogh, 1983
- **Enantioppia** Balogh y Mahunka, 1969
- **Gigantoppia** Mahunka, 2008
- **Granuloppia** Balogh, 1958
(=Pocsoppia Mahunka, 1984)
- **Hammerella** Balogh, 1983
- **H. (Bornemiszaella)** P. Balogh, 1994
- **H. (Interoppia)** Mahunka, 1987
- **H. (Parawoasella)** Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2012
- **H. (Varioppia)** Mahunka, 1985
(=Woasella J. y P. Balogh, 2002)
- **Senectoppia** Aoki, 1976
(=Macrosoma Hammer, 1979)
Teratoppiidae Balogh, 1983
- **Granuloteratoppia** P. Balogh, 1988
- **Leoppia** Pérez-Íñigo, 1983
- **L. (Brasiloppia)** Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
- **Teratoppia** Balogh, 1959
(=Cretoppia Mahunka, 1986)
- **T. (Teratoppiella)** Balogh, 1983
Sternoppiidae Balogh y Mahunka, 1969
- **Sternoppia** Balogh y Mahunka, 1968
(=Synoppia Balogh y Mahunka, 1969)
Machuellidae Balogh, 1983
- **Gredosella** Gil-Martín, Arillo y Subías, 2000
- **Machuella** Hammer, 1961
Papillonotidae Balogh, 1983
- **Papillonotus** Wallwork, 1961
Tuparezetidae Balogh, 1972
- **Tuparezetes** Spain, 1969
Quadropiidae Balogh, 1983
- **Borhidia** Balogh y Mahunka, 1974
- **Hexoppia** Balogh, 1958
- **Quadropia** Jacot, 1939
- **Q. (Coronoquadropia)** Ohkubo, 1995
Trizetoidea Ewing, 1917
Cuneoppiidae Balogh, 1983
- **Cuneoppia** Balogh y Mahunka, 1969
Suctobelbidae Jacot, 1938
- **Allosuctobelba** Moritz, 1970
- **A. (Helvetobelba)** Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
- **Coartobelba** Mahunka, 2001
- **Condylobelba** Mahunka, 2001
- **Fenestrobilba** Balogh, 1970
- **Interbelba** Mahunka y Mahunka-Papp, 2012
- **Kuklosuctobelba** Chinone, 2003
- **K. (Niosuctobelba)** Chinone, 2003
- **Neosuctobelba** Balogh y Mahunka, 1969
- **Novosuctobelba** Hammer, 1977
- **N. (Leptosuctobelba)** Chinone, 2003
(=Madabelba Mahunka, 2009)
(=Nasobelba Mahunka, 2005)
- **N. (Suctobelboides)** Pankov, 1997
- **Parasuctobelba** Hammer, 1977
- **Parisuctobelba** Higgins y Woolley, 1976
- **Persuctobelba** Mahunka, 2000
- **Rhynchobelba** Willmann, 1953
(=Rhinosuctobelba Woolley e Higgins, 1969)
- **Rhynchoppia** Balogh, 1968
- **Serratobelba** Mahunka, 1984
- **Sucteremaeus** Golosova y Krivolutsky, 1975
(=Kathetosuctobelba Chinone, 2003)
- **Suctobelba** Paoli, 1908
- **Suctobelbata** Gordeeva, 1991
(=Unicobelba Mahunka y Mahunka-Papp, 1999)
- **Suctobelbella** Jacot, 1937
- **S. (Flagrosuctobelba)** Hammer, 1979
- **S. (Ussuribata)** Rjabinin, 1975
(=Bruneibelba Mahunka, 2001)
(=Discosuctobelba Hammer, 1979)
- **Suctobelbila** Jacot, 1937
(=Reticobella Hammer, 1962)
(=Rhynchobella Hammer, 1961)
(=Suctoppia Balogh, 1958)
- **Suctobelbiloides** Mahunka, 1988
- **Zeasuctobelba** Hammer, 1966
Rhynchoribatidae Balogh, 1961
- **Eurhynchoribates** Miko, 2016
- **E. (Orinchobates)** Miko, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
- **Rhynchoribates** Grandjean, 1929
- **R. (Parhynchoribates)** Miko, 2016
- **R. (Rhynchoribatodes)** Miko, 2016
- **R. (Tectorhynchoribates)** Miko, 2016
- **Suctoribates** Balogh, 1963
Trizetidae Ewing, 1917
- **Trizetes** Berlese, 1904
Otocephoidea Balogh, 1961
Dampfiellidae Balogh, 1961
- **Beckiella** Grandjean, 1964
- **Dampfiella** Sellnick, 1931
Tetracondylidae Aoki, 1961
- **Afrotocephus** Mahunka, 1985
- **A. (Didierotocephus)** Mahunka, 1994
- **Borneremaeus** Mahunka, 1991
- **Bulbocephus** Mahunka, 1988
- **Carabocephus** Berlese, 1910
- **Cavernocephus** Balogh y Mahunka, 1969
- **Dolicheremaeus** Jacot, 1938
(=Dicondyla Aoki, 1965)
(=Tetracondyla Newell, 1956)
- **Fernandocephus** Mahunka, 1982
- **Fissicephus** Balogh y Mahunka, 1967
- **F. (Psammocephus)** Aoki, 1970
- **Flagellocephus** P. Balogh, 1984
- **Hydroecephus** Corpuz-Raros, 1979
- **Leptotocephus** Balogh, 1961
- **Longocephus** Balogh y Mahunka, 1966
- **Lophotocephus** J. y P. Balogh, 1983
- **Neotrichocephus** Hammer, 1973

- **Papillocephus** Balogh y Mahunka, 1966
(=Clavazetes Hammer, 1966)
 - **Paradolicheremaus** Tseng, 1982
 - **Pentacephus** Corpuz-Raros, 2004
 - **Plenotocephus** Hammer, 1966
 - **P.** (**Neotocephus**) Hammer, 1966
 - **Pseudotocephus** Balogh, 1961
(=Constrictocephus Grobler, 1998)
(=Nesotocephus Hammer, 1972)
 - **Seboetocephus** Mahunka, 1985
 - **Spinotocephus** Hammer, 1981
 - **Trichocephus** Balogh y Mahunka, 1966
 - **Trichocondyla** J. y P. Balogh, 1986
 - **Umashtanchaeviella** Ermilov, Anichkin y Tolstikov, 2014
- Otocephelidae Balogh, 1961
- **Basiceramerus** Corpuz-Raros, 1979
 - **Eurostocephus** Aoki, 1965
 - **E.** (**Cerostocephus**) Mahunka, 1973
 - **Ikarotocephus** Mahunka, 1988
 - **Kalayaan** Corpuz-Raros, 1998
 - **K.** (**Rimandocephus**) Corpuz-Raros, 1998
 - **Megalotocephus** Aoki, 1965
 - **M.** (**Archegotocephus**) Mahunka, 1988
 - **Ocellotocephus** Mahunka, 1989
 - **Otocephus** Berlese, 1905
 - **O.** (**Acrotocephus**) Aoki, 1965
 - **O.** (**Hexatocephus**) Wen, 1993
 - **Otopentacephus** Corpuz-Raros, 2007
 - **Papuacephus** Balogh, 1968
 - **Philippotocephus** J. y P. Balogh, 1992
 - **Samarocephus** Corpuz-Raros, 1990
 - **S.** (**Kaibacephus**) Corpuz-Raros, 2004
 - **Trichotocephus** Aoki, 1965
- Tokunocephelidae Aoki, 1966
- **Tokunocephus** Aoki, 1966
- Carabodoidea Koch, 1837
Carabodidae Koch, 1837
- **Afticarabodes** Fernández, Theron y Rollard, 2013
 - **Antongilibodes** Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014
 - **Aokiella** Balogh y Mahunka, 1967
 - **Apotomocephus** Aoki, 1965
 - **Archeocephus** Aoki, 1965
 - **Austrocarabodes** Hammer, 1966
 - **A.** (**Balghodes**) Mahunka, 1986
 - **A.** (**Uluguroides**) Mahunka, 1983
(=Ngorongobodes J. y P. Balogh, 1992)
 - **Bathocephus** Aoki, 1978
(=Philippobodes J. y P. Balogh, 1992)
 - **Bovicarabodes** Fernández, Theron y Rollard, 2013
 - **Bunabodes** Fujikawa, 2004
 - **Carabodes** Koch, 1835
(=Neocephus Willmann, 1936)
(=Tegeocranus Nicolet, 1855)
 - **C.** (**Flexa**) Kulijev, 1977
 - **C.** (**Klapperiches**) Mahunka, 1979
 - **C.** (**Phyllocarabodes**) Balogh y Mahunka, 1969
(=Antillobodes Mahunka, 1985)
(=Pentabodes P. Balogh, 1984)
 - **Cavaecarabodes** Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
 - **Cavernocarabodes** Mahunka, 1974
 - **Ceylobodes** J. y P. Balogh, 1992
 - **Chistyakovella** Ermilov, Aoki y Anichkin, 2013
 - **Congocephus** Balogh, 1958
- **C.** (**Fernandezbodes**) Subías, 2018
 - **Cubabodes** Balogh y Mahunka, 1974
 - **Gibbicephus** Balogh, 1958
(=Diplobodes Aoki, 1958)
 - **G.** (**Gibbibodes**) Mahunka, 1986
 - **G.** (**Kalloia**) Mahunka, 1985
(=Mauribodes J. y P. Balogh, 1992)
 - **G.** (**Neocarabodes**) Balogh y Mahunka, 1969
 - **Gymnobodes** Balogh, 1965
 - **Hardybodes** Balogh, 1970
(=Carabodella Mahunka, 1986)
 - **Machadocephus** Balogh, 1958
 - **M.** (**Sagittabodes**) J. y P. Balogh, 1992
(=Zimbabweae Fernández, Theron y Leiva, 2016)
 - **Malgasodes** Mahunka, 2000
 - **Meriocephus** Aoki, 1973
 - **Odontocephus** Berlese, 1913
 - **O.** (**Indotocephus**) Mondal y Kundu, 1999
 - **Pasocephus** Aoki, 1976
(=Opisthocephus Aoki, 1976)
 - **P.** (**Guineobodes**) Mahunka, 1987
 - **Pseudocarabodes** Mahunka, 1991
(=Bakobodes Mahunka, 1996)
(=Yemenobodes Mahunka, 2000)
 - **Rugocephus** Mahunka, 2009
 - **Singabodes** Mahunka, 1998
 - **Spathulocephus** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Tansocephus** Mahunka, 1983
 - **Tectocarabodes** Mahunka, 1988
 - **Trichocarabodes** Balogh, 1961
 - **Tuberocephus** Balogh y Mahunka, 1969
 - **T.** (**Mangabodes**) Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014
 - **Yoshiobodes** Mahunka, 1986
 - **Y.** (**Berndobodes**) Mahunka, 1986
 - **Y.** (**Dongnaibodes**) Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014
- Nippobodidae Aoki, 1959
- **Leobodes** Aoki, 1965
 - **Nippobodes** Aoki, 1959
- Tectocephoidea Grandjean, 1954
Tectocephelidae Grandjean, 1954
- **Tectocephus** Berlese, 1896
 - **Tegezotes** Berlese, 1913
Tegeocranellidae P. Balogh, 1987
 - **Tegeocranellus** Berlese, 1913
- Charassobatoidea Grandjean, 1958
Microtegeidae Balogh, 1972
- **Microtegeus** Berlese, 1916
 - **Suctotegeus** Mahunka, 1987
Charassobatidae Grandjean, 1958
 - **Charassobates** Grandjean, 1929
Nosybeidae Mahunka, 1993
 - **Lamellocephus** Balogh, 1961
(=Nosybea Mahunka, 1993)
(=Tessacarus Grandjean, 1962)
 - **Topalia** Balogh y Csiszár, 1963
- Hydrozetoidea Grandjean, 1954
Hydrozetidae Grandjean, 1954
- **Hydrozetes** Berlese, 1902
(=Argentinobates Fernández, 1984)
(=Heloribates Grandjean, 1966)
(=Ojaithrus Habeeb, 1982)

- Ameronothroidea Vitzthum, 1943
Ameronothridae Vitzthum, 1943
- **Alaskozetes** Hammer, 1955
 - **Ameronothrus** Berlese, 1896
(= **Hygroribates** Jacot, 1934)
 - **Aquanothrus** Engelbrecht, 1975
 - **Capillibates** Hammer, 1966
 - **Chudalupia** Wallwork, 1981
 - **Halozetes** Berlese, 1916
(= **Anarea** Dalenius, 1958)
(= **Pertorgunia** Dalenius, 1958)
 - **Podacarus** Grandjean, 1955
 - **Pseudantarctica** Balogh, 1970
Selenoribatidae Schuster, 1963
 - **Arotrobates** Luxton, 1992
 - **Carinozetes** Pflingstl y Schuster, 2012
 - **Pseudobates** Luxton, 1992
 - **Schusteria** Grandjean, 1968
 - **Selenoribates** Strenzke, 1961
 - **Thalassozetes** Schuster, 1963
(= **Rhizophobates** Karasawa y Aoki, 2005)
 - **Thaseczetes** Pflingstl, Baumann, Lienhard y Schatz, 2017
Fortuyniidae Hammen, 1963
 - **Alismobates** Luxton, 1992
 - **Circellobates** Luxton, 1992
 - **Fortuynia** Hammen, 1960
 - **Litoribates** Pflingstl y Schatz, 2017
- Cymbaeremaeoidea Sellnick, 1928
Adhaesozetidae Hammer, 1973
- **Adhaesozetes** Hammer, 1966
Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928
 - **Bulleremaeus** Hammer, 1966
 - **Cymbaeremaeus** Berlese, 1896
 - **Glanderemaeus** Balogh y Csiszár, 1963
 - **Scapheremaeus** Berlese, 1910
 - **Seteremaeus** Hammer, 1971
 - **Spineremaeus** Colloff, 2011
Ametroproctidae Subías, 2004
 - **Ametroproctus** Higgins y Woolley, 1968
 - **A. (Coropoculia)** Aoki y Fujikawa, 1972
 - **Scapuleremaeus** Behan-Pelletier, 1989
Eremellidae Balogh, 1961
 - **Archeremella** Balogh y Mahunka, 1974
 - **Eremella** Berlese, 1913
(= **Proteremella** Balogh, 1959)
 - **Licnocephus** Woolley, 1969
 - **Triteremella** Kunst, 1971
(= **Afreremella** Mahunka, 1974)
- PORONOTICAE Grandjean, 1954
- Licneremaeoidea Grandjean, 1954
Dendroeremaeidae Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005
- **Dendroeremaeus** Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005
Micreremidae Grandjean, 1954
 - **Fenichelina** Balogh, 1970
(= **Porofenichelina** Mahunka, 1985)
 - **Mexiceremus** J. y P. Balogh, 1998
 - **Micreremus** Berlese, 1908
 - **Phylleremus** Behan-Pelletier y Walter, 2007
 - **Phylloribatula** Balogh y Mahunka, 1978
(= **Balazsella** Mahunka, 1983)
Lamellareidae Balogh, 1972
 - **Cultroribella** Mahunka, 1985
 - **Lamellarea** Kok, 1968
 - **Microlamellarea** Coetzee, 1987
 - **Tenuelamellarea** Subías e Iturrondobeitia, 1978
Licneremaeidae Grandjean, 1954
 - **Huilicheremaeus** Fernández, Marcangeli y Eguaras, 1997
 - **Licneremaeus** Paoli, 1908
Scutoverticidae Grandjean, 1954
 - **Arthrovertex** Balogh, 1970
(= **Argentinovertex** Fernández y Cleva, 2002)
 - **Ethiovertex** Mahunka, 1982
 - **Exochocephus** Woolley e Higgins, 1968
(= **Latovertex** Mahunka, 1987)
 - **Hypovertex** Krivolutsky, 1969
 - **Lamellovertex** Bernini, 1976
 - **Provertex** Mihelčič, 1959
 - **Scutovertex** Michael, 1879
(= **Neoscutovertex** Mihelčič, 1957)
 - **Scutoverticosus** Kok, 1968
Passalozetidae Grandjean, 1954
 - **Bipassalozetes** Mihelčič, 1957
(= **Salpasozetes** Mahunka, 1977)
 - **B. (Passalobates)** Pérez-Íñigo y Peña, 1996
 - **Passalomonia** Mahunka, 1987
 - **Passalozetes** Grandjean, 1932
- Phenopelopoidea Petrunkevitch, 1955
Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955
- **Eupelops** Ewing, 1917
(= **Allopelops** Hammer, 1952)
(= **Celaeno** Koch, 1835)
(= **Globonothrus** Tseng, 1982)
(= **Pelops** Koch, 1835 *nom. praeoc.*)
(= **Phenopelops** Petrunkevitch, 1955)
(= **Tectopelops** Jacot, 1929)
 - **Nesopelops** Hammer, 1973
 - **Peloptulus** Berlese, 1908
 - **P. (Sacculoptulus)** Subías, 2017
 - **Propelops** Jacot, 1937
(= **Hammeria** Sellnick, 1944)
- Unduloribatoidea Kunst, 1971
Unduloribatidae Kunst, 1971
- **Scutoribates** Sellnick, 1918
(= **Koreoribates** Choi, 1994)
(= **Kunstella** Krivolutsky, 1974)
 - **Unduloribates** Balogh, 1943
 - **Valbehanella** Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
Eremaeozetidae Piffel, 1972
 - **Eremaeozetes** Berlese, 1913
 - **Idiozetes** Aoki, 1976
 - **Mahunkaia** Schatz, 2002
 - **Retrozetes** Colloff, 2012
 - **Rogerzetes** Fernández, Theron y Cleva, 2011
 - **Seteremaeozetes** P. Balogh, 1988
- Microzetoidea Grandjean, 1936
Microzetidae Grandjean, 1936
- **Acanthozetes** Balogh, 1958
 - **Acaroceras** Grandjean, 1936
 - **A. (Malgoceras)** Mahunka, 1993
 - **A. (Trichacaroceras)** Mahunka, 1991
 - **Afrozetes** Engelbrecht, 1972
 - **Amiracarus** Miko, 2013
 - **Anakingia** Hammer, 1961
 - **Arenozetes** Krivolutsky, 1971

- **Balghozetes** Mahunka, 2003
 - **Berlesezetes** Mahunka, 1980
 - **Brazilozetes** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Calozetes** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Caucasiozetes** Shtanchaeva, 1984
 - **Cavernozetes** Mahunka, 1984
 - **Christovizetes** Krivolutsky, 1975
 - **Comorozetes** Mahunka, 1994
 - **Cosmozetes** Balogh y Mahunka, 1969
 - **C. (Magoebazetes)** Engelbrecht, 1972
 - **Cuspitigula** Hammer, 1966
 - **Dinozetes** Balogh, 1962
 - **Fusozetes** Balogh, 1972
 - **Hauserozetes** Mahunka, 1980
 - **Hymenozetes** Balogh, 1964
 - **Kalyptrazetes** Balogh, 1972
(=Allozetes Higgins, 1965 *nom. praeoc.*)
 - **Kaszabozetes** Mahunka, 1988
(=Sinozetes Mahunka, 2000)
 - **Licnozetes** Balogh y Mahunka, 1969
 - **L. (Undulozetes)** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Microzetes** Berlese, 1913
(=Nellacaroides Mahunka, 1998)
(=Nellacarus Grandjean, 1936)
(=Teraja Mahunka, 1995)
 - **M. (Megazetes)** Balogh, 1959
 - **M. (Stylozetes)** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Mirabilozetes** Mahunka, 1977
 - **Miracarus** Kunst, 1959
 - **Mystacozetes** Balogh, 1962
 - **Mysterozetes** Hammer, 1961
 - **Orthozetes** Balogh, 1962
 - **Oxyzetes** Balogh, 1958
 - **Papuazetes** Balogh, 1968
 - **Phylacozetes** Grandjean, 1936
 - **Physozetes** Mahunka, 2008
 - **Plumozetes** Balogh, 1972
 - **Protozetes** Balogh, 1962
 - **Rhabdozetes** Hammer, 1962
 - **Rhopalozetes** Balogh, 1964
(=Austrozetes Balogh y Mahunka, 1969)
 - **Rugozetes** Balogh, 1960
 - **Schalleria** Balogh, 1962
 - **Schalleriella** Engelbrecht, 1972
(=Mahunkaceras J. y P. Balogh, 2002)
(=Megazetes Mahunka, 1993, *nom. praeoc.*)
 - **Schizozetes** Balogh, 1962
 - **Sturmozetes** J. y P. Balogh, 1992
(=Gymnozetes P. Balogh, 1984 *nom. praeoc.*)
 - **Szentivanyella** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Trichozetes** Balogh y Mahunka, 1980
 - **Vermacarus** Balogh y Mahunka, 1980
- Achipterioidea Thor, 1929
Achipteriidae Thor, 1929
- **Achipteria** Berlese, 1885
 - **A. (Izuachipteria)** Balogh y Mahunka, 1979
(=Hokkachipteria Balogh y Mahunka, 1979)
 - **Anachipteria** Grandjean, 1932
 - **A. (Hoffmanacarus)** Mahunka, 1995
 - **A. (Weigmanniella)** Subías, 2010
 - **Campachipteria** Aoki, 1995
 - **C. (Triachipteria)** Subías, 2017
 - **Cerachipteria** Grandjean, 1935
(=Zygachipteria Mihelčič, 1956)
 - **Cubachipteria** Balogh y Mahunka, 1979
 - **Dentachipteria** Nevin, 1974
- **Parachipteria** Hammen, 1952
(=Pseudachipteria Travé, 1960)
Tegoribatidae Grandjean, 1954
 - **Lemurobates** Mahunka, 1997
 - **Neophysobates** Luxton, 1987
(=Paraphysobates Luxton, 1985 *nom. praeoc.*)
(=Pseudophysobates Fujikawa, 1991)
 - **Paraphysobates** Mahunka, 1985
(=Monophysobates J. y P. Balogh, 1992)
 - **Physobates** Hammer, 1962
 - **Plakoribates** Popp, 1960
 - **Protectoribates Behan-Pelletier, 2017**
 - **Pseudotectoribates** Subías, 1977
 - **Scutozetes** Hammer, 1952
(=Neolepidozetes Hammer, 1977)
 - **Tectoribates** Berlese, 1910
(=Anoribatella Kunst, 1962)
 - **Tegoribates** Ewing, 1917
(=Lepidoribates Sellnick, 1920)
 - **Williamszetes** Hammer, 1961
(=Williamsia Hammer, 1958 *nom. praeoc.*)
Epactozetidae Grandjean, 1930
 - **Epactozetes** Grandjean, 1930
 - **Truncozetes** Balogh y Mahunka, 1969
- Oribatelloidea Jacot, 1925
Oribatellidae Jacot, 1925
- **Cuspidozetes** Hammer, 1962
 - **Ferolocella** Grabowski, 1971
(=Gendzella Kulijev, 1977)
 - **Joelia** Oudemans, 1906
(=Coggiella Berlese, 1916)
 - **Novoribatella** Engelbrecht, 1986
 - **Ophidiotrichus** Grandjean, 1953
 - **Oribatella** Banks, 1895
 - **O. (Bioribatella)** Subías, 2017
 - **O. (Fberninia)** Özdikmen, 2008
(=Berniniella Özdikmen, 2008 *nom. praeoc.*)
(=Cavernella Bernini, 1975 *nom. praeoc.*)
 - **O. (Fenestrobates)** Balogh y Mahunka, 1969
 - **O. (Monoribatella)** Subías, 2017
 - **O. (Multoribatella)** Subías, 2004
 - **O. (Sacculoribatella)** Shtanchaeva y Subías, 2012
 - **Prionoribatella** Aoki, 1975
 - **Siciliotrichus** Bernini, 1973
Ceratokalummidae Balogh, 1970
 - **Achipterina** Berlese, 1916
(=Ceratokalumma Balogh, 1970)
 - **Arcozetes** Hammer, 1958
 - **Cultrobates** Willmann, 1930
 - **Genavensia** Mahunka, 1983
 - **Guaranozetes** Balogh y Mahunka, 1981
(=Belemacarus Pérez-Íñigo y Baggio, 1997)
- Ceratozetoidea Jacot, 1925
Limnozetestidae Thor, 1937
- **Antarcticola** Wallwork, 1967
(=Petrozetes Sitnikova, 1968)
 - **Limnozetestella** Willmann, 1932
(=Austroceratobates Mahunka, 1985)
 - **Limnozetes** Hull, 1916
(=Vietobates Mahunka, 1987)
Heterozetidae Kunst, 1971
 - **Allozetes** Berlese, 1913
 - **Austrachipteria** Balogh y Mahunka, 1966
(=Parahypozetes Hammer, 1967)
 - **Farchacarus** Wallwork, 1967

- (=*Africacarus* Wallwork, 1965 *nom. praeoc.*)
- **Granizetes** Hammer, 1961
 - **Heterozetes** Willmann, 1917
 - **Lamellobates** Hammer, 1958
 - **L. (Paralamellobates)** Bhaduri y Raychaudhuri, 1968
 - **Palmitalia** Pérez-Íñigo y Peña, 1997
 - **Patagonozetes** J. y P. Balogh, 1990
 - **Punctizetes** Hammer, 1971
 - **Sacculozetes** Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991
 - **Sagittazetes** J. y P. Balogh, 1983
 - Ceratozetidae Jacot, 1925
 - **Adoribatella** Woolley, 1967
 - **Ceratozetella** Shaldybina, 1966
 - (=*Ceratozetoides* Shaldybina, 1966)
 - (=*Ceresella* Pavlichenko, 1993)
 - **C. (Cyrtozetes)** Behan-Pelletier, 1985
 - **Ceratozetes** Berlese, 1908
 - **C. (Mixozetes)** J. y P. Balogh, 1990
 - **Dentizetes** Hammer, 1952
 - **Edwardzetes** Berlese, 1913
 - **E. (Gamerozetes)** J. y P. Balogh, 1990
 - **Euzetes** Berlese, 1908
 - **Furcobates** Sellnick, 1959
 - **F. (Parafurcobates)** Hammer, 1967
 - **F. (Pseudogeminozetes)** Tseng, 1984
 - **Fuscozetes** Sellnick, 1928
 - **Geminozetes** Balogh y Csiszár, 1963
 - **G. (Naiazetes)** Behan-Pelletier, 1996
 - (=*Cyranozetes* Mahunka y Mahunka-Papp, 2003)
 - (=*Selvazetes* Behan-Pelletier, 1998)
 - **Ghilarovizetes** Shaldybina, 1969
 - (=*Koreozetes* Aoki, 1974)
 - **Hispanozetes** Subías y Shtanchaeva, 2012
 - **Jugatala** Ewing, 1913
 - **Lepidozetes** Berlese, 1910
 - (=*Onazetes* Bugrov, 1991)
 - **Lobozetes** Hammer, 1958
 - **Macrogena** Wallwork, 1966
 - (=*Lophozetes* P. Balogh, 1985)
 - (=*Paralobozetes* Tseng, 1984)
 - **M. (Safrobates)** Mahunka, 1989
 - **Magellozetes** Hammer, 1962
 - **Melanozetes** Hull, 1916
 - (=*Alphypochthonius* Schweizer, 1956)
 - (=*Sculptozetes* Mahunka, 1984)
 - **Neogymnobates** Ewing, 1917
 - (=*Boreozetes* Hammer, 1955)
 - **Onychobates** Hammer, 1967
 - **Oromurcia** Thor, 1930
 - **Pentazetes** J. y P. Balogh, 1983
 - **P. (Porallozetes)** J. y P. Balogh, 1992
 - **Scotiazetes** Wallwork, 1966
 - **S. (Guatemalozetes)** Mahunka, 1980
 - **Sphaerozetes** Berlese, 1885
 - (=*Incudozetes* J. y P. Balogh, 2002)
 - (=*Porozetes* Hammer, 1962)
 - (=*Sphaerozetella* Jacot, 1929)
 - **Trichoribates** Berlese, 1910
 - (?=*Claviceps* Canestrini y Fanzago, 1877 *gen. inq.*)
 - (?=*Murcia* Koch, 1835 *gen. inq.*)
 - **T. (Laminizetes)** Behan-Pelletier, 1986
 - **T. (Latilamellobates)** Shaldybina, 1971
 - (=*Trichoribatella* Mahunka, 1983)
 - (=*Vicinebates* Pavlichenko, 1991)
 - **T. (Viracochiella)** Hammer, 1961
 - (=*Leebates* Balogh y Mahunka, 1996)
 - **Tutorozetes** Hammer, 1967
 - **Umbellozetes** Krivolutsky, 1969
 - **Zetomimus** Hull, 1916
 - (=*Hamobates* Hammer, 1962)
 - **Z. (Protozetomimus)** Pérez-Íñigo, 1990
 - Chamobatidae Thor, 1937
 - **Ceratobates** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Chamobates** Hull, 1916
 - **C. (Xiphobates)** Pavlichenko, 1993
 - **Globozetes** Sellnick, 1928
 - **Hypozetes** Balogh, 1959
 - **Iugoribates** Sellnick, 1944
 - **Ocesobates** Aoki, 1965
 - (=*Chamozetes* Sellnick, 1974)
 - (=*Danobates* Gjelstrup, 1978)
 - **Pedunculozetes** Hammer, 1962
 - Maudheimiidae J. y P. Balogh, 1984
 - **Maudheimia** Dalenius, 1958
 - **Multimaudheimia** Subías, 2004
 - Humerobatidae Grandjean, 1971
 - **Africoribates** Evans, 1953
 - **Afroleius** Mahunka, 1984
 - **Anellozetes** Hammer, 1962
 - (=*Kilimabates* Mahunka, 1984)
 - **Diapterobates** Grandjean, 1936
 - **Humerobates** Sellnick, 1928
 - (=*Antarctozetes* Balogh, 1961)
 - (=*Baloghobates* Hammer, 1967)
 - (=*Banksinus* Jacot, 1938)
 - (=*Cordylobates* Luxton, 1995)
 - (=*Jeannelia* Dalenius, 1958)
 - (=*Trihumerozetes* Sellnick, 1959)
 - **Nuhivabates** Niemi y Behan-Pelletier, 2004
 - **Ramsayellus** Spain y Luxton, 1970
 - (=*Ulugurozetes* Mahunka, 1984)
 - (=*Zealandobates* Hammer, 1967 *nom. praeoc.*)
 - **Svalbardia** Thor, 1930
 - Punctoribatidae Thor, 1937
 - **Allomycobates** Aoki, 1976
 - **Cryptobothria** Wallwork, 1963
 - **Ellipsozetes** Bernini, 1980
 - **Feiderzetes** Subías, 1977
 - (=*Allozetes* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971 *nom. praeoc.*)
 - **Minunthozetes** Hull, 1916
 - (=*Jurabates* Jacot, 1929)
 - **M. (Inigozetes)** Subías, 2000
 - **Mycobates** Hull, 1916
 - **M. (Calyptozetes)** Thor, 1930
 - (=*Permycobates* Strenzke, 1954)
 - **Mycozetes** Spain, 1968
 - **Neomycobates** Wallwork, 1963
 - **Pelopsis** Hall, 1911
 - (=*Ewingozetes* Hammer, 1952)
 - (=*Parapelops* Jacot, 1938)
 - **Punctoribates** Berlese, 1908
 - **P. (Minguezetes)** Subías, Kahwash y Ruiz, 1990
 - **Semipunctoribates** Mahunka, 1987
 - **Zachvatkinibates** Shaldybina, 1973
 - (=*Eupunctoribates* Hammer, 1977)
 - **Z. (Alpizetes)** Mahunka, 2001
 - (=*Schweizerzetes* Mahunka, 2001)
 - Zetomotrichoidea Grandjean, 1934
 - Zetomotrichidae Grandjean, 1934
 - **Anoplozetes** Lee y Pajak, 1987
 - **Demisalto** Coetzee, 1993
 - **D. (Saltatrachus)** Coetzee, 1993

- **Floritrichus** Coetzee, 2003
 - **Ghilarovus** Krivolutsky, 1966
(=Desertozetes Khanbekyan, 1990)
 - **Mabulatrichus** Coetzee, 1993
(=Hungaromotrichus Mahunka, 1993)
 - **Mikizetes** Hammer, 1958
 - **M. (Oglasacarus)** Bernini, 1979
 - **Pallidacarus** Krivolutsky, 1975
 - **Rohria** Balogh y Mahunka, 1977
 - **Turkmenitrichus** Krivolutsky y Karppinen, 2006
 - **Zetomotrichus** Grandjean, 1934
 - **Z. (Keralotrichus)** Mahunka, 1985
- Oripodoidea Jacot, 1925
Drymobatidae J. y P. Balogh, 1984
- **Drymobates** Grandjean, 1930
 - **Drymobatoides** Jacot, 1936
(=Pelokylla Adolph y Haq, 1982)
(=Seychellozetes Mahunka, 1984)
 - **D. (Rykella)** Balogh, 1962
Mochlozetidae Grandjean, 1960
 - **Dynatozetes** Grandjean, 1960
 - **Gephyrazetes** Hirauchi, 1999
 - **Mahunkazetes** J. y P. Balogh, 1992
 - **Mochlobates** Norton, 1984
 - **Mochloribatula** Mahunka, 1979
 - **Mochlozetes** Grandjean, 1930
 - **Nesiotizetes** Jacot, 1934
 - **Podoribates** Berlese, 1908
(=Cardioribates Jacot, 1934)
(=Falsolobozetes Tseng, 1984)
(=Sphaerobates Sellnick, 1928)
 - **Unguizetes** Sellnick, 1925
(=Terrazetes Jacot, 1929)
 - **U. (Calugarella)** J. y P. Balogh, 1992
 - **Uracrobates** Balogh y Mahunka, 1967
(=Urobates Hammer, 1973)
 - **U. (Parauracrobates)** Ermilov y Martens, 2015
Oribatulidae Thor, 1929
 - **Capilloppia** Balogh y Mahunka, 1966
 - **Gerlobia** Coetzer, 1968
 - **G. (Baobabula)** Mahunka, 1975
 - **G. (Monophauloppia)** P. Balogh, 1988
(=Fuerteventuria Pérez-Íñigo y Peña, 1996)
 - **Grandjeania** Balogh, 1963
(=Gradjeanella Balogh, 1961 *nom. praeoc.*)
 - **Jornadia** Wallwork y Weems, 1984
(=Woolleybates J. y P. Balogh, 1984)
 - **Lucoppia** Berlese, 1908
(=Romanobates Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970)
 - **Lunoribatula** Mahunka, 1982
 - **Megatrichobates** Grobler, 2000
 - **Neolucoppia** Tseng, 1984
 - **Oribatula** Berlese, 1896
(=Ceroribatula Lee y Birchby, 1989)
 - **O. (Zygoribatula)** Berlese, 1916
(=Fovoribatula Lee y Birchby, 1991)
(=Neoribatula Ewing, 1917)
(=Zetobelba Hull, 1916)
 - **Ovobates** Mahunka, 1994
 - **Paraphauloppia** Hammer, 1967
 - **P. (Ermilovia)** Subías, 2017
 - **Phauloppia** Berlese, 1908
(=Calvoppia Jacot, 1934)
(=Eporibatula Sellnick, 1928)
(=Imaparatoppia Jacot, 1934)
(?=Oribata Latreille, 1802 *gen. inq.*)
 - (=Paraliodes Hall, 1911)
(=Trichoribatula Balogh, 1961)
 - **Phauloppiella** Subías, 1977
 - **P. (Ausrribula)** Lee, 1992
 - **Rekharibatula** Bose, Mathur, Jain y Dogra, 1996
 - **Sellnickia** Oudemans, 1927
 - **Spinoppia** Higgins y Woolley, 1966
 - **Subphauloppia** Hammer, 1967
 - **S. (Diphauloppia)** J. y P. Balogh, 1984
Nesozetidae J. y P. Balogh, 1984
 - **Nesozetes** Hammer, 1971
Pseudoppiidae Mahunka, 1975
 - **Behanpseudoppia** Subías, 2017
 - **Pontiobates** Luxton, 1989
 - **Pseudoppia** Pérez-Íñigo, 1966
(=Micropirnodus Weigmann, 2009)
(=Symphauloppia Balogh, 1972)
 - **Senoribula** Mahunka, 1975
Caloppiidae Balogh, 1960
 - **Brassiella** Balogh, 1970
 - **Crassoribatula** Hammer, 1967
 - **Luissubiasia** Ermilov, 2016
 - **Neotrichozetes** Travé, 1961
 - **Reticuloppia** Balogh y Mahunka, 1966
(=Decoribatula Lee y Birchby, 1989)
 - **Stelechobates** Grandjean, 1965
 - **Zetorchella** Berlese, 1916
(=Caloppia Balogh, 1958)
(=Chaunoproctellus Mahunka, 1992)
(=Chaunoproctus Pearce, 1906 *nom. praeoc.*)
(=Pabulozetes Tseng, 1982)
Hemileiidae J. y P. Balogh, 1984
 - **Constrictobates** Balogh y Mahunka, 1966
 - **Dometorina** Grandjean, 1951
(=Cryptozetes Hammer, 1962)
 - **D. (Vesiculobates)** Hammer, 1979
 - **Exoribatula** Jacot, 1936
(=Nesoribatula Aoki, 1964)
 - **E. (Multoribates)** Hammer, 1961
(=Setulobates Mahunka, 1984)
 - **Hemileius** Berlese, 1916
 - **H. (Monoschelobates)** Balogh y Mahunka, 1969
 - **H. (Simkinia)** Krivolutsky, 1966
(=Tenuileius Lee, 1989)
(=Turcibates Ayyildiz y Luxton, 1989)
 - **H. (Tuberemaus)** Sellnick, 1930
(=Anisochthodes Newell, 1957)
 - **H. (Urubambates)** Hammer, 1961
 - **Heteroleius** Balogh y Mahunka, 1966
 - **Mucrobates** Balogh y Mahunka, 1979
 - **Nasozetes** Sellnick, 1930
(=Kinabaluella Mahunka, 1996)
 - **Plumobates** Balogh y Mahunka, 1966
 - **Siculobata** Grandjean, 1953
(=Floribates Norton y Kethley, 1989)
 - **S. (Metaleius)** Travé, 1960
 - **S. (Paraleius)** Travé, 1960
 - **S. (Wallworkiella)** Hammer, 1979
 - **Zealandozetes** Ermilov, Minor y Behan-Pelletier, 2015
 - **Zescheloribates** Luxton, 1982
Liebstadiidae J. y P. Balogh, 1984
 - **Angullozetes** Hammer, 1967
 - **Areozetes** Hammer, 1961
 - **Cordiozetes** Mahunka, 1983
(=Mixoribatula Mahunka, 1987)
 - **Haloribatula** Schuster, 1957
 - **Liebstadia** Oudemans, 1906

- (=Irinobates Krivolutsky y Christov, 1970)
- (=Rajskibates J. y P. Balogh, 1984)
- **L. (Lagenobates)** Weigmann y Miko, 2002
- (=Pseudoprotoribates Weigmann y Monson, 2004)
- **Maculobates** Hammer, 1962
- (=Subulobates Hammer, 1972)
- **Poroschelorbates** Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994
- **Reductobates** Balogh y Mahunka, 1966
- (=Ingella Hammer, 1967)
- Symbioribatidae Aoki, 1966
- **Piffliella** Hammer, 1979
- **Separatoribates** Matsushima e Y.-N. e Y. Nakamura, 2009
- **Symbioribates** Aoki, 1966
- Scheloribatidae Grandjean, 1933
- **Annobonzetes** Pérez-Íñigo, 1983
- **Coronibatula** Mahunka, 1988
- **Cosmobates** Balogh, 1959
- **Ecuadoribates** Ermilov y Kalúz, 2012
- **Euschelorbates** Kunst, 1958
- (=Ambrobates Mahunka, 2009)
- (=Corynobates J. y P. Balogh, 1992)
- (=Tribates Mahunka, 1978)
- **E. (Trischelorbates)** Hammer, 1971
- (=Berndibula Mahunka, 2000)
- (=Nanobates J. y P. Balogh, 1984)
- **Fijibates** Hammer, 1971
- **Fissurobates** Balogh y Mahunka, 1969
- **Hammerabates** Balogh, 1970
- (=Otaheitea Hammer, 1972)
- (=Yoronoribates Aoki, 1987)
- **H. (Philoribates)** Corpuz-Raros, 1980
- **Muliercula** Coetzer, 1968
- **Nannerlia** Coetzer, 1968
- **Pachygena** Hammer, 1972
- **Planobates** Hammer, 1973
- **Rhabdoribates** Aoki, 1967
- **Samoabates** Hammer, 1973
- **Schelorbates** Berlese, 1908
- (=Andezetes Hammer, 1961)
- (=Megaschelorbates Lee y Pajak, 1990)
- (=Neoschelorbates Hammer, 1973)
- (=Paraschelobates Jacot, 1934)
- (=Protoschelobates Jacot, 1934)
- (=Semischelorbates Hammer, 1973)
- (=Storkania Jacot, 1929)
- **S. (Bischelorbates)** Mahunka, 1988
- **S. (Grandjeanobates)** Hammer, 1967
- (=Allenobates Mahunka, 1978)
- **S. (Makischelorbates)** Corpuz-Raros, 1980
- **S. (Oxyschelorbates)** J. y P. Balogh, 1990
- **S. (Perschelorbates)** Hammer, 1973
- (=Ischelorbates Corpuz-Raros, 1980)
- (=Scheloribatella Mahunka, 1984)
- **Scheloribatoides** Mahunka, 1988
- **Similobates** Mahunka, 1982
- **Striatobates** Hammer, 1973
- **Topobates** Grandjean, 1958
- (=Berndia Mahunka, 1988)
- (=Flagellobates Mahunka, 1978)
- (=Setobates Balogh, 1961)
- Oripodidae Jacot, 1925
- **Anoripoda** Sellnick, 1959
- **Benoibates** Balogh, 1958
- (=Exoripoda Woolley, 1961)
- (=Haploripoda Balogh y Mahunka, 1967)
- (=Reductoripoda Mahunka y Palacios-Vargas, 1996)
- **Birobates** Balogh, 1970
- **Brachyoripoda** Balogh, 1970
- **Campbellobates** Wallwork, 1964
- **Cosmopirnodus** Balogh, 1970
- **Gymnobates** Banks, 1902
- **Gymnobatoides** Woolley, 1966
- **Monstroripoda** Mahunka, 2006
- **Oripoda** Banks, 1904
- **Parapirnodus** Balogh y Mahunka, 1968
- **Protoripoda** Balogh, 1970
- (?=Frischia Oudemans, 1915 *gen. inq.*)
- **P. (Baloghates)** Özdikmen, 2008
- (=Calobates Balogh, 1961 *nom. praeoc.*)
- **Pseudopirnodus** Baranek, 1985
- **Pteroripoda** Balogh y Mahunka, 1974
- **Scriptoripoda** P. Balogh, 1985
- **Subpirnodus** Mahunka, 1988
- **Truncopes** Grandjean, 1956
- (=Huarpescoptes Fernández, Monetti y Martínez, 1995)
- Pirnodidae Grandjean, 1956
- **Cryptoribatula** Jacot, 1934
- (=Euaella Hammer, 1973)
- **Pirnodus** Grandjean, 1956
- Protoribatidae J. y P. Balogh, 1984
- **Cribrozetes** Balogh, 1970
- **Perxylobates** Hammer, 1972
- **Polillozetes** Corpuz-Raros, 2009
- **Protoribates** Berlese, 1908
- (=Alloribates Banks, 1947)
- (=Octodurozetes Mahunka, 1993)
- (=Styloribates Jacot, 1934)
- (=Xylobates Jacot, 1929)
- **P. (Biunguis)** Subías, 2018
- **P. (Triunguis)** Kulijev, 1978
- (=Brasilobates Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)
- (=Glaberoribates Tseng, 1984)
- **Setoxylobates** Balogh y Mahunka, 1967
- (=Lignobates Mahunka, 2006)
- **S. (Plenoxxylobates)** Hammer, 1979
- **S. (Polyxylobates)** Hammer, 1973
- **Sicaxylobates** Luxton, 1985
- **Totobates** Hammer, 1961
- **Transoribates** Pérez-Íñigo, 1992
- (=Edaphoribates Nakamura y Nakai, 2009)
- **Trixylobates** Balogh y Mahunka, 1978
- **Tuxenia** Hammer, 1958
- **Vilhenabates** Balogh, 1963
- **V. (Phalacrozetes)** Aoki, 1965
- Haplozetidae Grandjean, 1936
- **Acutozetes** Balogh, 1970
- **Baloghia** Mahunka, 1994
- **Baloghiella** Bulanova-Zachvatkina, 1972
- **Berlesiella** Hammer, 1979
- (=Comororibula Mahunka, 1994)
- **Borneozetes** Mahunka, 1997
- **Cantharozetes** Hammer, 1961
- **Conozetes** Balogh y Mahunka, 1969
- **Indoribates** Jacot, 1929
- (=Nixozetes Mahunka, 1977)
- (=Sundazetes Hammer, 1979)
- **I. (Bolkiah)** Mahunka, 1997
- **I. (Haplozetes)** Willmann, 1935
- (=Mixobates Gil-Martín y Subías, 1993)
- (=Propeschelobates Jacot, 1936)
- (=Triungulozetes Subías, 2001)
- **I. (Mancoribates)** Hammer, 1961
- (=Minasbates Pérez-Íñigo y Baggio, 1996)

- **I. (Philippizetes)** Corpuz-Raros, 1979
 - **Lauritzenia** Hammer, 1958
 - **L. (Incabates)** Hammer, 1961
(=Canaribates Pérez-Íñigo y Peña, 1994)
 - **L. (Magnobates)** Hammer, 1967
(=Gymnozetes Călugăr y Vasiliu, 1983)
 - **Magyaria** Balogh, 1963
 - **Mahnertozetes** Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 - **Nasobates** Woolley, 1966
 - **Paraxylobates** Balogh y Mahunka, 1969
 - **Peloribates** Berlese, 1908
(=Capillozetes Balogh, 1943)
(=Euryparazetes Radford, 1950)
(=Indobates Pandit y Bhattacharya, 1999)
(=Parazetes Willmann, 1930 *nom. praeoc.*)
(=Setincabates Lee, 1993)
 - **P. (Aokibates)** Mahunka, 1988
 - **P. (Peloribatodes)** Mahunka, 2011
 - **P. (Tentaculozetes)** Balogh, 1970
 - **Pilobatella** Balogh y Mahunka, 1967
 - **P. (Tripilobatella)** Subías, 2017
 - **Pilobates** Balogh, 1960
 - **P. (Italobates)** Mahunka, 1994
 - **Rostrozetella** Mahunka, 2006
 - **Rostrozetes** Sellnick, 1925
(=Carabozetes Mihelčič, 1957)
(=Zaherizetes Yousef y Nasr, 1976)
 - **Trachyoribates** Berlese, 1908
Tubulozetidae P. Balogh, 1989
 - **Tubulozetes** P. Balogh, 1989
Parakalummidae Grandjean, 1936
 - **Neoribates** Berlese, 1914
(=Protokalumma Jacot, 1929)
 - **N. (Parakalumma)** Jacot, 1929
 - **N. (Perezinigokalumma)** Subías, 2004
 - **N. (Pseudoneoribates)** Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
 - **Sandenia** Oudemans, 1917
 - **S. (Porokalumma)** Wallwork, 1966
(=Neokalumma Tseng, 1984)
- Galumnoidea Jacot, 1925
Galumnidae Jacot, 1925
- **Acrogalumna** Grandjean, 1956
 - **Africogalumna** Starý, 2005
 - **Allogalumna** Grandjean, 1936
(=Ctenogalumna Balogh, 1961)
(=Xenogalumna Balogh, 1961)
 - **Carinogalumna** Engelbrecht, 1973
(=Paracarinogalumna Mahunka, 1998)
(=Pseudogalumna Pérez-Íñigo y Baggio, 1994)
 - **Centroribates** Berlese, 1914
 - **Cryptogalumna** Grandjean, 1957
 - **Dicatozetes** Grandjean, 1956
 - **Dimidiogalumna** Engelbrecht, 1972
 - **Flagellozetes** Balogh, 1970
 - **F. (Cosmogalumna)** Aoki, 1988
(=Variogalumna Mahunka, 1995)
 - **Galumna** Heyden, 1826
(=Holokalumma Jacot, 1929)
(=Holozetes Jacot, 1929)
(=Kinezogalumna Aoki y Hu, 1993)
(=Zetes Koch, 1836)
 - **G. (Angulogalumna)** Grishina, 1981
(=Cuspidogalumna Starý, 2005)
 - **G. (Atypicogalumna)** Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015
 - **G. (Erogalumna)** Grandjean, 1966
 - **G. (Indogalumna)** Balakrishnan, 1985
 - **G. (Kabylogalumna)** Bernini, 1984
 - **G. (Rostrogalumna)** Engelbrecht, 1973
 - **Globogalumna** J. y P. Balogh, 1990
 - **Heterogalumna** Balogh, 1960
 - **Kunstogalumna** Starý, 2005
 - **Leptogalumna** Balogh, 1960
 - **L. (Aegyptogalumna)** Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985
 - **Neoctenogalumna** Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
 - **N. (Paractenogalumna)** Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
 - **Neogalumna** Hammer, 1973
 - **Notogalumna** Sellnick, 1959
 - **Orthogalumna** Balogh, 1961
(=Mirogalumna Mahunka, 1993)
 - **Pergalumna** Grandjean, 1936
(?=Neorizetes Jacot, 1933 *gen. inq.*)
 - **P. (Bigalumna)** Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 - **Pilizetes** Sellnick, 1937
 - **P. (Neopilizetes)** J. y P. Balogh, 1990
(?=Kratzensteinia Oudemans, 1919 *gen. inq.*)
 - **P. (Pseudopilizetes)** Ermilov, 2017
 - **Pilogalumna** Grandjean, 1956
(=Disparagalumna Hammer, 1973)
 - **Psammogalumna** Balogh, 1943
 - **Sacculogalumna** Engelbrecht, 1973
 - **Setogalumna** P. Balogh, 1985
 - **Sphaerogalumna** Balogh, 1961
 - **Stictozetes** Berlese, 1916
(=Strabogalumna Mahunka, 1995)
(=Trachygalumna Balogh, 1960)
 - **Taeniogalumna** Balogh, 1962
(=Didymonycha Mahunka, 1984 *nom. praeoc.*)
 - **Trichogalumna** Balogh, 1960
 - **T. (Sarawakiella)** Mahunka, 1996
 - **T. (Tanzanycha)** Koçak y Kemal, 2008
 - **Vaghia** Oudemans, 1919
Galumnellidae Balogh, 1960
 - **Galumnella** Berlese, 1916
 - **G. (Bigalumnella)** Mahunka, 1994
 - **Galumnopsis** Grandjean, 1931
 - **G. (Porogalumnella)** Balogh, 1968
 - **Iberogalumnella** Arillo y Subías, 1993
 - **Monogalumnella** Mahunka, 1986
 - **M. (Trichogalumnella)** Mahunka, 1992
 - **Trypogalumnella** Mahunka, 1995

LISTADO SISTEMÁTICO DE ESPECIES

Orden **ORIBATIDA** Dugès, 1834

Suborden **PALAEOSOMATA** Grandjean, 1969

Acaronychoidea Grandjean, 1932

Acaronychidae Grandjean, 1932 (5 gen. y 23 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acaronychus Grandjean, 1932 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Acaronychus traegardhi* Grandjean, 1932

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y subtropical (Holártica meridional).

- *Acaronychus grandjeani* Lange, 1975

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Acaronychus proximus* Schubart, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

- *Acaronychus traegardhi* Grandjean, 1932

DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea occidental, Paleártica oriental meridional y U.S.A. meridional), China suroriental e I. Galápagos.

Archeonothrus Trägårdh, 1906 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Archeonothrus natalensis* Trägårdh, 1906

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Archeonothrus natalensis* Trägårdh, 1906

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Loftacarus Lee, 1980 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Loftacarus siefi* Lee, 1981

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica) y Oriental.

- *Loftacarus longicaudatus* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Stomacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Loftacarus siefi* Lee, 1981

DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.

Stomacarus Grandjean, 1952 (10 spp.)

(=*Amuracarus* Lange, 1975)

(=*Andacarus* Grandjean, 1958)

ESPECIE TIPO: *Stomacarus tristani* Grandjean, 1952

DISTRIBUCIÓN: Austral, Neotropical, Australianooriental y Paleártica meridional.

- *Stomacarus abresi* Lee, 1981

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Stomacarus campbellensis* (Wallwork, 1966) (*Andacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).

- *Stomacarus cilius* Luxton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.

- *Stomacarus leei* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Tasmania y Vietnam.

- *Stomacarus ligamentifer* (Hammer, 1967) (*Andacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Stomacarus macfarlani* Grandjean, 1957

DISTRIBUCIÓN: Austral (Argentina y Antártica: I. Kerguelen).

- *Stomacarus setiger* R. Martínez y Casanueva, 1999

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Stomacarus tristani* Grandjean, 1952

DISTRIBUCIÓN: Subantártica (Isla de Gough [Tristán de Acuña]) y Crimea.

- *Stomacarus voskresenskii* (Lange, 1975) (*Amuracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Stomacarus watsoni* (Travé, 1964) (*Andacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).

Zachvatkinella Lange, 1954 (7 spp.)

(=*Himalacarus* Sheals, 1965)

ESPECIE TIPO: *Zachvatkinella belbiformis* Lange, 1954

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Zachvatkinella baicalica* Lange, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Zachvatkinella belbiformis* Lange, 1954
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Zachvatkinella caucasica* Lange, 1972
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Zachvatkinella chimalae* (Sheals, 1965) (*Himalacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Zachvatkinella doryura* Lange, 1972
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Zachvatkinella longipilus* (Jacot, 1938) (*Acaronychus traegardhi* l.) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Zachvatkinella nipponica* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Palaeacaroida Grandjean, 1932

Palaeacaridae Grandjean, 1932 (2 gen., 6 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Palaeacaroides Lange, 1972 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Palaeacaroides pacificus* Lange, 1972

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Palaeacaroides pacificus* Lange, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.

Palaeacarus Trägårdh, 1932 (5 spp. y 1 ssp.)

(=*Traegardhacarus* Zachvatkin, 1945)

ESPECIE TIPO: *Palaeacarus hystricinus* Trägårdh, 1932

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Palaeacarus caucasicus* Lange, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso e Islas del Este de Rusia asiática).
- Palaeacarus hystricinus* Trägårdh, 1932
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
- *Palaeacarus hystricinus hystricinus* Trägårdh, 1932
(=*Palaeacarus appalachicus* Jacot, 1938)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur) y China suroriental.
- *Palaeacarus hystricinus japonicus* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Palaeacarus kamenskii* (Zachvatkin, 1945) (*Traegardhacarus*)
(=*Palaeacarus hystricinus vaesterbottensis* Grandjean, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (Norte de Europa y Crimea) y Paleártica oriental.
- *Palaeacarus lapshovi* (Zachvatkin, 1945) (*Traegardhacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Palaeacarus orientalis* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Sur de Rusia europea, Este de Paleártica oriental).

Ctenacaridae Grandjean, 1954 (4 gen. y 11 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Beklemishevia Zachvatkin, 1945 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y Holártica meridional.

- *Beklemishevia africana* (Mahunka, 1974) (*Ctenacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Beklemishevia barbata* (Schubart, 1968) (*Ctenacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Beklemishevia demeteri* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Beklemishevia galeodula* Zachvatkin, 1945
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea oriental, Asia centrooccidental y U.S.A.: California).
- *Beklemishevia hispaniola* Pérez-Íñigo, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Beklemishevia iranica* Akrami y Behmanesh, 2016
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Beklemishevia zachvatkini* Bulanova-Zachvatkina, 1980

DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.

Ctenacarus Grandjean, 1939 (2 spp.)

(=*Grandjeanacarus* Zachvatkin, 1945)

ESPECIE TIPO: *Palaeacarus araneola* Grandjean, 1932

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Ctenacarus araneola* (Grandjean, 1932) (*Palaeacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Ctenacarus foliisetus* Bulanova-Zachvatkina, 1980

DISTRIBUCIÓN: Ucrania.

Gilarovella Lange, 1974 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Gilarovella demetrii* Lange, 1974

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Gilarovella demetrii* Lange, 1974

DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: Nuevo Méjico).

Neoctenacarus Moritz, 1974 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Neoctenacarus hastilis* Moritz, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Neoctenacarus hastilis* Moritz, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).

Adelphacaridae Grandjean, 1954 (2 gen., 3 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

Adelphacarus Grandjean, 1952 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Adelphacarus sellnicki* Grandjean, 1952

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

- *Adelphacarus reticulatus* Lotfollahi, 2017

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Adelphacarus sellnicki* Grandjean, 1952

DISTRIBUCIÓN: Europea y Neotropical (Brasil y Argentina).

Aphelacarus Grandjean, 1932 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Parhypochthonius acarinus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910) (*Parhypochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

- *Aphelacarus acarinus acarinus* (Berlese, 1910)

(=*Aphelacarus rossicus* Zachvatkin, 1945)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: menos frecuente en el Norte, Etiópica y Neotropical).

- *Aphelacarus acarinus sahariensis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992

DISTRIBUCIÓN: Sahara occidental.

Suborden PARHYPOSOMATA Balogh y Mahunka, 1979

Parhypochthonioidea Grandjean, 1932

Parhypochthoniidae Grandjean, 1932 (1 gen. y 4 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Parhypochthonius Berlese, 1904 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Parhypochthonius aphidinus* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Parhypochthonius africanus* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Parhypochthonius aphidinus* Berlese, 1904

(=*Parhypochthonius aphidinus germanicus* Willmann, 1931)

(=*Parhypochthonius aphidinus octofilamentis* Jacot, 1938)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Australianooriental y Neotropical: I. Galápagos y Brasil).

- *Parhypochthonius asiaticus* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Parhypochthonius pilosus* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).

Gehyepochthoniidae Strenzke, 1963 (1 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

Gehyepochthonius Jacot, 1936 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Gehyepochthonius rhadamanthus* Jacot, 1936

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Gehyepochthonius frondifer* Aoki, 1975

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Gehyepochthonius gracilis* Pankov, 2002

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Gehyepochthonius mariano* Martínez y Bernava, 2000

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Gehyepochthonius rhadamanthus* Jacot, 1936

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Norte de Oriental, Australia y Panamá).

- *Gehyepochthonius strenzkei* Lee, 1982

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Gehyepochthonius urticinus* (Berlese, 1910) (*Parhyepochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical: U.S.A. (Florida) y Chile, y Canadá.

- *Gehyepochthonius xarifae* Strenzke, 1963

DISTRIBUCIÓN: Oriental (I. Maldivas y Borneo).

Elliptochthoniidae Norton, 1975 (1 gen. y 1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Elliptochthonius Norton, 1975 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Elliptochthonius profundus* Norton, 1975

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Elliptochthonius profundus* Norton, 1975

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).

Suborden **ENARTHRONOTA** Grandjean, 1947

Brachychthonioidea Thor, 1934

Brachychthoniidae Thor, 1934 (11 gen., 1 subg., 163 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Brachychthonius Berlese, 1910 (16 spp.)

(=**Brachychochthonius** Jacot, 1938)

ESPECIE TIPO: (*Hypochochthonius brevis* Michael "sensu" Berlese, 1910) =*Brachychthonius berlesei* Willmann, 1928

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Australiana).

- *Brachychthonius africanus* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Brachychthonius amicabilis* Gil-Martín y Subías, 1997

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Brachychthonius berlesei* Willmann, 1928

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).

- *Brachychthonius bimaculatus* Willmann, 1936

(=*Brachychthonius helveticus* Schweizer, 1956)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Canadá).

- *Brachychthonius hauserorum* (Mahunka, 1979) (*Brachychochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Grecia y Túnez) e Irán.

- *Brachychthonius hirtus* Moritz, 1976

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional, Irán y Mongolia).

- *Brachychthonius impressus* Moritz, 1976

(=*Brachychochthonius subericoides* Balogh y Mahunka, 1979)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Brachychthonius jugatus* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Brachychthonius laevis* (Jacot, 1938) (*Brachychochthonius*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ténesi).

- *Brachychthonius lineatus* (Mahunka, 1982) (*Brachychochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Brachychthonius pacificus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

- *Brachychthonius parahirtus* Subías y Gil, 1991

DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

- *Brachychthonius pauliani* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Brachychthonius pius* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Canadá).
- *Brachychthonius psammophylus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Brachychthonius pseudoimmaculatus* Subías y Gil, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Eobrachychthonius Jacot, 1936 (10 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Eobrachychthonius sexnotatus* Jacot, 1936) = *Brachychthonius latior* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Neotropical, Oriental y Antártica).

- *Eobrachychthonius aegyptiacus* Elkawas, 2011
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Eobrachychthonius borealis* Forsslund, 1942
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Eobrachychthonius iranicus* Akrami, 2016
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Eobrachychthonius latior* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius*)
(=*Brachychthonius brevis glabra* Thor, 1930)
(=*Eobrachychthonius grandis* Sellnick, 1944)
(=*Eobrachychthonius latior strictior* Lombardini, 1962)
(=*Brachychthonius mooseri* Hammen, 1951)
(=*Eobrachychthonius sexnotatus* Jacot, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).
- *Eobrachychthonius longisetosus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Eobrachychthonius oudemansi* Hammen, 1952
(=*Eobrachychthonius argentinensis* Hammer, 1958)
(?= *Brachychthonius laetepictus* Berlese, 1910 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, China suroriental, Neotropical, Antártica: I. Georgia del Sur) y subantártica (I. Malvinas [I. Falkland]).
- *Eobrachychthonius planus* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Borneo.
- *Eobrachychthonius sanukiensis* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eobrachychthonius setus* Sergienko, 1992
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Eobrachychthonius similis* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional e Irán).

Liochthonius Hammen, 1959 (74 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Brachychthonius perpusillus* Berlese, 1910) = *Hypochthonius brevis* Michael, 1888

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Liochthonius (Liochthonius) Hammen, 1959 (73 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Liochthonius (L.) africanus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Liochthonius (L.) alius* Chinone, 1978 (*L. plumosus a.*)
(=*Liochthonius plumosus* Chinone y Aoki, 1972, "nom. praeoc." por Mahunka, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Liochthonius (L.) alpestris* (Forsslund, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Liochthonius (L.) altimonticola* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, ¿Canadá? y Nueva Zelanda.
- *Liochthonius (L.) altus* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (Argentina y Nueva Zelanda).
- *Liochthonius (L.) andinus* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Liochthonius (L.) andrewi* Evison, 1981
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Liochthonius (L.) approximatus* (Jacot, 1939) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Liochthonius (L.) asper* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Luisiana) y China suroriental.

- *Liochthonius (L.) attenuatus* (Jacot, 1938) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Liochthonius (L.) australis* Covarrubias, 1968
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Liochthonius bifurcatus* (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Liochthonius (L.) brevis* (Michael, 1888) (*Hypochthonius*)
(=*Brachychthonius latus* Jacot, 1936)
(=*Brachychthonius perpusillus* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y U.S.A. (Florida).
- *Liochthonius (L.) breviseta* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Liochthonius (L.) clavatus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).
- *Liochthonius (L.) crassus* Chinone, 1978 (*L. alpestris c.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liochthonius curtus* Hammer, 1962 (*L. rigidisetosus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Liochthonius (L.) dilutus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Liochthonius (L.) evansi* (Forsslund, 1958) (*Brachychthonius*)
(=*Liochthonius asotthalomensis* Marshall, Reeves y Norton, 1987)
(=*Liochthonius forsslundi* Mahunka, 1969, “nom. praec.” por Hammer, 1952)
(=*Liochthonius forsslundi levis* Chinone, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Carolina del Norte) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) fimbriatissimus* Hammer, 1962
(=*Brachychthonius fimbriatus* Hammer, 1958, “nom. praec.” por Jacot, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Australiana, Neotropical (América austral y Méjico) y Antártica (I. Príncipe Eduardo).
- *Liochthonius (L.) fimbriatus* (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Liochthonius (L.) forsslundi* (Hammer, 1952) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Liochthonius (L.) furcillatus* (Willmann, 1942) (*Brachychthonius*)
(=*Brachychthonius ensifer* Strenzke, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).
- *Liochthonius (L.) galba* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liochthonius (L.) gisini* (Schweizer, 1948) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Eurosiberiana.
- *Liochthonius (L.) horridus* (Sellnick, 1928) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Liochthonius (L.) hystricinus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
(=*Brachychthonius ocellatus* Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Chile.
- *Liochthonius (L.) idem* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Liochthonius (L.) intermedius* Chinone y Aoki, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) khencensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Liochthonius (L.) kirghisicus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Liochthonius (L.) lacunosus* Wang y Cui, 1992
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Liochthonius (L.) lapponicus* (Trägårdh, 1910) (*Hypochthonius brevis l.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).
- *Liochthonius (L.) latus* Mahunka, 1982
(=*Liochthonius neonominatus* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo).
- *Liochthonius (L.) leptaleus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional, Irán y Japón).
- *Liochthonius (L.) longipilus* (Womersley, 1945) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Argentina.
- *Liochthonius (L.) mollis* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador) y Antártica.
- *Liochthonius (L.) moritzi* Balogh y Mahunka, 1983

- (=*Liochthonius hystericinus tuxeni* Chinone, 1974, "nom. praeoc." por Forsslund, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Liochthonius (L.) murtazalievi* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liochthonius (L.) muscorum* Forsslund, 1964
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Groenlandia).
- *Liochthonius (L.) mussardi* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Liochthonius (L.) neglectus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Liochthonius (L.) nodifer* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico).
- *Liochthonius (L.) nortoni* R. Martínez y Casanueva, 1995
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Liochthonius (L.) oceanicus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Liochthonius (L.) ohnishi* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liochthonius (L.) patagoniensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Liochthonius (L.) peduncularius* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Liochthonius (L.) penicillus* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liochthonius (L.) pepitensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Liochthonius (L.) perelegans* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Liochthonius (L.) perfusorius* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Liochthonius (L.) phitosi* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Liochthonius (L.) plumosus* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooriental y Corea).
- *Liochthonius (L.) prior* (Jacot, 1938) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ténesi).
- *Liochthonius (L.) propinquus* Niedbała, 1972
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Liochthonius (L.) pseudohystericinus* Balogh y Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).
- *Liochthonius (L.) pusillus* Chinone, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Japón y Rumanía).
- *Liochthonius (L.) rigidisetosus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Ecuador).
- *Liochthonius (L.) saltaensis* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Nueva Zelanda y Antártica.
- *Liochthonius (L.) sellnicki* (Thor, 1930) (*Brachychthonius*)
(?= *Brachychthonius brevis expolitus* Berlese, 1910 "sp. inq.")
(= *Brachychthonius nodosus* Willmann, 1952)
(= *Brachychthonius scalaris* Forsslund, 1942)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) similis* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Liochthonius (L.) simplex* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica, Groenlandia, Oriental (Filipinas e India: Tripura), Australia y Sudáfrica.
- *Liochthonius (L.) strenzkei* Forsslund, 1963
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
- *Liochthonius (L.) szemmelveiszi* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Liochthonius (L.) tanzanicus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Liochthonius (L.) tuberculatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Liochthonius (L.) tumidus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Liochthonius (L.) tumulosus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2006

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Liochthonius (L.) tuxeni* (Forsslund, 1957) (*Brachychthonius hystericinus t.*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa occidental e Irán).

- *Liochthonius (L.) tyrrhenicus* Bernini, 1985

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Liochthonius (L.) unilateralis* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Brasil.

Liochthonius (Afroliochthonius) Mahunka, 1995 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Liochthonius (Afroliochthonius) reductus* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Liochthonius (Afroliochthonius) reductus* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Mixochthonius Niedbala, 1972 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachychthonius pilosetosus* Forsslund, 1942

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Mixochthonius concavus* (Chinone, 1974) (*Liochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

- *Mixochthonius pilosetosus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)

(=*Mixochthonius moritzi* Evison, 1981)

DISTRIBUCIÓN: Borealpina (Paleártica occidental y Canadá).

Neobrachychthonius Moritz, 1976 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachychthonius marginatus* Forsslund, 1942

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Neobrachychthonius magnus* Moritz, 1976 (*N. marginatus m.*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).

- *Neobrachychthonius marginatus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)

(=*Brachychthonius neosimplex* Schweizer, 1956)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).

Neoliochthonius Lee, 1982 (3 spp.)

(=*Moritzichthonius* Pereda e Iturrondobeitia, 1990)

(=*Paraliochthonius* Moritz, 1976, "nom. praeoc." por Beier, 1956)

ESPECIE TIPO: *Brachychthonius piluliferus* Forsslund, 1942

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Neoliochthonius globuliferus* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Neoliochthonius occultus* (Niedbala, 1971) (*Liochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.

- *Neoliochthonius piluliferus* (Forsslund, 1942) (*Brachychthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).

Papillochthonius Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Papillochthonius astatus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Papillochthonius astatus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992

DISTRIBUCIÓN: Sahara occidental.

Poecilochthonius Balogh, 1943 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachychthonius brevis italicus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Poecilochthonius italicus* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius brevis i.*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Norte).

- *Poecilochthonius novaezealandicus* (Hammer, 1966) (*Brachychthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Poecilochthonius parallelus* (Womersley, 1945) (*Brachychthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana: Australia y Nuevas Hébridias [Vanuatu].

- *Poecilochthonius spiciger* (Berlese, 1910) (*Brachychthonius brevis s.*)

(=*Brachychthonius rapoportii* Balogh y Mahunka, 1968)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, China suroriental y Neotropical (Argentina e I. Galápagos).

Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964 (45 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Brachychthonius zelawaiensis* Sellnick, 1928

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Sellnickochthonius americanus* (MacQuitty, 1986) (*Brachychochthonius*)

- DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Sellnickochthonius anonymus* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Sellnickochthonius aokii* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Sellnickochthonius borealis* (Krivolutsky, 1965) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
 - *Sellnickochthonius chinonei* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Sellnickochthonius comoroensis* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
 - *Sellnickochthonius cricoides* (Weis-Fogh, 1948) (*Brachychthonius* (*Brachyochthonius*))
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica, India y Australia).
 - *Sellnickochthonius danubialis* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Sellnickochthonius dolosus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Sellnickochthonius elisabethae* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
 - *Sellnickochthonius elsosneadensis* (Hammer, 1958) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica oriental meridional, China suroriental, Australia y Neotropical).
 - *Sellnickochthonius foliatifer* (Mahunka, 1982) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Sudáfrica).
 - *Sellnickochthonius foliatus* (Hammer, 1958) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Nueva Zelanda.
 - *Sellnickochthonius formosus* (Cooreman, 1947) (*Eobrachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
 - *Sellnickochthonius fuentesi* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Sellnickochthonius furcatus* (Weis-Fogh, 1948) (*Brachychthonius* (*Brachyochthonius*))
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática) y Canadá.
 - *Sellnickochthonius gracilis* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Japón e Irán) y China suroriental.
 - *Sellnickochthonius griseus* (Hammer, 1958) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Sellnickochthonius guanophilus* (Mahunka, 1979) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Sellnickochthonius hanyensis* Mahunka y Mahunka-Papp, 2002
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Sellnickochthonius heterotrichus* (Balogh, 1963) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
 - *Sellnickochthonius honestus* (Moritz, 1976) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
 - *Sellnickochthonius ilyinae* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Sellnickochthonius immaculatus* (Forsslund, 1942) (*Brachyochthonius*)
(=*Brachyochthonius arcticus* Hammer, 1952)
(=*Brachyochthonius berleseii erosus* Jacot, 1938)
(=*Brachychthonius gygeri* Bader, 1963)
(=*Brachychthonius obscurus* Krivolutsky, 1966)
(=*Brachychthonius semiornatus* Evans, 1952)
(=*Brachychthonius striatus* Willmann, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Neotropical.
 - *Sellnickochthonius jacoti* (Evans, 1952) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Carolina del Norte).
 - *Sellnickochthonius japonicus* (Chinone, 1974) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Sellnickochthonius lydiae* (Jacot, 1938) (*Brachyochthonius*)
(=*Brachychthonius hammerae* Chinone y Aoki, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Japón.
 - *Sellnickochthonius maroccanus* (Mahunka, 1980) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
 - *Sellnickochthonius meridionalis* (Bernini, 1973) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Sellnickochthonius monticola* (Hammer, 1961) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Sellnickochthonius miyauchii* (Chinone, 1978) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Sellnickochthonius muara* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo y Ecuador.
- *Sellnickochthonius niliacus* (Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid y El-Deeb, 1984) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Sellnickochthonius oesziae* (Balogh y Mahunka, 1979) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Sellnickochthonius paraplatus* (Niedbala, 1982) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Polonia.
- *Sellnickochthonius phyllophorus* (Moritz, 1976) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Sellnickochthonius plumosus* Subías y Gil, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- Sellnickochthonius rostratus* (Jacot, 1936) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
 - *Sellnickochthonius rostratus rostratus* (Jacot, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Sellnickochthonius rostratus hungaricus* (Balogh, 1943) (*Poecilochthonius h.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y China suroriental.
- *Sellnickochthonius rotundatus* (Hammer, 1958) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Sellnickochthonius similis* (Hammer, 1961) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Nueva Guinea.
- *Sellnickochthonius suecicus* (Forslund, 1942) (*Brachyochthonius jugatus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica, Neártica septentrional, Australiana: Nueva Zelanda, y subantártica: I. Amsterdam).
- *Sellnickochthonius tropicus* (Hammer, 1958) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Ecuador).
- *Sellnickochthonius variabilis* (Mahunka, 1982) (*Brachyochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Sellnickochthonius zelawaiensis* (Sellnick, 1928) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).

Synchthonius Hammen, 1952 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Synchthonius boschmai* Hammen, 1952) = *Brachyochthonius crenulatus* Jacot, 1938

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Synchthonius crenulatus* (Jacot, 1938) (*Brachyochthonius*)
(= *Synchthonius boschmai* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente).
- *Synchthonius elegans* Forslund, 1956
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
- *Synchthonius lentus* (Chinone, 1974) (*Liochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Verachthonius Moritz, 1976 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachychthonius laticeps* Strenzke, 1951

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).

- *Verachthonius congruus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Verachthonius diversus* Moritz, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Verachthonius laticeps* (Strenzke, 1951) (*Brachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Rusia asiática).
- *Verachthonius montanus* (Hammer, 1952) (*Eobrachychthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional y Argentina.
- *Verachthonius moritzi* Lee, 1982
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Verachthonius pseudolaticeps* (Subías, 1977) (*Liochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: España.

Heterochthonioidea Grandjean, 1954

Heterochthoniidae Grandjean, 1954 (3 gen. y 6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Heterochthonius Berlese, 1910 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Heterochthonius) gibbus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Heterochthonius byzovae* Krivolutsky, 1977

DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.

- *Heterochthonius caucasicus* Krivolutsky, 1977

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Heterochthonius gibbus* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius (H.)*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Heterochthonius monocerus* Pankov, 2002

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Neovochthonius Judson, 2009 (1 sp.)

(=*Neochthonius* Karppinen, 1984, “nom. praeoc.” por Chamberlin, 1929)

ESPECIE TIPO: *Neochthonius latisetosus* Golosova y Karppinen, 1984

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Neovochthonius latisetosus* (Golosova y Karppinen, 1984) (*Neochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: I. Sajalín.

Ovochthonius Rjabinin, 1977 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Ovochthonius rossicus* Rjabinin, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Ovochthonius rossicus* Rjabinin, 1977

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Trichthoniidae Lee, 1982 (3 gen. y 5 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Australiana.

Gozmanyina Balogh y Mahunka, 1983 (3 spp.)

(=*Marshallia* Gordeeva, 1980, “nom. praeoc.” por Zittel, 1887)

ESPECIE TIPO: *Trichthonius majestus* Marshall y Reeves, 1971

DISTRIBUCIÓN: Boreal y Neotropical austral.

- *Gozmanyina golosovae* (Gordeeva, 1980) (*Marshallia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Gozmanyina majestus* (Marshall y Reeves, 1971) (*Trichthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Gozmanyina pehuen* R. Martínez y Casanueva, 1996

DISTRIBUCIÓN: Chile.

Nipponiella Gordeeva, 1980 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Trichthonius simplex* Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Nipponiella simplex* (Aoki, 1966) (*Trichthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Trichthonius Hammer, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius pulcherrimus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

- *Trichthonius pulcherrimus* (Hammer, 1958) (*Cosmochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australia.

Arborichthoniidae J. y P. Balogh, 1992 (1 gen. y 2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Arborichthonius Norton, 1982 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Arborichthonius styosetosus* Norton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Arborichthonius azarbaijaniensis* Lotfollahi y Movahedzade, 2016

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Arborichthonius styosetosus* Norton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Canadá y Japón) y China suoriental.

Nanohystricidae Norton y Fuangarworn, 2015 (1 gen. y 1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Nanohystrix Norton y Fuangarworn, 2015 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Nanohystrix hammerae* Norton y Fuangarworn, 2015

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Nanohystrix hammerae* Norton y Fuangarworn, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Cosmochthonioidea Grandjean, 1947

- Cosmochthoniidae** Grandjean, 1947 (3 gen., 2 subg., 45 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- Cosmochthonius*** Berlese, 1910 (34 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius lanatus* Michael, 1885
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Cosmochthonius (Cosmochthonius) Berlese, 1910 (31 spp. y 3 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Cosmochthonius (C.) agartalensis* Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Cosmochthonius (C.) asiaticus* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y España).
- *Cosmochthonius (C.) assamensis* Talukdar y Chakrabarti, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Assam).
- *Cosmochthonius (C.) australicus* Womersley, 1945 (*C. plumatus a.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Cosmochthonius (C.) bengalensis* Chakrabarti, Bhaduri y Raychaudhuri, 1972
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Cosmochthonius (C.) bhutanensis* Chakrabarti y Wilson, 1981
DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Cosmochthonius (C.) concavus* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Cosmochthonius (C.) desaussurei* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Cosmochthonius (C.) foliatus* Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Cosmochthonius (C.) imperfectus* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Cosmochthonius (C.) lanatus (Michael, 1885) (*Hypochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

- *Cosmochthonius (C.) lanatus lanatus* (Michael, 1885)
(=*Cosmochthonius arctosus* Pankov, 2002)
(=*Cosmochthonius domesticus* Grandjean, 1947)
(=*Cosmochthonius novus* Sergienko, 1991)
(=*Cosmochthonius wallworki* Lee, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica: frecuente, Etiópica, Oriental y Neotropical).
- *Cosmochthonius (C.) lanatus diversiseta* Sarkar y Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Cosmochthonius (C.) lanatus foveolatus* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, China suroriental y Japón.
- *Cosmochthonius (C.) lusitanicus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) macrosetosus* Ayyildiz y Luxton, 1990
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Cosmochthonius (C.) margaritatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Cosmochthonius (C.) maroccanus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Cosmochthonius (C.) minifoveolatus* Gil, Subías y Candelas, 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) monegrensis* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) nayloroensis* Fujikawa, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cosmochthonius (C.) perezinigo* Morell, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Cosmochthonius (C.) plumatus Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical y Oriental (India: Tripura, y China suroriental), y Holártica meridional.

- *Cosmochthonius (C.) plumatus plumatus* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional, Neotropical y China suroriental.

- *Cosmochthonius (C.) plumatus suramericanus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, U.S.A. (Nuevo Méjico), e India (Tripura).
- *Cosmochthonius (C.) ponticus* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Cosmochthonius (C.) reticulatus* Grandjean, 1947
(=*Cosmochthonius trivialis* Sergienko, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental (China suroriental e India: Bengala Occidental) y Neotropical (Brasil y Cuba).
- *Cosmochthonius (C.) semiareolatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Madagascar.
- *Cosmochthonius (C.) semifoveolatus* Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: Ibérica y Argentina.
- *Cosmochthonius (C.) signatus* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Cosmochthonius (C.) spinosus* Gil, Subías y Candelas, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Cosmochthonius (C.) sublanatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Cosmochthonius (C.) taurus* Niemi, Gordeeva y Ayyildiz, 2002
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Cosmochthonius (C.) tenuisetus* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Cosmochthonius (C.) ugamaensis* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Grecia).
- *Cosmochthonius (C.) zanini* Penttinen y Gordeeva, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.

Cosmochthonius (Nanochthonius) Subías y Gil-Martín, 1995 (2 spp.)
(=***Microchthonius*** Kahwash, Subías y Ruiz, 1989, "nom. praeoc." por Hadzi, 1933)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Microchthonius) ruizi* Kahwash, Subías y Ruiz, 1989
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Cosmochthonius (Nanochthonius) juvenalis* Kamill, 1986 (C.)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Cosmochthonius (Nanochthonius) ruizi* Kahwash, Subías y Ruiz, 1989 (C. (*Microchthonius*))
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Cosmochthonius (Nortonchthonius) Jorrín, 2014 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Nortonchthonius) oblongisetosus* Jorrín, 2014
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Cosmochthonius (Nortonchthonius) oblongisetosus* Jorrín, 2014
DISTRIBUCIÓN: España.

Krivolutskiella Gordeeva, 1980 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Krivolutskiella pennata* Gordeeva, Penttinen y Petrova, 2007
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Krivolutskiella pubescens* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Phyllozetes Gordeeva, 1978 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius emmae* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Phyllozetes alatus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Phyllozetes emmae* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius*)
(=*Trichthonius heterotrichus* Sanyal y Bhaduri, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.
- *Phyllozetes heelei* Shereef, Hanna y Duweini, 1981
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Phyllozetes hypoquercus* McDaniel y Bolen, 1980
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Phyllozetes latifolius* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y tropical (Méjico e Indonesia: Java y Komodo).
- *Phyllozetes longifolius* Balakrishnan, 1986
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Phyllozetes nilamburicus* Balakrishnan, 1986
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Phyllozetes osithchnjukovi* Gordeeva, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Phyllozetes subiasi* Jorrín, 2014
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Phyllozetes tauricus* Gordeeva, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).

Haplochthoniidae Hammen, 1959 (2 gen., 1 subg. y 15 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Amnemochthonius Grandjean, 1949 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Amnemochthonius taeniophorus* Grandjean, 1949
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Australiana.
- *Amnemochthonius taeniophorus* Grandjean, 1949
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Australia.

Haplochthonius Willmann, 1930 (14 spp.)
ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius (Haplochthonius) simplex* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

Haplochthonius (Haplochthonius) Willmann, 1930 (13 spp.)
(=***Tetrochthonius*** Hammer, 1958)

- DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).
- *Haplochthonius (H.) antarcticus* Sanyal, Basak y Barman, 2002
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
 - *Haplochthonius (H.) chamela* Mahunka y Mejía-Recamier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico e Irán.
 - *Haplochthonius (H.) clavatus* (Hammer, 1958) (*Tetrochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, India y España.
 - *Haplochthonius (H.) crassisetosus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Haplochthonius (H.) graecus* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Haplochthonius (H.) intermedius* Chakrabarti, Bhaduri y Raychaudhuri, 1977
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Haplochthonius (H.) longisetosus* Sanyal, Basak y Barman, 2002
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
 - *Haplochthonius (H.) maitri* Sanyal, Basak y Barman, 2002
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
 - *Haplochthonius (H.) muscicola* Fujikawa, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Haplochthonius (H.) sanctaeluciae* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Subtropical: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental) y tropical: Senegal y Neotropical (I. Galápagos y Chile).
 - *Haplochthonius (H.) simplex* (Willmann, 1930) (*Cosmochthonius (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Etiópica, Oriental y **Brasil**.
 - *Haplochthonius (H.) stylosanthes* Corpuz-Raros y García, 2003
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Haplochthonius (H.) variabilis* Wallwork, 1972
DISTRIBUCIÓN: Neártica meridional.

Haplochthonius (Senilochthonius) Mahunka, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Senilochthonius baobab* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Haplochthonius (Senilochthonius) baobab* (Mahunka, 1992) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Pediculochelidae Lavoipierre, 1946 (1 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Holártica meridional.

Paralycus Womersley, 1944 (7 spp.)
(=***Pediculochelus*** Lavoipierre, 1946)
ESPECIE TIPO: *Alycus pyrigerus* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Holártica meridional.
- *Paralycus chongqingensis* Fan, Li y Xuan, 1996

- DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Paralycus lavoipierrei* (Price, 1973) (*Pediculocheilus*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Este de Rusia europea y U.S.A. (California), y Australia.
 - *Paralycus longior* Fan, Li y Xuan, 1996
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Paralycus parasiti* Zhang y Li, 2001
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Paralycus parvulus* (Price, 1973) (*Pediculocheilus*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Paralycus pyrigerus* (Berlese, 1905) (*Alycus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Paralycus raulti* (Lavoipierre, 1946) (*Pediculocheilus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947 (2 gen. y 18 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Similochthonius Mahunka, 1985 (2 spp.)

(=*Sphaerochochthonius* Mahunka, 1985)

ESPECIE TIPO: *Similochthonius decoratus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Similochthonius australis* (Mahunka, 1985) (*Sphaerochochthonius*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Similochthonius decoratus* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Sphaerochthonius Berlese, 1910 (16 spp.)

(=*Sphaerochthoniella* Mahunka, 1985)

ESPECIE TIPO: *Hypochothionius splendidus* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Sphaerochthonius bengalensis* Sanyal y Sengupta, 1990
 DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Sphaerochthonius fungifer* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Sphaerochthonius gemma* (Oudemans, 1909) (*Hypochothionius*)
 (= *Sphaerochthonius elegans* Berlese, 1910)
 (= *Sphaerochthonius wallworki* Lee, 1982)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java), Australiana (Komodo), Etiópica (Ghana y Somalia) y Sureste de Europa (Crimea).
- *Sphaerochthonius lipataensis* Corpuz-Raros y García, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sphaerochthonius litoralis* Schatz, 2003
 DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Sphaerochthonius longisetus* Mahunka, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Komodo).
- *Sphaerochthonius pallidus* Muñoz-Mingarro, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Sphaerochthonius phyllophorus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Brasil e Irán.
- *Sphaerochthonius spectabilis* Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Sphaerochthonius splendidus* (Berlese, 1904) (*Hypochothionius*)
 (= *Sphaerochthonius dilutus* Sergienko, 1991)
 (= *Sphaerochthonius ovatus* Sergienko, 1991)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Oriental (China suroriental y Vietnam), Australiana (Australia y Polinesia), Neotropical y Etiópica, y subtropical (Holártica meridional: frecuente).
- *Sphaerochthonius strinatii* Mahunka, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Sphaerochthonius suzukii* Aoki, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Japón) y Hawái.
- *Sphaerochthonius transversus* Wallwork, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Ghana, India y Cuba) y Paleártica meridional.
- *Sphaerochthonius uruguayensis* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Sphaerochthonius variesetosus* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Sphaerochthonius windsori* Schatz, 2003

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

Atopochthonioidea Grandjean, 1949

Atopochthoniidae Grandjean, 1949 (3 gen. y 7 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Paleotropical y Australiana).

Atopochthonius Grandjean, 1949 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Atopochthonius artiodactylus* Grandjean, 1949

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Atopochthonius artiodactylus* Grandjean, 1949

DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.

- *Atopochthonius maimaensis* Grishina, 1971

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

Phyllochthonius Travé, 1967 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Phyllochthonius aoutii* Travé, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Phyllochthonius aoutii* Travé, 1967

DISTRIBUCIÓN: Costa de Marfil.

- *Phyllochthonius ovatosetosus* Fuangarworn, 2010

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Phyllochthonius peniculus* Fuangarworn, 2010

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Pterochthonius Berlese, 1913 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmochthonius angelus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica, y Australianooriental.

- *Pterochthonius angelus* (Berlese, 1910) (*Cosmochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental: China suroriental e India (Bengala Occidental), Méjico y Hawái.

- *Pterochthonius roynortoni* Ermilov y Minor, 2015

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Protoplophoroidea Ewing, 1917

Protoplophoridae Ewing, 1917 (7 gen., 2 subg. y 30 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Arthrhoplophora Berlese, 1910 (4 spp.)

(=*Neoprototritia* Shereef, 1978)

(=*Triplophora* Mahunka, 1977)

ESPECIE TIPO: *Arthrhoplophora paradoxa* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Arthrhoplophora adjacentis* Fuangarworn, 2011

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Arthrhoplophora paradoxa* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Arthrhoplophora vulpes* Berlese, 1916

(=*Arthrhoplophora (Triplophora) berlesei* Mahunka, 1977)

DISTRIBUCIÓN: África oriental y Vietnam.

- *Arthrhoplophora zachvatkini* (Shereef, 1978) (*Neoprototritia*)

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Bursoplophora Subías y Pérez-Íñigo, 1978 (9 spp.)

(=*Csibiplophora* Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Bursoplophora iberica* Subías y Pérez-Íñigo, 1978

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y Paleártica meridional.

- *Bursoplophora bivaginata* (Grandjean, 1932) (*Protoplophora*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Bursoplophora ethiopica* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Bursoplophora genavensium* (Mahunka, 1984) (*Csibiplophora*)

DISTRIBUCIÓN: Paraguay.

- *Bursoplophora iberica* Subías y Pérez-Íñigo, 1978

DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

- *Bursoplophora insularis* Kahwash, Subías y Ruiz, 1989

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Bursoplophora madagassica* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bursoplophora meridionalis* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Bursoplophora muraiae* Mahunka y Mejía-Recamier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Bursoplophora tyrrhenica* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Cryptoplophora Grandjean, 1932 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Cryptoplophora abscondita* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).
- *Cryptoplophora abscondita* Grandjean, 1932
(=*Cryptoplophora asiatica* Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica (Nigeria), Oriental (Java) y Neotropical, y subtropical: Paleártica meridional y Neártica (U.S.A.: Tejas).

Grandjeanoplophora Balogh y Mahunka, 1979 (2 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Cryptoplophora mauritanica* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Grandjeanoplophora (Grandjeanoplophora) Balogh y Mahunka, 1979 (1 sp.)

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Grandjeanoplophora (G.) mauritanica* (Grandjean, 1932) (*Cryptoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Grandjeanoplophora (Tauroplophora) Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1998 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Tauroplophora aureonotata* Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1998
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Grandjeanoplophora (Tauroplophora) aureonotata* (Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1998) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Crimea.

Hauseroplophora Mahunka, 1977 (3 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Hauseroplophora soniae* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Hauseroplophora flagellata* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hauseroplophora phitosi* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Hauseroplophora soniae* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Protoplophora Berlese, 1910 (4 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Protoplophora palpalis* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australianooriental.
- *Protoplophora iranica* Akrami y Behmanesh, 2012
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Protoplophora oglasicola* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Protoplophora palpalis* Berlese, 1910
(=*Protoplophora grandjeani* Bernini, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: California) y Australia.
- *Protoplophora takensis* Fuangarworn, 2011
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Prototritia Berlese, 1916 (7 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Arthrhoplophora (Prototritia) armadillo* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Prototritia (Prototritia) Berlese, 1916 (6 spp.)

- (=*Aedoplophora* Grandjean, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Prototritia (P.) armadillo* (Berlese, 1916) (*Arthrhoplophora (P.)*)
(=*Aedoplophora africana* Mahunka, 1977)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Prototritia (P.) glomerata* (Grandjean, 1932) (*Aedoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Filipinas.

- *Prototritia (P.) grandjeani* (Mahunka, 1977) (*Aedoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Java y Komodo).
- *Prototritia (P.) major* (Jacot, 1933) (*Aedoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Prototritia (P.) palaciosi* Mahunka y Mejía-Recamier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Prototritia (P.) triangularibus* Niedbala, 2015
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Prototritia (Siciliophora) Bernini, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Prototritia (Siciliophora) sicula* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Prototritia (Siciliophora) sicula* Bernini, 1983
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).

Hypochthonioidea Berlese, 1910

Hypochthoniidae Berlese, 1910 (4 gen., 1 subg., 26 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Eohypochthonius Jacot, 1938 (13 spp.)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius gracilis* Jacot, 1936
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Eohypochthonius (Eohypochthonius) Jacot, 1938 (12 spp.)
(=*Afrhypochthonius* Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Eohypochthonius (E.) africanus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Eohypochthonius (E.) asiaticus* (Berlese, 1910) (*Hypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Eohypochthonius (E.) becki* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eohypochthonius (E.) benacensis* Schatz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Eohypochthonius (E.) crassisetiger* Aoki, 1959 (*E. gracilis* c.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Cáucaso y Paleártica oriental (excepto Norte), Australianooriental y Cuba.
- *Eohypochthonius (E.) gracilis* (Jacot, 1936) (*Hypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica): frecuente y subtropical.
- *Eohypochthonius (E.) magnus* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Minesota) y China suroriental.
- *Eohypochthonius (E.) parvus* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental).
- *Eohypochthonius (E.) robustus* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eohypochthonius (E.) salicifolius* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Borneo).
- *Eohypochthonius (E.) vermicularis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eohypochthonius (E.) vilhenarum* (Balogh, 1958) (*Afrhypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica e India (Bengala Occidental).

Eohypochthonius (Neoatrichosus) Fernández, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei* Fernández, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eohypochthonius (Neoatrichosus) travei* Fernández, 1984
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Hypochthonius Koch, 1835 (5 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Hypochthonius rufulus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Hypochthonius elegans* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Hypochthonius luteus* Oudemans, 1917
(=*Hypochthonius luteus rectosetosus* Krivolutsky, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Noreste de Oriental y Nueva Zelanda.

- *Hypochthonius montanus* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Hypochthonius rufulus* Koch, 1835
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Oriental, I. Seychelles y Méjico).
 - *Hypochthonius rufulus rufulus* Koch, 1835
(=*Hypochthonius rufulus brevisetosus* Krivolutsky, 1965)
(=*Hypochthonius pallidulus* Koch, 1835)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental, I. Seychelles y Méjico).
 - *Hypochthonius rufulus carolinicus* Jacot, 1936 “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Hypochthonius rufulus europaeus* Krivolutsky, 1965
DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
 - *Hypochthonius rufulus paucipectinatus* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Hypochthonius ventricosus* (Canestrini, 1898) (*Hermannia*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Malacoangelia Berlese, 1913 (3 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Malacoangelia remigera* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Malacoangelia assamica* Talukdar y Chakrabarti, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Assam).
- Malacoangelia remigera* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
 - *Malacoangelia remigera remigera* Berlese, 1913
(=*Malacoangelia remigera symmetrica* Wallwork, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
 - *Malacoangelia remigera indica* Chakrabarti, Bhaduri y Raychaudhuri, 1972
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Malacoangelia similis* Sarkar y Subías, 1982
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Nothrolohmannia Balogh, 1968 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nothrolohmannia calcarata* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Nothrolohmannia baloghi* Norton, 2003
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nothrolohmannia calcarata* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nothrolohmannia flagellata* Fuangarworn y Lekprayoon, 2012
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Nothrolohmannia samarensis* Norton y Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Nothrolohmannia thailandica* Fuangarworn y Lekprayoon, 2012
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Eniochthoniidae Grandjean, 1947 (1 gen. y 6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hypochthoniella Berlese, 1910 (6 spp.)

(=*Arthrochthonius* Ewing, 1917)

(=*Eniochthonius* Grandjean, 1933)

ESPECIE TIPO: *Hypochthonius minutissimus* Berlese, 1903

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Hypochthoniella crosbyi* (Ewing, 1909) (*Hypochthonius*)
(=*Eniochthonius borealis* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Sur).
- *Hypochthoniella fukushiraensis* Shiraiishi y Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hypochthoniella mahunkai* (Norton y Behan-Pelletier, 2007) (*Eniochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Hypochthoniella minutissima* (Berlese, 1903) (*Hypochthonius*)
(=*Eniochthonius grandjeani* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Hypochthoniella paludicola* Fujikawa, 1994
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hypochthoniella sumatrana* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Malgache.

Psammochthoniidae Fuangarworn y Norton, 2013 (1 gen. y 1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Neártica, Neotropical y Oriental.

Psammochthonius Fuangarworn y Norton, 2013 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Psammochthonius kethleyi* Fuangarworn y Norton, 2013

DISTRIBUCIÓN: Neártica, Neotropical y Oriental.

- *Psammochthonius kethleyi* Fuangarworn y Norton, 2013

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí), Brasil y Tailandia.

Lohmannioidea Berlese, 1916

Lohmanniidae Berlese, 1916 (22 gen., 5 subg., 219 spp. y 9 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Annectacarus Grandjean, 1950 (17 spp.)

ESPECIE TIPO: *Annectacarus mucronatus* Grandjean, 1950

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Annectacarus africanus* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica e Indonesia (Komodo).

- *Annectacarus aokii* Jaikumar, Haq y Ramani, 1994

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Annectacarus eksteeni* Coetzee, 2001

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Annectacarus granditrichosus* Sengbusch, 1984

DISTRIBUCIÓN: Micronesia.

- *Annectacarus hainanensis* Hu y X. Wang, 1990

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Annectacarus hammerae* Shiji, Haq y Ramani, 2007

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Annectacarus insculptus* Wallwork, 1962

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Annectacarus krachan* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Annectacarus longisetosus* Bhattacharya, Bhaduri y Raychaudhuri, 1974

DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

- *Annectacarus mahabaeus* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas e India: Kerala).

- *Annectacarus mucronatus* Grandjean, 1950

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) y "oeste de Oriental".

- *Annectacarus parallelus* (Berlese, 1916) (*Lohmannia*)

DISTRIBUCIÓN: Somalia.

- *Annectacarus perezinigoï* Călugăr y Vasiliu, 1983

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Annectacarus sejugatus* Wallwork, 1962

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Annectacarus trivandricus* Haq, 1978

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Annectacarus unilateralis* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Tropical: Polinesia (I. Tonga), Oriental (Java y Vietnam) e I. Galápagos.

- *Annectacarus vinalesensis* Ermilov y Tolstikov, 2015

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Annectacarus wallworki* Adolph y Haq, 1991

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Bedoslohmannia Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bedoslohmannia annea* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Bedoslohmannia annea* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Cryptacarus Grandjean, 1950 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.

- *Cryptacarus dendrisetosus* Bhattacharya, Bhaduri y Raychaudhuri, 1974

DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

- *Cryptacarus grandjeani* Adolph y Haq, 1991
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Cryptacarus keralensis* Shiji, Haq y Ramani, 2007
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Cryptacarus longipilus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Cryptacarus promecus* Grandjean, 1950
(=*Lohmannia valdemorica* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental) y Etiópica.
- *Cryptacarus schauenbergi* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Cryptacarus tuberculatus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Dendracarus Balogh, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Dendracarus pulchellus* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Dendracarus pulchellus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Haplacarus Wallwork, 1962 (11 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Haplacarus foliatus* Wallwork, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Haplacarus bhadurii* Sanyal, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Maharashtra).
- *Haplacarus davisi* Xavier, Haq y Ramani, 2005
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- Haplacarus foliatus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (África centrooccidental, Oriental, Norte de Neotropical y Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Haplacarus foliatus foliatus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (África centrooccidental, Oriental, Norte de Neotropical y Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Haplacarus foliatus bengalensis* Bhattacharya, Bhaduri y Raychaudhuri, 1974
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Haplacarus javensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java) y Neotropical (Centroamérica e I. Galápagos).
- *Haplacarus keralensis* Haq, Mubarak y Ramani, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Haplacarus maharashtraensis* Sanyal, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Maharashtra).
- *Haplacarus pairathi* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Haplacarus pandanus* Sengbusch, 1982
DISTRIBUCIÓN: Micronesia.
- *Haplacarus porosus* Haq y Adolph, 1995
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Haplacarus rugosus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Haplacarus xavieri* Xavier, Haq y Ramani, 2005
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Heptacarus Piffel, 1963 (10 spp.)

(=*Neotrichacarus* Hammer, 1973)

(=*Pseudocryptacarus* McDaniel, Norton y Bolen, 1979)

ESPECIE TIPO: *Heptacarus notoneotrichus* Piffel, 1963

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

- *Heptacarus encantadae* Schatz, 1994
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Heptacarus graminosus* (McDaniel, Norton y Bolen, 1979) (*Pseudocryptacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Heptacarus hirsutus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad) y Oriental (India: Kerala y Rajastán).
- *Heptacarus neotropicus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Heptacarus notoneotrichus* Piffel, 1963
DISTRIBUCIÓN: África nororiental.

- *Heptacarus ornatus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1985
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Heptacarus piffli* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Sumbawa).
- *Heptacarus plumosus* (Hammer, 1973) (*Neotrichacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (I. Samoa), y Oriental: Filipinas.
- *Heptacarus reticulatus* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Komodo) e I. Seychelles.
- *Heptacarus supertrichus* Piffli, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Iraq y Túnez) e Irán, y Norte de Neotropical.

Javacarus Balogh, 1961 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Javacarus kuehneli* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Javacarus (*Javacarus*) Balogh, 1961 (7 spp.)

(=*Tongacarus* Hammer, 1973)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Javacarus (J.) foliatus* Hammer, 1972 (*J. kuehneli f.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Noreste de India).
- *Javacarus (J.) granulatus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Java y Melanesia (I. Fiji).
- *Javacarus (J.) inexpectatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Surinam).
- *Javacarus (J.) jocelynae* Judson, 1991
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Javacarus (J.) kuehneli* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: frecuente, y Australiana: Islas del Pacífico) y Egipto.
- *Javacarus (J.) marginatus* (Hammer, 1973) (*Tongacarus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Javacarus (J.) porosus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Javacarus (*Euryacarus*) Woolley, 1966 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Euryacarus petalus* Woolley, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Javacarus (Euryacarus) petalus* (Woolley, 1966) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Guatemala y Brasil).
- *Javacarus (Euryacarus) pilosus* (Mahunka, 1982) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Lepidacarus Csiszár, 1961 (2 spp. y 1 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lepidacarus ornatissimus* Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Lepidacarus ennarpi* Haq y Ramani, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sur de India.
- *Lepidacarus ornatissimus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nueva Caledonia).
- *Lepidacarus ornatissimus ornatissimus* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Australiana (Nueva Caledonia).
- *Lepidacarus ornatissimus rehmabia* Haq, Mubarak y Ramani, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Lohmannia Michael, 1898 (30 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Michaelia paradoxa* Haller, 1884

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Lohmannia (*Lohmannia*) Michael, 1898 (28 spp. y 1 ssp.)

(=*Michaelia* Haller, 1884, “nom. praeoc.” por Roemer, 1852)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Lohmannia (L.) banksi* Norton, Metz y Sharma, 1978
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte y Tejas) y Norte de Neotropical.
- *Lohmannia (L.) bifoliata* Willmann, 1936
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Lohmannia (L.) corallium* Nakatamari, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Lohmannia (L.) coreana* Choi, 1985

- DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Lohmannia (L.) embrionalis* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
 - *Lohmannia (L.) guzhangensis* Hu y X. Wang, 1990
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Lohmannia (L.) hungarorum* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Lohmannia (L.) indica* (Kardar, 1972) (*Papillacarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
 - Lohmannia (L.) javana* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Oriental y Melanesia (I. Fiji).
 - *Lohmannia (L.) javana javana* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Melanesia (I. Fiji) y Japón.
 - *Lohmannia (L.) javana interrupta* Choi, 1985
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Lohmannia (L.) jornoti* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Lohmannia (L.) juliae* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Lohmannia (L.) lanceolata* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y China suroriental.
 - *Lohmannia (L.) lerellana* Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Lohmannia (L.) maya* Iglesias y Palacios-Vargas, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Lohmannia (L.) paradoxa* (Haller, 1884) (*Michaelia*)
(=*Papillacarus egypticus* Elbadry y Nasr, 1977)
(=*Lohmannia loebli* Mahunka, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Mediterránea y Alemania) e Irán.
 - *Lohmannia (L.) pinnigera* Sengbusch, 1984
DISTRIBUCIÓN: Micronesia.
 - *Lohmannia (L.) pseudoturcmenica* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Lohmannia (L.) regalis* Berlese, 1923
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Lohmannia (L.) reticulata* Sellnick, 1931 (*L. regalis r.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Grecia y Eslovenia).
 - *Lohmannia (L.) semibarbulata* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Lohmannia (L.) serrata* Hu y X. Wang, 1990
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Lohmannia (L.) similis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Lohmannia (L.) texana* (Banks, 1910) (*Hypochthonius*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
 - *Lohmannia (L.) triangulata* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Lohmannia (L.) turcmenica* Bulanova-Zachvatkina, 1960 (*L. lanceolata t.*)
(=*Lohmannia hispaniola* Pérez-Íñigo, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (China suroriental) y Neotropical (Argentina), y subtropical (Paleártica meridional).
 - *Lohmannia (L.) unsui* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Lohmannia (L.) vanharteni* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
 - *Lohmannia (L.) vulcania* Schatz, 1993
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- Lohmannia (Carolohmannia)*** Norton, Metz y Sharma, 1978 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia (Carolohmannia) carolensis* Norton, Metz y Sharma, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Oriental.
- *Lohmannia (Carolohmannia) carolensis* Norton, Metz y Sharma, 1978
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Sur).
 - *Lohmannia (Carolohmannia) monosetosa* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Meristacarus Grandjean, 1934 (15 spp. y 3 sspp.)

(=*Javalohmannia* Hammer, 1979)

ESPECIE TIPO: *Meristacarus porcula* Grandjean, 1934

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Meristacarus africanus Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.

- *Meristacarus africanus africanus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Meristacarus africanus annobonensis* Pérez-Íñigo, 1969

DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón] y Vietnam.

- *Meristacarus biroi* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Meristacarus bogorensis* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Meristacarus degradatus* Haq y Jaikumar, 1993

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Meristacarus douhereti* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

- *Meristacarus gapudi* Corpuz-Raros y Lit, 2009

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Meristacarus heterotrichus Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Melanesia (I. Fiji).

- *Meristacarus heterotrichus heterotrichus* Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y China suroriental) y Melanesia (I. Fiji).

- *Meristacarus heterotrichus glabrisetus* Mahunka, 1988 (*M. g.*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Meristacarus longisetosus* Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente en Centroamérica).

Meristacarus madagascarensis Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Malgache) y Oriental (Tailandia y Vietnam).

- *Meristacarus madagascarensis madagascarensis* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Malgache y Vietnam.

- *Meristacarus madagascarensis obscurus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Meristacarus porcula* Grandjean, 1934

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: frecuente, Etiópica: Ghana, y Oriental: Filipinas).

- *Meristacarus rubescens* (Canestrini, 1897) (*Hermannia*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Polinesia: Tahití) y Oriental (Java y Península Malaya).

- *Meristacarus striatus* (Hammer, 1979) (*Javalohmannia*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Meristacarus sundensis* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Meristacarus tuloyus* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Meristacarus wynadensis* Haq y Adolph, 1995

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Meristolohmannia Balogh y Mahunka, 1966 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Meristolohmannia meristacaroides* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Meristolohmannia abbreviata* Y. Chen, Yang y Xie, 2010

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Meristolohmannia chinensis* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Meristacarus*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Meristolohmannia meristacaroides* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Mixacarus Balogh, 1958 (24 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Mixacarus integer* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

Mixacarus (Mixacarus) Balogh, 1958 (18 spp. y 1 ssp.)

(=*Hamacarus* Hammer, 1977)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

- *Mixacarus (M.) brevipes* (Banks, 1947) (*Lohmannia*)

DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A. y Costa Rica.

- *Mixacarus (M.) chapmani* Wallwork, 1962

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

Mixacarus (M.) exilis Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Este de Paleártica oriental, Irán y Cáucaso) y Oriental (China suroriental y Vietnam).

- *Mixacarus (M.) exilis exilis* Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Este de Paleártica oriental y Cáucaso) y Oriental (China suroriental y Vietnam).

- *Mixacarus (M.) exilis foveolatus* Aoki, 1987

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Mixacarus (M.) facundo* Corpuz-Raros y García, 2003

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Mixacarus (M.) hexagonus* Fujikawa, 2008

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Mixacarus (M.) integer* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).

- *Mixacarus (M.) lawariensis* (Hammer, 1977) (*Hamacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Mixacarus (M.) murcioides* (Berlese, 1896) (*Angelia*)

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Mixacarus (M.) neotropicus* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mixacarus (M.) quadrifasciatus* Balakrishnan, 1986

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Mixacarus (M.) sublestus* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Mixacarus (M.) suoxiensis* Hu y X. Wang, 1990

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Mixacarus (M.) taibaiensis* Y. Chen y Yang, 2011

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Mixacarus (M.) tianmuensis* Y. y L. Li, 1985

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Mixacarus (M.) turialbaiensis* Fernández, Theron, Leiva y Tiedt, 2017

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Mixacarus (M.) vanhongui* Mahunka, 1973

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Mixacarus (M.) vanuatuensis* Ermilov y Deharveng, 2016

DISTRIBUCIÓN: Nuevas Hébridas [Vanuatu].

- *Mixacarus (M.) zhuzhikovi* Bulanova-Zachvatkina, 1979

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Mixacarus (Phyllolohmannia) J. y P. Balogh, 1987 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mixacarus hamanni* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) foliifer* Golosova, 1984 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) hamanni* Balogh, 1961 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) luiseae* Mahunka, 2008 (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) pectinatus* Ermilov y Kalúz, 2014

DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) tenasserimensis* Fuangarworn y Chaisuekul, 2011

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) variatus* Fuangarworn y Chaisuekul, 2011

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Mixacarus (Phyllolohmannia) yinae* (Hu y Aoki, 1993) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Nesiacarus Csiszár, 1961 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nesiacarus reticulatus* Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Nesiacarus australis* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Paraguay.

- *Nesiacarus completus* Hu y X. Wang, 1990

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Nesiacarus granulatus* Hammer, 1972

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití), Japón y Norte de Neotropical.

- *Nesiacarus philippinensis* Mahunka, 1990

- DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Nesiacarus reticulatus* Csiszár, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Nesiacarus schusteri* Schatz, 1994
 DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
 - *Nesiacarus sinensis* Hu y X. Wang, 1988
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Ozacarus Colloff y Halliday, 1998 (2 spp.)
 (= ***Austracarus*** J. y P. Balogh, 1983, "nom. praeoc." por Lawrence, 1949)
 ESPECIE TIPO: *Austracarus reductus* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Ozacarus reductus* (J. y P. Balogh, 1983) (*Austracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Ozacarus tahitiensis* (Hammer, 1972) (*Meristacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia.

Papillacarus Kunst, 1959 (37 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Lohmannia murcioides aciculata* Berlese, 1904
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Papillacarus (Papillacarus) Kunst, 1959 (18 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Papillacarus (P.) aciculatus* (Berlese, 1904) (*Lohmannia murcioides a.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Paleártica occidental (excepto Norte) e Irán, y Vietnam.
- *Papillacarus (P.) aequalis* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Papillacarus (P.) angulatus* Wallwork, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Paleártica meridional (Cáucaso e Irán), Brasil e India (Maharashtra).
- *Papillacarus (P.) benenensis* Vū, Ermilov y Dao, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus (P.) conicus* Fujikawa, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Papillacarus (P.) echinatus* Li y H. Chen, 1991
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Asia centrooccidental.
- *Papillacarus (P.) elongatus* Xavier, 2007
 DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Papillacarus (P.) gramenicus* Bayartogtokh, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Papillacarus (P.) indistinctus* Ermilov, Anichkin y Wu, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Papillacarus (P.) lienhardi* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Papillacarus (P.) ondriasi* Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y China suroriental.
- *Papillacarus (P.) pavlovskii* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Thamnacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Papillacarus (P.) polygonatus* Ermilov y Anichkin, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus (P.) pseudoaciculatus* Mahunka, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Australia.
- *Papillacarus (P.) simplirostratus* Bhattacharya, Bhaduri y Raychaudhuri, 1974
 DISTRIBUCIÓN: India.
- *Papillacarus (P.) spinosus* Alzuet, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Papillacarus (P.) undirostratus* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Papillacarus (P.) vitis* Elbadry y Nasr, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Papillacarus (Vepracarus) Aoki, 1965 (19 spp.)

ESPECIE TIPO: *Vepracarus ogawai* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Papillacarus (Vepracarus) abchasicus* Tarba, 1985 (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Papillacarus (Vepracarus) akimovi* Sergienko, 1992 (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

- *Papillacarus (Vepracarus) chamartinensis* Pérez-Íñigo, 1967 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).
- *Papillacarus (Vepracarus) cornutus* (Sarkar y Subías, 1984) (V.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Tripura) y Vietnam, y Australiana: Nuevas Hébridias [Vanuatu].
- *Papillacarus (Vepracarus) cruzae* Corpuz-Raros, 1979 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y China suroriental).
- *Papillacarus (Vepracarus) gueyeae* (Pérez-Íñigo, 1989) (V.)
DISTRIBUCIÓN: Senegal y Vietnam.
- *Papillacarus (Vepracarus) hirsutus* (Aoki, 1961) (*Cryptacarus*)
(=*Papillacarus arboriseta* Jeleva y Vû, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica, Oriental: frecuente, y Polinesia) y subtropical (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
- *Papillacarus (Vepracarus) incompletus* (Mahunka, 1985) (V.)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Papillacarus (Vepracarus) jinggangshanensis* (Y. Chen, Yang y Liang, 2010) (V.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Papillacarus (Vepracarus) konglinensis* Y. Chen y Yang, 2011 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Papillacarus (Vepracarus) koreanus* (Mahunka, 1973) (V.)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Papillacarus (Vepracarus) luteus* Ermilov, 2015 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus (Vepracarus) ogawai* (Aoki, 1965) (V.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) e Irán.
- *Papillacarus (Vepracarus) parapolysetosus* Ermilov y Tolstikov, 2015 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Papillacarus (Vepracarus) polysetosus* Ermilov, Anichkin y Wu, 2012 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillacarus (Vepracarus) punctatus* (Hu y X. Wang, 1990) (V.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental e Irán.
- *Papillacarus (Vepracarus) ramirezae* (Corpuz-Raros, 1979) (V.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Papillacarus (Vepracarus) ramosus* Balogh, 1961 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Papillacarus (Vepracarus) whitteni* Fernández, Theron, Rollard y Leiva, 2015 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Paulianacarus Balogh, 1961 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Paulianacarus laevis* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Paulianacarus (Paulianacarus) Balogh, 1961 (10 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Paulianacarus (P.) barlowi* Coetzee, 2001
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paulianacarus (P.) costaricensis* Fernández, Theron, Leiva y Tiedt, 2017
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Paulianacarus (P.) groblerae* Coetzee, 2001
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paulianacarus (P.) laevis* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Paulianacarus (P.) longyanensis* Y. Chen, Liang y Yang, 2012
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Paulianacarus (P.) nodosus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Paulianacarus (P.) rugosus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Paulianacarus (P.) rugulosus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Paulianacarus (P.) simplisetosus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Paulianacarus (P.) vietnamese* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Paulianacarus (Millotacarus) Balogh, 1961 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Millotacarus granulatus* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Paulianacarus (Millotacarus) foliatus* Mondal y Chakrabarti, 1983 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Paulianacarus (Millotacarus) granulatus* (Balogh, 1961) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar e India (Andhra Pradesh).
- *Paulianacarus (Millotacarus) indicus* (Sanyal, 1992) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Paulianacarus (Millotacarus) orientalis* (Mahunka, 1988) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Paulianacarus (Millotacarus) sarbias* Coetzee, 2001 (*P.*)
(=*Paulianacarus foliatus* Sarkar y Subías, 1984, “nom. praeoc.” por Mondal y Chakrabarti, 1983)
(=*Paulianacarus sarkarae* P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Reptacarus Pérez-Íñigo y Peña, 1995 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Reptacarus sagatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1995
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Reptacarus sagatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1995
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Strinatacarus Mahunka, 1977 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Strinatacarus aelleni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Strinatacarus aelleni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Thamnacarus Grandjean, 1950 (5 spp.)
(=*Asiacarus* Krivolutsky, 1971)
ESPECIE TIPO: *Lohmannia deserticola* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional y Etiópica).
- *Thamnacarus arnoldii* (Bashkirova, 1958) (*Trhypochthonius*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.
- *Thamnacarus deserticola* (Grandjean, 1934) (*Lohmannia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Thamnacarus elongatus* (Krivolutsky, 1971) (*Asiacarus*)
(=*Thamnacarus moribei* Aoki, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental y Etiopía.
- *Thamnacarus longisetosus* Bulanova-Zachvatkina, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Thamnacarus smirnovi* Bulanova-Zachvatkina, 1978
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Torpacarus Grandjean, 1950 (15 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Torpacarus omittens* Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: **Pantropical (excepto Oriental) y subtropical (Neártica meridional).**
- *Torpacarus callipygus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Torpacarus cinctus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Torpacarus cylindricus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus elegans* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus foliatus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus foveolatus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Torpacarus gramineus* McDaniel, Norton y Bolen, 1979
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Torpacarus izabalensis* Schatz, 1994
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Torpacarus lobatus* Starý, 1998
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Torpacarus magnus* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
Torpacarus omittens Grandjean, 1950
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.
- *Torpacarus omittens omittens* Grandjean, 1950

- DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) y Etiópica.
 - *Torpacarus omittens galapagensis* Schatz, 1994
 DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
 - *Torpacarus omittens paraguayensis* Balogh y Mahunka, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Argentina).
 - *Torpacarus pseudocallipygus* Starý, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Torpacarus remotus* Schatz, 1994
 DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
 - *Torpacarus reticulatus* (Sengbusch, 1982) (*Javacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Micronesia.
 - *Torpacarus schatzi* Starý, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Ululohmannia Mahunka, 1987 (1 sp.)
 (= *Austracarus* Mahunka, 1984, "nom. praeoc." por Lawrence, 1949)
 ESPECIE TIPO: *Austracarus cristatus* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Ululohmannia cristata* (Mahunka, 1984) (*Austracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Xenolohmannia Balogh y Mahunka, 1969 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Xenolohmannia discrepans* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Xenolohmannia capillata* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Xenolohmannia comosa* P. Balogh, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Colombia.
 - *Xenolohmannia discrepans* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Mesoplophoroidea Ewing, 1917

Mesoplophoridae Ewing, 1917 (4 gen., 1 subg., 61 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Apoplophora Aoki, 1980 (18 spp.)
 ESPECIE TIPO: (*Apoplophora remota* Aoki, 1980) = *Mesoplophora pantotrema* Berlese, 1913
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
 - *Apoplophora aokii* Mondal, Kundu y Roy, 1999
 DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Apoplophora cristata* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Apoplophora dentata* Liu, Chen y Qiao, 2009
 DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
 - *Apoplophora heterotricha* Mahunka, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Oriental, China (Tíbet) y "Australiana".
 - *Apoplophora kapiti* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental (Borneo y Australia).
 - *Apoplophora malaya* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Apoplophora marcuardi* Mahunka, 1991
 (= *Apoplophora trisetata* Mahunka, 1991)
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Apoplophora minuscula* Niedbala, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Apoplophora ornata* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Borneo y Península Malaya.
 - *Apoplophora pantotrema* (Berlese, 1913) (*Mesoplophora*)
 (= *Mesoplophora discreta* Berlese, 1913)
 (= *Mesoplophora indica* Mahunka, 1985)
 (= *Apoplophora jaccoudi* Mahunka, 1991)
 (= *Apoplophora lineata* Mahunka, 1987)
 (= *Apoplophora ornatissima* Mahunka, 1988)
 (= *Apoplophora remota* Aoki, 1980)
 (= *Mesoplophora rostrorugosa* Hammer, 1979)
 (= *Mesoplophora striata* Mahunka, 1985)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental: frecuente, y Este de Paleártica oriental.

- *Apoplophora paraserrata* Niedbała, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Apoplophora paraspinosa* Niedbała, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Apoplophora phalerata* Niedbała, 2000
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Apoplophora sarawaki* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Apoplophora serrata* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Apoplophora solomonensis* Niedbała, 1998
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Apoplophora spinosa* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Apoplophora triquetra* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Archoplophora Hammen, 1959 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: (*Phthiracarulus laevis* Jacot, 1938) = *Phthiracarulus rostralis* Willmann, 1930

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, Neotropical y Etiópica).

- *Archoplophora rostralis* (Willmann, 1930) (*Phthiracarulus*)
(=*Phthiracarulus laevis* Jacot, 1938)
(=*Archoplophora villosa* Aoki, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Neártica: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental meridional y Cáucaso), Oriental, Neotropical (Centroamérica) y Etiópica (Madagascar).

Dudichoplophora Mahunka, 1982 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Dudichoplophora reticulata* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Dudichoplophora reticulata* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Mesoplophora Berlese, 1904 (41 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mesoplophora michaeliana* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Mesoplophora (Mesoplophora) Berlese, 1904 (25 spp.)

(=*Phthiracarulus* Berlese, 1920)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

- *Mesoplophora (M.) africana* Balogh, 1958
(=*Mesoplophora ifeana* Badejo, Woas y Beck, 2001)
(=*Mesoplophora insularis* Pérez-Íñigo, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).
- *Mesoplophora (M.) bacilla* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesoplophora (M.) bolivari* Călugăr, 1990
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Mesoplophora (M.) brachysetosa* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesoplophora (M.) brasiliiana* (Vitzthum, 1925) (*Phthiracarulus*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesoplophora (M.) crassisetosa* Subías y Sakar, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Mesoplophora (M.) cubana* Călugăr y Vasiliu, 1977
(=*Mesoplophora cubana pratensis* Scull, 1985)
(=*Mesoplophora longiseta* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Centroamérica y Ecuador).
- *Mesoplophora (M.) frogneri* Niedbała, 2004
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Mesoplophora (M.) gaveae* Schuster, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical, Etiópica (Sudáfrica) y Oriental (Bután).
- *Mesoplophora (M.) hauseri* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Mesoplophora (M.) heterotricha* Liu, 2016
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Mesoplophora (M.) ignota* Niedbała, 1988

- DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Mesoplophora (M.) invisitata* Niedbala, 1983
DISTRIBUCIÓN: **Etiópica** y Oriental: India (Goa).
 - *Mesoplophora (M.) longisetosa* Călugăr y Vasiliu, 1977
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Mesoplophora (M.) michaeliana* Berlese, 1904
(=*Mesoplophora caucasica* Krivolutsky, 1975)
(=*Mesoplophora graeca* Walzl, 1974)
(=*Mesoplophora pectinata* Mahunka, 1979)
(=*Phthiracarus (Phthiracarulus) perexiguus* Berlese, 1920)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Noreste de India.
 - *Mesoplophora (M.) parabolicilla* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Mesoplophora (M.) paragaveae* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
 - *Mesoplophora (M.) parapulchra* Niedbala, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Mesoplophora (M.) permodica* Niedbala, 1985
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental, Neotropical (Venezuela y Costa Rica) e Indonesia.
 - *Mesoplophora (M.) pusilla* Schuster, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Mesoplophora (M.) quasigaveae* Niedbala, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Mesoplophora (M.) rostrata* Mahunka, 1988 (*M. (Parplophora)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Mesoplophora (M.) similis* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Mesoplophora (M.) sparsa* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Perú y Brasil.
 - *Mesoplophora (M.) vesca* Niedbala y Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

***Mesoplophora (Parplophora)* Niedbala, 1985 (16 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Mesoplophora pulchra* Sellnick, 1928

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Mesoplophora (Parplophora) abscondita* Niedbala, 1988
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (frecuente).
- *Mesoplophora (Parplophora) bacula* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Mesoplophora (Parplophora) brevicarinata* Niedbala, 2008
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Mesoplophora (Parplophora) elsi* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) flavida* Niedbala, 1985
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Noreste de China.
- *Mesoplophora (Parplophora) iuvenalis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) japonica* Aoki, 1970 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental, Neártica septentrional y U.S.A.: California).
- *Mesoplophora (Parplophora) leviseta* Hammer, 1979 (*M.*)
(=*Mesoplophora gibba* Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica: Malgache, Oriental: Java, y Australiana: Islas del Pacífico).
- *Mesoplophora (Parplophora) madegassica* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Mesoplophora (Parplophora) niedbalai* Subías, 2009
(=*Mesoplophora (Parplophora) pertenuis* Niedbala, 2006, “nom. praeoc.” por Niedbala, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mesoplophora (Parplophora) paraleviseta* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Mesoplophora (Parplophora) pertenuis* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Mesoplophora (Parplophora) polita* Niedbala, 1985 (*M.*)
(=*Mesoplophora villosa* Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Borneo y Nueva Guinea.
- *Mesoplophora (Parplophora) pulchra* Sellnick, 1928 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y **Etiópica (Tanzania)**.
- *Mesoplophora (Parplophora) setulosa* Niedbala, 2006

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Mesoplophora (Parplophora) subtilis* Niedbala, 1981 (*M.*)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

Suborden MIXONOMATA Grandjean, 1969

Infraorden DICHOSOMATA Balogh y Mahunka, 1979

Nehpochthonioidea Norton y Metz, 1980

Nehpochthoniidae Norton y Metz, 1980 (1 gen. y 2 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional, Oriental y Australiana.

Nehpochthonius Norton y Metz, 1980 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Nehpochthonius porosus* Norton y Metz, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional, Oriental y Australiana.
 - *Nehpochthonius porosus* Norton y Metz, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A., Vietnam y Hawái.
 - *Nehpochthonius yanoi* Aoki, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Perlohmannioidea Grandjean, 1954

Perlohmanniidae Grandjean, 1954 (2 gen., 1 subg. y 11 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

Hololohmannia Kubota y Aoki, 1998 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Hololohmannia alaskensis* Kubota y Aoki, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Hololohmannia alaskensis* Kubota y Aoki, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Alaska.
 - *Hololohmannia skrjabini* (Bashkirova, 1958) (*Eulohmannia*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.

Perlohmannia Berlese, 1916 (9 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Lohmannia insignis* Berlese, 1904
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

Perlohmannia (Perlohmannia) Berlese, 1916 (6 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.
 - *Perlohmannia (P.) altaica* Grishina, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
 - *Perlohmannia (P.) coiffaiti* Grandjean, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Paleártica oriental) y ¿Neártica septentrional?
 - *Perlohmannia (P.) dissimilis* (Hewitt, 1908) (*Lohmannia insignis d.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional, Asia centrooccidental y Este de Rusia asiática) y Hawái.
 - *Perlohmannia (P.) insignis* (Berlese, 1904) (*Lohmannia*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa occidental (excepto Norte).
 - *Perlohmannia (P.) nasuta* Schuster, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Perlohmannia (P.) turcica* Ayyildiz, Subías y Baran, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Perlohmannia (Apolohmannia) Aoki, 1960 (3 spp.)
 (= *Neolohmannia* Bulanova-Zachvatkina, 1960)
 ESPECIE TIPO: *Apolohmannia gigantea* Aoki, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Perlohmannia (Apolohmannia) gigantea* (Aoki, 1960) (*A.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte).
 - *Perlohmannia (Apolohmannia) heterosa* Fujikawa, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Perlohmannia (Apolohmannia) zachvatkini* (Bulanova-Zachvatkina, 1960) (*Neolohmannia*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Rusia asiática).

Collohmanniidae Grandjean, 1958 (1 gen. y 3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Collohmanna Sellnick, 1922 (3 spp.)

(?= *Embolacarus* Sellnick, 1919 [†])

(= *Phthiracaroides* Štorkán, 1923)

ESPECIE TIPO: *Collohmanna gigantea* Sellnick, 1922

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Collohmanna asiatica* Krivolutsky y Christov, 1970

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Collohmanna gigantea* Sellnick, 1922

(= *Phthiracaroides incertus* Štorkán, 1923)

(= *Collohmanna nova* Sellnick, 1932)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centrooriental y Asia centrooccidental).

- *Collohmanna johnstoni* Norton y Sidorchuk, 2014

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia Occidental).

Eulohmannioidea Grandjean, 1931

Eulohmanniidae Grandjean, 1931 (1 gen. y 2 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Eulohmannia Berlese, 1910 (2 spp. y 1 ssp.)

(= *Arthronothrus* Trägårdh, 1910)

ESPECIE TIPO: *Lohmannia (Eulohmannia) ribagai* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Eulohmannia antonii* (Lombardini, 1962) (*Gehyochthonius*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Italia.

Eulohmannia ribagai (Berlese, 1910) (*Lohmannia (E.)*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Eulohmannia ribagai ribagai* (Berlese, 1910)

(= *Arthronothrus biunguiculatus* Trägårdh, 1910)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y China suroriental.

- *Eulohmannia ribagai bifurcata* Fujikawa, 2014

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Epilohmannioidea Oudemans, 1923

Epilohmanniidae Oudemans, 1923 (2 gen., 1 subg., 55 spp. y 8 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Epilohmannia Berlese, 1910 (45 spp. y 8 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Lohmannia cylindrica* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Epilohmannia (Epilohmannia) Berlese, 1910 (33 spp.)

(= *Lesseria* Oudemans, 1917)

(= *Sinolohmannia* Balogh y Mahunka, 1979)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Epilohmannia (E.) amygdaliformis* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.

- *Epilohmannia (E.) barbatula* Balogh, 1958 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Epilohmannia (E.) cultrata* Woolley, 1966

DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

Epilohmannia (E.) cylindrica (Berlese, 1904) (*Lohmannia*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica: Chad y Yemen, Oriental, Australiana: Australia y Hawái, y Neotropical).

- *Epilohmannia (E.) cylindrica cylindrica* (Berlese, 1904)

(= *Phthiracarus szanisloi* Oudemans, 1915)

(= *Epilohmannia verrucosa* Jacot, 1934)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica: Chad, Oriental, Australiana: Hawái, y Neotropical).

- *Epilohmannia (E.) cylindrica media* Lee, 1985

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Epilohmannia (E.) cylindrica minima* Schuster, 1960 (*E. szanisloi m.*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea: frecuente en Europa meridional, e Irán).

- *Epilohmannia (E.) daghestanica* Karpinen y Shtanchaeva, 1987

- DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Epilohmannia (E.) dimorpha* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Sudáfrica) y Oriental (Vietnam).
 - *Epilohmannia (E.) flagellifer* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Epilohmannia (E.) flexuosa* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Epilohmannia (E.) foveolata* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Epilohmannia (E.) gigantea* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
 - *Epilohmannia (E.) heterotricha* Mahunka, 1966
(=*Epilohmannia (Sinolohmannia) norberti* Moreno y Moraza, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).
 - *Epilohmannia (E.) imreorum* Bayoumi y Mahunka, 1976
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
 - *Epilohmannia (E.) inexpectata* Schuster, 1960
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Irán e I. Santa Helena.
 - *Epilohmannia (E.) insignipes* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Epilohmannia (E.) kulaginae* Shtanchaeva, 1993
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Epilohmannia (E.) luzonica* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Epilohmannia (E.) mahunkai* Călugăr y Vasiliu, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - Epilohmannia (E.) minuta* Berlese, 1920
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
 - *Epilohmannia (E.) minuta minuta* Berlese, 1920
(=*Epilohmannia elongata* Banks, 1947)
(=*Epilohmannia pallida* Wallwork, 1962)
(=*Epilohmannia pallida americana* Balogh y Mahunka, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica, Oriental, India, y Neotropical) y U.S.A. centrooriental.
 - *Epilohmannia (E.) minuta aegyptica* Bayoumi y Mahunka, 1976 (*E. pallida a.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
 - *Epilohmannia (E.) minuta areolata* Sarkar y Subías, 1982 (*E. pallida a.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Epilohmannia (E.) minuta australica* Lee, 1985 (*E. pallida a.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Epilohmannia (E.) minuta indica* Bhattacharya y Banerjee, 1980 (*E. pallida i.*)
DISTRIBUCIÓN: India.
 - *Epilohmannia (E.) minuta pacifica* Aoki, 1965 (*E. pallida p.*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Paleártica oriental meridional.
 - *Epilohmannia (E.) minuta rugosa* Sarkar y Subías, 1982 (*E. pallida r.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Epilohmannia (E.) nortoni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Epilohmannia (E.) ornata* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
 - *Epilohmannia (E.) pilosa* Li y H. Chen, 1990
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Epilohmannia (E.) praetritia* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
 - *Epilohmannia (E.) puella* Berlese, 1916
(=*Epilohmannia nota* McDaniel y Bolen, 1983)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional
 - *Epilohmannia (E.) rubra* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Epilohmannia (E.) schusteri* Călugăr y Vasiliu, 1976
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Epilohmannia (E.) sculpturata* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Argentina) e Irán.
 - *Epilohmannia (E.) serrata* Fujikawa, 2008
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Epilohmannia (E.) shtanchaevae* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Epilohmannia (E.) spathulata* Aoki, 1970

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y Oriental (China suroriental y Vietnam).
 - *Epilohmannia (E.) spathuloides* Bayartogtokh, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Epilohmannia (E.) styriaca* Schuster, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional e Irán).
 - *Epilohmannia (E.) taiwanica* Tseng, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Epilohmannia (Neoepilohmannia) McDaniel y Bolen, 1989 (12 spp.)

ESPECIE TIPO: *Epilohmannia neotricha* Wallwork, 1962

DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical (Holártica meridional).

- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) crassisetosa* Ermilov y Anichkin, 2012 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) dolosa* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) guarani* Balogh y Mahunka, 1977 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) lenkoi* Balogh y Mahunka, 1977 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) maurii* Fernández, 1978 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) multisetosa* Hammer, 1971 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) neotricha* Wallwork, 1962 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) ovalis* Berlese, 1916 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) ovata* Aoki, 1961 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Cáucaso y Paleártica oriental (excepto Norte), y Oriental (China suroriental y Vietnam).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) taeda* (McDaniel y Bolen, 1989) (N.)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) vicina* Fujikawa, 2008 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannia (Neoepilohmannia) zwarti* Hammen, 1986 (E.)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Nuevas Hébridias [Vanuatu]).

Epilohmannoides Jacot, 1936 (10 spp.)

ESPECIE TIPO: *Epilohmannoides terrae* Jacot, 1936

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Holártica meridional).

- *Epilohmannoides esulcatus* Ohkubo, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Borneo.
- *Epilohmannoides jacoti* Norton, Metz y Sharma, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Epilohmannoides kishidai* Ohkubo, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannoides rabori* (Corpuz-Raros, 1979) (*Epilohmannia*)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Epilohmannoides samarensis* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Epilohmannoides setoensis* Fujikawa, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epilohmannoides sexparus* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Epilohmannoides terrae* Jacot, 1936
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de U.S.A. y España), Panamá y China suroriental.
- *Epilohmannoides wallworki* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Epilohmannoides xena* (Mahunka, 1983) (*Epilohmannia*)
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical, Vietnam e Irán.

Infradorden EUPTYCTIMA Grandjean, 1967

Euphthiracaroida Jacot, 1930

Oribotritiidae Balogh, 1943 (9 gen., 3 subg., 200 spp. y 4 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Austrotritia Sellnick, 1959 (20 spp. y 3 sspp.)

(=***Macarotritia*** Pérez-Íñigo, 1986)

ESPECIE TIPO: *Austrotritia quadricarinata* Sellnick, 1959

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical.

- *Austrotritia bifurca* Niedbala, 2000

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Austrotritia bryani* (Jacot, 1929) (*Euphthiracarus* (I.))

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Austrotritia carinata* Niedbala, 2000

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Australia).

- *Austrotritia dentata* Aoki, 1980

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Austrotritia didyma* Liu, Chen y Qiao, 2009

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Austrotritia engelbrechti* Niedbala, 2006

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Austrotritia finlandica* Niedbala y Penttinen, 2006

DISTRIBUCIÓN: Finlandia.

- *Austrotritia fissurata* Liu, Chen y Qiao, 2009

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Austrotritia gibba* Bayoumi y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: India (Cachemira).

- *Austrotritia glabrata* Niedbala, 2000

DISTRIBUCIÓN: Himalaya.

- *Austrotritia herenessica* (Pérez-Íñigo, 1986) (*Indotritia* (*Macarotritia*))

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Austrotritia kinabaluensis* Ramsay y Sheals, 1969

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Austrotritia lebronneci (Jacot, 1934) (*Indotritia*)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Austrotritia lebronneci lebronneci* (Jacot, 1934)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Austrotritia lebronneci crassiori* (Jacot, 1934) (*Indotritia*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).

- *Austrotritia lebronneci flagelloides* (Jacot, 1934) (*Indotritia*) “ssp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).

- *Austrotritia lebronneci tahitiana* (Jacot, 1934) (*Indotritia*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Austrotritia parabellingeri* Niedbala, 2013

DISTRIBUCIÓN: Zambia.

- *Austrotritia quadricarinata* Sellnick, 1959

DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes (I. Tubuai).

- *Austrotritia ramsayi* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Austrotritia robusta* Niedbala y Corpuz-Raros, 1998

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Península Malaya) y Australiana.

- *Austrotritia saraburiensis* Aoki, 1965 (*A. lebronneci* s.)

(=*Austrotritia ishigakiensis* Aoki, 1980)

(=*Austrotritia optabilis* Niedbala, 1991)

(=*Austrotritia shealsi* Mahunka, 1987)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Australiana: Islas del Pacífico y Australia) y subtropical (Sureste de Paleártica oriental).

- *Austrotritia singaporensis* Niedbala, 2004

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Austrotritia uncarinata* Aoki, 1980

DISTRIBUCIÓN: Japón y Micronesia (I. Marianas).

Indotritia Jacot, 1929 (37 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tritia krakatauensis* Sellnick, 1924

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

***Indotritia* (*Indotritia*)** Jacot, 1929 (33 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Indotritia* (I.) *africana* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Indotritia* (I.) *allocotos* Niedbala, 2004

- DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Indotritia (I.) bellingeri* Niedbala y Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indotritia (I.) breviseta* (Berlese, 1923) (*Tritia berlesei b.*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Indotritia (I.) clavata* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Indotritia (I.) consimilis* Märkel, 1964 (*I. krakatauensis c.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Indotritia (I.) cypha* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) didyma* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) eksteeni* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) fusa* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) jacoti* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Indotritia (I.) javensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
(=*Indotritia completa* Mahunka, 1987)
(=*Oribotritia mollis* Aoki, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Oriental (frecuente), Australiana (Nueva Guinea), Este de Paleártica oriental, subantártica (I. Amsterdam) y Etiópica (Madagascar).
- *Indotritia (I.) krakatauensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
(=*Indotritia acanthophora* Märkel, 1964)
(=*Indotritia heterotricha* Mahunka, 1984)
(=*Indotritia sellnicki* Aoki, 1965)
(=*Indotritia septentrionalis* Mahunka, 1987)
(=*Indotritia tropica* Starý, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Indotritia (I.) lakshadweepensis* Sanyal y Basu, 2014 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (I. Laquedivas).
- *Indotritia (I.) lanceolata* (Aoki, 1988) (*Austrotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Indotritia (I.) missouri* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Indotritia (I.) montkoupensis* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Indotritia (I.) nuda* Mahunka, 1988
(=*Indotritia usambarensis* Starý, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Indotritia (I.) nunomurai* Hirauchi y Aoki, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Indotritia (I.) paraconsimilis* Niedbala, 2012
DISTRIBUCIÓN: Etiopía y Tanzania.
- *Indotritia (I.) partita* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) paulyi* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Indotritia (I.) phymatha* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Indotritia (I.) propinqua* Niedbala, 1991
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Indotritia (I.) retalteca* (Stoll, 1891) (*Hoplophora*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Indotritia (I.) retusa* Niedbala y Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical y Etiópica (Sudáfrica).
- *Indotritia (I.) tetradis* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Indotritia (I.) tricarinata* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Indotritia (I.) tripartita* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Indotritia (I.) tumenensis* Liu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Indotritia (I.) undulata* Bayoumi y Mahunka, 1979

- (=*Indotritia aspera* Niedbała, 2000)
 DISTRIBUCIÓN: Himalaya (frecuente) y China suroriental.
 - *Indotritia (I.) vestigia* Niedbała, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Indotritia (I.) zangherii* Mahunka y Paoletti, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Italia.

Indotritia (Afrotritia) Mahunka, 1988 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Indotritia (Afrotritia) compacta* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Indotritia (Afrotritia) compacta* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: África central.

Indotritia (Zeaotritia) Mahunka, 1988 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Indotritia aotearoana* Ramsay, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Indotritia (Zeaotritia) aotearoana* Ramsay, 1966 (*I. a.*)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Indotritia (Zeaotritia) brevipilosa* Niedbała, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Caledonia).
 - *Indotritia (Zeaotritia) brevisetosa* Niedbała, 2000
 (= *Indotritia breviseta* Niedbała y Colloff, 1997, “nom. praec.” por Berlese, 1923)
 (= *Indotritia colloffii* J. y P. Balogh, 2002)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

Maerkelotritia Hammer, 1967 (5 spp.)
 ESPECIE TIPO: (*Maerkelotritia alaskensis* Hammer, 1967) = *Oribotritia kishidai* Aoki, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Maerkelotritia cryptopa* (Banks, 1904) (*Phthiracarus*)
 (= *Oribotritia gibbera* Walker, 1965)
 (= *Phthiracarus maximus* Ewing, 1913)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica occidental (frecuente) y Eurosiberiana.
 - *Maerkelotritia faeroensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Noroeste de Europa.
 - *Maerkelotritia fusiformis* Liu, Niedbała y Chen, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Maerkelotritia kishidai* (Aoki, 1958) (*Oribotritia*)
 (= *Maerkelotritia alaskensis* Hammer, 1967)
 (= *Oribotritia sellnicki* Walker, 1965)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica: frecuente en Oeste).
 - *Maerkelotritia krivolutskyi* Märkel, 1968
 (= *Maerkelotritia kirghizica* Niedbała, 2006)
 (= *Maerkelotritia krivolutskyi mongolica* Mahunka, 1981)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

Mesotritia Forsslund, 1963 (33 spp.)
 ESPECIE TIPO: (*Mesotritia testacea* Forsslund, 1963) = *Phthiracarus flagelliformis* Ewing, 1909
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Mesotritia (Mesotritia) Forsslund, 1963 (30 spp.)
 (= *Entomotritia* Märkel, 1964)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
 - *Mesotritia (M.) atractos* Niedbała, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
 - *Mesotritia (M.) australis* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Mesotritia (M.) bicarinata* Liu y Chen, 2010
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Mesotritia (M.) biramula* Niedbała, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Mesotritia (M.) brasiliensis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Mesotritia (M.) breviseta* Niedbała y Schatz, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Mesotritia (M.) cozumelensis* Niedbała, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Mesotritia (M.) dissimilis* Hammer, 1977 (*M. (Entomotritia)*)

- DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Mesotritia (M.) elegantula* Starý, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Mesotritia (M.) flagelliformis* (Ewing, 1909) (*Phthiracarus*)
 (= *Mesotritia testacea* Forsslund, 1963)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Norte de Europa y Este de Paleártica oriental, y Neártica: frecuente).
- *Mesotritia (M.) glabra* Niedbala, 2002
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional
 - *Mesotritia (M.) glabrata* (Say, 1821) (*Oribata*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Mesotritia (M.) indica* Sanyal, 1988
 DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
 - *Mesotritia (M.) jacoti* Niedbala, 2001
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Mesotritia (M.) maerkeli* Sheals, 1965
 (= *Mesotritia clara* Starý, 1992)
 (= *Mesotritia flagellata* Bayoumi y Mahunka, 1979)
 (= *Mesotritia spinosa* Aoki, 1980)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental (Himalaya y Vietnam).
 - *Mesotritia (M.) minima* Niedbala, 2002
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
 - *Mesotritia (M.) multisetosa* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Mesotritia (M.) nitida* Hammer, 1977 (*M. (Entomotritia)*)
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Mesotritia (M.) nova* Starý, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Mesotritia (M.) nuda* (Berlese, 1887) (*Tritia*)
 (= *Oribotritia brachythrix* Walker, 1965)
 (= *Mesotritia elastica* Sergienko, 1988)
 (= *Oribotritia grandjeani* Feider y Suciú, 1957)
 (= *Mesotritia (Entomotritia) piffli* Märkel, 1964)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica: frecuente), Etiópica (Sudáfrica), Norte de Neotropical y Oriental (China suroriental).
 - *Mesotritia (M.) okuyamai* Aoki, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Mesotritia (M.) paraflagelliformis* Niedbala, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Mesotritia (M.) procera* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Mesotritia (M.) recursa* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Brasil).
 - *Mesotritia (M.) ruwenzorii* Niedbala, 1998
 DISTRIBUCIÓN: África central.
 - *Mesotritia (M.) semota* Niedbala, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Mesotritia (M.) serrata* Liu y Chen, 2010
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Mesotritia (M.) similis* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Cachemira) y Tailandia, y Australiana: I. Célebes [Sulawesi].
 - *Mesotritia (M.) solhoeyi* Liu, Niedbala y Starý, 2011
 DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
 - *Mesotritia (M.) virginiensis* (Jacot, 1930) (*Oribotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.

***Mesotritia (Perutritia)* Märkel, 1964 (3 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Perutritia amazonensis* Märkel, 1964

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mesotritia (Perutritia) amazonensis* (Märkel, 1964) (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Mesotritia (Perutritia) asensillata* (Ojeda, 1992) (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Mesotritia (Perutritia) curviseta* (Hammer, 1961) (*Oribotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

***Oribotritia* Jacot, 1924 (95 spp. y 1 ssp.)**

(=*Berndotritia* Mahunka, 1987)

(=*Philotritia* Mahunka, 1988)

(=*Plesiotritia* Walker, 1965)

(=*Tritia* Berlese, 1883, “nom. praeoc.” por Risso, 1826)

ESPECIE TIPO: (*Hoplophora decumana* Koch “sensu” Berlese, 1883) =*Phthiracarus berlesesi* Michael, 1898

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Oribotritia africana* Starý, 1993

(=*Oribotritia bicarinata* Niedbala, 1993)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).

- *Oribotritia afromontanensis* Niedbala, 2006

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Oribotritia alajuela* Niedbala, 2003

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Oribotritia allocota* Niedbala, 2003

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Oribotritia ampla* Niedbala, 1991

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).

- *Oribotritia ampliata* Niedbala, 2004

DISTRIBUCIÓN: Jamaica.

- *Oribotritia anceps* Niedbala, 2000

DISTRIBUCIÓN: Nepal y Noreste de China.

- *Oribotritia angusta* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Oribotritia aokii* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Oribotritia asiatica Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y China suroriental.

- *Oribotritia asiatica asiatica* Hammer, 1977

(=*Oribotritia koreense* Mahunka, 1982)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.

- *Oribotritia asiatica norikoe* Suzuoka, 1983 “ssp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Oribotritia attenuata* Niedbala y Schatz, 1996

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Oribotritia bagnalli* (Hull, 1916) (*Phthiracarus*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

- *Oribotritia baikalica* Niedbala, 2006

DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.

- *Oribotritia banksi* (Oudemans, 1916) (*Tritia*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (frecuente).

- *Oribotritia berlesesi* (Michael, 1898) (*Phthiracarus*)

(?=*Hoplophora decumana* Koch, 1836 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Norte de Oriental.

- *Oribotritia bilaminae* Liu y Zhang, 2013

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Oribotritia bipartita* Niedbala, 2000

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Oribotritia brevis* Niedbala y Colloff, 1997

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Oribotritia breviseta* Niedbala y Starý, 2014

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Oribotritia brevisetosa* Niedbala, 2003

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Oribotritia bulbifer* (Mahunka, 1987) (*Berndotritia*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Oribotritia capitanea* Niedbala y Corpuz-Raros, 1998

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Oribotritia carolinae* Jacot, 1930

DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

- *Oribotritia cherokee* Niedbala, 2002

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Arkansas).

- *Oribotritia chichijimensis* Aoki, 1980

(=*Oribotritia chichijimensis ryukyuensis* Nakatamari, 1985)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroriental y Taiwán [Formosa]).

- *Oribotritia contortula* Niedbala, 1993

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Oribotritia contraria* Niedbala, 1993

- DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Oribotritia corporaali* (Oudemans, 1926) (*Tritia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).
 - *Oribotritia deminuta* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Oribotritia didyma* Niedbala y Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oribotritia dipterocarpensis* Niedbala, Corpuz-Raros y Gruèzo, 2006
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Oribotritia dispar* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Oribotritia duotrisetosa* Niedbala, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Oribotritia duplex* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Oribotritia exilis* (Sellnick, 1923) (*Tritia*)
(=*Oribotritia partita* Niedbala, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oribotritia fennica* Forsslund y Märkel, 1963
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Euroatlántica y Japón).
 - *Oribotritia geminata* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Oribotritia gigas* Bayoumi y Mahunka, 1979
(=*Oribotritia nepalensis* Niedbala, 2000)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica oriental.
 - *Oribotritia gladiola* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Oribotritia grossa* Niedbala, 2017
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Oribotritia hauseri* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Oribotritia hawaiiensis* (Jacot, 1929) (*Euphthiracarus (Indotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Oribotritia henicos* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Oribotritia hermanni* Grandjean, 1967
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Oribotritia heterotricha* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Oribotritia hunchunensis* Liu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Oribotritia incognita* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Oribotritia krivolutskyi* Liu, Niedbala y Starý, 2011
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Oribotritia laselve* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oribotritia lepteces* Niedbala, Corpuz-Raros y Gruèzo, 2006
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Península Malaya) y Australia.
 - *Oribotritia magna* (Ewing, 1907) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
 - *Oribotritia mahunkai* Niedbala y Starý, 2013
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Oribotritia mangamuka* Liu y Zhang, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Oribotritia megale* (Walker, 1965) (*Plesiotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
 - *Oribotritia microsetosa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009 (*O. (Berndotritia)*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Oribotritia multisetosa* Niedbala, 2014
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Oribotritia nasalis* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
 - *Oribotritia opipara* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Oribotritia oregonensis* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).

- *Oribotritia paraajalueta* Niedbala e Illig, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Oribotritia paraaokii* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribotritia paracarolinae* Niedbala, 2007
DISTRIBUCIÓN: Canadá y U.S.A. (Washington).
- *Oribotritia parachichijimensis* Niedbala y Penttinen, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribotritia paracontraria* Niedbala, 2017
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribotritia paracorporaali* Niedbala y Penttinen, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Caledonia y Australia).
- *Oribotritia paraincognita* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia paraspinosa* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Oribotritia pecki* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribotritia perpusilla* Niedbala y Starý, 2016
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia pulla* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Oribotritia pumila* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Ecuador).
- *Oribotritia rafalskii* Niedbala, 1997
DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Oribotritia recta* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Oribotritia samoensis* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Oribotritia schusteri* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribotritia serrata* Feider y Suciú, 1958
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribotritia serrula* Niedbala y Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica (I. del Coco).
- *Oribotritia shikoku* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribotritia solitaria* Niedbala, 1993
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Oribotritia spinosa* (Mahunka, 1988) (*Philotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (frecuente).
- *Oribotritia storkani* Feider y Suciú, 1957 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribotritia striata* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia submolesta* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Norte de India).
- *Oribotritia succincta* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribotritia tashkentae* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Oribotritia teberdaensis* Niedbala, 2015
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribotritia teretis* Niedbala, 1993
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribotritia tiwi* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: África oriental (frecuente).
- *Oribotritia tokukoa* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribotritia trisetosa* Niedbala y Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Oribotritia turcica* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oribotritia varia* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Oribotritia vicina* Niedbala, 2004

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Oribotritia virgulata* Niedbala, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Paratritia Moritz, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Paratritia baloghi* Moritz, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Paratritia baloghi* Moritz, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional e Irán).

Protoribotritia Jacot, 1938 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Protoribotritia canadaris* Jacot, 1938

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y Oriental.

- *Protoribotritia aberrans* (Märkel y Meyer, 1959) (*Oribotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: **Paleártica.**

- *Protoribotritia africana* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Protoribotritia canadaris* Jacot, 1938

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional y Nuevo Méjico.

- *Protoribotritia ensifer* Aoki, 1969 (*P. aberrans* e.)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Protoribotritia oligotricha* Märkel, 1963

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental (Nepal y "China").

Sabacarus Ramsay y Sheals, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sabacarus corneri* Ramsay y Sheals, 1969

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Australianooriental, Paleártica meridional y subantártica).

- *Sabacarus corneri* Ramsay y Sheals, 1969

(=*Sabacarus ranokaoensis* Hammer, 1970)

DISTRIBUCIÓN: Tropical: Australianooriental, y subantártica (I. Amsterdam).

- *Sabacarus japonicus* Shimano y Aoki, 1997

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Terratritia Ramsay y Sheals, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Terratritia askewi* Ramsay y Sheals, 1969

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Terratritia askewi* Ramsay y Sheals, 1969

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Terratritia secunda* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Euphthiracaridae Jacot, 1930 (5 gen., 2 subg., 179 spp. y 5 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acrotritia Jacot, 1923 (49 spp. y 3 sspp.)

(=*Rhysotritia* Märkel y Meyer, 1959)

ESPECIE TIPO: *Phthiracarus americanus* Ewing, 1909

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Acrotritia aokii* (Niedbala, 2000) (*Rhysotritia*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Paleártica meridional (Turquía y Este de Paleártica oriental).

Acrotritia ardua (Koch, 1841) (*Hoplophora*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Acrotritia ardua ardua* (Koch, 1841)

(=*Hoplophora arctata* Riley, 1874)

(=*Pseudotritia ardua antetritriheterodactylum* Jacot, 1933)

(=*Phthiracarus canestrinii* Michael, 1898)

(?= *Trombidium loricatum* Rathke, 1799 "sp. inq.")

(=*Rhysotritia pinguisetosa* Bayartogtokh, 2010)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).

- *Acrotritia ardua americana* (Ewing, 1909) (*Phthiracarus am.*)

(=*Rhysotritia ardua affinis* Sergienko, 1989)

(=*Rhysotritia ardua penicillata* Pérez-Íñigo, 1969)

(=*Rhysotritia hauseri* Mahunka, 1991)

(=*Tritia lentula hyeroglyphica* Berlese, 1916)

(=*Phthiracarus pectinatus* Ewing, 1917)

(=*Acrotritia sinensis tritriheterodactylis* Jacot, 1923)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica: Somalia, Oriental y Neotropical: Panamá).

- *Acrotritia ardua neotropicalis* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1993) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Acrotritia bacula* Niedbala, 2004 (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Acrotritia bipartita* (Niedbala, 2000) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Acrotritia brasiliiana* (Mahunka, 1983) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical, Oriental: India, y Etiópica: I. Reunión) y subantártica (I. Amsterdam).
- *Acrotritia clavata* (Märkel, 1964) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), Etiópica (Guinea Ecuatorial), Oriental (India: Kerala) y "Polonia".
- *Acrotritia closteros* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Acrotritia colombiana* Liu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Acrotritia corletti* (Mahunka, 2000) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Acrotritia cunangra* Liu y Zhang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Acrotritia curticephala* (Jacot, 1938) (*Pseudotritia ardua c.*)
(=*Rhysotritia ardua otaheitensis* Hammer, 1972)
(=*Rhysotritia clavata sextiana* Lions, 1966)
(=*Rhysotritia lucida* Niedbala, 1998)
(=*Rhysotritia riezuae* Moreno y Moraza, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica): frecuente.
- *Acrotritia diaphoros* (Niedbala, 2002) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.
- *Acrotritia dikra* (Niedbala y Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y U.S.A. oriental.
- *Acrotritia dinota* (Niedbala y Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acrotritia dixia* (Niedbala y Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Acrotritia duplicata* (Grandjean, 1953) (*Pseudotritia*)
(=*Rhysotritia duplicata limbata* Märkel y Meyer, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Oriental (Vietnam y Nepal).
- *Acrotritia ejuncida* (Niedbala y Schatz, 1996) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acrotritia furca* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Acrotritia furcata* (Bayoumi y Mahunka, 1979) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Este de Paleártica oriental meridional.
- *Acrotritia gracile* (Niedbala, 2000) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de India y China (Tíbet).
- *Acrotritia granulata* (Mahunka, 1999) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Acrotritia hallasanensis* (Niedbala, 2002) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Acrotritia ischnos* (Niedbala, 2004) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acrotritia koreensis* Mahunka, 1997
(=*Rhysotritia penicillata* Mahunka, 1982, "nom. praeoc." por Pérez-Íñigo, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.
- *Acrotritia meristos* (Niedbala, 2003) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Centroamérica e I. Galápagos).
- *Acrotritia munita* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Acrotritia ornata* (Niedbala, 2002) (*Rhysotritia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia) y Méjico.
- *Acrotritia paraardua* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Acrotritia parabrasiliana* Niedbala e Illig, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Acrotritia paradikra* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Acrotritia paradivida* Niedbala y Penttinen, 2007

- DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Acrotritia paraganulata* Niedbala, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Acrotritia parallelus* (Niedbala, 2003) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica y Brasil.
 - *Acrotritia parareticulata* (Niedbala, 2002) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Acrotritia paraspiculifera* Niedbala, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Acrotritia peruensis* (Hammer, 1961) (*Oribotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) e India.
 - *Acrotritia pirovaci* Niedbala, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Croacia e Irán).
 - *Acrotritia proxima* Niedbala, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Acrotritia quasidivida* Niedbala y Starý, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Camerún.
 - *Acrotritia refracta* (Niedbala, 1998) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: Borneo y Filipinas, Australiana, Neotropical y Etiópica: Madagascar).
 - *Acrotritia reticulata* (Mahunka, 1988) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Acrotritia rhopalota* Niedbala e Illig, 2007
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Acrotritia rustica* (Niedbala, 1991) (*Rhysotritia*)
 (= *Rhysotritia divida* Mahunka, 1991)
 (= *Rhysotritia monodactyla* Niedbala, 2002)
 (= *Rhysotritia simile* Mahunka, 1982, “nom. praeoc.” por Sellnick, 1923)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Antártica).
 - *Acrotritia scotti* (Walker, 1965) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Acrotritia similis* (Sellnick, 1923) (*Tritia* (*Pseudotritia*)) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
 - *Acrotritia sinensis* Jacot, 1923
 (= *Rhysotritia ardua jinyunia* Li y H. Chen, 1990)
 (= *Rhysotritia clavata spiculifera* Mahunka, 1991)
 (= *Rhysotritia rasile* Mahunka, 1982)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).
 - *Acrotritia sterigma* (Niedbala, 1998) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (Tahití) y Australia, y Oriental: Bali.
 - *Acrotritia tibetensis* Liu y Chen, 2015
 DISTRIBUCIÓN: China (Tibet).
 - *Acrotritia vestita* (Berlese, 1913) (*Hoploderma*)
 (= *Rhysotritia anchiseta* Niedbala, 1998)
 (= *Rhysotritia bifurcata* Niedbala, 1993)
 (= *Rhysotritia comteae* Mahunka, 1983)
 (= *Rhysotritia niedbalai* J. y P. Balogh, 2002)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente), Este de Paleártica oriental y Canadá.
 - *Acrotritia wallworki* (Lee, 1981) (*Rhysotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Guinea).

Bukitritia Mahunka, 1990 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bukitritia timah* Mahunka, 1990

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Bukitritia timah* Mahunka, 1990

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya y Madagascar.

Euphthiracarus Ewing, 1917 (96 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Phthiracarus flavus* Ewing, 1908

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

***Euphthiracarus* (*Euphthiracarus*)** Ewing, 1917 (83 spp. y 2 sspp.)

(?= *Hummelia* Oudemans, 1916 “gen. inq.”)

(= *Niedbalaia* Mahunka, 1999)

(= *Parapocsia* Niedbala, 2014)

(= *Pseudotritia* Willmann, 1919)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Euphthiracarus* (*E.*) *aequalis* Liu, Wu y Chen, 2011

- DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Tibet.
- *Euphthiracarus (E.) aggenitalis* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Euphthiracarus (E.) alazon* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Euphthiracarus (E.) antipai* Feider y Călugăr, 1969
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Euphthiracarus (E.) arilloi* Subías, 2009
(=*Euphthiracarus reticulatus* Niedbala, 2004, "nom. praeoc." por Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Euphthiracarus (E.) bhutanicus* Reddy, 1989 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Euphthiracarus (E.) bombuscaroensis* Niedbala e Illig, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Euphthiracarus (E.) breviculus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Ecuador).
- *Euphthiracarus (E.) carinatus* Liu, Wu y Chen, 2011
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) cathayanus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Euphthiracarus (E.) cernuus* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Euphthiracarus (E.) clavatus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Euphthiracarus (E.) comteae* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Euphthiracarus (E.) cooki* Norton, Sanders y Minor, 2003
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Euphthiracarus (E.) crassisetae* Jacot, 1938
(=*Euphthiracarus polytretos* Walker, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- Euphthiracarus (E.) cribrarius* (Berlese, 1904) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Oriental.
- *Euphthiracarus (E.) cribrarius cribrarius* (Berlese, 1904)
(=*Phthiracarus punctulatus* Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Norte de Oriental.
- *Euphthiracarus (E.) cribrarius foveolatus* Aoki, 1980 (*E. f.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Euphthiracarus (E.) depressculus* Jacot, 1924
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Euphthiracarus (E.) diatropos* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (E.) dilatatus* Liu, Wu y Chen, 2011
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) duplex* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Euphthiracarus (E.) evexus* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Euphthiracarus (E.) excultus* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Euphthiracarus (E.) flagellatus* Liu, Wu y Chen, 2011
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Euphthiracarus (E.) flavus* (Ewing, 1908) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Euphthiracarus (E.) fulvus* (Ewing, 1909) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (menos frecuente en el Sur).
- *Euphthiracarus (E.) fusticulus* Niedbala y Schatz, 1996
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica (I. del Coco).
- *Euphthiracarus (E.) fusulus* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Oeste).
- *Euphthiracarus (E.) heterosetosus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Euphthiracarus (E.) humeralis* Norton y Metz, 1977
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Euphthiracarus (E.) incredibilis* (Mahunka, 1999) (*Niedbalaia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Euphthiracarus (E.) inglisi* Sheals, 1965

- DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
 - *Euphthiracarus (E.) karpellesi* (Oudemans, 1916) (*Hummelia*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Euphthiracarus (E.) klabati* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo) y Australiana (I. Célebes [Sulawesi]).
 - *Euphthiracarus (E.) labyrinthicus* Starý, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Euphthiracarus (E.) lanceolatus* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Brasil).
 - *Euphthiracarus (E.) longirostralis* Walker, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
 - *Euphthiracarus (E.) longisetus* Liu, Wu y Chen, 2011
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) longulus* Liu, Wu y Chen, 2011
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) macrorostralis* Liu, Wu y Chen, 2012
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) medius* (Niedbala, 2014) (*Parapocsia*)
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Euphthiracarus (E.) medogensis* Liu, Wu y Chen, 2012
 DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
 - *Euphthiracarus (E.) minimus* Liu, Wu y Chen, 2012
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) modicus* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Honduras y Brasil).
 - *Euphthiracarus (E.) monodactylus* (Willmann, 1919) (*Tritia (Pseudotritia)*)
 (= *Tritia aequipunctata* Berlese, 1923)
 (= *Euphthiracarus mixtus* Mahunka, 1979)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Neártica: excepto Sur) y Nueva Guinea.
 - *Euphthiracarus (E.) monyx* Walker, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Euphthiracarus (E.) nasalis* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Euphthiracarus (E.) nasutus* Niedbala, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Euphthiracarus (E.) netron* Niedbala y Starý, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Euphthiracarus (E.) novosibiricus* Niedbala, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Rusia asiática meridional.
 - *Euphthiracarus (E.) oblongus* Liu, Wu y Chen, 2012
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) ornatus* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Euphthiracarus (E.) pakistanensis* Hammer, 1977
 (= *Euphthiracarus meghalayensis* Sanyal, 1988)
 DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Paleártica oriental meridional.
 - *Euphthiracarus (E.) parabrasiliensis* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Euphthiracarus (E.) parafusulus* Niedbala, 2002
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Euphthiracarus (E.) paranetron* Niedbala y Starý, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Euphthiracarus (E.) paraoblongus* Liu, 2017
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) parareticulatus* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Euphthiracarus (E.) parasimilis* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Euphthiracarus (E.) paravesciculus* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
 - *Euphthiracarus (E.) pedanos* Niedbala, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
 - *Euphthiracarus (E.) protrusus* Liu, Wu y Chen, 2012
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) pulchrum* Jacot, 1930 (*E. flavum* p.)
 (= *Euphthiracarus pulchrum pisgahi* Jacot, 1939)

- DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental (frecuente).
- *Euphthiracarus (E.) punctulatus* Jacot, 1930
("non" *Phthiracarus punctulatus* Berlese, 1913, =*Euphthiracarus cribrarius*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
 - *Euphthiracarus (E.) quasitakahashii* Niedbala, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Euphthiracarus (E.) razdolnicus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Euphthiracarus (E.) rectus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - Euphthiracarus (E.) reticulatus* (Berlese, 1913) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte).
 - *Euphthiracarus (E.) reticulatus reticulatus* (Berlese, 1913)
(=*Pseudotritia intermedia* Feider y Suciú, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Euphthiracarus (E.) reticulatus alpinus* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Rusia asiática).
 - *Euphthiracarus (E.) scuticus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Euphthiracarus (E.) serangos* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Euphthiracarus (E.) shogranensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Paleártica oriental meridional.
 - *Euphthiracarus (E.) sikhotealinicus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Euphthiracarus (E.) singularis* Liu, 2017
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) spinus* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Euphthiracarus (E.) subcedrus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Rusia asiática meridional.
 - *Euphthiracarus (E.) suputincus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Euphthiracarus (E.) takahashii* Aoki, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
 - *Euphthiracarus (E.) tanythrix* Walker, 1965
(=*Euphthiracarus tanythrix sierriensis* Walker, 1965)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California y Ténsi) y Este de Canadá.
 - *Euphthiracarus (E.) tessellatus* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Euphthiracarus (E.) truncatus* Liu, Wu y Chen, 2012
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Euphthiracarus (E.) tumidus* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Euphthiracarus (E.) vesciculus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Honduras.
 - *Euphthiracarus (E.) vicinus* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Dakota del Sur).
 - *Euphthiracarus (E.) vietnamicus* Starý, 1993
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Euphthiracarus (E.) virgatus* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipi).

***Euphthiracarus (Brasiliotritia)* Märkel, 1964 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Euphthiracarus (Brasiliotritia) brasiliensis* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.

- *Euphthiracarus (Brasiliotritia) brasiliensis* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (Brasiliotritia) dlohyorum* Mahunka, 1984
(=*Brasiliotritia dlohyorum sanctipauli* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Himachal Pradesh).

***Euphthiracarus (Pocsia)* Mahunka, 1983 (17 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Pocsia africana* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Euphthiracarus (Pocsia) africanus* (Mahunka, 1983) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Euphthiracarus (Pocsia) bicarinatus* (Starý, 1991) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Euphthiracarus (Pocsia) disparilis* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Euphthiracarus (Pocsia) dubius* (Niedbala y Schatz, 1996) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Euphthiracarus (Pocsia) heterotrichus* (Mahunka, 1988) (P.)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Euphthiracarus (Pocsia) inopinatus* (Niedbala, 1993) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Euphthiracarus (Pocsia) insolitus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Euphthiracarus (Pocsia) kunsti* (Starý, 1988) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) microseta* (Starý, 1993) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Euphthiracarus (Pocsia) paraafricanus* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) paradisparilis* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (Pocsia) parakunsti* Niedbala, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) sarawaki* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Euphthiracarus (Pocsia) secundus* (Mahunka, 1983) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) sudamericanus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Euphthiracarus (Pocsia) trentus* (Mahunka, 1983) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Euphthiracarus (Pocsia) uluguruensis* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Microtritia Märkel, 1964 (22 spp.)

ESPECIE TIPO: *Phthiracarus minimus* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Microtritia bicarinata* Liu y Chen, 2014
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Microtritia contraria* Niedbala, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Microtritia cristata* Niedbala, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Microtritia diaphoros* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtritia fissurata* Märkel, 1968
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Este).
- *Microtritia fusa* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Microtritia glabrata* Niedbala, 1993
(=*Microtritia novazealandiensis* Niedbala, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Microtritia hauseri* Mahunka, 1993
(=*Microtritia altissima* Mahunka, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Microtritia hawaiiensis* Niedbala, 1994
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Microtritia incisa* Märkel, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Microtritia minima* (Berlese, 1904) (*Phthiracarus*)
(=*Tritia (Pseudotritia) minuta* Willmann, 1919)
(=*Microtritia xilofila* Subías, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, Neártica oriental, Oriental, Australiana: Hawái, y Neotropical: Centroamérica).
- *Microtritia mirifica* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Microtritia neominata* Subías, 2004
(=*Microtritia glabrata* Starý, 1993, “nom. praeoc.” por Niedbala, 1993)

- DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Microtritia parahauseri* Niedbala y Starý, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Microtritia paranovazealandiensis* Niedbala, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Microtritia paratropica* Niedbala, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Microtritia pinarensis* Niedbala y Starý, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Microtritia schusteri* Märkel, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
 - *Microtritia simplex* (Jacot, 1930) (*Pseudotrítia*)
 (= *Rhysotrítia paeneminima* Walker, 1965)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Centroamérica.
 - *Microtritia striata* Liu y Zhang, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Microtritia striatissima* Mahunka, 1999
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Microtritia tropica* Märkel, 1964
 (= *Microtritia ethiopia* Mahunka, 1988)
 (= *Microtritia tropica dusan* Ramsay y Sheals, 1969)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical, Japón y "Polonia".
 - *Microtritia tumida* Niedbala, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).

Sumatrotrítia Mahunka, 1989 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sumatrotrítia inusitata* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Sumatrotrítia elegans* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Sumatrotrítia inusitata* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra e India: Arunachal Pradesh).
- *Sumatrotrítia murphyi* Mahunka, 1999
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Synichotritiidae Walker, 1965 (4 gen. y 17 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical (Holártica meridional).

Apotritia Norton y Lions, 1992 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Apotritia walkeri* Norton y Lions, 1992

DISTRIBUCIÓN: Neártica meridional.

- *Apotritia walkeri* Norton y Lions, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.

Sabahtrítia Mahunka, 1987 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sabahtrítia hauseri* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Sabahtrítia dongnaiensis* Niedbala, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Sabahtrítia foveolata* (Hu, X. Wang y Aoki, 1991) (*Synichotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Sabahtrítia furcata* (Hu y X. Wang, 1992) (*Synichotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Sabahtrítia hauseri* Mahunka, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Sabahtrítia lienhardi* Mahunka, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Sabahtrítia mirabilis* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Sabahtrítia sarawak* Mahunka, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Sabahtrítia striata* Liu y Chen, 2009
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Sabahtrítia tianmuensis* (Hu, X. Wang y Aoki, 1991) (*Synichotritia*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Synichotritia Walker, 1965 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Synichotritia caroli* Walker, 1965

DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional.

- *Synichotritia caroli* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Nororiental).
- *Synichotritia longipila* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Synichotritia parvipilosa* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí).
- *Synichotritia reticulata* Niedbala y Starý, 2010
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Synichotritia spinulosa* Walker, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto nororiental) y Este de Paleártica oriental.

Temburongia Mahunka, 1990 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Temburongia patoi* Mahunka, 1990

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Temburongia patoi* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Temburongia similanensis* Fuangarworn y Lekprayoon, 2011
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Phthiracaroida Perty, 1841

Phthiracaridae Perty, 1841 (7 gen., 12 subg., 898 spp. y 10 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Atropacarus Ewing, 1917 (42 spp. y 2 sspp.)

(=*Helvetacarus* Mahunka, 1993)

ESPECIE TIPO: *Hoplophora stricula* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Atropacarus absimilis* (Niedbala, 1982) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Atropacarus achmedovi* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus antennatus* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2003) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Atropacarus antrosus* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Atropacarus bichei* Niedbala, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Atropacarus chernovae* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus ciliosus* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroccidental.
- *Atropacarus clavatus* Aoki, 1980 (*A. sticulus* c.)
DISTRIBUCIÓN: Japón, Tailandia y Méjico.
- *Atropacarus clavigerus* (Berlese, 1904) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus csiszarae* (Balogh y Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)
(=*Phthiracarus lutulentus* Sellnick, 1920)
(=*Steganacarus nemorosus* Gordeeva, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (excepto Oeste).
- *Atropacarus echinodiscus* (Mahunka, 1982) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia e Irán).
- *Atropacarus genavensis* (Mahunka, 1993) (*Helvetacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Atropacarus griseus* (Niedbala, 1984) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Atropacarus immunus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
(=*Steganacarus* (*Atropacarus*) *decipiens* Niedbala, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Atropacarus inconditus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Atropacarus inculpatus* (Niedbala, 1984) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Atropacarus kremenitsai* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Atropacarus longisensillus* (Liu y Zhang, 2013) (*Phrathicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Atropacarus maculosus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus mirabilis* (Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus multisetosus* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
- *Atropacarus murciensis* Niedbala, 1986
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus obesus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Atropacarus obesus obesus* (Niedbala, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Atropacarus obesus minimus* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España).
- *Atropacarus ochraceus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
- *Atropacarus papillatus* Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Marruecos y Cáucaso).
- *Atropacarus paraclavatus* Niedbala, 2002
DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Atropacarus paraclavigerus* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Atropacarus parainsularis* Niedbala y Starý, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus paraserratus* Niedbala, 2008
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Atropacarus parastriculus* Niedbala y Starý, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus parvulus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Atropacarus perversus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Este de Rusia asiática).
- *Atropacarus phyllophorus* (Berlese, 1904) (*Hoploderma*)
(=*Steganacarus ropalus* Feider y Suciú, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional y Vietnam.
- *Atropacarus platakisi* (Mahunka, 1979) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus plumatus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Atropacarus punctulatus* Moraza, 1985
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Atropacarus serratus* (Feider y Suciú, 1957) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Atropacarus striculus* (Koch, 1835) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, Centroamérica, Australiana y Madagascar).
 - *Atropacarus striculus striculus* (Koch, 1835)
(=*Steganacarus diaphanus* Jacot, 1930)
(=*Steganacarus senex* Aoki, 1958)
(=*Steganacarus trichosus* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Oriental, Centroamérica, Australiana y Madagascar).
 - *Atropacarus striculus insularis* (Weigmann, 1976) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Atropacarus substrictus* (Niedbala, 1983) (*Steganacarus* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Atropacarus terrapene* (Jacot, 1937) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Atropacarus wandae* (Niedbala, 1981) (*Steganacarus*)
(=*Steganacarus navarrensis* Moraza, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Atropacarus yarovenkoi* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Hoplophorella Berlese, 1923 (128 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hoploderma cucullatum* Ewing, 1909

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Hoplophorella (Hoplophorella) Berlese, 1923 (111 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Hoplophorella (H.) aethes* (Niedbala, 2009) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) andrei* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola) y Neotropical (Colombia).
- *Hoplophorella (H.) angolensis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hoplophorella (H.) anosculpturata* (Mahunka, 1987) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) armata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) baloghi* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) berninii* (Niedbala, 1991) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) brachys* (Niedbala, 2004) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Puerto Rico y Méjico).
- *Hoplophorella (H.) brasiliensis* (Niedbala, 1988) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) brevipilis* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental y Cáucaso.
- *Hoplophorella (H.) buffaloensis* (Niedbala, 2006) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) calotropica* (Haq y Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) catalauca* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: La Española (R. Dominicana).
- *Hoplophorella (H.) caverna* (Niedbala, 2012) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Hoplophorella (H.) chaliyamensis* (Haq y Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) clavifer* Mahunka y Mahuka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) claviger* (Niedbala, 1993) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Hoplophorella (H.) collaris* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hoplophorella (H.) colombiana* (Liu y Oconnor, 2015) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Hoplophorella (H.) contigua* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) crenula* (Haq y Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hoplophorella (H.) crinata* (Niedbala, 2006) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophorella (H.) cucullata* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
(=*Hoplophorella cucullata cuculloides* Jacot, 1933)
(=*Hoploderma lincophorum* Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente), subtropical (frecuente) y Canadá.
- *Hoplophorella (H.) curtisetosa* (Niedbala y Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) diamphidios* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) diaphoros* (Niedbala, 2000) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) diatropos* (Niedbala y Starý, 2014) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) digna* Niedbala, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (H.) dissimilis* (Niedbala, 1998) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hoplophorella (H.) distincta* (Niedbala y Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (H.) diversisetosa* Subías, 2010

- (=*Notophthiracarus buffaloensis* Niedbala, 2006, "nom. praec." por Niedbala, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) dubia* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Hoplophorella (H.) engelbrechti* (Niedbala, 2006) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hoplophorella (H.) ensifera* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hoplophorella (H.) evergladus* (Niedbala, 2001) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Hoplophorella (H.) finitima* (Niedbala, 2002) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Hoplophorella (H.) foaensis* (Niedbala y Penttinen, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Hoplophorella (H.) fonseciai* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) frondeus* (Niedbala, 2003) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) furcata* (Niedbala y Corpuz-Raros, 1998) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophorella (H.) gibba* (Niedbala y Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) grandjeani* Niedbala, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) hamata* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
(=*Hoplophorella cochlearia* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993)
(=*Hoplophorella cucullata curassensis* Willmann, 1936)
(=*Hoplophorella cucullata floridae* Jacot, 1933)
(=*Phthiracarus (Hoplophorella) cucullatus obsoletior* Berlese, 1923)
(=*Hoplophorella cuneiseta* Mahunka, 1988)
(=*Hoplophorella glauca* Hammer, 1972)
(=*Hoplophorella ligulifera* Mahunka, 1987)
(=*Hoplophorella pallens* Niedbala, 1983)
(=*Hoplophorella schauenbergi* Mahunka, 1978)
(=*Hoplophorella spatulata* Parry, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
- *Hoplophorella (H.) hamidi* (Mahunka, 1987) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) heteropilosa* (Niedbala, 2003) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hoplophorella (H.) heterosetosa* (Niedbala, 2003) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) inaequa* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (H.) inelegans* (Niedbala, 1986) (*Hoplophthiracarus*)
(=*Hoplophthiracarus atypicus* Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (Malgache).
- *Hoplophorella (H.) inepta* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Cachemira) y Melanesia (I. Salomón).
- *Hoplophorella (H.) inflata* (Liu y Chen, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroccidental.
- *Hoplophorella (H.) insolens* Niedbala, 1988
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hoplophorella (H.) korupensis* (Niedbala y Starý, 2014) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) kulczynskii* Niedbala, 1981
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) kyphos* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Hoplophorella (H.) lacunosa* (Niedbala, 2008) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Hoplophorella (H.) lanceoseta* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Steganacarus*)
(=*Hoplophorella neglecta* Niedbala, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) lanceosetoides* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) mahunkai* (Niedbala y Starý, 2013) (*Atropacarus (H.)*)

- (=*Atropacarus (Hoplophorella) othneios* Niedbala y Starý, 2014)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (H.) mayottei* (Niedbala, 2001) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Hoplophorella (H.) miranda* (Niedbala, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hoplophorella (H.) miranda* (Niedbala, 1988) (*Austrophthiracarus*)
(“nom. praec.” por Niedbala, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) neonominata* Subías, 2004
(=*Protophthiracarus cavernosus* Niedbala, 2002, “nom. praec.” por Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Arizona).
- *Hoplophorella (H.) notata* (Niedbala, 2001) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Gabón.
- *Hoplophorella (H.) oblonga* Niedbala, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Madagascar).
- *Hoplophorella (H.) ocula* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) oidematos* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) onkos* (Niedbala, 2017) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) otwayensis* (Niedbala, 2017) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) pachetos* (Niedbala, 2008) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophorella (H.) paraensis* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1997) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) paratripartita* (Niedbala, 2015) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) pardinus* (Berlese, 1916) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Hoplophorella (H.) pergrata* (Niedbala, 1998) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hoplophorella (H.) perisi* Subías y Sarkar, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Hoplophorella (H.) permirus* (Niedbala, 1991) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) pervicax* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Hoplophorella (H.) phymatos* (Niedbala, 2004) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) pinarensis* (Niedbala, 2009) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) praeoccupata* Subías, 2004 (*H. (Kakophthiracarus)*)
(=*Atropacarus (Hoplophorella) tuberosus* Niedbala y Schatz, 1996, “nom. praec.” por Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Centroamérica e I. Galápagos).
- *Hoplophorella (H.) preptos* (Niedbala y Starý, 2014) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Hoplophorella (H.) procera* (Niedbala, 2001) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (H.) prodorsocristata* Subías, 2010
(=*Arphthiracarus frondeus* Niedbala, 2004, “nom. praec.” por Niedbala, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) prominens* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Angola).
- *Hoplophorella (H.) rangiroaensis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Hoplophorella (H.) raychaudhurii* Subías y Sarkar, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Hoplophorella (H.) remigera* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhophophora)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Hoplophorella (H.) repetita* Subías, 2004
(=*Protophthiracarus reductus* Niedbala, 1991, “nom. praec.” por Mahunka, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (H.) reticulata* (Haq y Xavier, 2005) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Hoplophorella (H.) ruseki* (Niedbała, 2009) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (H.) sabahna* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophorella (H.) sacyae* (Mahunka, 1983) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) sarawaki* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Sumatra).
- *Hoplophorella (H.) saucius* (Niedbała, 1988) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) schatzi* (Niedbała, 1989) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Hoplophorella (H.) sculptilis* (Niedbała, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
(=*Hoplophthiracarus magnus* Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (H.) singularis* Sellnick, 1959
(=*Hoplophthiracarus marianus* Aoki, 1994)
(=*Hoplophorella queenslandica* Balogh y Mahunka, 1978)
(=*Hoplophthiracarus regalis* Mahunka, 1978)
(=*Hoplophorella sundarbanensis* Sanyal y Bhaduri, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y "Polonia".
- *Hoplophorella (H.) sororia* (Niedbała, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) stilifera* (Hammer, 1961) (*Steganacarus*)
(=*Hoplophorella benoiti* Mahunka, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.
- *Hoplophorella (H.) subciliata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) subita* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hoplophorella (H.) subsellata* Balogh y Mahunka, 1977
(=*Steganacarus galeatus* Balogh y Mahunka, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) szeptyckii* (Niedbała, 2009) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (H.) texana* (Niedbała, 2002) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Hoplophorella (H.) tripartita* (Niedbała y Schatz, 1996) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Belice.
- *Hoplophorella (H.) trisulca* (Niedbała, 2004) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hoplophorella (H.) turianiensis* (Niedbała y Starý, 2015) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (H.) unqus* (Niedbała, 1991) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hoplophorella (H.) varia* (Niedbała y Schatz, 1996) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) varians* Jacot, 1933
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hoplophorella (H.) venusta* Niedbała, 1983
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Hoplophorella (H.) vitrina* (Berlese, 1913) (*Hoploderma*)
(=*Hoplophorella africana* Wallwork, 1967)
(=*Hoplophorella lienhardi* Mahunka, 1987)
(=*Atropacarus (Hoplophorella) nigeriensis* Badejo, Woas y Beck, 2001)
(=*Hoplophorella scapellata* Aoki, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.

Hoplophorella (Kakophthiracarus) Mahunka, 1992 (17 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Hoplophorella tuberosa* Mahunka, 1988) =*Steganacarus tuberculosissimus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) balazsi* Mahunka, 1983 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) brevopilosa* (Niedbała, 2004) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) brevisetosa* (Niedbała, 2006) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) clavatosensillus* (Subías, 2010) (*Notophthiracarus*)
(=*Arphthiracarus baloghi* Niedbala, 2004, “nom. praeoc.” por Niedbala, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) cuculla* (Niedbala, 2012) (*Steganacarus (Rhacaplacarus)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) jacoti* (Niedbala, 1987) (*Steganacarus (Rhacaplacarus)*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Guinea).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) lemuria* Mahunka, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) manipurensis* Misra, Bhaduri y Raychaudhuri, 1983 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) minima* (Liu y Chen, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) minisetosa* Mahunka, 1978 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica oriental (Malgache y Malawi).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) multirugosa* (Mahunka, 1978) (*Steganacarus*)
(=*Steganacarus cornutus* Mahunka, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) mwali* Mahunka, 1994 (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) paralemuria* (Niedbala y Starý, 2016) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) parastenos* (Niedbala y Starý, 2016) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) pustulata* Mahunka, 1993 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) rafalskii* (Niedbala, 1997) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) spiniger* Aoki, 1980 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) spinus* (Niedbala, 2014) (*Steganacarus (Rhacaplacarus)*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) stenos* (Niedbala y Starý, 2014) (*Atropacarus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hoplophorella (Kakophthiracarus) tuberculosissima* (Mahunka, 1978) (*Steganacarus*)
(=*Hoplophorella horrida* Mahunka, 1984)
(=*Hoplophorella meszarosi* Mahunka, 1988)
(=*Hoplophorella tuberosa* Mahunka, 1988)
(=*Hoplophorella verrucosa* Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

***Hoplophthiracarus* Jacot, 1933 (62 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Hoploderma histricinum* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Hoplophthiracarus aduncus* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hoplophthiracarus angustatus* Niedbala, 1984
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Hoplophthiracarus baculus* (Niedbala, 2003) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Hoplophthiracarus bengalensis* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Hoplophthiracarus berlesei* (Niedbala, 1987) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hoplophthiracarus bicarinatus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus bisulcus* Niedbala, 1993
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hoplophthiracarus cacainus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Hoplophthiracarus cazanicus* Feider y Călugăr, 1970
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Rumanía e I. Canarias).
- *Hoplophthiracarus clavatus* Niedbala, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hoplophthiracarus clavellatus* Niedbala y Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hoplophthiracarus concavus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)

- DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hoplophthiracarus concinuus* Niedbala, 1982
(=*Hoplophthiracarus tropicus* Mondal y Kundu, 1988)
 - DISTRIBUCIÓN: Himalaya y China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus concolor* (Sergienko, 2000) (*Calyptophthiracarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: Crimea.
 - *Hoplophthiracarus cristatus* (Aoki, 1980) (*Hoplophorella*)
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hoplophthiracarus cristatus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
("nom. praeoc." por Aoki, 1980)
 - DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus dispar* (Niedbala, 2000) (*Plonaphacarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
 - *Hoplophthiracarus foveolatus* Aoki, 1980
 - DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India (Bengala Occidental).
 - *Hoplophthiracarus foveolatus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
("nom. praeoc." por Aoki, 1980)
 - DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus fujianensis* Liu, 2015
 - DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus grossmani* Jacot, 1933 "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Hoplophthiracarus hainanensis* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus hamatus* (Hammer, 1973) (*Phthiracarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: Polinesia, Japón, Malgache (I. Reunión) y Vietnam.
 - *Hoplophthiracarus heterosetosus* (Niedbala, 2008) (*Plonaphacarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Hoplophthiracarus histricinus* (Berlese, 1908) (*Hoploderma*)
(=*Phthiracarus (Trachyhoplophora) histricinus nitidior* Berlese, 1923)
(=*Phthiracarus pavidus minus* Krivolutsky, 1966)
(=*Hoplophthiracarus robustior* Jacot, 1933)
 - DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Norte) y norte de Neotropical.
 - *Hoplophthiracarus hulli* Niedbala, 1987
 - DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus illinoisensis* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
(=*Hoplophthiracarus paludis* Jacot, 1938)
(=*Hoplophthiracarus vanderhammeni* Niedbala, 1991)
 - DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental (Filipinas y China suroriental) y Norte de Neotropical.
 - *Hoplophthiracarus inoueeae* Aoki, 1994
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hoplophthiracarus insignitus* (Niedbala, 1989) (*Plonaphacarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Hoplophthiracarus insularis* Aoki, 2006
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hoplophthiracarus ishikawai* Aoki, 1980
 - DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Hoplophthiracarus kawanoi* Aoki, 2009
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hoplophthiracarus kugohi* Aoki, 1959
(=*Hoplophthiracarus africanus* Mahunka, 1984)
(=*Hoplophthiracarus minor* Mahunka, 1991)
(=*Hoplophthiracarus rimosus* Mahunka, 1985)
(=*Hoplophthiracarus siamensis* Aoki, 1965)
(=*Hoplophthiracarus wittmeri* Bayoumi y Mahunka, 1979)
(=*Hoplophthiracarus (Plonaphacarus) yoshii* Mahunka, 1991)
 - DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y Paleártica meridional.
 - *Hoplophthiracarus lamingtoni* Liu y Zhang, 2014
 - DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus lanceolatus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus leonilae* (Niedbala, 2017) (*Plonaphacarus*)
 - DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hoplophthiracarus loebli* Mahunka, 1985
 - DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Kerala) y Australiana: I. Célebes [Sulawesi].
 - *Hoplophthiracarus longicarinatus* (Niedbala, 2008) (*Plonaphacarus*)

- DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Hoplophthiracarus longqiensis* Liu, 2015
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus mallacoolaensis* Niedbala, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus maritimus* (C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996) (*Calyptophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Hoplophthiracarus mielcareki* Niedbala, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Hoplophthiracarus mutabilis* Niedbala y Schatz, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
 - *Hoplophthiracarus nasalis* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Hoplophthiracarus nepalensis* Sheals, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
 - *Hoplophthiracarus pakistanensis* Hammer, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Vietnam.
 - *Hoplophthiracarus parafoveolatus* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
 - *Hoplophthiracarus paravicinus* (Niedbala, 2017) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus penicillatus* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Hoplophthiracarus protrusus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus proximus* Niedbala, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australia, Oriental: Península Malaya, y Neotropical: Venezuela).
 - *Hoplophthiracarus punctatus* Mondal y Kundu, 1988
 DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
 - *Hoplophthiracarus rafalskii* Niedbala, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
 - *Hoplophthiracarus repetitus* Subías, 2004
 (= *Hoplophthiracarus indicus* Sanyal, 1990, “nom. praec.” por Bayoumi y Mahunka, 1979)
 DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Hoplophthiracarus rotundus* (Liu, Wu y Chen, 2011) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hoplophthiracarus scrupeus* (Niedbala, 1989) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y China suroriental).
 - *Hoplophthiracarus similis* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: India (Cachemira).
 - *Hoplophthiracarus stigmosus* Niedbala, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Borneo).
 - *Hoplophthiracarus toolangiensis* (Niedbala, 2006) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus trojani* (Niedbala, 2009) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus vicinus* (Niedbala, 2012) (*Plonaphacarus*)
 (“non” *Hoplophthiracarus vicinus* Niedbala, 1984, = *Notophthiracarus* (*Calyptophthiracarus*) *pavidus*
vicinus)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hoplophthiracarus vinalesensis* Niedbala, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Notophthiracarus Ramsay, 1966 (325 spp. y 3 sspp.)
 ESPECIE TIPO: *Phthiracarus maculatus* Trägårdh, 1931
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Notophthiracarus (*Notophthiracarus*) Ramsay, 1966 (208 spp. y 1 ssp.)
 (= *Arphthiracarus* Niedbala, 1994)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y subantártica.
 - *Notophthiracarus* (*N.*) *abstemius* Niedbala y Colloff, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
 - *Notophthiracarus* (*N.*) *aculeatus* Niedbala, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Notophthiracarus* (*N.*) *agulhasensis* Niedbala, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Notophthiracarus* (*N.*) *alienus* Niedbala, 1989

- DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) alienus* (Niedbala, 2017) (*Arphthiracarus*)
("nom. praeoc." por Niedbala, 1989)
- DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Notophthiracarus (N.) allocotos* (Niedbala, 2003) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) amus* (Niedbala y Starý, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costra Rica.
- *Notophthiracarus (N.) anceps* (Niedbala, 2004) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Notophthiracarus (N.) andamanensis* (Niedbala, 2011) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Islas Andaman).
- Notophthiracarus (N.) aokii* (Mahunka, 1983) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Notophthiracarus (N.) aokii aokii* (Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Notophthiracarus (N.) aokii malagasensis* (Mahunka, 2010) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) aquilus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) araios* (Niedbala, 2001) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) ater* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) aulicis* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) australis* Ramsay, 1966
(=*Notophthiracarus caliginosus* Niedbala, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Australia.
- *Notophthiracarus (N.) austroafricanus* (Mahunka, 1984) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) baculus* (Liu, Wu y Chen, 2014) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Notophthiracarus (N.) bah* (Liu y Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) bentoni* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Pitcairn).
- *Notophthiracarus (N.) bloszyki* Niedbala, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) bonangensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) brachistos* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Notophthiracarus (N.) bulbosus* (Niedbala, 2006) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) bulbus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Notophthiracarus (N.) calugarae* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) capevidalensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) capillatus* Niedbala, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) carinatus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Notophthiracarus (N.) caudatus* (Balogh y Mahunka, 1977) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) caulis* Niedbala, 2017
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) clavatus* (Niedbala y Starý, 2014) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costra Rica.
- *Notophthiracarus (N.) coetzeeae* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) comparativus* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Notophthiracarus (N.) consimilis* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

- *Notophthiracarus (N.) conspicuus* Niedbala, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) contortulus* Niedbala, 1992
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) contrarius* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Iraq.
- *Notophthiracarus (N.) cordylus* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) curiosus* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Notophthiracarus (N.) dactyloscopicus* (Mahunka, 1978) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Notophthiracarus (N.) dandenongensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) dewalteri* (Liu y Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) diaphorillus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) dikroos* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) dispersus* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) dugdalei* Liu y Zhang, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) echinus* (Balogh, 1964) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) ephylus* Niedbala e Illig, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Notophthiracarus (N.) elizabethiensis* (Niedbala, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) endroedyoungai* (Mahunka, 1984) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) eparmatos* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) ethiopicus* (Niedbala, 2008) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Notophthiracarus (N.) evexus* (Niedbala, 2000) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Notophthiracarus (N.) exacutus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) extraordinarius* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Notophthiracarus (N.) fatidicus* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea y Australia).
- *Notophthiracarus (N.) fecundus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda) y **subantártica** (Isla de Gough [Tristán de Acuña]).
- *Notophthiracarus (N.) feideri* (Balogh y Ciszár, 1963) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Notophthiracarus (N.) flagellatus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) flagellatus* (Liu y Oconnor, 2014) (*Austrophthiracarus*)
(“nom. praeoc.” por Niedbala, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Notophthiracarus (N.) flagrus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) flexiloquus* Niedbala, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Notophthiracarus (N.) fornicarius* (Niedbala, 1982) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) fulvus* (Niedbala, 1985) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Notophthiracarus (N.) fusiformis* Liu y Chen, 2013
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Notophthiracarus (N.) fusticulus* (Niedbala, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) fusulus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Brasil).

- *Notophthiracarus (N.) glennieensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) globifer* (Hammer, 1962) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) gongylos* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) grossus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) gyros* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].
- *Notophthiracarus (N.) hallidayi* Niedbala, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) hammeni* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) ignobilis* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Notophthiracarus (N.) improvisus* (Niedbala, 1982) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico).
- *Notophthiracarus (N.) inauditus* (Niedbala, 1982) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Bolivia).
- *Notophthiracarus (N.) incomparabilis* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) indicus* (Bayoumi y Mahunka, 1979) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Notophthiracarus (N.) indiligens* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Malawi.
- *Notophthiracarus (N.) indubitatus* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Notophthiracarus (N.) inenarrabilis* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Cachemira).
- *Notophthiracarus (N.) inusitatus* Mahunka, 2010
(“nom. praeoc.” por Niedbala, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) iubatus* (Niedbala, 2003) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Notophthiracarus (N.) janosbaloghi* Subías, 2010
(=*Notophthiracarus baloghi* Niedbala, 2004, “nom. praeoc.” por Niedbala, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) latebrosus* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente en Centroamérica).
- *Notophthiracarus (N.) latior* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Australiana (Hawái y Nueva Caledonia), India (Himalaya), Este de Rusia asiática y Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) leei* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) lineatus* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) lineolatus* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Notophthiracarus (N.) lionsi* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) liratus* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) longisetus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) longus* (Niedbala, 2017) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) maculatus* (Trägårdh, 1931) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) mahunkai* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) mahunkai* (Niedbala y Starý, 2013) (*Protophthiracarus*)
(“nom. praeoc.” por Niedbala, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) marginatus* (Mahunka, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Notophthiracarus (N.) mastigos* Niedbala, 2004

- DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) matatipiu* Liu y Zhang, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) maurus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) medius* Niedbala y Starý, 2016
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) mekistos* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) meristos* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) michaeli* (Niedbala, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) minorae* Niedbala, 2016
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) minusculus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Bolivia) y **subantártica** (Isla de Gough [Tristán de Acuña]).
- *Notophthiracarus (N.) modicus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) motomuka* Liu y Zhang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) nicoleti* (Niedbala, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) niedbalai* Subías, 2009
(=*Notophthiracarus procerus* Niedbala, 2006, “nom. praeoc.” por Niedbala, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) nigerrimus* (Berlese, 1920) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Notophthiracarus (N.) ogmos* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) otagoensis* Niedbala, 2016
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) pandanensis* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) paraallocotos* (Niedbala, 2006) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Notophthiracarus (N.) paracapillatus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) paracuriosus* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Notophthiracarus (N.) paraendroedyoungai* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) paraflagellatus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Notophthiracarus (N.) parafusticulus* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) parapauliani* Niedbala y Starý, 2016
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) pararavidus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) parareductus* Mahunka, 1992
(=*Hoplophorella reducta* Mahunka, 1988, “nom. praeoc.” por Mahunka, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Notophthiracarus (N.) pararidiculus* (Niedbala, 2003) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) parasaucius* (Niedbala, 2003) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) parasentus* (Niedbala, 2000) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Notophthiracarus (N.) parasomalicus* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) parasummersi* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) paratinctus* (Niedbala y Starý, 2015) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Notophthiracarus (N.) paratubulus* (Niedbala, 1991) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Notophthiracarus (N.) paraunicarinatus* Niedbala y Penttinen, 2007
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Notophthiracarus (N.) parausitatus* Niedbala, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) paravariolosus* Niedbala, 1994
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) parilloi* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) pauliani* (Balogh, 1964) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) pearcei* Subías, 2010 “sp. inq.”
(=*Hoploderma claviger* Pearce, 1906, “nom. praec.” por Berlese, 1904)
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Notophthiracarus (N.) pedanos* Niedbala, 2003
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Notophthiracarus (N.) perezinigo* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) perti* (Niedbala, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) pervalidus* (Niedbala, 2003) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Notophthiracarus (N.) phoxos* (Niedbala y Starý, 2016) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) plegados* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) prolixus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: La Española (R. Dominicana).
- *Notophthiracarus (N.) pseudotuberculatus* (Mahunka, 2008) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Notophthiracarus (N.) pullus* (Niedbala, 1989) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Notophthiracarus (N.) pumilus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) quasisimilis* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) quasisomalicus* Niedbala y Starý, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) quasiuluguruensis* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Notophthiracarus (N.) queenslandensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) quietus* Niedbala, 1989
(=*Notophthiracarus gressitti* Balogh y Mahunka, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Notophthiracarus (N.) rabus* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) rafalskii* (Niedbala, 1997) (*Arphthiracarus*)
 (“non” *Notophthiracarus rafalskii* Niedbala, 1997, =*Hoplophorella (H.) rafalskii*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Notophthiracarus (N.) ramsayi* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) rapax* (Berlese, 1916) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Notophthiracarus (N.) ravidus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) remotus* (Niedbala, 1989) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) repostus* Niedbala, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Notophthiracarus (N.) rhachis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) rimi* Liu y Zhang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) rotoitiensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Notophthiracarus (N.) salebrosus* Niedbala, 2017
DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Notophthiracarus (N.) sassafraensis* (Niedbala, 2017) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) schizocoma* (Hammer, 1962) (*Steganacarus*)
(=*Notophthiracarus niger* Mahunka, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Notophthiracarus (N.) schusteri* Niedbala, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) scuticus* (Niedbala, 2006) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) sensifus* Liu y Zhang, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) sentus* (Niedbala, 1989) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Sumatra).
- *Notophthiracarus (N.) serratus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) shealsi* (Lee, 1981) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) sicilicoma* (Hammer, 1962) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (N.) sigifurcatus* Liu y Zhang, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) similis* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) simplex* (Niedbala, 2017) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Notophthiracarus (N.) sinuosus* (Niedbala, 1982) (*Phthiracarus*)
(=*Notophthiracarus alpinus* Balogh y Mahunka, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Notophthiracarus (N.) solitarius* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Notophthiracarus (N.) solomonensis* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Notophthiracarus (N.) sordidus* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Notophthiracarus (N.) spiniformis* (Liu, Wu y Chen, 2014) (*Arphthiracarus*)
(“nom. praeoc.” por Niedbala, 2004)
DISTRIBUCIÓN: China suroccidental.
- *Notophthiracarus (N.) spinus* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) spurcus* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Notophthiracarus (N.) strictus* (Niedbala, 2017) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Notophthiracarus (N.) striolatus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Ecuador).
- *Notophthiracarus (N.) sulcatus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Panamá.
- *Notophthiracarus (N.) sumatranus* (Niedbala, 2000) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Notophthiracarus (N.) summersi* Niedbala, 2001
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) szeptyckii* Niedbala, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) tinctus* (Niedbala, 2000) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Notophthiracarus (N.) tohivea* Niedbala, 1998
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia y Oriental: Taiwán [Formosa].
- *Notophthiracarus (N.) trapezoides* (Fuangarworn y Lekprayoon, 2011) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Notophthiracarus (N.) trichosus* (Mahunka, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Notophthiracarus (N.) trivestigius* (Niedbala, 2012) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (N.) tsitsikamaensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) tuberculatus* (Niedbala y Corpuz-Raros, 1998) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Notophthiracarus (N.) tuberculus* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Notophthiracarus (N.) uluguruensis* Niedbala y Starý, 2015
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Notophthiracarus (N.) uncinatus* Niedbala y Colloff, 1997
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) uncinulus* Niedbala, 2000
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) usitatus* Niedbala, 1989
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (N.) variolosus* (Berlese, 1888) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (N.) venezolanus* Subías, 2010
(=*Arphthacarus ogmos* Niedbala, 2004, "nom. praeoc." por Niedbala, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Notophthiracarus (N.) vernonensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (N.) veteratorius* (Niedbala, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
- *Notophthiracarus (N.) waitere* (Liu y Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (N.) zebra* (Balogh, 1964) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (N.) zeuktos* (Niedbala, 2003) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Notophthiracarus (N.) zululandensis* Niedbala, 2006
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

***Notophthiracarus (Besuchetacarus)* Mahunka, 1985 (16 spp.)**

(=*Neokakophthiracarus* J. y P. Balogh, 2002)

ESPECIE TIPO: *Besuchetacarus orientalis* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) abacus* Niedbala, 2008 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) angustus* Niedbala, 2012 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) bicarinatus* Niedbala, 2001 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) biputeus* Liu y Zhang, 2014 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) enigmaticus* (Mahunka, 1996) (*Kakophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) ephippiger* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) hauseri* Mahunka, 1995 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) lienhardi* Mahunka, 1996 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo y Península Malaya.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) orientalis* (Mahunka, 1985) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) planus* (Mahunka, 1985) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: India meridional.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) primus* (Niedbala y Starý, 2015) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) protrusus* Liu y Chen, 2013 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) quadrus* (Niedbala, 2004) (*Arphthacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) tamaki* Liu y Zhang, 2014 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) tricarinatus* (Niedbala, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Notophthiracarus (Besuchetacarus) tripartitus* Niedbala, 1989 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

***Notophthiracarus (Calyptophthiracarus)* Aoki, 1980 (15 spp. y 2 sspp.)**

(=*Hauserophthiracarus* Mahunka, 1982)

(=*Phrathicarus* Niedbala, 1994)

ESPECIE TIPO: *Calyptophthiracarus mitratus* Aoki, 1980

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) bruneiensis* Subías, 2010

(=*Hoplophthiracarus (Plonaphacarus) aculeatus* Mahunka, 1995, "nom. praeoc." por Niedbala, 1988)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) candidulus* (Niedbala, 1983) (*Hoplophthiracarus*)

(=*Hoplophthiracarus meridionalis* Sergienko, 1992)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) comatus* Niedbala, 2000 (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) costai* (Macfarlane y Sheals, 1965) (*Hoplophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Israel y España) e India.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) filiformis* (Liu y Chen, 2014) (*Austrophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) gomerensis* (Niedbala, 2008) (*Austrophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) grandjeani* (Niedbala, 1987) (*Plonaphacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Melanesia: I. Fiji).

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) heterotrichus* (Mahunka, 1979) (*Hoplophthiracarus*)

(=*Calyptophthiracarus canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) inflatus* (Niedbala, 1994) (*Phrathicarus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) inusitatus* (Niedbala, 1983) (*Hoplophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) longisetosus* (Liu y Chen, 2014) (*Austrophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) mitratus* (Aoki, 1980) (*C.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) nitidus* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1988) (*C.*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) oenipontanus* (Mahunka, 1982) (*Hauserophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) olivaceus* (Jacot, 1929) (*Phthiracarus*)

(=*Phthiracarus erinaceum* Jacot, 1930)

DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).

Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) pavidus (Berlese, 1913) (*Hoploderma*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional e India (Maharastra).

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) pavidus pavidus* (Berlese, 1913)

(=*Hoplophthiracarus cretensis* Mahunka, 1979)

(=*Calyptophthiracarus cretensis inopinatus* Mahunka, 1991)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional e India (Maharastra).

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) pavidus vicinus* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus* v.)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Notophthiracarus (Calyptophthiracarus) setiformis* (Liu, 2017) (*Austrophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Notophthiracarus (Phthirarica) Mahunka, 1982 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Phthirarica ridicula* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).

- *Notophthiracarus (Phthirarica) filaris* (Niedbala, 2004) (*Protophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

- *Notophthiracarus (Phthirarica) retrorsus* (Niedbala, 2003) (*Austrophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Costra Rica.

- *Notophthiracarus (Phthirarica) ridiculus* (Mahunka, 1982) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica (frecuente).

- *Notophthiracarus (Phthirarica) tawhai* (Liu y Zhang, 2013) (*Austrophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Notophthiracarus (Phthirarica) traegardhi* (Niedbala, 1987) (*Calyptophthiracarus*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Notophthiracarus (Protophthiracarus) Balogh, 1972 (45 spp.)

(=*Austrophthiracarus* Balogh y Mahunka, 1978)

(=*Fuegoplophora* Mahunka, 1980)

(=*Notophthiracarus* Balogh y Mahunka, 1967, "nom. praeoc." por Ramsay, 1966)

(=*Sturmacarus* P. Balogh, 1984)

- ESPECIE TIPO: *Notophthiracarus chilensis* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Australianooriental, Neotropical y Antártica).
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) aculeatus* (Niedbała y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
("nom. praeoc." por Niedbała, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) admirabilis* (Niedbała, 1982) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) andinus* (P. Balogh, 1984) (*Phthirarica*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) aokii* (Niedbała, 1987) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) baloghi* (Niedbała, 1987) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania) y Méjico.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) cajanumaensis* (Niedbała e Illig, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) chatham* Liu y Zhang, 2015 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) chilensis* Balogh y Mahunka, 1967 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) clandestinus* (Niedbała, 2003) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) cronadun* (Liu y Zhang, 2013) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) curtatus* Niedbała, 2004 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) daimonios* (Niedbała, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) diazae* (Ojeda, 1985) (P.)
(=*Calyptophthiracarus cucundus* Niedbała, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) dilucidus* (Niedbała, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) donnabuangensis* (Niedbała, 2017) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) elconsuleoensis* (Niedbała e Illig, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) equisetosus* (Mahunka, 1980) (*Neoprotophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) espeletiae* (P. Balogh, 1984) (*Sturmacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) foveoreticulatus* (Mahunka, 1980) (*Fuegoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) golondrinasis* (Niedbała e Illig, 2007) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) hiore* (Liu y Zhang, 2014) (N.) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) impolitus* (Niedbała, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) incrassatus* (Niedbała, 1984) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) konwerskii* (Niedbała, 2012) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) lunatus* (Niedbała, 2017) (*Austrophthiracarus*)
("nom. praeoc." por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) matuku* (Liu y Zhang, 2014) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) neochilensis* Subías, 2010
(=*Austrophthiracarus heteropilosus* Niedbała, 2004, "nom. praeoc." por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) neutrichus* (Wallwork, 1966) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) nexilis* (Niedbała, 2003) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Notophthiracarus (Protophthiracarus) niedbalai* (Liu y Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
(=*Austrophthiracarus longisetosus* Niedbała y Starý, 2015, "nom. praeoc." por Liu y Chen, 2014)
(=*Austrophthiracarus longisetus* Niedbała y Starý, 2015, "nom. praeoc." por Niedbała, 2000)

- ("nom. praec." por Pérez-Íñigo y Baggio, 1996, y Subías, 2009)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) notoporosus* (Liu y Zhang, 2014) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) paraandinus* Subías, 2018
 (= *Austrophthiracarus baloghi* Niedbala, 2004, "nom. praec." por Niedbala, 1987)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) paracronadun* (Liu y Wu, 2016) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) paralamingtoni* (Niedbala, 2017) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) paralargus* (Niedbala y Penttinen, 2007) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) phaleratus* (Niedbala, 1982) (*Neophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) radiatus* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Austrophthiracarus*)
 (= *Austrophthiracarus similis* J. y P. Balogh, 1983)
 DISTRIBUCIÓN: Australia y Costa Rica.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) rotundus* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) strigosus* (Niedbala, 1984) (*Neophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) valdiviaensis* (Niedbala, 2008) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) ventosus* (Hammer, 1961) (*Steganacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) villosus* (Niedbala, 1982) (*Neophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) warburtonensis* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) weldboroughensis* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Notophthiracarus (Protophthiracarus) willmanni* (Niedbala, 1987) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

***Notophthiracarus (Steganacarellus)* Mahunka, 1986 (36 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Steganacarellus reductus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Notophthiracarus (Steganacarellus) aethes* Niedbala, Corpuz-Raros y Gruèzo, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) anakolos* (Niedbala, 2006) (*Phthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) brachys* Niedbala, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) cavernosus* (Mahunka, 1987) (*Hoplophorella*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) cristatus* Niedbala, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) deminutus* Niedbala, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) dilatatus* Niedbala, 2004 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) distinctus* Niedbala, 1989 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) frondeus* Niedbala, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) hammerae* Niedbala, 1987 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) heterosetosus* Niedbala, 1998 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) heterotrichus* (Mahunka, 1984) (*Hoplophorella*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) knysnaensis* Niedbala, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) korannabergensis* Niedbala, 2006 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) lewisensis* Niedbala, 2012 (N.)

- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Notophthiracarus (Steganacarellus) lunatus* Niedbala, 2004 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) minimus* (Liu y Zhang, 2015) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) mirus* Niedbala, 2000 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) multituberculatus* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) natalensis* Niedbala, 2006 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) novazelandicus* Subías, 2010
(=*Arphthiracarus heterotrichus* Niedbala, 2000, “nom. praeoc.” por Mahunka, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) obsessus* Subías, 2004 (N.)
(=*Notophthiracarus admirabilis* Niedbala y Colloff, 1997, “nom. praeoc.” por Niedbala, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) paraparvulus* Niedbala, 2000 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) parvulus* Niedbala, 1998 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) perlucundus* Niedbala, 2000 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) perparvus* Niedbala, 1989 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) phyllodes* Niedbala, 2006 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) reductus* (Mahunka, 1986) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) robertsi* (Sheals, 1965) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Nepal e India (Bengala Occidental), y Cáucaso.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) samarensis* Niedbala, Corpuz-Raros y Gruèzo, 2006 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) spiniformis* Niedbala, 2004 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) stenotus* Niedbala y Corpuz-Raros, 1998 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas y Nueva Guinea.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) tenuiseta* (J. y P. Balogh, 1986) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) trojani* Niedbala, 2009 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) uncarinatus* Niedbala, 2000 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Notophthiracarus (Steganacarellus) whakau* Liu y Zhang, 2013 (N.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Phthiracarus Perty, 1841 (215 spp. y 1ssp.)

ESPECIE TIPO: (*Phthiracarus contractilis* Perty, 1841) =*Hoplophora laevigata* Koch, 1841

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Phthiracarus (Phthiracarus) Perty, 1841 (49 spp. y 1ssp.)

(=*Ginglymacarus* Ewing, 1917)

(=*Hoploderma* Michael, 1898)

(=*Hoplophora* Koch, 1835, “nom. praeoc.” por Germar, 1833)

(=*Peridromotritia* Jacot, 1923)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Phthiracarus (P.) abstemius* Niedbala, 1989

DISTRIBUCIÓN: Vietnam y “China”.

- *Phthiracarus (P.) affinis* (Hull, 1914) (*Hoploderma*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.

- *Phthiracarus (P.) benoiti* Balogh, 1958 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Angola.

Phthiracarus (P.) boresetosus Jacot, 1930

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Neotropical e India (Cachemira).

- *Phthiracarus (P.) boresetosus boresetosus* Jacot, 1930

(=*Phthiracarus dudichi* Mahunka, 1982)

(=*Phthiracarus kaszabi* Mahunka, 1981)

- (=*Phthiracarus minimarginatus* Woolley, 1954)
 (= *Phthiracarus tenuis* Hammer, 1977)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Neártica), Neotropical e India (Cachemira).
 - *Phthiracarus (P.) boresetosus propinquus* Niedbala, 1983 (*P. p.*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Rusia asiática meridional.
- *Phthiracarus (P.) clavifer* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Phthiracarus (P.) clemens* Aoki, 1963
 (= *Phthiracarus clemens kyushuensis* Aoki, 1980)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte), Cáucaso y Norte de Oriental.
- *Phthiracarus (P.) compressus* Jacot, 1930
 (= *Phthiracarus commutabilis* Niedbala, 1983)
 (= *Phthiracarus pallidus* Feider y Suciú, 1958)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Oriental.
- *Phthiracarus (P.) crinitus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Phthiracarus (P.) curtulus* Berlese, 1923
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Phthiracarus (P.) danubianus* Feider y Călugăr, 1970 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Phthiracarus (P.) dubinini* Feider y Suciú, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Phthiracarus (P.) ferrugineus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
 (= *Phthiracarus juvenalis* Parry, 1979)
 (= *Phthiracarus membranifer* Parry, 1979)
 (= *Phthiracarus paraligneus* Iturrondobeitia y Saloña, 1989)
 (= *Phthiracarus sellnicki* Feider y Suciú, 1957)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Corea) y Ceilán [Sri Lanka].
- *Phthiracarus (P.) globosus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
 (= *Phthiracarus rotundus* Ewing, 1908)
 (= *Hoplophora sphaerula* Banks, 1895)
 (= *Phthiracarus subglobosus* Berlese, 1923)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Norte de Neotropical y Borneo.
- *Phthiracarus (P.) heteropilosus* (Niedbala, 2004) (*Notophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Phthiracarus (P.) incredibilis* Niedbala, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Phthiracarus (P.) inexpectatus* Niedbala, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Phthiracarus (P.) insularis* Jacot, 1934
 (= *Phthiracarus perlucidus* Niedbala, 1994)
 DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Phthiracarus (P.) irreprensus* Niedbala, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Phthiracarus (P.) italicus* (Oudemans, 1900) (*Hoplophora*)
 (?=*Hoplophora testudinea* Koch, 1841 "sp. inq.")
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Míchigan).
- *Phthiracarus (P.) jacoti* Feider y Suciú, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Phthiracarus (P.) japonicus* Aoki, 1958
 (= *Phthiracarus ewingi* Niedbala, 1994)
 (= *Phthiracarus miyamaensis* Fujikawa, 2004)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental meridional, y Neártica: frecuente) y Norte de Oriental.
- *Phthiracarus (P.) koumantanosi* Niedbala, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Phthiracarus (P.) laevigatus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
 (= *Phthiracarus besuchetianus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2003)
 (= *Phthiracarus contractilis* Perty, 1841)
 (?=*Oribata dasyptus* Dugès, 1834 "sp. inq.")
 (= *Hoplophora maxima* Haupt, 1882)
 (= *Hoplophora nitens* Nicolet, 1855)
 (= *Phthiracarus roubali* Berlese, 1923)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte), Perú y Etiópica (I. Santa Helena e I. Reunión).
- *Phthiracarus (P.) lautus* Niedbala, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Phthiracarus (P.) leliehoekensis* Niedbala, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Phthiracarus (P.) lentulus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
 (= *Phthiracarus angolensis* Mahunka, 1985)
 (= *Phthiracarus conformis* Sergienko, 1987)
 (= *Phthiracarus incertus* Niedbala, 1983)
 (= *Phthiracarus rotundus* Berlese, 1923, "nom. praeoc." por Ewing, 1908)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Neártica) y Etiópica (Angola y

Madagascar).

- *Phthiracarus (P.) longulus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
 (= *Phthiracarus apiculatus* Jacot, 1939)
 (= *Hoploderma borealis* Trägårdh, 1910)
 (= *Phthiracarus crenophilus* Willmann, 1951)
 (= *Phthiracarus flexisetosus* Parry, 1979)
 (= *Phthiracarus hortobagyensis* Mahunka, 1982)
 (= *Phthiracarus malagensis* Niedbala, 1986)
 (= *Phthiracarus montium* Jacot, 1937)
 (= *Phthiracarus mundus* Niedbala, 1983)
 (= *Phthiracarus pannonicus* Willmann, 1954)
 (= *Phthiracarus prior* Jacot, 1933)
 (= *Phthiracarus setosellus* Jacot, 1929)
 (= *Phthiracarus tardus* Forsslund, 1943)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Uruguay.
- *Phthiracarus (P.) machadoi* Balogh, 1958 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Phthiracarus (P.) occultus* Niedbala, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Polonia.
- *Phthiracarus (P.) paralongulus* Niedbala y Starý, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Chequia y Noreste de China).
- *Phthiracarus (P.) persimplex* Mahunka, 1982
 (= *Phthiracarus (Archiphthiracarus) shirakamiensis* Fujikawa, 2004)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Phthiracarus (P.) phoxos* Niedbala, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical y "Polonia".
- *Phthiracarus (P.) plenus* Niedbala, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (P.) ponticus* Krivolutsky, 1975 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Phthiracarus (P.) pudicus* Berlese, 1923
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus (P.) pusillus* Niedbala, 2001
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.
- *Phthiracarus (P.) reductus* Niedbala, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (P.) sarahae* Jacot, 1930
 (= *Phthiracarus validus* Niedbala, 1986)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).
- *Phthiracarus (P.) serrulatus* Parry, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Phthiracarus (P.) sichuanensis* Liu, 2014
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Phthiracarus (P.) similis* Niedbala, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental y Mediterránea oriental.
- *Phthiracarus (P.) spadix* Niedbala, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Phthiracarus (P.) stenotus* Niedbala, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Phthiracarus (P.) subdulus* Niedbala, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Phthiracarus (P.) swiftae* Niedbala, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phthiracarus (P.) tristis* Mahunka y Paoletti, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Phthiracarus (P.) undatus* Oudemans, 1916 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Phthiracarus (P.) zicmani* Balogh y Mahunka, 1983
 (= *Phthiracarus feideri* Balogh y Mahunka, 1979, "nom. praeoc." por Balogh y Csiszár, 1963)
 DISTRIBUCIÓN: Europea.

***Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*)** Balogh y Mahunka, 1979 (109 spp.)
 (= *Archiphthiracarella* Mahunka, 1996)
 (= *Microphthiracarus* Mahunka, 1982)
 (= *Paraphthiracarus* Aoki, 1980)
 ESPECIE TIPO: (*Archiphthiracarus variabilis* Balogh y Mahunka, 1979) = *Phthiracarus peristomaticus* Willmann, 1954

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *acuminatus* (Liu, 2017) (*Hoplophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *aegypticus* (Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid y El-Deeb, 1984) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *aethes* Niedbala, 2004 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *aitu* (Liu y Zhang, 2015) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *aliquantus* Niedbala, 1988 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental (frecuente) y Kentucky.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *andasibensis* (Niedbala y Starý, 2014) (*Notophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *anonymus* Grandjean, 1933 (P.)
 (= *Phthiracarus anonymus amicus* Jacot, 1938)
 (= *Archiphthiracarus hauseri* Mahunka, 1988)
 (= *Archiphthiracarus pocsi* Mahunka, 1983)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *atlanticus* (Pérez-Íñigo, 1987) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *atratus* (Niedbala, 2000) (*Notophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *australis* (Aoki, 1980) (*Paraphthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *baloghi* Feider y Suciú, 1957 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e Irán.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *banksi* Niedbala, 1987 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Australia y Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *bicarinatus* Niedbala, 2008 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *blythdalensis* Niedbala, 2006 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *bryobius* Jacot, 1930 (*P. setosellum* b.)
 (= *Phthiracarus clavatus* Parry, 1979)
 (= *Phthiracarus crinitosimilis* Willmann, 1939)
 (= *Archiphthiracarus gobiensis* Mahunka, 1981)
 (= *Archiphthiracarus hungaricus* Balogh y Mahunka, 1979)
 (= *Phthiracarus lanatus* Feider y Suciú, 1957)
 (= *Phthiracarus opacus* Niedbala, 1986)
 (= *Archiphthiracarus pilosus* Sergienko, 1987)
 (?= *Hoplophora straminea* Koch, 1841 "sp. inq.")
 (= *Archiphthiracarus tzanoudakisi* Mahunka, 1979)
 (= *Phthiracarus wallworki* Niedbala, 1984)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica, I. Santa Helena, Nepal y Neotropical (Costa Rica y Bolivia).
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *bulbiferus* (Mahunka, 1996) (*Archiphthiracarella*)
 (= *Microphthiracarus baloghi* Mahunka, 1982, "nom. praeoc." por Feider y Suciú, 1957)
 (= *Archiphthiracarella baloghorum* Mahunka, 1997)
 (= *Phthiracarus insularis* Balogh, 1964, "nom. praeoc." por Jacot, 1935)
 (= *Phthiracarus minor* Niedbala, 2001)
 (= *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *neonominatus* Subías, 2004)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Etiopía).
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *cadizi* Niedbala, 1986 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: España.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *catalaucus* Niedbala, 2004 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *cavernosus* (Wallwork, 1977) (*Hoplophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *closteros* Niedbala, 2004 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phthiracarus* (*Archiphthiracarus*) *cognatus* Niedbala, 1988 (P.)
 (= *Phthiracarus rafalskii* Niedbala, 1997)

- DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Sureste): frecuente.
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) comatus* Niedbala, 1983 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) crassus* Niedbala, 1983 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) crispus* Hammer, 1972 (P.)
(=*Archiphthiracarus schauenbergi* Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Nueva Caledonia), Oriental y Etiópica (Malgache y Sudáfrica).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) curiosus* Niedbala, 1998 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) densus* Niedbala, 2006 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) dissonus* Niedbala, 1983 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Este de Rusia asiática).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) dominiaki* Niedbala, 1984 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) duplex* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) endroedyi* (Mahunka, 1984) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) eupalineus* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) falciformis* Morell y Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) filiformis* (Liu y Oconnor, 2014) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) flagellatus* Wallwork, 1977 (P.)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) flexipilus* Călugăr y Vasiliu, 1981 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) forsslundi* (Niedbala, 1987) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) fraternus* Niedbala, 1998 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) fujianensis* Liu, 2014 (P.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) furvus* Niedbala, 1983 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) gibber* (Aoki, 1980) (*Paraphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) globus* Parry, 1979 (P.)
(=*Phthiracarus mediocris* Niedbala, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) granpedraensis* (Niedbala, 2009) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) heterotrichosus* (Niedbala, 2000) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) hillcrestensis* Niedbala, 2006 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) humilis* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) imbecillis* (Mahunka, 1989) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) inaccessus* Niedbala, 1998 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico y Australia).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) inornatus* Niedbala, 1984 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) insolens* (Niedbala, 2000) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) invenustus* Niedbala, 2000 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) kokae* Niedbala, 2006 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) largus* Niedbala, 1984 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Cáucaso, Asia central rusa e I. Sajalín).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ligneus* Willmann, 1931 (P.)

- DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y "Neártica").
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) liparus* Niedbala, 1984 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) lividus* (Niedbala, 2000) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) luridus* (Ewing, 1909) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) mediocris* (Niedbala, 2017) (*Hoplophthiracarus*)
("nom. praeoc." por Niedbala, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) micidus* (Niedbala y Starý, 2015) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) mindanaoensis* Niedbala, Corpuz-Raros y Gruèzo, 2006 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) minutus* Liu y Zhang, 2016 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) modestus* Niedbala, 1988 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Sureste).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) montanus* Pérez-Íñigo, 1969 (P.)
(=*Phthiracarus assimilis* Niedbala, 1983)
(=*Phthiracarus murphyi* Harding, 1976)
(=*Phthiracarus rectisetosus* Parry, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Suroeste de Paleártica oriental.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) niahensis* (Niedbala, 2008) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) nitidus* Niedbala, 1986 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Canadá y U.S.A.: Utah).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) obliquus* (Niedbala y Starý, 2015) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) obscurus* Niedbala, 1986 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) obturatus* (Niedbala, 2009) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ochthus* Niedbala, 2001 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ornatus* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pachys* Niedbala, 2015 (P.)
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pandus* Niedbala, 2004 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Jamaica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) papillosus* Parry, 1979 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parabaloghi* Niedbala, 1983 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Uganda y Camerún).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parabanangensis* (Niedbala, 2006) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parabotrichus* (Feider y Suciu, 1957) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paracrispus* Niedbala y Starý, 2016 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paraglobosus* Niedbala, 1982 (P.)
DISTRIBUCIÓN: India (Cachemira).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paralaevigatus* Niedbala y Starý, 2010
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parapocsi* Niedbala, 2001 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paratryssos* (Niedbala y Starý, 2015) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) parmatus* (Nakatamari, 1985) (*Paraphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) paucus* Niedbala, 1991 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: Australiana, Sudáfrica, Oriental (Vietnam y Bali) y subtropical (Este de Paleártica oriental).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pedanos* (Niedbala, 2004) (*Arphthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: La Española (R. Dominicana) y Ecuador.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pellucidus* Ramsay, 1966 (P.)

- DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Phthiracarus (Archiphthiracarus) peristomaticus* Willmann, 1954 (P.)
(=*Archiphthiracarus hammeni* Balogh y Mahunka, 1979)
(=*Archiphthiracarus variabilis* Balogh y Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) persimilis* Niedbała, 1998 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pertenuis* Niedbała, 2006 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) piger* (Scopoli, 1763) (Acarus)
(=*Hoplophora lucida* Koch, 1841)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y "Neártica").
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pondoklowii* Niedbała, 2004 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) puylaerti* (Niedbała, 2001) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Madagascar).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) pygmaeus* Balogh, 1958 (P.)
(=*Archiphthiracarus foveolatus* Mahunka, 1988)
(=*Archiphthiracarus minutissimus* Balogh y Mahunka, 1980)
(=*Phthiracarus passimpunctatus* P. Balogh, 1988)
(=*Phthiracarus serrula* Balogh y Mahunka, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) ranomafanensis* Niedbała y Starý, 2016 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sangumburiensis* (Niedbała, 2002) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sanvicensis* Subías y Gil-Martín, 1990 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) schusteri* Niedbała, 2008 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Turquía y Portugal).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) scitus* Niedbała, 1983 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) subiasi* Niedbała, 1986 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sudafricanus* Subías, 2010
(=*Phthiracarus humilis* Niedbała, 2006, "nom. praec." por Niedbała, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) sudamericanus* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1993) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) thaiensis* Mahunka, 2008 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) thorntonensis* (Niedbała y Penttinen, 2007) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) torosus* Willmann, 1939 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) totus* Niedbała, 2003 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Costa Rica y Brasil) y Cáucaso.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) tryssos* (Niedbała, 2004) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) tubulus* Hammer, 1972 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Polinesia) y Oriental (Vietnam).
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) turgidus* (Niedbała, 1991) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) varablancus* (Niedbała, 2006) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) weigmanni* (Niedbała, 1987) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Archiphthiracarus) yunnanensis* Liu, 2014 (P.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

***Phthiracarus (Metaphthiracarus)* Aoki, 1980 (10 spp.)**

ESPECIE TIPO: (*Metaphthiracarus bacillatus* Aoki, 1980) =*Hoplophora setosa* Banks, 1895

DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Oriental).

- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) bicarinatus* (Niedbała y Starý, 2014) (*Austrophthiracarus*)
("nom. praec." por Niedbała, 2008)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Phthiracarus (Metaphthiracarus) brevisetae* Jacot, 1930 (P.)

- (=*Phthiracarus restrictus* Jacot, 1937)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Centroamérica.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) conspersus* (Niedbala, 2006) (*Notophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) jumbongiense* (Niedbala, 2002) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) kamillae* (Niedbala, 1987) (*Notophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) paraclosteros* Niedbala, 2004 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) parainusitatus* (Niedbala y Starý, 2011) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) rabacalensis* (Niedbala, 2013) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Madeira.
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) setanus* Jacot, 1939 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Noroeste) y Notropical (Chile y Panamá).
 - *Phthiracarus (Metaphthiracarus) setosus* (Banks, 1895) (*Hoplophora*)
 (= *Metaphthiracarus bacillatus* Aoki, 1980)
 (= *Phthiracarus falcatus* Hammer, 1977)
 (= *Archiphthiracarus filiferus* Mahunka, 1982)
 (= *Phthiracarus (Archiphthiracarus) hirsutus* Fujikawa, 2003)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica: frecuente, y Paleártica oriental meridional) y U.S.A. (Florida).

Phthiracarus (Neophthiracarus) Balogh y Csiszár, 1963 (46 spp.)

(=*Antarctoplophora* Mahunka, 1980)

(=*Neoprotophthiracarus* Mahunka, 1980)

ESPECIE TIPO: *Neophthiracarus insignis* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australia y Neotropical) y subtropical.

- *Phthiracarus (Neophthiracarus) aenus* (Niedbala, 2000) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) allocotos* Niedbala y Starý, 2015 (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) amoroensis* (Niedbala y Starý, 2015) (*Protophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) aureus* (Niedbala, 2000) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) australianicus* Subías, 2010
 (= *Plonaphacarus feideri* Niedbala, 1987, "nom. praec." por Balogh y Csiszár, 1963)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) comosus* (Aoki, 1980) (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) darwini* (Mahunka, 1980) (*Antarctoplophora*)
 DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) difficilis* (Niedbala, 2014) (*Plonaphacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) egregius* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) excellens* (Niedbala, 1982) (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) facetus* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) furcatus* (Kramer, 1898) (*Hoplophora*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) glennieensis* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia y Tasmania.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) gongylos* (Niedbala, 2004) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Chile).
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) hallidayi* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) helluonis* (Niedbala, 1982) (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) hirtus* (P. Balogh, 1984) (*Sturmacarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y Chile).
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) insignis* (Balogh y Csiszár, 1963) (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Phthiracarus (Neophthiracarus) karioi* (Liu y Zhang, 2014) (*Austrophthiracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Phthiracarus (Neophthiracarus) kirikiri* (Liu y Zhang, 2015) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) kochi* (Niedbala, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) lamingtoni* (Niedbala, 2000) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) minisetosus* (Niedbala, 2004) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) multisetosus* (J. y P. Balogh, 1983) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) mutabilis* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) nimius* (Niedbala, 2009) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) obsessus* Subías, 2004
(=*Calyptophthiracarus sellnicki* Niedbala, 1987, “nom. praec.” por Feider y Suciú, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) octosetosus* Niedbala, 2004 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) opiparus* Niedbala, 2004 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) paraminisetosus* (Niedbala e Illig, 2007) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) parapilosus* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) parapulchellus* (Niedbala, 2006) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) parashiptoni* Niedbala, 2004 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) perpropinquus* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) pilosus* (Niedbala y Colloff, 1997) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) portentosus* (Niedbala, 1988) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Austrophthiracarus dissonus* Niedbala y Colloff, 1997, “nom. praec.” por Niedbala, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) probus* Niedbala y Colloff, 1997 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) pulchellus* (Niedbala, 1993) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) quasiminisetosus* (Niedbala e Illig, 2007) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) reiteratus* Subías, 2017
(=*Austrophthiracarus neonominatus* Liu y Wu, 2016, “nom. praec.” por Subías, 2004)
(=*Austrophthiracarus parapulchellus* Niedbala, 2016, “nom. praec.” por Niedbala, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) repetitus* Subías, 2004
(=*Austrophthiracarus largus* Niedbala, 2000, “nom. praec.” por Niedbala, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) scopolii* (Niedbala, 1987) (*Calyptophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) shiptoni* (Sheals y Macfarlane, 1966) (N.)
(=*Neoprotophthiracarus flagellatus* Mahunka, 1980)
(=*Phthiracarus mahunkai* Niedbala, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) vestigiis* (Liu y Wu, 2016) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Phthiracarus (Neophthiracarus) wallworki* (J. y P. Balogh, 1983) (*Austrophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Rhacaplacarus Niedbala, 1986 (57 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hoplophorella amoena* Niedbala, 1983

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Rhacaplacarus (Rhacaplacarus) Niedbala, 1986 (45 spp.)

(=*Plonaphacarus* Niedbala, 1986)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Rhacaplacarus (R.) ambiguus* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Rhacaplacarus (R.) amoenus* (Niedbala, 1983) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Rhacaplacarus (R.) brevisetus* (Mahunka, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Rhacaplacarus (R.) diaphoros* (Niedbala, 2000) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Rhacaplacarus (R.) dikros* (Niedbala, 2000) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Rhacaplacarus (R.) discrepus* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Rhacaplacarus (R.) ecphylus* (Niedbala, 2001) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Rhacaplacarus (R.) eximius* (Niedbala, 1982) (*Hoplophthiracarus*)
(=*Steganacarus politus* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Rhacaplacarus (R.) frater* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Rhacaplacarus (R.) granulatus* (Banks, 1902) (*Hoploderma*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Rhacaplacarus (R.) hamulus* (Niedbala, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Rhacaplacarus (R.) inflatus* (Niedbala, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: África central.
- *Rhacaplacarus (R.) kaluzi* (Niedbala, 2013) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Rhacaplacarus (R.) kaszabi* (P. Balogh, 1988) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rhacaplacarus (R.) kumboensis* (Niedbala y Starý, 2014) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Rhacaplacarus (R.) laetabilis* (Niedbala, 1988) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Rhacaplacarus (R.) laterospinosus* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Rhacaplacarus (R.) longipilosus* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (R.) machadoi* (Balogh, 1958) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).
- *Rhacaplacarus (R.) martensi* (Niedbala, 2014) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Rhacaplacarus (R.) mekistos* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (R.) montigenus* (Niedbala, 1981) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Rhacaplacarus (R.) ngongi* (Niedbala, 2001) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Rhacaplacarus (R.) optivus* (Niedbala, 1994) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Rhacaplacarus (R.) ortizi* (Pérez-Íñigo, 1970) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Rhacaplacarus (R.) parafrater* (Niedbala, 2012) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Rhacaplacarus (R.) paramachadoi* (Niedbala y Starý, 2015) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Rhacaplacarus (R.) pervigens* (Niedbala, 1988) (*Hoplophorella*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Rhacaplacarus (R.) pseudosomalicus* (Mahunka, 2010) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhacaplacarus (R.) rafalskii* (Niedbala, 1997) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: Bengala Occidental, y Borneo).
- *Rhacaplacarus (R.) reticulatus* (Niedbala y Starý, 2014) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Rhacaplacarus (R.) rybalovi* (Niedbala, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Rhacaplacarus (R.) semiaciculatus* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Península Malaya).
- *Rhacaplacarus (R.) sidorchukae* (Niedbala, 2011) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Rhacaplacarus (R.) somalicus* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhoplophora)*)
(=*Plonaphacarus persimilis* Niedbala, 1994)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Somalia y Madagascar).
- *Rhacaplacarus (R.) spinatus* (Niedbala, 2001) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Rhacaplacarus (R.) spiniferus* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Rhacaplacarus (R.) spinus* (Niedbala y Starý, 2014) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Rhacaplacarus (R.) styphelos* (Niedbala, 2001) (*Plonaphacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Rhacaplacarus (R.) succinctus* (Niedbala, 2001) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Rhacaplacarus (R.) szeptyckii* (Niedbala, 2009) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Rhacaplacarus (R.) tanzicus* (Mahunka, 1993) (*Hoplophthiracarus (Plonaphacarus)*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Rhacaplacarus (R.) thoreau* (Jacot, 1930) (*Steganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).
- *Rhacaplacarus (R.) walteri* (Liu y Zhang, 2014) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Rhacaplacarus (R.) zicsii* (Mahunka, 1988) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Rhacaplacarus (Mantigueracarus) Balogh y Mahunka, 1992 (12 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mantigueracarus baggioi* Balogh y Mahunka, 1992

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) aduncatus* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) baggioi* (Balogh y Mahunka, 1992) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) brasiliensis* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) evexus* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) fusticulus* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) gladius* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) incredibilis* (Niedbala, 1982) (*Neophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) multipilosus* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) perezinigo* (Balogh y Mahunka, 1992) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) quaternarius* (Niedbala y Starý, 2014) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) sedecimus* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Bolivia).
- *Rhacaplacarus (Mantigueracarus) stenodes* (Niedbala, 2004) (*Steganacarus (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Steganacarus Ewing, 1917 (65 spp. y 4 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Hoplophora anomala* Berlese, 1883

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Steganacarus (Steganacarus) Ewing, 1917 (29 spp. y 3 sspp.)

(=*Niedbalacarus* J. y P. Balogh, 2002)

(=*Trachyhoplophora* Berlese, 1923)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Steganacarus (S.) applicatus* (Sellnick, 1920) (*Phthiracarus*)
(?= *Phthiracarus berlese* Oudemans, 1915 "sp. inq.")
(?= *Hoplophora quadriseriata* Haupt, 1882 "sp. inq.")

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Steganacarus (S.) caelestis* Niedbala, 1984
DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Steganacarus (S.) carlosi* Niedbala, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Steganacarus (S.) carusoi* Bernini y Avanzati, 1989
(?= *Steganacarus applicatus crassisetosus* Willmann, 1939 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (S.) controversus* (Niedbala, 2000) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Steganacarus (S.) craterifer* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
 - *Steganacarus (S.) diatropos* Niedbala, 2004
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Steganacarus (S.) ewingi* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2009) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Steganacarus (S.) foliosus* (Niedbala, 2003) (*Atropacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Steganacarus (S.) guanarteme* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Steganacarus (S.) herculeanus* Willmann, 1953
(= *Steganacarus longisetosus* Moraza, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
 - *Steganacarus (S.) hirsutus* Pérez-Íñigo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (S.) hirsutus hirsutus* Pérez-Íñigo, 1974
(= *Steganacarus perezinigo* Balogh y Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (S.) hirsutus azorensis* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Steganacarus (S.) inaestimabilis* Niedbala, 1984
DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Steganacarus (S.) incomptus* Niedbala, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Steganacarus (S.) insulanus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Steganacarus (S.) inurbanus* Niedbala, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Uganda y Kenia).
 - *Steganacarus (S.) magnus* (Nicolet, 1855) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.) e I. Santa Helena.
 - *Steganacarus (S.) magnus magnus* (Nicolet, 1855) (*Hoplophora*)
(= *Phthiracarus magnus oblongus* Oudemans, 1915)
(= *Phthiracarus magnus rotundus* Oudemans, 1915, “nom. praeoc.” por Ewing, 1908)
(= *Phthiracarus magnus transitans* Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Irán y U.S.A.) e I. Santa Helena.
 - *Steganacarus (S.) magnus anomalus* (Berlese, 1883) (*Hoplophora a.*)
(= *Steganacarus karamani* Tarman, 1962)
(= *Phthiracarus magnus anomaloides* Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este).
 - *Steganacarus (S.) manganellii* Avanzati, Baratti y Bernini, 1994
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Steganacarus (S.) michaeli* Bernini y Avanzati, 1987
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
 - *Steganacarus (S.) reticularis* (Niedbala y Starý, 2014) (*Notophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Steganacarus (S.) similis* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
 - *Steganacarus (S.) simonettae* Bernini y Avanzati, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (S.) sol* Balogh, 1958
(= *Hoplophthiracarus peracutus* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
 - *Steganacarus (S.) spinosus* (Sellnick, 1920) (*Phthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europea e Irán, y Oriental: India (Megalaya).
 - *Steganacarus (S.) spinosus spinosus* (Sellnick, 1920)
(= *Steganacarus barborae* Mahunka y Miko, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europea e Irán, y Oriental: India (Megalaya).

- *Steganacarus (S.) spinosus personatus* Niedbala, 1983 (*S. p.*)
(=*Steganacarus punctulatus* Sergienko, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Steganacarus (S.) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Steganacarus (S.) vernaculus* Niedbala, 1982
(=*Steganacarus donatoi* Avanzati, Baratti y Bernini, 1994)
(=*Steganacarus schweizeri* Mahunka y Mahunka-Papp, 2003)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Steganacarus (S.) vestitus* Niedbala, 1983
(=*Steganacarus complicatus* Mahunka, 1993)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Steganacarus wallworki* (Mahunka, 1984) (*Hoplophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Steganacarus (S.) wernerii* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.

Steganacarus (Rafacarus) Niedbala, 1981 (15 spp.)

(=*Neosteganacarus* Balogh y Mahunka, 1992)

(=*Nortonacarus* Balogh y Mahunka, 1992)

ESPECIE TIPO: *Rafacarus rafalskii* Niedbala, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana.

- *Steganacarus (Rafacarus) absidatus* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Bolivia).
- *Steganacarus (Rafacarus) angulatus* (Balogh y Mahunka, 1992) (*Neosteganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) aspergillus* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) fecundus* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) hikurangi* (Liu y Zhang, 2013) (*Phrathicarus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Steganacarus (Rafacarus) niedbalai* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1996) (*Protophthiracarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) niedbalai* (Liu y Zhang, 2013) (*Atropacarus*)
("nom. praeoc." por Pérez-Íñigo y Baggio, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Steganacarus (Rafacarus) paradoxus* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) pararafalskii* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) phasganus* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) rafalskii* (Niedbala, 1981) (*R.*)
(=*Neosteganacarus cataracta* Balogh y Mahunka, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) relictus* (Balogh y Mahunka, 1992) (*Neosteganacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) sculptilis* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) tumidus* Niedbala, 2004 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Steganacarus (Rafacarus) valerieae* (Balogh y Mahunka, 1992) (*Nortonacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Steganacarus (Tropacarus) Ewing, 1917 (21 spp. y 1 ssp.)

(=*Calhoplophora* Berlese, 1923)

ESPECIE TIPO: *Hoplophora carinata* Koch, 1841

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Steganacarus (Tropacarus) adelaidae* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Steganacarus (Tropacarus) balcanicus* Berninni y Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Steganacarus (Tropacarus) balearicus* (Pérez-Íñigo, 1969) (*S.*)
(=*Steganacarus macrosulpturatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Steganacarus (Tropacarus) bicarinatus* (Jeleva, 1970) (*T.*)

- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Steganacarus (Tropacarus) boulfekhari* Niedbala, 1986 (S.)
(=*Steganacarus (Tropacarus) maghrebinus* Bernini, S. Bernini y Avanzati, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (Tropacarus) brevopilus* (Berlese, 1923) (*Phthiracarus (Trachyhoplophora)*)
(=*Hoploderma brevopilus perfecta* Sellnick, 1931)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (excepto Norte) e Irán.
 - *Steganacarus (Tropacarus) callainii* Bernini, S. Bernini y Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Steganacarus (Tropacarus) carinatus* (Koch, 1841) (*Hoplophora*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica e India (Cachemira).
- *Steganacarus (Tropacarus) carinatus carinatus* (Koch, 1841)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) e India (Cachemira).
- *Steganacarus (Tropacarus) carinatus pulcherrimus* (Berlese, 1887) (*Hoplophora p.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Steganacarus (Tropacarus) coniunctus* Niedbala, 1983 (S.)
(=*Steganacarus danae* Mahunka y Miko, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Este de Paleártica oriental.
 - *Steganacarus (Tropacarus) desmeti* Niedbala, 1988 (S.)
(=*Steganacarus (Tropacarus) altitudinis* Bernini, S. Bernini y Avanzati, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (Tropacarus) doumandji* Niedbala, 1986 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Steganacarus (Tropacarus) excavatus* (Niedbala, 1981) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
 - *Steganacarus (Tropacarus) flagellatissimus* Mahunka, 1979 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Steganacarus (Tropacarus) grandjeani* Mahunka, 1977 (S.)
(=*Steganacarus sacculiferus* Parry, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Israel.
 - *Steganacarus (Tropacarus) incognitus* Niedbala, 1984 (S.)
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Steganacarus (Tropacarus) lasithiensis* Mahunka, 1979 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Steganacarus (Tropacarus) lucidus* Sergienko, 1994 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Steganacarus (Tropacarus) malatestai* Avanzati, Baratti y Bernini, 1994
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Steganacarus (Tropacarus) patruelis* Niedbala, 1983 (S.)
(=*Steganacarus lazitanicus* Mahunka y Miko, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional.
 - *Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus* Bernini y Avanzati, 1989
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Steganacarus (Tropacarus) travei* Lions, 1968 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Suborden HOLOSOMATA Grandjean, 1960

Crotonioidea Thorell, 1876

Trhypochthoniidae Willmann, 1931 (7 gen., 1 subg., 57 spp. y 14 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Afronothrus Wallwork, 1961 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Afronothrus incisivus* Wallwork, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Afronothrus arboreus* Ramani y Haq, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Afronothrus incisivus* Wallwork, 1961
(=*Afronothrus incisivus maheensis* Mahunka, 1978)
(=*Afronothrus incisivus neotropicus* Balogh y Mahunka, 1974)
(=*Afronothrus incisivus paraguayensis* Mahunka, 1984)
(=*Afronothrus sulcatus* Hammer, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Allonothrus Hammen, 1953 (18 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Allonothrus schuilingi* Hammen, 1953

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Allonothrus (*Allonothrus*) Hammen, 1953 (17 spp. y 2 sspp.)

(=*Parallonothrus* Badejo, Woas y Beck, 2002)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Allonothrus* (*A.*) *brasiliensis* (Badejo, Woas y Beck, 2002) (*Parallonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Allonothrus* (*A.*) *dhananjayi* Sarkar, 1991
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Allonothrus* (*A.*) *foveolatus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1988
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Allonothrus* (*A.*) *giganticus* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Allonothrus* (*A.*) *henroi* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Allonothrus* (*A.*) *indicus* Bhaduri y Raychaudhuri, 1968
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

- *Allonothrus* (*A.*) *longinoi* Szywilewska y Olszanowski, 2006
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Allonothrus* (*A.*) *monensis* Ghosh y Bhaduri, 1979
DISTRIBUCIÓN: India (Nagaland).

- *Allonothrus* (*A.*) *monodactylus* Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: África occidental, Oriental y Venezuela.

- *Allonothrus* (*A.*) *neotropicus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente).

- *Allonothrus* (*A.*) *nigeriensis* (Badejo, Woas y Beck, 2002) (*Parallonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.

- *Allonothrus* (*A.*) *pararusseolus* Subías y Sarkar, 1982
DISTRIBUCIÓN: India.

- *Allonothrus* (*A.*) *pyriformis* (Berlese, 1913) (*Angelia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia).

Allonothrus (*A.*) *russeolus* Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Allonothrus* (*A.*) *russeolus russeolus* Wallwork, 1960
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica: Ghana, Oriental y Norte de Neotropical) y Japón.

- *Allonothrus* (*A.*) *russeolus reticulatus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Java).

Allonothrus (*A.*) *schuilingi* Hammen, 1953

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana: frecuente, I. Seychelles, Venezuela y China: Hong-Kong) y Este de Paleártica oriental.

- *Allonothrus* (*A.*) *schuilingi schuilingi* Hammen, 1953

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana: frecuente, Venezuela y China: Hong-Kong) y Este de Paleártica oriental.

- *Allonothrus* (*A.*) *schuilingi seychelli* Olszanowski y Bochniak, 2015
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

- *Allonothrus* (*A.*) *sinicus* Wang y Norton, 1988
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Allonothrus* (*A.*) *tuxtlasensis* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

Allonothrus (*Pseudonothrus*) Balogh, 1958 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pseudonothrus hirtus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Allonothrus* (*Pseudonothrus*) *hirtus* (Balogh, 1958) (*P.*)
(=*Allonothrus ghanensis* Wallwork, 1961)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Archeozetes Grandjean, 1931 (2 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Epilohmannia magna* Sellnick, 1925

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Archeozetes longisetosus* Aoki, 1965

(=*Archeozetes chamelensis* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997)

(=*Archeozetes magnus indicus* Bhaduri y Raychaudhuri, 1968)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica): frecuente en Oriental y Neotropical.

Archeozetes magnus (Sellnick, 1925) (*Epilohmannia*)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Archeozetes magnus magnus* (Sellnick, 1925)

(=*Archeogozetes tuberculatus* Sarkar, 1985)

(=*Archeogozetes veracruzensis* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (Oriental: frecuente, Australiana: Polinesia, Etiópica y Neotropical: Méjico y Brasil).

- *Archeogozetes magnus mediosetosus* Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (I. Seychelles) y Norte de Neotropical.

Mainothrus Choi, 1996 (3 spp.)

(=*Altrhynchthonius* Weigmann, 1997)

ESPECIE TIPO: *Mainothrus aquaticus* Choi, 1996

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical austral.

- *Mainothrus aquaticus* Choi, 1996

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Mainothrus badius* (Berlese, 1905) (*Trhynchthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).

- *Mainothrus breviclava* (Hammer, 1958) (*Trhynchthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Mucronothrus Trägårdh, 1931 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Mucronothrus rostratus* Trägårdh, 1931) =*Malaconothrus nasalis* Willmann, 1929

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).

- *Mucronothrus braziliensis* Ermilov, Tolstikov, Senna y Pešić, 2014

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Mucronothrus nasalis* (Willmann, 1929) (*Malaconothrus*)

(=*Mucronothrus rostratus* Trägårdh, 1931)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Boreoalpina: frecuente, Australiana y Neotropical).

- *Mucronothrus willmanni* Norton, Behan-Pelletier y Wang, 1996

DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.

Trhynchthoniellus Willmann, 1928 (10 spp. y 3 sspp.)

(=*Hydronothrus* Aoki, 1964)

ESPECIE TIPO: (*Trhynchthonius* (*Trhynchthoniellus*) *setosus* Willmann, 1928) =*Trhynchthonius longisetus* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Trhynchthoniellus ashoroensis* Fujikawa, 2000

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trhynchthoniellus brevisetus* Kuriki, 2005

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trhynchthoniellus chilensis* Ermilov y Weigmann, 2015

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral (Chile).

Trhynchthoniellus longisetus (Berlese, 1904) (*Trhynchthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica, Etiópica, Australiana, Neotropical y Oriental: Vietnam).

- *Trhynchthoniellus longisetus longisetus* (Berlese, 1904)

(=*Hydronothrus aquariorum* Fain y Lambrechts, 1987)

(=*Nothrus crassus* Warburton y Pearce, 1905)

(=*Hydronothrus crispus* Aoki, 1964)

(=*Camisia excavata* Willmann, 1919)

(=*Hydronothrus puniceus* Habeeb, 1981)

(=*Trhynchthonius trichosus* Schweizer, 1922)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (Holártica, Etiópica: I. Santa Helena y Sudáfrica, Australiana, Neotropical y Oriental: Vietnam).

- *Trhynchthoniellus longisetus brasilensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1988 (*T. setosus* b.)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Trhynchthoniellus longisetus canadensis* Hammer, 1952 (*T. setosus* c.)

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Trhynchthoniellus longisetus setosus* (Willmann, 1929) (*Trhynchthonius* (*Trhynchthoniellus*))

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina y Madagascar.

- *Trhynchthoniellus malaconothroiformis* Ermilov, Hugo-Coetzee y Theron, 2017

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Trhynchthoniellus porticus* Fujikawa, 2000

DISTRIBUCIÓN: Japón y Filipinas.

- *Trhynchthoniellus qianensis* Z.-Y. Hu y Jin, 2010

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Trhynchthoniellus ramosus* Hammer, 1982

DISTRIBUCIÓN: Bali.

- *Trhynchthoniellus reticulatus* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

- *Trhypochthoniellus taisetsuensis* Kuriki, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Trhypochthonius Berlese, 1904 (19 spp. y 8 sspp.)

(=*Albonothrus* Tseng, 1982)

(=*Trilohmannia* Willmann, 1923)

(=*Tumidalvus* Ewing, 1908)

ESPECIE TIPO: *Hypochthonius tectorum* Berlese, 1896

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Trhypochthonius africanus* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Trhypochthonius altaicus* Bayartogtokh, 2010

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Trhypochthonius cladonicolus* (Willmann, 1919) (*Camisia*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur) y Canadá.

- *Trhypochthonius conspectus* Sergienko, 1991

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Trhypochthonius hammerae* Schweizer, 1956 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Trhypochthonius japonicus* Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Paleártica centromeridional y U.S.A.: Luisiana) y China suroriental.

- *Trhypochthonius javanus* Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Java y Japón.

- *Trhypochthonius longipes* (Warburton, 1912) (*Nothrus tectorum* l.) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

- *Trhypochthonius montanus* Hammen, 1956

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Trhypochthonius multisulcatus* (Tseng, 1982) (*Albonothrus*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Trhypochthonius nigricans* Willmann, 1928

(=*Trhypochthonius sphagnicola* Weigmann, 1997)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Sur y Neártica septentrional).

- *Trhypochthonius ruttneri* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Trhypochthonius sclerotrichus* (Willmann, 1923) (*Trilohmannia cladonicola* s.) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Trhypochthonius semovitisi* Szywilewska, 2004

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

- *Trhypochthonius setantis* Golosova, 1983

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Paleártica oriental meridional.

Trhypochthonius silvestris Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: U.S.A., Europa central y Este de Paleártica oriental.

- *Trhypochthonius silvestris silvestris* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (menos frecuente en el Norte) y "Paleártica".

- *Trhypochthonius silvestris europaeus* Weigmann y Raspotnig, 2009

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

- *Trhypochthonius silvestris misumaiensis* Fujikawa, 2000 (*T. m.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trhypochthonius silvestris septentrionalis* Fujikawa, 1995 (*T. s.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Trhypochthonius tectorum (Berlese, 1896) (*Hypochthonius*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental (China suroriental y Noreste de India), Etiopía y Neotropical.

- *Trhypochthonius tectorum tectorum* (Berlese, 1896)

(=*Trhypochthonius monodactylus* Mihelčič, 1957)

(=*Tumidalvus mutsalpina* Kishida, 1931)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Holártica (frecuente), Oriental (China suroriental y Noreste de India),

Etiopía y Neotropical.

- *Trhypochthonius tectorum americanus* (Ewing, 1908) (*Tumidalvus a.*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A.

- *Trhypochthonius tectorum congregator* Grandjean, 1940

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Trhypochthonius tectorum fujinaitensis* Fujikawa, 2000 (*T. f.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trhypochthonius tectorum spinosus* Kulijev, 1968

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Trhypochthonius tectorum stercus* Fujikawa, 2000 (*T. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón e India (Arunachal Pradesh).
- *Trhypochthonius tepoztecus* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Trhypochthonius triangulum* Nakamura, Y.- N. Nakamura y Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Malaconothridae Berlese, 1916 (2 gen., 2 subg., 174 spp. y 4 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Malaconothrus Berlese, 1904 (84 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrus monodactylus* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- Malaconothrus (Malaconothrus)*** Berlese, 1904 (31 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Malaconothrus (M.) angulatus* Hammer, 1958
(=*Malaconothrus hammerae* Colloff y Cameron, 2013)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Malaconothrus (M.) ashizuriensis* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Malaconothrus (M.) aureopunctatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Brasil.
 - *Malaconothrus (M.) calcehtokensis* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Malaconothrus (M.) chajulensis* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Malaconothrus (M.) conicus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Malaconothrus (M.) dipankari* Saha y Sanyal, 1996
DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
 - *Malaconothrus (M.) dispela* Colloff, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Malaconothrus (M.) dorsofoveolatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
 - *Malaconothrus (M.) globiger* Trägårdh, 1910 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Suroeste).
 - *Malaconothrus (M.) gundungurra* Colloff y Cameron, 2013
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Malaconothrus (M.) hexasetosus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Indonesia).
 - *Malaconothrus (M.) japonicus* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Malaconothrus (M.) laetus* Sergienko y Melamud, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
 - *Malaconothrus (M.) liklik* Colloff, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Malaconothrus (M.) machadoi* Balogh y Mahunka, 1969 “sp. inq.”
(=*Malaconothrus praeoccupatus* Subías, 2004)
(=*Malaconothrus punctulatus* Balogh, 1958, “nom. praeoc.” por Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
 - *Malaconothrus (M.) macrofoveolatus* Ermilov, Kalúz y Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Arunachal Pradesh) y Filipinas.
 - *Malaconothrus (M.) margaritae* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Malaconothrus (M.) marginatus* Yamamoto, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Japón.
 - *Malaconothrus (M.) minimus* Yamamoto y Coetzee, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Malaconothrus (M.) minutus* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Malaconothrus (M.) monodactylus* (Michael, 1888) (*Nothrus*)
(=*Lohmannia (Malaconothrus) egregia* Berlese, 1904)
(=*Malaconothrus gracilis* Hammen, 1952)
(=*Malaconothrus mollisetosus* Hammer, 1952)
(=*Malaconothrus pulcher* Mihelčič, 1957)
(=*Malaconothrus punctulatus* Hammen, 1952)

- DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Neotropical.
 - *Malaconothrus (M.) neominatus* Subías, 2004
 (= *Malaconothrus pulcher* Hammer, 1961, “nom. praeoc.” por Mihelčič, 1957)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Malaconothrus (M.) pilosellus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Malaconothrus (M.) processus* Hammen, 1952
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
 - *Malaconothrus (M.) pseudolamellatus* Willmann, 1931
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Tripura).
 - *Malaconothrus (M.) purvisi* Luxton, 1987
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Malaconothrus (M.) pygmaeus* Aoki, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (excepto Norte) y Canadá, y China surenoriental.
 - *Malaconothrus (M.) scutatus* Luxton, 1987
 (= *Malaconothrus luxtoni* Colloff y Cameron, 2013)
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Malaconothrus (M.) setoumi* Fujikawa, 2005
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Malaconothrus (M.) silvaticus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Malaconothrus (M.) yinae* Yamamoto, Aoki, Wang y Hu, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China surenoriental.

Malaconothrus (Trimalaconothrus) Berlese, 1916 (52 spp. y 1 ssp.)

(= *Zeanothrus* Hammer, 1966)

ESPECIE TIPO: *Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) africanus* (Balogh, 1958) “sp. inq.” (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Angola.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) almagrensis* (Iglesias, Palacios-Vargas y Mahunka, 2001) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) altissimus* (Piffel, 1971) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) azumaensis* (Yamamoto, Kuriki y Aoki, 1993) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) brevisetiger* (Yamamoto y Aoki, 1998) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: China surenoriental.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) crinitus* Berlese, 1908 (M.) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) crispus* (Hammer, 1962) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Chile y Nueva Zelanda.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) darwini* Colloff y Cameron, 2013 (M.)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) eichhornicus* (Iglesias, Palacios-Vargas y Mahunka, 2001) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) elegans* (Hammer, 1966) (*Zeanothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) flagelliformis* (Wallwork, 1970) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
Malaconothrus (Trimalaconothrus) foveolatus (Willmann, 1931) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional y Oriental (Indonesia).
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) foveolatus foveolatus* (Willmann, 1931)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (Europa: menos frecuente en el Sur, Paquistán y Neártica septentrional).
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) foveolatus sundaicus* (Willmann, 1931) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) granulatus* (Tseng, 1982) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) hakonensis* (Yamamoto, 1977) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) indusiatus* Berlese, 1916
 DISTRIBUCIÓN: Europea.
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) iteratus* (Subías, 2004) (T.)
 (= *Trimalaconothrus longirostris* Hammer, 1966, “nom. praeoc.” por Willmann, 1929)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Orissa).
 - *Malaconothrus (Trimalaconothrus) joonsooi* (Choi, 1986) (T.)

- DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) jowettae* Colloff y Cameron, 2013 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) knuellei* Colloff y Cameron, 2013 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) longirostris* (Willmann, 1929) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) longisetosus* (Yamamoto y Aoki, 2000) (T.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) maniculatus* (Fain y Lambrechts, 1987) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Europa central y Japón.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) mirabilis* (Sergienko y Melamud, 1993) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) montanus* (Hammer, 1958) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) multipilosus* (J. y P. Balogh, 2002) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) murmurensis* (Colloff, 2013) (M.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) nipponicus* (Yamamoto y Aoki, 1971) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) nodosus* (Yamamoto, 1997) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) obsessus* (Subías, 2004) (T.)
(=*Trimalacoanthrus albulus* Tseng, 1982, “nom. praeoc.” por Hammer, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) opisthoseta* (Hammer, 1966) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) oppositus* (P. Balogh, 1997) (T.)
(=*Trimalacoanthrus oppositus* J. y P. Balogh, 2002, “nom. praeoc.” por P. Balogh, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) oxyrhinus* (Hammer, 1962) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Chile y Nueva Zelanda.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) pallidus* (Wallwork, 1977) (T.)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) paraweigmanni* Ermilov, 2016 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) planus* (Balogh, 1958) “sp. inq.” (T.)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) platyrhinus* (Hammer, 1962) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Nueva Zelanda e India.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) prahuensis* (Hammer, 1979) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) punctus* (Yamamoto y Coetzee, 2004) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) repetitus* (Subías, 2004) (T.)
(=*Trimalacoanthrus reticulatus* Yamamoto, 1977, “nom. praeoc.” por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) reticulatus* (Balogh, 1958) “sp. inq.” (T.)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) sacculus* (Hammer, 1966) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) seniczaki* (Colloff, 2013) (*Tyrphonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) similis* (Balogh, 1958) “sp. inq.” (T.)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) soror* (Balogh, 1958) “sp. inq.” (T.)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) talaitae* Colloff y Cameron, 2013 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) tardus* (Michael, 1888) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte) y Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) tidbinbilla* (Colloff, 2013) (M.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) tonkini* (Luxton, 1982) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Malacoanthrus (Trimalacoanthrus) tripurensis* (Sarkar, 1983) (T.)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) vietsi* (Willmann, 1925) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).

- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) yachidairaensis* (Yamamoto, Kuriki y Aoki, 1993) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Malaconothrus (Trimalaconothrus) weigmanni* Colloff, 2013 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Tyrphonothrus Knülle, 1957 (91 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: (*Malaconothrus novus* Sellnick, 1921) = *Malaconothrus maior* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Tyrphonothrus (Tyrphonothrus) Knülle, 1957 (47 spp. y 3 sspp.)

(= *Fossoothrus* Hammer, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tyrphonothrus (T.) albulus* (Hammer, 1972) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Vietnam.

Tyrphonothrus (T.) angulatus (Willmann, 1931) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Euroatlántica, Japón y U.S.A.: Nueva York).

- *Tyrphonothrus (T.) angulatus angulatus* (Willmann, 1931)

(= *Trimalaconothrus kurikii* Yamamoto, 1997)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Euroatlántica, Japón y U.S.A.: Nueva York).

- *Tyrphonothrus (T.) angulatus grandis* (Hammen, 1952) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: Holanda, y Japón).

- *Tyrphonothrus (T.) angustirostrum* (Hammer, 1966) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.

- *Tyrphonothrus (T.) aquatilis* (Fain, Lambrechts y Wauthy, 1990) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Bélgica.

- *Tyrphonothrus (T.) auburnensis* (Habeeb, 1973) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva York.

- *Tyrphonothrus (T.) australis* (Hammer, 1958) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Tyrphonothrus (T.) barbatus* (Yamamoto, 1977) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Tyrphonothrus (T.) barrancensis* (Hammer, 1961) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Tyrphonothrus (T.) binodulus* (Yamamoto y Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Tyrphonothrus (T.) blaucus* (Hammer, 1961) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Tyrphonothrus (T.) buresi* (Kunst, 1959) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Tyrphonothrus (T.) cajamarcensis* (Hammer, 1961) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Perú y Norte de India.

- *Tyrphonothrus (T.) canopeus* (Iglesias, Palacios-Vargas y Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Tyrphonothrus (T.) crassisetosus (Willmann, 1932) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia e India: Arunachal Pradesh), Australiana (Islas del Pacífico) y Etiópica (Zambia).

- *Tyrphonothrus (T.) crassisetosus crassisetosus* (Willmann, 1932)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia e India: Arunachal Pradesh).

- *Tyrphonothrus (T.) crassisetosus fijiensis* (Hammer, 1971) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Etiópica (Zambia).

- *Tyrphonothrus (T.) duoaculeus* (Yamamoto y Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Tyrphonothrus (T.) glaber (Michael, 1888) (*Nothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.) y Java.

- *Tyrphonothrus (T.) glaber glaber* (Michael, 1888)

(= *Nothrus simplex* Banks, 1895)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.).

- *Tyrphonothrus (T.) glaber javensis* (Willmann, 1932) (*Trimalaconothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Tyrphonothrus (T.) gnammaensis* Colloff y Cameron, 2013

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Tyrphonothrus (T.) gringai* Colloff y Cameron, 2013

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Tyrphonothrus (T.) heterotrichus* (Wallwork, 1973) (*Trimalaconothrus*)

- DISTRIBUCIÓN: Camerún.
 - *Tyrphonothrus (T.) humeratus* (P. Balogh, 1997) (*Trimalaconothrus*)
 (= *Trimalaconothrus humeratus* J. y P. Balogh, 2002, “nom. praeoc.” por P. Balogh, 1997)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Tyrphonothrus (T.) itatiaiae* (P. Balogh, 1997) (*Trimalaconothrus*)
 (= *Trimalaconothrus itatiaiae* J. y P. Balogh, 2002, “nom. praeoc.” por P. Balogh, 1997)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Tyrphonothrus (T.) kanaka* Colloff, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
 - *Tyrphonothrus (T.) kimberleyi* Colloff, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Tyrphonothrus (T.) latus* (Hammer, 1962) (*Fossonothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Tyrphonothrus (T.) lineolatus* (J. y P. Balogh, 1986) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Tyrphonothrus (T.) lisosetosus* (Iglesias, Palacios-Vargas y Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Tyrphonothrus (T.) magnilamellatus* (Yamamoto, 1996) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Tyrphonothrus (T.) magnisetosus* (Iglesias, Palacios-Vargas y Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Tyrphonothrus (T.) maior* (Berlese, 1910) (*Malacothonthrus*)
 (= *Trimalaconothrus intermedius* Cooreman, 1941)
 (= *Malacothonthrus novus* Sellnick, 1921)
 (= *Malacothonthrus sphagnicola* Trägårdh, 1910)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Paleártica occidental, Neotropical, Etiópica: I. Santa Helena y Sudáfrica, Australiana: Nueva Zelanda e Islas del Pacífico, y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]).
 - *Tyrphonothrus (T.) maritimus* Colloff y Cameron, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Tyrphonothrus (T.) mongolicus* (Bayartogtokh, 2010) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Tyrphonothrus (T.) novaezealandiae* (Hammer, 1966) (*Fossonothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Tyrphonothrus (T.) obesus* (Yamamoto y Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Tyrphonothrus (T.) papuensis* Colloff, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Tyrphonothrus (T.) pilipes* (Willmann, 1933) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Tyrphonothrus (T.) pitentzin* (Iglesias, Palacios-Vargas y Mahunka, 2001) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Tyrphonothrus (T.) rafalskii* (Olszanowski, 1997) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Polonia.
 - *Tyrphonothrus (T.) rectus* (Yamamoto y Coetzee, 2004) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Tyrphonothrus (T.) saxosus* (Knülle, 1957) (*Trimalaconothrus*)
 (?= *Malacothonthrus optatus* Berlese, 1908 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa meridional y Este de Rusia asiática).
 - *Tyrphonothrus (T.) scimitarum* (Tarras-Wahlberg, 1985) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Tyrphonothrus (T.) sculptus* (Knülle, 1957) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
 - *Tyrphonothrus (T.) scutatus* (Mihelčič, 1959) “sp. inq.” (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Tyrphonothrus (T.) taylori* Colloff y Cameron, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Tyrphonothrus (T.) undulatus* (Yamamoto, Kuriki y Aoki, 1993) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Tyrphonothrus (T.) wuyanensis* (Yamamoto, Aoki, Wang y Hu, 1993) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Tyrphonothrus (T.) yunnanensis* (Yamamoto y Aoki, 1998) (*Trimalaconothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Tyrphonothrus (T.) wallworki* (Starý y Block, 1995) (*Fossonothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Georgia del Sur.

Tyrphonothrus (Cristonothrus) Subías, 2004 (44 spp.)

ESPECIE TIPO: *Malaconothrus pauciareolatus* Subías y Sarkar, 1982

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) adilatatus* (Ermilov, Anichkin y Tolstikov, 2014) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) agusanensis* (Ermilov y Corpuz-Raros, 2015) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) asiaticus* (Aoki, 1967) (*Malaconothrus robustus a.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia e India).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) assamensis* (Chakrabarti y Talukdar, 1979) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) atuelanus* (Hammer, 1958) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) beecroftensis* Colloff y Cameron, 2013 (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) cordisetus* (Mahunka, 1993) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) cornutus* (Hammer, 1973) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) engelbrechti* (Yamamoto y Coetzee, 2003) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) ensifer* (Mahunka, 1982) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) foliatus* (Aoki, 1994) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas) y Filipinas.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) geminus* (Hammer, 1972) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Oriental.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) gogolensis* (Colloff, 2013) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) granulatus* (Palacios-Vargas e Iglesias, 1997) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) hauseri* (Mahunka, 1984) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (I. Seychelles).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) heterotrichus* (Mahunka, 1992) (*Malaconothrus*)
(“nom. praeoc.” por Wallwork, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) humboldtensis* (Ermilov, 2016) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) indifferens* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (Nueva Zelanda y Etiópica: Sudáfrica y Lesoto).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) iriomotensis* (Yamamoto y Aoki, 1997) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) keriensis* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Bali.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) kiiensis* (Yamamoto, 1996) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) kotozenus* (Fujikawa, 2005) (*Malaconothrus (C.)*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) laensis* (Colloff, 2013) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) longidorsus* (Yamamoto y Coetzee, 2003) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Lesoto).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) neoplumosus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) pachypilus* (Hammer, 1972) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) pauciareolatus* (Subías y Sarkar, 1982) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) peruensis* (Hammer, 1961) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Méjico) e India (Tripura).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) plumosus* (Willmann, 1929) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) prismaticus* (Warburton, 1912) (*Nothrus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) pseudoadilatatus* (Ermilov y Corpuz-Raros, 2017) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) ramensis* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Paquistán).

- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) robustus* (Hammer, 1958) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) rohri* (P. Balogh, 1997) (*Malaconothrus*)
(=*Malaconothrus rohri* J. y P. Balogh, 2002, "nom. praeoc." por P. Balogh, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) rostopilosus* (Saha y Sanyal, 1996) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) sarkarae* Subías, 2016
(=*Malaconothrus crassisetosus* Subías y Sarkar, 1982, "nom. praeoc." por Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) stigmatus* (Yamamoto y Coetzee, 2003) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) subrasus* (Balogh, 1964) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) translamellatus* (Hammer, 1958) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Antártica (I. Georgia del Sur) y subantártica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) valerieae* (J. y P. Balogh, 2002) (*Malaconothrus*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) variosetosus* (Hammer, 1971) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana: (Melanesia), y Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) vilhenarum* (Balogh, 1958) (*Malaconothrus*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) yamamotoi* (Aoki, 1994) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tyrphonothrus (Cristonothrus) zealandicus* (Hammer, 1966) (*Malaconothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Nothridae Berlese, 1896 (3 gen., 100 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Nothrus Koch, 1836 (87 spp. y 6 sspp.)

(=*Angelia* Berlese, 1885)

(=*Gymnonothrus* Ewing, 1917)

(=*Vigilomicrozetes* Tseng, 1982)

ESPECIE TIPO: *Nothrus palustris* Koch, 1839

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica)

- *Nothrus akitaensis* Fujikawa, 1999

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Nothrus anauniensis* Canestrini y Fanzago, 1877

(?=*Nothrus biciliatus* Koch, 1841 "sp. inq.")

(=*Nothrus pseudoborussicus* Mahunka 1978)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente en Paleártica.

- *Nothrus angolensis* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Nothrus ashoroensis* Fujikawa, 1999

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Nothrus asiaticus* Aoki y Ohnishi, 1974 (*N. palustris* a.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y China.

- *Nothrus bacilliseta* Fujikawa, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Nothrus basilewskyi* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Nothrus baviensis* Krivolutsky, 1998

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Nothrus becki* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Nothrus berlesei* Subías, 2016

(=*Angelia pulchella crinita* Berlese, 1916, "nom. praeoc." por Warburton y Pearce, 1905)

DISTRIBUCIÓN: "África oriental".

- *Nothrus bicolor* Koch, 1844 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Nothrus bilongisetosus* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Nothrus bispinosus* Koch, 1839 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

Nothrus borussicus Sellnick, 1928

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Neotropical.

- *Nothrus borussicus borussicus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Norte de Neotropical.
- *Nothrus borussicus neominatus* Subías, 2004 “ssp. inq.”
(=*Nothrus borussicus longipilus* Mihelčič, 1959, “nom. praecoc.” por Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Nothrus brasiliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1988
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Nothrus brevisrostris* (Ewing, 1910) (*Notaspis*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Orissa).
- *Nothrus coniferus* Golosova y Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Nothrus corticalis* Karpelles, 1893 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Nothrus cotopaxiensis* Kutý, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus crassisetus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Nothrus dinema* Haupt, 1882 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus discifer* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Himachal Pradesh).
- *Nothrus ellipticus* Haupt, 1882 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus engelbrechti* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nothrus espinarensis* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Nothrus ezoensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus flagellum* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Nothrus glaesarius* Kutý, 2007
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus gracilis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (Norte de India y Vietnam).
- *Nothrus guiyangensis* Z.-Y. Hu y Jin, 2010
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nothrus hatanoensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus hauseri* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Nothrus ifeensis* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Nothrus incavatus* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Nothrus ishikariensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus jaliscoensis* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Nothrus lasebikani* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Nothrus leleupi* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nothrus longipilus* (Berlese, 1910) (*Angelia anauniensis* L.)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Nothrus louiseae* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nothrus lucunosus* Sergienko y Melamud, 1993
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Nothrus lugubris* Canestrini, 1898 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nothrus macedi* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Paleártica occidental (Cáucaso).
- *Nothrus madagascarensis* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Nothrus magnus* Palacios-Vargas e Iglesias, 1997
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

- *Nothrus meakanensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón y Nepal.
- *Nothrus minimus* Koch, 1844 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus monodactylus* (Berlese, 1910) (*Angelia anauniensis* m.)
(=*Nothrus terminalis* Banks, 1910)
(=*Nothrus terminalis carolinae* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (menos frecuente en el Norte).
- *Nothrus monolongisetosus* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Nothrus montanus* Krivolutsky, 1998
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Nothrus monticola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Himalaya.
- *Nothrus mystax* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nothrus niedbalai* Kuty y Olszanowski, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus oblongus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú e I. Galápagos) y Norte de India.
- *Nothrus obsoletus* (Koch, 1841) (*Celaeno*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus oceanicus* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Indonesia y Vietnam).
- *Nothrus olszanowskii* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus pallidus* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus palustris* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental (Himalaya) e I. Santa Helena.
 - *Nothrus palustris palustris* Koch, 1839
(=*Nothrus pallens* Koch, 1844)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental (Himalaya) e I. Santa Helena.
 - *Nothrus palustris azorensis* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Nothrus palustris bipilis* Banks, 1895 (*N. b.*) “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Nothrus perezinigo* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centooccidental y Este de U.S.A.).
- *Nothrus peruensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Sureste de U.S.A.
- *Nothrus phylliformis* Ermilov, Kalúz y Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Assam) y Nepal.
- *Nothrus pileiformis* Karpelles, 1884 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Pensilvania).
- *Nothrus piriformis* Kuty, 2006
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Nothrus posticus* Koch, 1839 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Nothrus praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Vigilomicrozetes pulchellus* Tseng, 1982, “nom. praec.” por Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Nothrus pratensis* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Nothrus pulchellus* (Berlese, 1910) (*Angelia*)
(=*Nothrus parvus* Sitnikova, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa centromeridional y Paleártica oriental.
- *Nothrus pumilatus* Golosova y Karppinen, 1985
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
- *Nothrus quadripilus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental y Méjico.
- *Nothrus reticulatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Islas del Este de Rusia asiática.
- *Nothrus reunionensis* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Nothrus sadoensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Nothrus senegalensis* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Nothrus separatum* Nakamura, Y.- N. Nakamura y Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus septatus* Golosova y Karppinen, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Rusia europea.
- *Nothrus seropedicalensis* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Nothrus seychellensis* Warburton, 1912
(=*Nothrus scotti* Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Nothrus shapensis* Krivolutsky, 1998
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- Nothrus silvestris* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Nepal, Nueva Zelanda y Méjico.
 - *Nothrus silvestris silvestris* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Nepal, Nueva Zelanda y Méjico.
 - *Nothrus silvestris bistilus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
 - *Nothrus silvestris exilior* Jacot, 1937 “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Kentucky).
- *Nothrus silvicus* Jacot, 1937 (*N. truncatus* s.)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Nothrus springsmythi* Sheals, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Nothrus suramericanus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Nothrus taisetsuensis* Fujikawa, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Nothrus truncatus* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Nothrus truncatus truncatus* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Nothrus truncatus robustus* Jacot, 1937 “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Maine).
- *Nothrus undulatus* Hirauchi y Aoki, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nothrus willmanni* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Novonothrus Hammer, 1966 (11 spp.)

ESPECIE TIPO: *Novonothrus flagellatus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Novonothrus barringtonensis* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus coronospinosus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus covarrubiasi* Casanueva y Norton, 1997
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Novonothrus flagellatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Novonothrus glabriseta* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).
- *Novonothrus kethleyi* Casanueva y Norton, 1998
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Novonothrus lucasi* Olszanowski y Bromberek, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus nothofagii* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Novonothrus papuensis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Novonothrus puyehue* Casanueva y Norton, 1997
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Novonothrus silvanus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Trichonothrus Mahunka, 1986 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Trichonothrus austroafricanus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Australiana.

- *Trichonothrus austroafricanus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Trichonothrus hallidayi* Colloff, 2011

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Crotoniidae Thorell, 1876 (5 gen., 3 subg., 168 spp. y 5 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Austronothrus Hammer, 1966 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Austronothrus curviseta* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Austronothrus clarki* Colloff y Cameron, 2009

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Austronothrus curviseta* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Austronothrus flagellatus* Colloff y Cameron, 2009

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Austronothrus kinabalu* Colloff y Cameron, 2014

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Austronothrus rostralis* Colloff y Cameron, 2014

DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).

Camisia Heyden, 1826 (35 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis segnis* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Camisia (Camisia) Heyden, 1826 (30 spp. y 1 ssp.)

(=*Uronothrus* Berlese, 1913)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Camisia (C.) abdosensilla* Olszanowski y Clayton, 2002

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Camisia (C.) amictus* (Sowerby, 1806) (*Acarus*) "sp. inq."

(=*Nothrus angulatus* Koch, 1839)

DISTRIBUCIÓN: I. Británicas y Alemania.

- *Camisia (C.) anomia* Colloff, 1993

DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.

- *Camisia (C.) arcuata* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Camisia (C.) australis* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Camisia (C.) biurus (Koch, 1839) (*Nothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.

- *Camisia (C.) biurus biurus* (Koch, 1839)

(=*Camisia exuvialis* Grandjean, 1939)

(=*Nothrus furcatus* Koch, 1839)

(=*Uronothrus kochi* Willmann, 1943)

(=*Nothrus pigerrimus* Koch, 1844)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.

- *Camisia (C.) biurus amicus* Jacot, 1938 (*C. segnis a.*) "ssp. inq."

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Camisia (C.) biverrucata* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

(?= *Acarus scaber* Linnaeus, 1758 "sp. inq.")

(=*Camisia berlesei* Oudemans, 1900)

(=*Camisia fischeri* Oudemans, 1900)

(=*Camisia nicoleti* Oudemans, 1900)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Nepal.

- *Camisia (C.) borealis* (Thorell, 1871) (*Nothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Eurosiberiana, Cáucaso, Irán, Este de Rusia asiática y Groenlandia).

- *Camisia (C.) carrolli* André, 1980

DISTRIBUCIÓN: Noroeste de U.S.A.

- *Camisia (C.) dictyna* Colloff, 1993

DISTRIBUCIÓN: Boreal.

- *Camisia (C.) flagellata* (Berlese, 1888) (*Nothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Camisia (C.) foveolata* Hammer, 1955

- DISTRIBUCIÓN: Boreal y Chile.
 - *Camisia (C.) grymae* Colloff, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Camisia (C.) hamulifera* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Etiópica (Sudáfrica y Etiopía), subantártica (Isla de Gough [Tristán de Acuña]) y Taiwán [Formosa].
 - *Camisia (C.) heterospinifer* Fujikawa, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Camisia (C.) horrida* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
 (= *Nothrus bistriatus* Koch, 1839)
 (= *Nothrus mutilus* Koch, 1839)
 (= *Nothrus rugulosus* Banks, 1895)
 (= *Nothrus runcinatus* Koch, 1839)
 (= *Nothrus sinuatus* Koch, 1839)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Norte de Oriental, Etiópica (Etiopía) y Norte de Neotropical.
 - *Camisia (C.) invenusta* (Michael, 1888) (*Nothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Norte de Oriental.
 - *Camisia (C.) khencensis* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile).
 - *Camisia (C.) nortoni* Colloff, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Camisia (C.) nova* (Hammer, 1966) (*C. segnis* n.)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Hawái) y Neotropical (frecuente).
 - *Camisia (C.) oregonae* Colloff, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Oregón, y Canadá).
 - *Camisia (C.) orthogonia* Olszanowski, Szywilewska y Norton, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
 - *Camisia (C.) polytricha* Piffel, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Camisia (C.) segnis* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
 (= *Nothrus bicarinatus* Koch, 1839)
 (= *Nothrus excisus* Banks, 1895)
 (= *Nothrus rostratus* Koch, 1839)
 (= *Camisia segnis segnoides* André, Lebrun y Leroy, 1984)
 (= *Nothrus ventricosus* Koch, 1839)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Oriental, Neotropical y Antártica).
 - *Camisia (C.) spinifer* (Koch, 1836) (*Nothrus*)
 (= *Nothrus ansatus* Haupt, 1882)
 (= *Nothrus concavus* Haupt, 1882)
 (= *Nothrus echinatus* Koch, 1835)
 (= *Nothrus quadracanthus* Haupt, 1882)
 (= *Nothrus sordidus* Koch, 1839)
 (= *Nothrus superbus* Berlese, 1910)
 (= *Nothrus taurinus* Banks, 1906)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Norte de Oriental y Neotropical: Brasil y Panamá).
 - *Camisia (C.) tatica* Olszanowski, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Polonia.
 - *Camisia (C.) tryphosa* Colloff, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Camisia (C.) umbratilis* (Hull, 1915) (*Nothrus*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Camisia (C.) valeriae* Colloff, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Camisia (C.) zangherii* Lombardini, 1962 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Italia.

***Camisia (Ensicamisia)* Kunst, 1971 (5 spp.)**

(= *Ivarsia* Karppinen y Krivolutsky, 1987)

ESPECIE TIPO: *Nothrus lapponicus* Trägårdh, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Camisia (Ensicamisia) lapponica* (Trägårdh, 1910) (*Nothrus*)
 (= *Camisia labradorica* Behan-Pelletier, 1978)
 DISTRIBUCIÓN: Borealpina.
- *Camisia (Ensicamisia) monongahelae* Bromberek y Olszanowski, 2012 (*C.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia Occidental).
- *Camisia (Ensicamisia) presbytis* Colloff, 1993 (*C.*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).

- *Camisia (Ensicamisia) sibirica* Karppinen y Krivolutsky, 1987 (*C. (Ivarsia)*)

DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.

- *Camisia (Ensicamisia) solhoeyi* Colloff, 1993 (*C.*)

(=*Camisia islandica* Gjelstrup y Solhøy, 1994)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur) y Oriental (China suroccidental y Nepal).

Crotonia Thorell, 1876 (66 spp.)

(=*Acronothrus* Berlese, 1916)

(=*Westwoodia* Cambridge, 1875, "nom. praeoc." por Brullé, 1846)

ESPECIE TIPO: *Westwoodia obtecta* Cambridge, 1875

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Holártica y Oriental).

- *Crotonia aculeata* Colloff, 2009

DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

- *Crotonia alluaudi* (Berlese, 1916) (*Nothrus (Acronothrus)*)

DISTRIBUCIÓN: "África oriental".

- *Crotonia alpina* Colloff y Perdomo, 2009

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia americana* (Berlese, 1901) (*Neoliodes*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Crotonia ardala* Luxton, 1987

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia blacki* Colloff y Perdomo, 2009

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia blaszaki* Szywilewska, Olszanowski y Norton, 2005

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Crotonia borbora* Luxton, 1987

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia brassicae* Wallwork, 1977

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Crotonia brevicornuta* (Wallwork, 1966) (*Acronothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Clapbell).

- *Crotonia brisbanensis* Colloff, 2010

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia camelus* (Berlese, 1910) (*Nothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia y "Sudamérica".

- *Crotonia cameroni* Colloff, 2010

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia camillae* Łochińska, 2008

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Crotonia capistrata* Luxton, 1987

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia carioca* Colloff, 2009

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Crotonia caudalis* (Hammer, 1966) (*Acronothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Crotonia cervicornia* Luxton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Crotonia chiloensis* Wallwork, 1977

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Crotonia cophinaria* (Michael, 1908) (*Nothrus*)

(=*Acronothrus brachyrostrum* Hammer, 1966)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Argentina.

- *Crotonia cornuta* Colloff y Perdomo, 2009

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia cupulata* Luxton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Crotonia daviesae* Colloff, 2010

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia dicella* Colloff, 1990

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Tasmania.

- *Crotonia ephyla* Colloff, 1990

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Crotonia eungella* Colloff, 2010

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Crotonia flagellata* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Acronothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Crotonia gadubanudi* Colloff y Perdomo, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia gorgonia* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Lord Howe).
- *Crotonia jethurmerae* Lee, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia lanceolata* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Crotonia longibulbula* Luxton, 1982
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia longisetosa* Łochińska, 2008
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia lyrata* Colloff, 1990
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Crotonia macfadyeni* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Crotonia maculata* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia marlenae* Olszanowski, 1997
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Crotonia momittoi* Colloff y Perdomo, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia monteithi* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia norfolkensis* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Crotonia nukuhivae* (Jacot, 1934) (*Acronothrus*)
(=*Crotonia melanesiae* Wallwork, 1977)
(=*Acronothrus nukuhivae hivaoae* Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Crotonia obtecta* (Cambridge, 1875) (*Westwoodia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Chile.
- *Crotonia ovata* Olszanowski, 2000
(=*Holonostrus ryszardi* Łochińska, 2008)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia paupelora* Colloff, 1990
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Crotonia perforata* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Crotonia pulchra* (Beck, 1962) (*Acronothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Crotonia pyemaireneri* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia queenslandiae* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia ramsayi* Colloff, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia raveni* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia reticulata* Luxton, 1982
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia rothschildi* (Berlese, 1916) (*Nothrus* (*Acronothrus*))
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Crotonia seemani* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia sterigma* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia tasmaniana* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia tasmanica* Łochińska, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Crotonia tryjanowskii* Olszanowski, 2000
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia tuberculata* Luxton, 1982
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Crotonia unguifera* (Michael, 1908) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Crotonia utricularia* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Crotonia valdivia* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Crotonia venetirolana* Łochińska, 2010
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Crotonia victoriae* Colloff y Perdomo, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia wallworki* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Crotonia weiri* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Crotonia yeatesi* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Heminothrus Berlese, 1913 (47 spp. y 4 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Nothrus targionii* Berlese, 1885
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Heminothrus (*Heminothrus*) Berlese, 1913 (12 spp.)
(=*Paulonothrus* Kunst, 1971)

- DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Heminothrus (H.) apophysiger* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
 - *Heminothrus (H.) glaber* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
 - *Heminothrus (H.) interlamellaris* Jacot, 1939 (*H. longisetosus* i.)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
 - *Heminothrus (H.) leleupi* (Balogh, 1958) (*Platynothrus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Heminothrus (H.) longisetosus* (Willmann, 1925) (*Nothrus (H.) paolianus* l.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Norte) y Taiwán [Formosa].
 - *Heminothrus (H.) minor* Aoki, 1969
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroriental y Filipinas).
 - *Heminothrus (H.) ornatissimus* (Berlese, 1910) (*Angelia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Heminothrus (H.) oromii* Morell y Subías, 1991
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Heminothrus (H.) paolianus* (Berlese, 1913) (*Nothrus (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, U.S.A.: Michigan, y Groenlandia).
 - *Heminothrus (H.) papua* (J. y P. Balogh, 1986) (*Holonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Heminothrus (H.) similis* Fujikawa, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Heminothrus (H.) targionii* (Berlese, 1885) (*Nothrus*)
(=*Nothrus (Heminothrus) princeps* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental (China suroriental y Nepal) y Panamá.

Heminothrus (*Capillonothrus*) Kunst, 1971 (17 spp. y 3 sspp.)

(=*Ovonothrus* Kunst, 1971)

(=*Paracamisia* Olszanowski y Norton, 2002)

ESPECIE TIPO: *Angelia thori* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Etiópica).

- *Heminothrus (Capillonothrus) biangulatus* (Hammer, 1962) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Heminothrus (Capillonothrus) bicarinatus* (Jacot, 1938) (*Platynothrus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Heminothrus (Capillonothrus) bistratus* (Chakrabarti y Mondal, 1978) (*Sigmonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus* (Berlese, 1914) (*Angelia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, U.S.A.: California, y Groenlandia).
- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus capillatus* (Berlese, 1914)
(=*Platynothrus capillatus septentrionalis* Sellnick, 1944)
(=*Platynothrus maior* Willmann, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, U.S.A.: California, y Groenlandia).
- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus kikonaiensis* (Fujikawa, 1982) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Heminothrus (Capillonothrus) capillatus peltiferinus* (Winkler, 1955) (*Platynothrus*) “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) castaneus* (Hammer, 1961) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) exaggeratus* Hammer, 1979 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) fluviatilis* (Hull, 1914) (*Hermannia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) maximus* (Trägårdh, 1901) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) meakanensis* (Fujikawa, 1982) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) microclava* Hammer, 1966 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) nevadensis* (Pérez-Íñigo, 1969) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: España y Corea.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) numatai* (Aoki, 1965) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
 - *Heminothrus (Capillonothrus) osornensis* (Olszanowski y Norton, 2002) (*Paracamisia*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - Heminothrus (Capillonothrus) skoettsbergi* (Trägårdh, 1931) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Austral (Neotropical austral, Nueva Zelanda, Antártica: I. Georgia del Sur y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]) y ¿Centroamérica?
 - *Heminothrus (Capillonothrus) skoettsbergi skoettsbergi* (Trägårdh, 1931)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Nueva Zelanda y subantártica (I. Malvinas [I. Falkland]).
 - *Heminothrus (Capillonothrus) skoettsbergi expansus* (Wallwork, 1966) (*Platynothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
 - *Heminothrus (Capillonothrus) thori* (Berlese, 1904) (*Angelia*)
(=*Nothrus crinitus* Warburton y Pearce, 1905)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica: menos frecuente en el Sur) y Oriental (China suroriental e India: Sikkim).
 - *Heminothrus (Capillonothrus) traversus* Hammer, 1966 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
 - *Heminothrus (Capillonothrus) yamasakii* Aoki, 1958 (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional: frecuente y China suroriental.
- Heminothrus (Platynothrus)*** Berlese, 1913 (18 spp. y 1 ssp.)
(=*Neonothrus* Forsslund, 1955)
(=*Sigmonothrus* Chakrabarti y Kundu, 1978)
ESPECIE TIPO: *Nothrus peltifer* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Heminothrus (Platynothrus) altimontanus* (Hammer, 1958) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Heminothrus (Platynothrus) banksi* (Michael, 1898) (*Nothrus*)
(=*Nothrus furcatus* Banks, 1895, “nom. praeoc.” por Koch, 1844)
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental y China suroriental.
 - *Heminothrus (Platynothrus) brevisetosus* (Lee, 1985) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Heminothrus (Platynothrus) carinatus* (Banks, 1910) (*Nothrus*) “sp. inq.”
 (“non” *Hermannia carinata* Kramer, 1897, =*Heminothrus (Platynothrus) punctatus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Heminothrus (Platynothrus) fossatus* (Kramer, 1898) (*Nothrus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
 - *Heminothrus (Platynothrus) hooki* (Piffil, 1966) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Heminothrus (Platynothrus) humicola* (Forsslund, 1955) (*Neonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Borealpina e Irán.
 - *Heminothrus (Platynothrus) krivolutskyi* Subías, 2016
(=*Neonothrus sibiricus* Krivolutsky, 1984, “nom. praeoc.” por Sitnikova, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Siberia.
 - *Heminothrus (Platynothrus) novaezealandicus* (J. y P. Balogh, 2002) (*P.*)
(=*Platynothrus major* Hammer, 1966, “nom. praeoc.” por Willmann, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Heminothrus (Platynothrus) ovatus* (Kundu y Mondal, 1978) (*Sigmonothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- Heminothrus (Platynothrus) peltifer* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Norte de Oriental, Australiana: Nueva Zelanda, Norte de Neotropical e I. Santa Helena).

- *Heminothrus (Platynothrus) peltifer peltifer* (Koch, 1839)

(=*Heminothrus abchasicus* Tarba, 1990)

(=*Nothrus bicristatus* Haupt, 1882)

(=*Nothrus cirrosus* Canestini y Fanzago, 1877)

(=*Platynothrus grandjeani* Sitnikova, 1975)

(?=*Acarus infusionum* Schrank, 1803 "sp. inq.")

(=*Nothrus palliatus* Koch, 1839)

(=*Nothrus spirophilus* Haupt, 1882)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Norte de Oriental, Australiana: Nueva Zelanda, Norte de Neotropical e I. Santa Helena).

- *Heminothrus (Platynothrus) peltifer japonensis* (Fujikawa, 1972) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Heminothrus (Platynothrus) praeoccupatus* Subías, 2004

(=*Signonothrus quadristriatus* Chakrabarti y Kundu, 1978, "nom. praeoc." por Hammer, 1958)

DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

- *Heminothrus (Platynothrus) punctatus* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)

(=*Hermannia carinata* Kramer, 1897)

(=*Heminothrus valentianus* Hull, 1916)

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.

- *Heminothrus (Platynothrus) quadristriatus* (Hammer, 1958) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Heminothrus (Platynothrus) reductus* (J. y P. Balogh, 1986) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Heminothrus (Platynothrus) robustior* Berlese, 1916 (H.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Uruguay).

- *Heminothrus (Platynothrus) sibiricus* (Sitnikova, 1975) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental y Neártica) y Centroamérica.

- *Heminothrus (Platynothrus) tenuiclava* (Hammer, 1966) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Holonothrus Wallwork, 1963 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Holonothrus foliatus* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Holártica y Oriental).

- *Holonothrus artus* Olszanowski, 1999

DISTRIBUCIÓN: Chile y Melanesia (I. Salomón).

- *Holonothrus concavus* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).

- *Holonothrus ecuadoriensis* Kutty, 2006

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Holonothrus foliatus* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).

- *Holonothrus glaesarius* Łochyńska, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

- *Holonothrus gracilis* Olszanowski, 1997

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Holonothrus minusculus* Łochyńska, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

- *Holonothrus mitis* Olszanowski, 1991

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).

- *Holonothrus naskreckii* Olszanowski, 1997

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Holonothrus nortoni* Olszanowski, 1999

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Holonothrus novaecaledoniae* Olszanowski, 1997

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

- *Holonothrus pulcher* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Holonothrus robustus* Olszanowski, 1991

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Tasmania y Australia).

- *Holonothrus venetiolanus* Olszanowski, 1999

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Chile).

- *Holonothrus virungensis* Norton y Olszanowski, 1989

DISTRIBUCIÓN: Congo.

Suborden BRACHYPYLINA Hull, 1918

Infraorden PYCNONOTICAE Grandjean, 1954

Nanhermannioidea Sellnick, 1928

Nanhermanniidae Sellnick, 1928 (7 gen., 1 subg. y 65 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Bicyrthermannia Hammer, 1979 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Bicyrthermannia duodentata* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Bicyrthermannia bicornicula* (Tseng, 1982) (*Cyrthermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Bicyrthermannia bicornuta* (Haq, 1978) (*Cyrthermannia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Bicyrthermannia cagayana* (Corpuz-Raros, 1979) (*Cyrthermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Bicyrthermannia duodentata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia e India: Kerala) e Irán.
- *Bicyrthermannia ezziati* (Bayoumi y Mahunka, 1977) (*Cyrthermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Bicyrthermannia foliata* (Mahunka, 1985) (*Cyrthermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Bicyrthermannia nigeriana* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Bicyrthermannia quadricornuta* (Chakrabarti y Bhaduri, 1978) (*Cyrthermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

Cosmohermannia Aoki y Yoshida, 1970 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmohermannia frondosa* Aoki y Yoshida, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Australianooriental.

- *Cosmohermannia frondosa* Aoki y Yoshida, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Cosmohermannia robusta* (Aoki, 1994) (*Nippohermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental: Micronesia (I. Marianas) y Vietnam.

Cyrthermannia Balogh, 1958 (11 spp.)

(=*Linothrus* Tseng, 1982)

ESPECIE TIPO: *Cyrthermannia tuberculata* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Cyrthermannia baloghorum* Pérez-Íñigo y Baggio, 1988
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Cyrthermannia florens* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cyrthermannia formosana* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Cyrthermannia guadeloupensis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cyrthermannia luminosa* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Filipinas).
- *Cyrthermannia nasata* (Warburton, 1912) (*Hermannia*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Cyrthermannia perinfamis* (Tseng, 1982) (*Linothrus*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Cyrthermannia simplex* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cyrthermannia stellata* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Ceilán [Sri Lanka].
- *Cyrthermannia tuberculata* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Congo, Mediterránea oriental y Java.
- *Cyrthermannia vicinicornuta* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Brasil.

Dendrohermannia P. Balogh, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmohermannia monstrosa* Aoki, 1977

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Dendrohermannia monstrosa* (Aoki, 1977) (*Cosmohermannia*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea) y Oriental (Filipinas y Vietnam).

Masthermannia Berlese, 1913 (10 spp.)

(=*Phyllonothrus* Sellnick, 1959)

(=*Posthermannia* Grandjean, 1954)

ESPECIE TIPO: *Angelia mammillaris* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Masthermannia extrema* (Balogh, 1958) (*Posthermannia*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Masthermannia grandjeani* (Balogh, 1958) (*Posthermannia*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Masthermannia hauseri* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Masthermannia hirsuta* (Hartman, 1949) (*Nanhermannia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, China suroriental y U.S.A. (Tejas).

- *Masthermannia mammillaris* (Berlese, 1904) (*Angelia*)

(=*Posthermannia nematophora* Grandjean, 1954)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Masthermannia multiciliata* Nakamura, Y.- N. Nakamura y Fujikawa, 2013

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Masthermannia ornatissima* Pérez-Íñigo y Baggio, 1988

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Masthermannia runcifer* (Sellnick, 1959) (*Phyllonothrus*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].

- *Masthermannia sahariensis* Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid y Khalil, 1988

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Masthermannia seropedica* Badejo, Woas y Beck, 2002

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Nanhermannia Berlese, 1913 (32 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nothrus nanus* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

***Nanhermannia* (*Nanhermannia*)** Berlese, 1913 (31 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Nanhermannia* (*N.*) *acutisetosa* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Nanhermannia* (*N.*) *angulata* Fujikawa, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Nanhermannia* (*N.*) *bifurcata* Fujikawa, 1990

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Nanhermannia* (*N.*) *comitalis* Berlese, 1916

(=*Nanhermannia ussurica* Golosova, 1969)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Noreste de U.S.A.).

- *Nanhermannia* (*N.*) *continua* Golosova y Karppinen, 1985

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Nanhermannia* (*N.*) *domrowi* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Nanhermannia* (*N.*) *dorsalis* (Banks, 1896) (*Carabodes*)

(=*Nanhermannia coronata* Berlese, 1913)

(=*Nanhermannia hiemalis* Fujikawa, 2003)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y China suroriental.

- *Nanhermannia* (*N.*) *elegantissima* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y **subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]**.

- *Nanhermannia* (*N.*) *elegantula* Berlese, 1913

(=*Nanhermannia areolata* Strenzke, 1953)

DISTRIBUCIÓN: Holártica e I. Santa Helena.

- *Nanhermannia* (*N.*) *fenneri* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

- *Nanhermannia* (*N.*) *forsslundi* Karppinen, 1958

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Norte de Europa y Sur de Siberia).

- *Nanhermannia* (*N.*) *gladiata* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Nanhermannia* (*N.*) *gorodkovi* Sitnikova, 1975

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Asia central rusa e I. Kuriles) e India (Bengala Occidental).

- *Nanhermannia* (*N.*) *grandjeani* Lee, 1985

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Nanhermannia (N.) himalayensis* Chakrabarti y Raychaudhuri, 1978
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Nanhermannia (N.) komareki* Kunst, 1956
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Nanhermannia (N.) laevis* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (I. Sajalín e Irán).
- *Nanhermannia (N.) milloti* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Nanhermannia (N.) nana* (Nicolet, 1855) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Neotropical, Norte de Oriental, Nueva Zelanda, I. Santa Helena y Antártica).
- *Nanhermannia (N.) pectinata* Strenzke, 1953
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Nanhermannia (N.) pluriseta* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Nanhermannia (N.) quadridentata* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y "Mediterránea".
- *Nanhermannia (N.) sabahensis* Fujikawa, 1990
(=*Nanhermannia pluriseta* Mahunka, 1988, "nom. praec." por Mahunka, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Nanhermannia (N.) sellnicki* Forsslund, 1958
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Eurosiberiana, Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Nanhermannia (N.) tenuicoma* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nanhermannia (N.) tenuisetosa* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Nanhermannia (N.) thaiensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Nanhermannia (N.) tokara* Aoki, 1987 (*N. nana t.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nanhermannia (N.) transversaria* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Nanhermannia (N.) triangula* Fujikawa, 1990
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nanhermannia (N.) verna* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Nanhermannia (Nippohermannia) P. Balogh, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Nanhermannia parallela* Aoki, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Nanhermannia (Nippohermannia) parallela* Aoki, 1961 (*Nan.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Cáucaso y Oriental.

Notohermannia P. Balogh, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Notohermannia obtusa* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

- *Notohermannia obtusa* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Australia y Perú.

Hermannioidea Sellnick, 1928

Hermannidae Sellnick, 1928 (3 gen., 2 subg. y 113 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Galapagacarus P. Balogh, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Galapagacarus schatzi* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Galapagacarus schatzi* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Hermannia Nicolet, 1855 (111 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Hermannia crassipes* Nicolet, 1855) =*Nothrus gibbus* Koch, 1839

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Hermannia (Hermannia) Nicolet, 1855 (15 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Paleotropical, "Neotropical" y "Australiana".

- *Hermannia (H.) canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

- DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Hermannia (H.) clara* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de Paleártica oriental.
 - *Hermannia (H.) convexa* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
 (= *Hermannia grandis* Berlese, 1910)
 (= *Claviceps rugosus* L. Koch, 1879)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental y U.S.A.: Virginia),
 India (Sikkim) e I. Seychelles.
 - *Hermannia (H.) dentipes* Canestrini, 1898 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Hermannia (H.) doliaris* (Koch, 1839) (*Nothrus*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Hermannia (H.) exilis* Canestrini, 1897 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Hermannia (H.) gibba* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
 (= *Hermannia crassipes* Nicolet, 1855)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica e I. Seychelles.
 - *Hermannia (H.) gigantea* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
 - *Hermannia (H.) hokkaidensis* Aoki y Ohnishi, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Canadá.
 - *Hermannia (H.) jesti* Travé, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Hermannia (H.) macronycha* Trägårdh, 1907 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
 - *Hermannia (H.) neutricha* Choi, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Hermannia (H.) ovulum* (Haupt, 1882) (*Nothrus*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Hermannia (H.) shimanoi* Aoki, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hermannia (H.) trinebulosa* Riley, 1885 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: “U.S.A.”

Hermannia (Heterohermannia) Woas, 1992 (13 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hermannia reticulata* Thörell, 1871

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Hermannia (Heterohermannia) evidens* Pérez-Íñigo, 1992 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Hermannia (Heterohermannia) gracilis* Woas, 1978 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Hermannia (Heterohermannia) intermedia* Woas, 1980 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Hermannia (Heterohermannia) minuta* Woas, 1981 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Hermannia (Heterohermannia) nodosa* Michael, 1888 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa occidental y Groenlandia).
- *Hermannia (Heterohermannia) polystriata* Woas, 1978 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Hermannia (Heterohermannia) pseudonodosa* Woas, 1981 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Hermannia (Heterohermannia) pulchella* Willmann, 1952 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Hermannia (Heterohermannia) reticulata* Thörell, 1871 (*Herm.*)
 (= *Hermannia quadriseriata* Banks, 1898)
 DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Hermannia (Heterohermannia) scabra* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Hermannia (Heterohermannia) schusteri* Woas, 1980 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (excepto Oeste).
- *Hermannia (Heterohermannia) subglabra* Berlese, 1910 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa y Neártica septentrional).
- *Hermannia (Heterohermannia) woasi* Pérez-Íñigo, 1992 (*Herm.*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Hermannia (Phyllhermannia) Berlese, 1916 (83 spp.)

(= *Lawrencoppia* Jacot, 1936)

- ESPECIE TIPO: *Hermannia phyllophora* Michael, 1908
DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y subantártica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) ababa* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) acalepha* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) africana* (Balogh, 1958) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) angulata* (Balogh y Mahunka, 1966) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) areolata* (Aoki, 1970) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) bandabanda* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) becki* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1988) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) benguetana* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) berlesei* (Mondal, 1984) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) bimaculata* (Hammer, 1979) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) canlaonensis* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) clavata* Mahunka, 1985 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) colini* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) colloffii* (Luxton, 1991) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) comparabilis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) coronata* (Mahunka, 1991) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) craticula* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) croajingolongensis* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) curvata* (Corpuz-Raros y Gruèzo, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) dentata* Trägårdh, 1931 (P.)
(=*Phyllhermannia dentata glabra* Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e Irán.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) dinghuensis* Lu y Wang, 1995
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) engelbrechti* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) errinundrae* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) eusetosa* (Lee, 1985) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) exobothridialis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) exornata* (Balogh, 1964) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) falklandica* (P. Balogh, 1988) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland], y Chile.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) filipina* (Corpuz-Raros y Gruèzo, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) foliata* (Hammer, 1966) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) forsteri* (P. Balogh, 1985) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
 - *Hermannia (Phyllhermannia) foveolata* (Sanyal, 1990) (P.)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Hermannia (Phyllhermannia) fungifer* Mahunka, 1988 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Hermannia (Phyllhermannia) gigas* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) gladiata* (Aoki, 1965) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Hermannia (Phyllhermannia) heterotricha* Mahunka, 1988 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hermannia (Phyllhermannia) hunti* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) javensis* (Hammer, 1979) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Hermannia (Phyllhermannia) kanoi* Aoki, 1959 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Hermannia (Phyllhermannia) leei* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) lemanna*e (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) leonilae* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) leytensis* (Corpuz-Raros y Gruèzo, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) longipediseta* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) longisetosa* Subías y Shtanchaeva, 2013
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hermannia (Phyllhermannia) louisiae* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) luxtoni* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) maganda* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) malindangensis* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) maruokaensis* Y. e Y.-N. Nakamura, Hashimoto y Gotoh, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannia (Phyllhermannia) mauritii* (Jacot, 1936) (*Lawrencoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hermannia (Phyllhermannia) modesta* (Mahunka, 1978) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Hermannia (Phyllhermannia) mollis* (Hammer, 1966) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) namadjiensis* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) natalensis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) nathanaeli* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) neonominata* Subías, 2004
(=*Phyllhermannia mauritii* Mahunka, 1978, "nom. praeoc." por Jacot, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hermannia (Phyllhermannia) neotropica* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hermannia (Phyllhermannia) notogastralis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pacifica* (Hammer, 1972) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pauliani* (Balogh, 1964) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermannia (Phyllhermannia) phylliformis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) phyllophora* Michael, 1908 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pinicola* (Corpuz-Raros y Gruèzo, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) pocsii* Mahunka, 1985 (H.) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermannia (Phyllhermannia) polilloensis* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Hermannia (Phyllhermannia) pulchra* (Aoki, 1973) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannia (Phyllhermannia) punctata* (Sanyal, 1990) (P.)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Hermannia (Phyllhermannia) quadrirotunda* (Hammer, 1979) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Hermannia (Phyllhermannia) rubra* (Hammer, 1966) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermannia (Phyllhermannia) samarensis* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hermannia (Phyllhermannia) sauli* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) sculpturata* Mahunka, 1983 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermannia (Phyllhermannia) serrata* (Balogh y Mahunka, 1966) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) setiformis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).
- *Hermannia (Phyllhermannia) similis* (Balogh y Mahunka, 1967) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hermannia (Phyllhermannia) spathulata* Mahunka, 1985 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) strigosa* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tanjili* (Colloff, 2011) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tenuiseta* (P. Balogh, 1988) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hermannia (Phyllhermannia) transvaalensis* Wet, 1993 (H.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tremicta* (Mahunka, 1978) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Hermannia (Phyllhermannia) truncata* (Wang, 1993) (P.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hermannia (Phyllhermannia) tuberculata* (Covarrubias, 1967) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Uruguay) e Irán.
- *Hermannia (Phyllhermannia) vermicula* (Corpuz-Raros, 2009) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Neohermannia Bayoumi y Mahunka, 1979 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Neohermannia trichosa* Bayoumi y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Neohermannia trichosa* Bayoumi y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Bután.

Hermannelloidea Grandjean, 1934

Hermannelliidae Grandjean, 1934 (9 gen., 63 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Akansilvanus Fujikawa, 1993 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Akansilvanus parvus* Fujikawa, 1993

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Akansilvanus parvus* Fujikawa, 1993

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Ampullobates Grandjean, 1962 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ampullobates nigriclavatus* Grandjean, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ampullobates ecuadoriensis* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Ampullobates nigriclavatus* Grandjean, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Baloghacarus Mahunka, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Baloghacarus hauseri* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Baloghacarus australis* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Baloghacarus hauseri* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Bullibates Subías y Shtanchaeva, 2012 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bullibates hygrophilus* Subías y Shtanchaeva, 2012

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Bullibates hygrophilus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.

Hermanniella Berlese, 1908 (40 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Hermannia granulata* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

- *Hermanniella aliverdievae* Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España) e India (Arunachal Pradesh).
- *Hermanniella aristosa* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Oriental e Islas del Pacífico.
- *Hermanniella bugiamapensis* Ermilov y Bayartogtokh, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hermanniella canestrinii* (Tietze, 1899) (*Hypochthonius*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Hermanniella clavasetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermanniella clavigera* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri) y Cáucaso.
- *Hermanniella congoensis* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Hermanniella diversisetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Micronesia: I. Marianas).
- *Hermanniella dolosa* Grandjean, 1931
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Hermanniella dubinini* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Paleártica oriental meridional.
- *Hermanniella dubiosa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Etiopía).
- *Hermanniella gibber* Kulijev, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Hermanniella grandis* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (España, Irán y Este de Paleártica oriental).
- *Hermanniella granulata* (Nicolet, 1855) (*Hermannia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y Noreste de U.S.A.) y Oriental.
- *Hermanniella humilis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermanniella incondita* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Hermanniella issanielloides* Gil-Martín y Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hermanniella laurisilvae* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Hermanniella longisetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermanniella madagascarensis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermanniella mastyx* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hermanniella microsetosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Hermanniella multipora* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional.
- *Hermanniella oblitera* Sitnikova, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Hermanniella occidentalis* Ewing, 1918 (*H. punctulata* o.)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Hermanniella orbiculata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Hermanniella picea* (Koch, 1839) (*Nothrus*)

- (=*Hermannia arrecta* Nicolet, 1855)
 (= *Hermannella punctulata* Berlese, 1908)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Norte, y U.S.A.: Virginia) y Oriental.
- *Hermannella reticulata* Sitnikova, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Cáucaso).
- *Hermannella robusta* Ewing, 1918 (*H. punctulata* r.)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Hermannella septentrionalis* Berlese, 1910 (*H. punctulata* s.)
 (= *Hermannella barbata* Moraza, 1990)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: excepto Norte, Irán y U.S.A.: Oregón).
- *Hermannella serrata* Sitnikova, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental, Irán y Este de Rusia asiática).
- *Hermannella similis* Sitnikova, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Hermannella spiniseta* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- Hermannella subnigra* (Ewing, 1909) (*Hermannia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica y Australiana.
- *Hermannella subnigra subnigra* (Ewing, 1909)
 (= *Hermannella punctulata columbiana* Berlese, 1910)
 (= *Hermannella subnigra setacea* Jacot, 1937)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica y Australiana (Islas del Pacífico).
- *Hermannella subnigra rigida* Jacot, 1938
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Illinois.
- *Hermannella tenuisetosa* (Choi, Bayartogtokh y Aoki, 2001) (*Dicastribatess*)
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Hermannella thani* Mahunka, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Hermannella tobori* Mizutani, Shimano y Aoki, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannella vohimana* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hermannella yasumai* Aoki, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hermannella zhengi* Qiao, Tang y Chen, 2011
 DISTRIBUCIÓN: China (Noroeste y Tíbet) y Nepal.

Hermannobates Hammer, 1961 (11 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hermannobates monstruosus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Hermannobates bifurcatus* Ermilov y Kalúz, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hermannobates cubanus* Starý, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hermannobates dilatatus* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hermannobates dillerorum* Ermilov, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hermannobates flagelliseta* Balogh y Mahunka, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hermannobates hammerae* Starý, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hermannobates horridus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hermannobates intermedius* Călugăr, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Hermannobates monstruosus* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Hermannobates ruseki* Starý, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Hermannobates scoparius* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Issaniella Grandjean, 1962 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Issaniella mograbin* Grandjean, 1962

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

Issaniella mograbin Grandjean, 1962

- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e I. Galápagos.
 - *Issaniella mograbin mograbin* Grandjean, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e I. Galápagos.
 - *Issaniella mograbin hauseri* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Mahunkobates Călugăr, 1989 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Mahunkobates singularis* Călugăr, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Mahunkobates singularis* Călugăr, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

Sacculobates Grandjean, 1962 (4 spp.)
 (= *Bruneiella* Mahunka, 1997)
 (= *Dicastrribates* J. y P. Balogh, 1988)
 ESPECIE TIPO: *Sacculobates horologiorum* Grandjean, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
 - *Sacculobates heterotrichus* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Panamá).
 - *Sacculobates horologiorum* Grandjean, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente).
 - *Sacculobates indicus* Ermilov, Kalúz y Tolstikov, 2013
 DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Sacculobates sultan* (Mahunka, 1997) (*Bruneiella*)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Plasmobatidae Grandjean, 1961 (4 gen. y 22 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

Malgachebates Fernández, Cleva y Theron, 2011 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Malgachebates peyrierasi* Fernández, Cleva y Theron, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Malgachebates peyrierasi* Fernández, Cleva y Theron, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Orbiculobates Grandjean, 1961 (5 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Plasmobates orbiculus* Grandjean, 1929
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australianooriental.
 - *Orbiculobates acutirostrum* (Hammer, 1973) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
 - *Orbiculobates javensis* (Hammer, 1979) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Orbiculobates orbiculus* (Grandjean, 1929) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Orbiculobates schubarti* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1988) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Orbiculobates transvectus* (Grandjean, 1929) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Plasmobates Grandjean, 1929 (9 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Plasmobates pagoda* Grandjean, 1929
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
 - *Plasmobates africanus* Balogh, 1958 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Plasmobates asiaticus* Aoki, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
 - *Plasmobates carboneli* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
 - *Plasmobates foveolatus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Plasmobates hyalinus* Hammer, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
 - *Plasmobates machadoi* Balogh, 1958 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Plasmobates minor* Balogh, 1958 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Plasmobates pagoda* Grandjean, 1929

- DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical, India y ¿Cáucaso?
 - *Plasmobates zarae* Fernández y Theron, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Ruanda.

Solenozetes Grandjean, 1931 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Plasmobates cribratus* Grandjean, 1929

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Solenozetes australis* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Orbiculobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Solenozetes carinatus* (Hammer, 1961) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Solenozetes cribratus* (Grandjean, 1929) (*Plasmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Solenozetes flagellatus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Solenozetes flagellifer* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Solenozetes gallonae* Hunt, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Solenozetes makokouensis* Fernández, Theron y Rollard, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Gabón.

Neoliodoidea Sellnick, 1928

Neoliodidae Sellnick, 1928 (4 gen., 52 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Neoliodes Berlese, 1888 (40 spp. y 1 ssp.)

(=***Liodes*** Heyden, 1826, "nom. praeoc." por *Leiodes* Latreille, 1796)

(=***Udetaliodes*** Jacot, 1929)

ESPECIE TIPO: *Notaspis theleproctus* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Neoliodes alatus* (Hammer, 1979) (*Liodes*)
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Neoliodes backstroemi* Trägårdh, 1931
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Chile (I. Juan Fernández) y Méjico.
- *Neoliodes bataviensis* Sellnick, 1925
 DISTRIBUCIÓN: Java, Australiana (Islas del Pacífico) y Japón.
- *Neoliodes canaliculatus* (Koch, 1839) (*Nothrus*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Neoliodes capensis* Berlese, 1910 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neoliodes concentricus* (Say, 1821) (*Oribata*)
 (= *Nothrus malleolus* Karpelles, 1884)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Neoliodes cyclonotus* (Gervais, 1849) (*Oribata*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Neoliodes elongatus* (Fernández, Marcangeli y Martínez, 1995) (*Liodes*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Neoliodes eques* (Canestrini, 1897) (*Nothrus*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoliodes floridensis* Banks, 1906 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Neoliodes funafutiensis* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia: I. Ellice [Tuvalu].
- *Neoliodes globosus* (Subías y Gil-Martín, 1990) (*Liodes*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Neoliodes hawaiiensis* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes*)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Neoliodes hawaiiensis hawaiiensis* (Jacot, 1929)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Neoliodes hawaiiensis aculeatisetae* (Jacot, 1934) (*Udetaliodes*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Neoliodes iheyaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoliodes ionicus* Sellnick, 1931
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e Irán.

- *Neoliodes kornhuberi* (Karpelles, 1884) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Neoliodes lamellatus* (Rainbow, 1897) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia: I. Ellice [Tuvalu].
- *Neoliodes lanceosetosus* (Wallwork, 1977) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Neoliodes lawrencei* Jacot, 1940
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neoliodes longipes* Berlese, 1916 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Neoliodes marplatensis* (Fernández, Marcangeli y Martínez, 1995) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Neoliodes mauritius* (Jacot, 1936) (*Udetaliodes*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Neoliodes modestior* Berlese, 1916 (*N. squamiger m.*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Neoliodes nigricans* (Hammer, 1966) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neoliodes notactis* (Gervais, 1849) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Neoliodes ocellatus* Pearce, 1906 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Neoliodes polysetosus* (Sitnikova, 1975) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Neoliodes porcellus* Berlese, 1888 (*N. theleproctus p.*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Neoliodes pyramidalis* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Neoliodes ramosus* (Hammer, 1971) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Japón.
- *Neoliodes rugosus* Warburton, 1912
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Neoliodes segestris* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Neoliodes silvestris* (Hammer, 1977) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Neoliodes sqamiger* Berlese, 1916 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Neoliodes striatus* Warburton, 1912
(=*Neoliodes femoralis* Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles y Japón.
- *Neoliodes swezeyi* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Neoliodes terrestris* (Wallwork, 1963) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica, Oriental (India) y Neotropical, y Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental).
- *Neoliodes theleproctus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Nothrus circumvallatus* Haupt, 1882)
(=*Nothrus dimera* Haupt, 1882)
(=*Nothrus dorsatus* Canestrini y Fanzago, 1877)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: menos frecuente en el Norte, Oriental: Vietnam, Australiana: Nueva Guinea y Hawái, y Neotropical: Cuba).
- *Neoliodes vermiculatus* Jacot, 1924
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Neoliodes wakensis* (Jacot, 1929) (*Udetaliodes hawaiiensis w.*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Neoliodes zimmermanni* (Sellnick, 1959) (*Liodes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Sureste, y Japón.

Platyliones Berlese, 1916 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nothrus doderleini* Berlese, 1883

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Platyliones doderleini* (Berlese, 1883) (*Nothrus*)

(?= *Nothrus venosus* Grube, 1859 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Platyliones graecus* Sellnick, 1927

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Platylodes japonicus* Aoki, 1979
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (China suroccidental y Vietnam).
- *Platylodes longisetosus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Platylodes macroprius* Woolley e Higgins, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional y Japón.
- *Platylodes montanus* Fujikawa, 2001
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Platylodes scaliger* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Mediterránea).

Poroliodes Grandjean, 1934 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: (*Notaspis theleproctus* Hermann “sensu” Michael, 1888) = *Nothrus farinosus* Koch, 1839

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Poroliodes farinosus* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
(= *Neoliodes caudatus* Berlese, 1914)
- DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nepal.

Teleliodes Grandjean, 1934 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Teleliodes madinensis* Grandjean, 1934

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Teleliodes ghanensis* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Ghana y Brasil.
- *Teleliodes madinensis* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teleliodes zikani* (Sellnick, 1930) (*Neoliodes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente).

Plateremaeoidea Trägårdh, 1926

Plateremaeidae Trägårdh, 1926 (6 gen., 16 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Allodamaeus Banks, 1947 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Allodamaeus ewingi* Banks, 1947

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Allodamaeus coralgablensis* Paschoal, 1987
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Florida.
- *Allodamaeus ewingi* Banks, 1947
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional y Asia centrooccidental.

Balgheremaeus Arillo y Subías, 2006 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Balgheremaeus chimaera* Arillo y Subías, 2006

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Balgheremaeus chimaera* Arillo y Subías, 2006
DISTRIBUCIÓN: España.

Calipteremaeus Paschoal, 1987 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Plateremaeus yaginumi* Aoki, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Calipteremaeus yaginumi* (Aoki, 1977) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Lopheremaeus Paschoal, 1987 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Plateremaeus mirabilis* Csiszár, 1962

DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional) y Etiópica.

- *Lopheremaeus laminipes* (Berlese, 1916) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Lopheremaeus mirabilis* (Csiszár, 1962) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Lopheremaeus tunicatus* (Balogh, 1958) (*Gymnodamaeus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Paralopheremaeus Paschoal, 1987 (2 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Plateremaeus legendrei* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Paralopheremaeus hispanicus* (Ruiz, Kahwash y Subías, 1990) (*Plateremaeus*)

- DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
 - *Paralopheremaeus hispanicus hispanicus* (Ruiz, Kahwash y Subías, 1990)
 DISTRIBUCIÓN: España y Crimea.
 - *Paralopheremaeus hispanicus arifi* Baran, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
 - *Paralopheremaeus legendrei* (Balogh, 1962) (*Plateremaeus*)
 (= *Plateremaeus elongatus* Mahunka, 1987)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Kenia) y Ceilán [Sri Lanka].

Plateremaeus Berlese, 1908 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Damaeus ornatissimus* Berlese, 1888

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Plateremaeus anteriosetosus* Woas, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Plateremaeus berlesei* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Plateremaeus complanatus* (Warburton, 1912) (*Damaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Plateremaeus costulatus* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Plateremaeus latus* P. Balogh, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Plateremaeus novemsetosus* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Plateremaeus ornatissimus* (Berlese, 1888) (*Damaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Pheroliodidae Paschoal, 1987 (5 gen. y 52 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y Antártica.

Lopholiodes Paschoal, 1987 (6 spp.)

(= *Octoliodes* Paschoal, 1987)

ESPECIE TIPO: *Lopholiodes micropunctinatum* Paschoal, 1987

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).

- *Lopholiodes diamantei* Fernández y Cleva, 1999
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lopholiodes luteomarginatus* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lopholiodes macropunctinatum* Paschoal, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).
- *Lopholiodes micropunctinatum* Paschoal, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Lopholiodes rotoruensis* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lopholiodes tolstikovi* Ermilov, Shtanchaeva, Bayartogtokh y Subías, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Lyrifissiella Paschoal, 1989 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella latoclava* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Lyrifissiella cryptonota* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lyrifissiella latoclava* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lyrifissiella vestita* (Trägårdh, 1931) (*Plateremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

Malgacheliodes Fernández y Cleva, 2010 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Malgacheliodes guillaumeti* Fernández y Cleva, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Malgacheliodes guillaumeti* Fernández y Cleva, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Nooliodes Paschoal, 1989 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Plateremaeus glaber* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Nooliodes franzi* (Balogh, 1966) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Chad.

- *Nooliodes glaber* (Balogh, 1962) (*Plateremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Pheroliodes Grandjean, 1931 (40 spp.)

(=*Andesperuviella* Paschoal, 1989)

(=*Hammeriella* Paschoal, 1989, "nom. praec." por *Hammerella* Balogh, 1983)

(=*Neonooliodes* Hunt, 1996)

(=*Paschoalia* Subías, 2004)

(=*Pedrocortesia* Hammer, 1958)

ESPECIE TIPO: *Cymbaeremaeus wehncke* Willmann, 1930

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y Antártica.

- *Pheroliodes achalensis* Baranek, 1986

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes africanus* (Balogh, 1966) (*Pedrocortesia*)

(=*Pedrocortesella pletzenae* J. y P. Balogh, 2002)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Sudáfrica).

- *Pheroliodes australis* (Hammer, 1962) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica.

- *Pheroliodes barringtonensis* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pheroliodes carinulatus* (Berlese, 1888) (*Eremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Pheroliodes casabranquensis* Paschoal, 1987

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Pheroliodes ceroplastes* (Hunt, 1996) (*Neonooliodes*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pheroliodes complanatus* (Berlese, 1901) (*Eremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Pheroliodes concavus* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pheroliodes copiosus* Hunt y Lee, 1995

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pheroliodes cordobensis* Baranek, 1986

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes delticus* Baranek, 1984

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes dentatus* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pheroliodes elegans* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pheroliodes grandis* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Pheroliodes hammerae* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Pheroliodes inca* Fernández, Martínez y Eguaras, 1991

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes intermedius* (Hammer, 1961) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pheroliodes lindsayae* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

- *Pheroliodes longiceps* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.

- *Pheroliodes longisetus* Baranek, 1986

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes lordhowensis* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Lord Howe).

- *Pheroliodes minutus* Baranek, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).

- *Pheroliodes mirabilis* (Hammer, 1958) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes monteithi* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pheroliodes nemoricultricus* Paschoal, 1987

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Pheroliodes neuquinus* Baranek, 1986

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pheroliodes pellitus* Paschoal, 1987
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes reticulatus* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Pheroliodes roblensis* Covarrubias, 1968
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pheroliodes robustus* Hunt y Lee, 1995
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Pheroliodes rotundatus* (Berlese, 1913) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pheroliodes rusticus* Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pheroliodes sicarius* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes springthorpei* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes transversus* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pheroliodes uruguayensis* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Pheroliodes vermicularis* (Balogh, 1970) (*Pedrocortesía*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Pheroliodes vulgaris* Baranek, 1984
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pheroliodes wehnckeí* (Willmann, 1930) (*Cymbaeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Licnodamaeidae Grandjean, 1954 (7 gen., 1 subg. y 73 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Flammaeremaeus Balogh, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Flammaeremaeus gressitti* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Flammaeremaeus gressitti* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Hexachaetoniella Paschoal, 1987 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella sexpilosa* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Holártica meridional.

- *Hexachaetoniella bunya* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hexachaetoniella contigua* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Hexachaetoniella dispersa* (P. Balogh, 1985) (*Pedrocortesella*)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Hexachaetoniella japonica* (Aoki y Suzuki, 1970) (*Pedrocortesella*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Filipinas y Méjico.
- *Hexachaetoniella norfolkensis* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Hexachaetoniella rjabini* (Golosova, 1980) (*Pedrocortesella*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Hexachaetoniella sculptrata* (Aoki, 1974) (*Pedrocortesía*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China.
- *Hexachaetoniella sexpilosa* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Licnodamaeolus Covarrubias, 1998 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Licnodamaeolus travei* Covarrubias, 1998

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

Licnodamaeolus (Licnodamaeolus) Covarrubias, 1998 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

- *Licnodamaeolus (L.) erfensdamensis* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Licnodamaeolus (L.) travei* Covarrubias, 1998
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Licnodamaeolus (Nacunansella) Fernández y Cleva, 1998 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nacunansella diminuta* Fernández y Cleva, 1998

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

- *Licnodamaeolus (Nacunansella) asetosus* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012 (L.)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Licnodamaeolus (Nacunansella) diminutus* (Fernández y Cleva, 1998) (N.)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Licnodamaeus Grandjean, 1931 (12 spp.)

ESPECIE TIPO: *Licneremaeus undulatus* Paoli, 1908

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y Neotropical.

- *Licnodamaeus baccettii* Bernini, 1972

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Licnodamaeus costula* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Licnodamaeus eperezinigoae* Subías, 2018

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Licnodamaeus fissuratus* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

- *Licnodamaeus granulatus* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e Irán.

- *Licnodamaeus inaequalis* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Sureste de Europa (Crimea) y Paleártica oriental meridional.

- *Licnodamaeus itsukushima* Fujikawa, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Licnodamaeus pulcherrimus* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte).

- *Licnodamaeus rarisetosus* (Bayartogtokh y Smelyansky, 2002) (*Pedrocortesella*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Licnodamaeus stebaevae* (Grishina, 1981) (*Pedrocortesia*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Licnodamaeus triangulatus* (Bayartogtokh, 2001) (*Pedrocortesella*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

- *Licnodamaeus undulatus* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte) y Taiwán [Formosa].

Licnoliodes Grandjean, 1931 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Licnoliodes adminensis* Grandjean, 1933

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Licnoliodes andrei* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).

- *Licnoliodes apunctatus* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Novazelandiella Paschoal, 1989 (7 spp.)

(=*Darthvaderum* Hunt, 1996)

(=*Labiogena* Hunt, 1996)

ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella nigroclava* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Novazelandiella convexa* (Hunt, 1996) (*Labiogena*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Novazelandiella enigma* (Hunt, 1996) (*Pedrocortesella*)

DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

- *Novazelandiella greensladeae* (Hunt, 1996) (*Darthvaderum*)

DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

- *Novazelandiella kellyi* Hunt, 1996

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Novazelandiella nigroclava* (Hammer, 1966) (*Pedrocortesella*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Novazelandiella queenslandica* (P. Balogh, 1985) (*Pedrocortesella*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Novazelandiella walteri* (Hunt, 1996) (*Labiogena*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Pedrocortesella Hammer, 1961 (38 spp.)

(=*Acupedicellus* Hunt y Lee, 1995)

ESPECIE TIPO: *Pedrocortesella pulchra* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical.

- *Pedrocortesella africana* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía).
- *Pedrocortesella anica* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella augusta* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella bannisteri* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella bithongabela* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella callitarsus* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella callosa* (Hammer, 1979) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Pedrocortesella calmorum* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella conundrum* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella cornuta* (Hunt y Lee, 1995) (*Acupedicellus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella cryptoreticulata* Hunt y Lee, 1995
DISTRIBUCIÓN: **Australiana** (Australia y Nueva Zelanda).
- *Pedrocortesella dongnaiensis* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pedrocortesella excavata* (Hammer, 1979) (*Plateremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Pedrocortesella fusca* (Rjabinin, 1986) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Pedrocortesella gunjina* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella gymnonota* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pedrocortesella hangayi* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella hardyi* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Japón.
- *Pedrocortesella humerata* (Mahunka, 1978) (*Pedrocortesia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Pedrocortesella impedita* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella kanangra* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella leei* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella minuta* Bayartogtokh y Smelyansky, 2004
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia europea.
- *Pedrocortesella monicai* Eguaras, Martínez y Fernández, 1990
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pedrocortesella montis* Fernández, 1990
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Pedrocortesella nortoni* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Pedrocortesella obesa* Hunt, 1996
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella parva* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pedrocortesella propinqua* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pedrocortesella pulchra* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile), Oriental (Vietnam) y Este de Rusia asiática.
- *Pedrocortesella reticulata* (Rjabinin, 1986) (*Pedrocortesia*)
(=*Pedrocortesella neonominata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
- *Pedrocortesella semireticulata* Hunt y Lee, 1995

- DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pedrocortesella stellata* (Rjabinin, 1986) (*Pedrocortesella*)
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
 - *Pedrocortesella subula* Hunt, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pedrocortesella temperata* P. Balogh, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
 - *Pedrocortesella tristius* Eguaras, Martínez y Fernández, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Pedrocortesella truncata* Hunt, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pedrocortesella vietnamica* Ermilov y Anichkin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Licnobelbidae Grandjean, 1965 (2 gen. y 3 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Flabellobelba Pérez-Íñigo, 1994 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Licnobelba almeriensis* Ruiz, Kahwash y Subías, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Flabellobelba almeriensis* (Ruiz, Kahwash y Subías, 1990) (*Licnobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: España.

Licnobelba Grandjean, 1931 (2 spp.)

- ESPECIE TIPO: (*Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931) = *Licneremaeus latiflabellatus* Paoli, 1908
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Licnobelba caesarea* (Berlese, 1910) (*Licneremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Licnobelba latiflabellata* (Paoli, 1908) (*Licneremaeus*)
 (= *Licnobelba alestensis* Grandjean, 1931)
 (= *Licnobelba montana* Mihelčič, 1957)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte) y Oeste de Paleártica oriental.

Gymnodamaeioidea Grandjean, 1954

Gymnodamaeidae Grandjean, 1954 (6 gen. y 67 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

Adrodamaeus Paschoal, 1984 (14 spp.)

- (= *Heterodamaeus* Woolley, 1957, "nom. praec." por Ewing, 1917)
 ESPECIE TIPO: *Damaeus magnisetosus* Ewing, 1909
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Palearctica.
 - *Adrodamaeus decemsetiger* (Choi y Aoki, 1985) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Corea y China suroriental.
 - *Adrodamaeus femoratus* (Koch, 1839) (*Damaeus*)
 (= *Belba dugesi* **Canestrini y Fanzago, 1877**)
 (= *Belba gibba* Canestrini y Fanzago, 1877)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, y Paquistán).
 - *Adrodamaeus haradai* (Aoki, 1984) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Adrodamaeus hispanicus* (Grandjean, 1928) (*Gymnodamaeus*)
 (= *Gymnodamaeus noster* Mihelčič, 1957)
 (= *Gymnodamaeus sculptus* Mihelčič, 1957)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Adrodamaeus johanni* (Hugo, 2010) (*Arthrodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Zambia).
 - *Adrodamaeus magnisetosus* (Ewing, 1909) (*Damaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental.
 - *Adrodamaeus mongolicus* (Bayartogtokh y Weigmann, 2005) (*Arthrodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
 - *Adrodamaeus musci* Paschoal, 1984
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
 - *Adrodamaeus rossicus* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
 - *Adrodamaeus siculus* (Berlese, 1910) (*Gymnodamaeus reticulatus* s.)
 (= *Arthrodamaeus ignotus* Paschoal, 1984)
 (= *Gymnodamaeus italicus* Berlese, 1916)

(=*Arthrodamaeus parvulus* Kunst, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Adrodamaeus starki* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*Allodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).

- *Adrodamaeus striatus* (Aoki, 1984) (*Allodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Norte de Oriental.

- *Adrodamaeus vietnamicus* (Ermilov y Anichkin, 2011) (*Arthrodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Adrodamaeus woonhahi* (Choi y Aoki, 1985) (*Allodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Corea.

Arthrodamaeus Grandjean, 1954 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Gymnodamaeus reticulatus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Arthrodamaeus bicristatus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Arthrodamaeus cereus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Arthrodamaeus mediterraneus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Arthrodamaeus octosetosus* Subías, Arillo y J. Subías, 1997

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Arthrodamaeus reticulatus* (Berlese, 1910) (*Gymnodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.

- *Arthrodamaeus rosarius* Subías, Arillo y J. Subías, 1997

(?= *Arthrodamaeus reticulatus tenuis* Mihelčič, 1958 “ssp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: España.

Gymnodamaeus Kulczynski, 1902 (24 spp.)

(=*Donjohnstonella* Walter, 2009)

(=*Heterodamaeus* Ewing, 1917)

(=*Johnstonella* Paschoal, 1983)

(=*Odontodamaeus* Paschoal, 1982)

(=*Pleodamaeus* Paschoal, 1983)

ESPECIE TIPO: *Damaeus bicostatus* Koch, 1935

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Gymnodamaeus adpressus* (Aoki y Fujikawa, 1971) (*Allodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Norte de India y Vietnam).

- *Gymnodamaeus barbarossa* Weigmann, 2006

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Gymnodamaeus bicostatus* (Koch, 1835) (*Damaeus*)

(=*Eremaeus asperulus* Berlese, 1882)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Gymnodamaeus chalazionus* Woolley, 1972

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

- *Gymnodamaeus gregarius* Paschoal, 1982 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).

- *Gymnodamaeus guilfordidei* Paschoal, 1982

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).

- *Gymnodamaeus kazakhstanicus* (Bayartogtokh y Smelyansky, 2002) (*Pleodamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Gymnodamaeus knowltoni* Paschoal, 1982 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.

- *Gymnodamaeus leurolomasus* Woolley e Higgins, 1973

DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A.: Colorado, y Este de Rusia asiática).

- *Gymnodamaeus notcapodematus* Paschoal, 1982 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).

- *Gymnodamaeus orbicularius* Paschoal, 1982

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).

- *Gymnodamaeus ornatus* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Gymnodamaeus pearsei* Banks, 1947

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Gymnodamaeus plokosus* Woolley e Higgins, 1973

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Gymnodamaeus pusillus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Gymnodamaeus quadriseta* Ruiz, Kahwash y Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Gymnodamaeus rotundigranulatus* (Bayartogtokh, 2001) (*Pleodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Gymnodamaeus saltuensis* Paschoal, 1982 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Gymnodamaeus subalpinus* (Paschoal, 1983) (*Johnstonella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Gymnodamaeus taedaceus* Paschoal, 1982 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Gymnodamaeus theliis* Woolley e Higgins, 1973
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Gymnodamaeus tuberculatus* (Bayartogtokh y Smelyansky, 2004) (*Pleodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia europea.
- *Gymnodamaeus umbraticus* Paschoal, 1982 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Gymnodamaeus veriornatus* Higgins, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

Jacotella Banks, 1947 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Gymnodamaeus quadricaudiculus* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Jacotella austriaca* (Willmann, 1935) (*Gymnodamaeus*)
(=*Gymnodamaeus austriacus stepposus* Bashkirova, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Jacotella enoplura* Paschoal, 1983
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Noroeste de U.S.A. y Europa meridional (Bulgaria).
- *Jacotella frondeus* (Kulijev, 1979) (*Plesiodamaeus*)
(=*Plesiodamaeus ornatus* Mahunka, 1979, “nom. praeoc.” por Balogh y Csiszár, 1963)
(=*Plesiodamaeus perezinigo* Mahunka, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Jacotella glabra* (Mihelčič, 1957) (*Plesiodamaeus*)
(?=*Gymnodamaeus aprofundatus* Mihelčič, 1956 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional e India (Maharashtra).
- *Jacotella neonominata* Subías, 2004
(=*Plesiodamaeus ornatus* Pérez-Íñigo, 1972, “nom. praeoc.” por Balogh y Csiszár, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Jacotella ornata* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Allodamaeus*)
(=*Allodamaeus tuberculatus* Aoki y Fujikawa, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico) e India (Himalaya).
- *Jacotella quadricaudicula* (Jacot, 1937) (*Gymnodamaeus*)
(=*Gymnodamaeus minor* Banks, 1947)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).
- *Jacotella reticulata* Ruiz, Kahwash y Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Jacotella whartoni* Paschoal, 1983
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).

Joshuella Wallwork, 1972 (12 spp.)

(=*Nortonella* Paschoal, 1982, “nom. praeoc.” por Rohwer, 1908)

(=*Paschoalia* Özdikmen, 2008, “nom. praeoc.” por Subías, 2004)

(=*Roynortonella* Walter, 2009)

ESPECIE TIPO: *Joshuella striata* Wallwork, 1972

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Joshuella agrosticula* Paschoal, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá: Alberta).
- *Joshuella bicentenaria* Paschoal, 1983
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Joshuella gildersleeveae* (Hammer, 1952) (*Gymnodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Joshuella helvetica* (Woas, 1992) (*Gymnodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Joshuella irregularis* (Bayartogtokh y Schatz, 2009) (*Gymnodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Joshuella meyeri* (Bayartogtokh y Schatz, 2009) (*Gymnodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Joshuella mongolica* (Bayartogtokh y Aoki, 1997) (*Nortonella*)

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Finlandia.
 - *Joshuella polygrammus* (Wen y Chen, 1992) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Joshuella striata* Wallwork, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A. y Méjico.
 - *Joshuella tectoria* (Wen y Chen, 1992) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Joshuella transitus* (Aoki, 1984) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Joshuella victoriae* (Paschoal, 1982) (*Gymnodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Plesiodamaeus Grandjean, 1954 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Damaeus craterifer* Haller, 1884

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

- *Plesiodamaeus craterifer* (Haller, 1884) (*Damaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Sur de Siberia).
 - *Plesiodamaeus tabuencai* Fernández y Cleva, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Aleurodamaeidae Paschoal y Johnston, 1985 (2 gen. y 17 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical.

Aleurodamaeus Grandjean, 1954 (16 spp.)

(=*Trichodamaeus* Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Damaeus setosus* Berlese, 1883

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.

- *Aleurodamaeus africanus* Mahunka, 1984 (A. (*Trichodamaeus*))
 DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
 - *Aleurodamaeus angelae* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus australis* Woas, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus cephalotes* (Berlese, 1916) (*Gymnodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
 - *Aleurodamaeus deswardti* (Hugo, 2010) (*Gymnodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus ermilovi* (Hugo-Coetzee, 2014) (*Adrodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus hungaricus* Paschoal y Johnston, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Aleurodamaeus minutus* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus niedbalai* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus prominens* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus recenfesevpi* Ermilov y Rybalov, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Aleurodamaeus salvadordalii* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus setosus* (Berlese, 1883) (*Damaeus*)
 (= *Gymnodamaeus gibbus* Mihelčič, 1963)
 (= *Gymnodamaeus nitidus* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Aleurodamaeus trichosus* (Kulijev, 1979) (*Allodamaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Aleurodamaeus vicinus* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Aleurodamaeus woasi* Hugo-Coetzee, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Austrodamaeus Balogh y Mahunka, 1981 (1 sp.)

(=*Idiodamaeus* Paschoal, 1984)

ESPECIE TIPO: (*Austrodamaeus rimosus* Balogh y Mahunka, 1981) = *Gymnodamaeus elegantulus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Austrodamaeus elegantulus* (Hammer, 1958) (*Gymnodamaeus*)

(=*Idiodamaeus illecebrosus* Paschoal, 1984)
 (= *Austrodamaeus rimosus* Balogh y Mahunka, 1981)
 (= *Allodamaeus trisetosus* Balogh y Mahunka, 1969)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Damaeidea Berlese, 1896

Damaeidae Berlese, 1896 (13 gen, 14 subg., 286 spp. y 7 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Acanthobelba Enami y Aoki, 1993 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Acanthobelba tortuosa* Enami y Aoki, 1993

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Acanthobelba heterosetosa* Choi, 1997

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Acanthobelba tortuosa* Enami y Aoki, 1993

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Belba Heyden, 1826 (33 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis corynopus* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y "Australiana".

Belba (Belba) Heyden, 1826 (32 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y "Australiana".

- *Belba (B.) aegrota* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

- *Belba (B.) aurata* Kulijev, 1967

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Belba (B.) barbata* Fujita y Fujikawa, 1986

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Belba (B.) bulanovae* Subías, 2016

(=*Belba minuta* Bulanova-Zachvatkina, 1962, "nom. praeoc." por Banks, 1895)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Rumanía y Asia centrooccidental).

- *Belba (B.) clavasensilla* Norton y Palacios-Vargas, 1982

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Belba (B.) compta (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Taiwán [Formosa].

- *Belba (B.) compta compta* (Kulczynski, 1902)

(=*Belba verrucosa* Bulanova-Zachvatkina, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Belba (B.) compta japonica* Aoki, 1984 (*B. verrucosa j.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].

- *Belba (B.) cornuta* Wang y Norton, 1995

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Belba (B.) corynopus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

(=*Belba bulbipes* Karpelles, 1893)

(=*Damaeus sufflexus* Michael, 1885)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Belba (B.) crassisetosa* Bayartogtokh, 2000

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Belba (B.) daghestanica* Bulanova-Zachvatkina, 1962

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.

- *Belba (B.) dubinini* Bulanova-Zachvatkina, 1962

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooriental y Paleártica oriental).

- *Belba (B.) flagellata* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Belba (B.) flammeisetosa* Tolstikov, 1995

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Belba (B.) heterosetosa* Bayartogtokh, 2004

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Belba (B.) itsukiensis* Fujikawa, 2011

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Belba (B.) jacoti* Wilson, 1936

DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.

- *Belba (B.) meridionalis* Bulanova-Zachvatkina, 1962

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Paleártica oriental meridional).

- *Belba (B.) minor* Mihelčič, 1953 "sp. inq."

- DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Belba (B.) mongolica* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Belba (B.) paracorynopus* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional y Este de Paleártica oriental).
 - *Belba (B.) patelloides* (Michael, 1890) (*Notaspis*)
(=*Belba bartosi* Winkler, 1955)
(=*Belba pseudocorynopus* Märkel y Meyer, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
 - *Belba (B.) pectinifera* Canestrini, 1897 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Belba (B.) prasadi* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Belba (B.) pulchra* Mihelčič, 1964
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Belba (B.) rossica* Bulanova-Zachvatkina, 1962
(=*Belba piriformis* Mihelčič, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Belba (B.) sarvari* Tolstikov, 1995
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
 - *Belba (B.) sasakawai* Enami, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón y China.
 - *Belba (B.) sculpta* Mihelčič, 1957
(=*Belba aberrans* Mihelčič, 1957)
(=*Belba ignota* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
 - *Belba (B.) sellnicki* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Ucrania y Este de Paleártica oriental).
 - *Belba (B.) servadeii* Lombardini, 1962 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Belba (B.) tenuisetosa* Bulanova-Zachvatkina, 1962
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
 - *Belba (B.) unicornis* Enami, 1994
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Belba (Caenobelba) Norton, 1980 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Caenobelba alleganiensis* Norton, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Belba (Caenobelba) alleganiensis* (Norton, 1980) (C.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Belbodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1967 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Belbodamaeus tuberculatus* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Belbodamaeus (Belbodamaeus) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Belbodamaeus (B.) indicus* Ermilov, Kalúz y Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Belbodamaeus (B.) tuberculatus* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental y Paleártica oriental).

Belbodamaeus (Lanibelba) Norton, 1980 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lanibelba pini* Norton, 1980

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Neotropical.

- *Belbodamaeus (Lanibelba) longitarsalis* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) marginatus* Kulijev, 1967 (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) palaciosi* (Iglesias y Guzmán, 2012) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Belbodamaeus (Lanibelba) pini* (Norton, 1980) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y U.S.A. (Florida).
- *Belbodamaeus (Lanibelba) rarituberculatus* Bayartogtokh, 2004 (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Belbodamaeus (Protobelba) Norton, 1979 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata californica* Banks, 1904

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Belbodamaeus (Protobelba) californica* (Banks, 1904) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.

Damaeus Koch, 1835 (147 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Damaeus auritus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Paleotropical y Neotropical.

Damaeus (Damaeus) Koch, 1835 (40 spp.)

(=**Hypodamaeus** Bulanova-Zachvatkina, 1957)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Damaeus (D.) ainu* Enami y Aoki, 1998

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Damaeus (D.) alpinus* (Schwizer, 1956) (*Belba*)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Damaeus (D.) angustipes* (Banks, 1905) (*Oribata*)

(=*Belba kingi* Hartenstein, 1962)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

- *Damaeus (D.) appalachicus* Norton, 1978

DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

- *Damaeus (D.) arvernensis* Grandjean, 1960

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Oeste de Europa y Egipto).

- *Damaeus (D.) auritus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Paleártica: frecuente.

- *Damaeus (D.) australis* (Banks, 1895) (*Belba*)

(=*Damaeus atlanticus* Norton, 1978)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A.

- *Damaeus (D.) bacillum* (Kulczynski, 1926) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).

- *Damaeus (D.) bulbipedata* Packard, 1888 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Kentucky).

- *Damaeus (D.) bulbofemoralis* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Damaeus (D.) camtschaticus* (Kulczynski, 1926) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).

- *Damaeus (D.) conjugenus* (Xie, Yang y Huang, 2011) (*Epidamaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Damaeus (D.) cordatus* Xie y Yang, 2010 (*D. (Tectodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Damaeus (D.) costanotus* Wang y Norton, 1989

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Damaeus (D.) crispatus* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Paquistán).

- *Damaeus (D.) curtus* Haupt, 1882 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Damaeus (D.) echinopus* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Damaeus (D.) firmus* Kunst, 1958

DISTRIBUCIÓN: Sur de Europa.

- *Damaeus (D.) flagellifer* Michael, 1890

(=*Damaeus kulczynskii* Grandjean, 1943)

(=*Damaeus longipes* Mihelčič, 1957, “nom. praeoc.” por Willmann, 1940)

(=*Belba pachytrichosa* Mihelčič, 1956)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).

- *Damaeus (D.) formica* (Gervais, 1849) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Damaeus (D.) foroliviensis* Lombardini, 1962 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Damaeus (D.) gevi* Subías, 2012

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Damaeus (D.) glycyphagoides* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Méjico.

- *Damaeus (D.) gracilipes* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Suroeste de Paleártica oriental y Groenlandia).

- *Damaeus (D.) grossmani* (Wilson, 1936) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.

- *Damaeus (D.) helveticus* (Schweizer, 1956) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Damaeus (D.) longipes* (Willmann, 1940) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Damaeus (D.) longiseta* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (D.) longus* (Xie y Yang, 2009) (*Tectodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (D.) lupus* Miko, 2016
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Damaeus (D.) maximus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Damaeus (D.) opiloides* Norton, 1978
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Damaeus (D.) ortizi* Pérez-Íñigo, 1995
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (D.) pseudoauritus* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Damaeus (D.) recasensi* Capilla, 1971
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Damaeus (D.) riparius* Nicolet, 1855
(=*Damaeus alienus* Hull, 1915)
(=*Belba obscura* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Damaeus (D.) selgae* Pérez-Íñigo, 1966
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (D.) striatus* (Enami y Aoki, 1988) (*Tectodamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Damaeus (D.) tauricus* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Damaeus (D.) torquisetosus* (Mihelčič, 1955) (*Belba*)
(=*Damaeus ornatus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Damaeus (Adamaeus) Norton, 1977 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Damaeus onustus* Koch, 1841

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Damaeus (Adamaeus) onustus* Koch, 1841 (*D.*)

(=*Belba geniculosa* Oudemans, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente) y Etiópica: Tanzania e I. Santa Helena.

Damaeus (Epidamaeus) Bulanova-Zachvatkina, 1957 (82 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata bituberculata* Kulczynski, 1902

DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (Oriental y Neotropical).

- *Damaeus (Epidamaeus) aborigensis* (Behan-Pelletier y Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Epidamaeus) affinis* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Noreste de Paleártica occidental y Centroeste de Paleártica oriental).
- *Damaeus (Epidamaeus) aleinikovae* (Bulanova-Zachvatkina, 1964) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Damaeus (Epidamaeus) alticola* (Wang y Cui, 1996) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Damaeus (Epidamaeus) angulatus* (Fujikawa y Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) angustirostratus* (Bayartogtokh, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) aokii* (Bayartogtokh, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) arcticola* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) bahamensis* (Ermilov y Smit, 2017) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Bahamas.
- *Damaeus (Epidamaeus) bakeri* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) barbatulus* Choi, 2004 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Damaeus (Epidamaeus) bayartogtokhi* Subías, 2010

- (=*Epidamaeus granulatus* Bayartogtokh, 2000, "nom. praec." por Willmann, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia y China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) berlesei* Michael, 1898 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) bituberculatus* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Damaeus (Epidamaeus) brevisetosus* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) brevitibialis* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
- *Damaeus (Epidamaeus) canadensis* (Banks, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. oriental, y Canadá).
- *Damaeus (Epidamaeus) chukchi* (Behan-Pelletier y Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Siberia.
- *Damaeus (Epidamaeus) cincinnatus* (Wang y Norton, 1993) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Damaeus (Epidamaeus) coreanus* Aoki, 1966 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) coxalis* (Hammer, 1952) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) craigheadi* (Jacot, 1939) (*Metabelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Damaeus (Epidamaeus) crassisensillatus* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) culterisetosus* (Bayartogtokh, 2000) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) elegantis* (Wang y Norton, 1993) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) farinosus* (Trägårdh, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Suecia.
- *Damaeus (Epidamaeus) flagellatus* Wang, 1994 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) flagelloides* (Norton, 1979) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Ecuador).
- *Damaeus (Epidamaeus) flexispinosus* (Kunst, 1961) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) flexus* (Fujikawa y Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) floccosus* (Behan-Pelletier y Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) floridus* (Wilson, 1936) (*Belba globifer f.*)
(=*Belbaalachua* Wilson, 1936)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Damaeus (Epidamaeus) folium* (Fujikawa y Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) fortisensillus* (Enami y Aoki, 2001) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) fortispinosus* (Hammer, 1967) (*E.*)
(?= *Oribata traegardhi* Graversen, 1931 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Damaeus (Epidamaeus) fragilis* (Enami y Fujikawa, 1989) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) fujikawae* Subías, 2010
(=*Epidamaeus bacillum* Fujikawa y Fujita, 1985, "nom. praec." por Kulczynski, 1926)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) gibbofemoratus* (Hammer, 1955) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Damaeus (Epidamaeus) gilyarovi* (Behan-Pelletier y Norton, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Epidamaeus) globifer* Ewing, 1913 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Damaeus (Epidamaeus) groenlandicus* (Hammer, 1953) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Groenlandia y Oeste de Siberia).
- *Damaeus (Epidamaeus) hammerae* (Behan-Pelletier y Norton, 1983) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Damaeus (Epidamaeus) hastatus* (Hammer, 1967) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.

- *Damaeus (Epidamaeus) inornatus* Strenzke, 1952 (D.) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Groenlandia.
- *Damaeus (Epidamaeus) johnstoni* (Tolstikov, 1997) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Damaeus (Epidamaeus) kanbulaensis* (Xie y Yang, 2011) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Damaeus (Epidamaeus) karelicus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Europa.
- *Damaeus (Epidamaeus) khustaiensis* (Bayartogtokh, 2000) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) kodiakensis* (Hammer, 1967) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional, Este de Paleártica oriental).
- *Damaeus (Epidamaeus) koyukon* (Behan-Pelletier y Norton, 1985) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) longispinosus* (Wang y Norton, 1993) (E.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental y España.
- *Damaeus (Epidamaeus) mackenziensis* (Hammer, 1952) (Belba)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) mayangheensis* (Xie y Yang, 2011) (E.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) michaeli* Ewing, 1909 (D.) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Damaeus (Epidamaeus) microspinus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Damaeus (Epidamaeus) microtuberculatus* (Bayartogtokh, 2004) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) mitlsensillus* (Palacios-Vargas, 1984) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Damaeus (Epidamaeus) munkhbayari* (Bayartogtokh, Burkhitbaeva y Enkhbayar, 2016) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) nasutus* (Behan-Pelletier y Norton, 1985) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) oharensis* (Enami, 1992) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) olitor* (Jacot, 1937) (Belba) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) paraspinosus* (Bulanova-Zachvatkina, 1975) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Siberia).
- *Damaeus (Epidamaeus) parayunnanensis* (Ermilov y Kalúz, 2013) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Damaeus (Epidamaeus) pavlovskii* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Damaeus (Epidamaeus) pinguis* (Kulijev, 1967) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Damaeus (Epidamaeus) plumosus* (Bulanova-Zachvatkina, 1975) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) puritanicus* (Banks, 1906) (Oribata)
(=*Epidamaeus grandjeani* Bulanova-Zachvatkina, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Damaeus (Epidamaeus) pyrenaicus* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (E.)
(=*Epidamaeus ibericus* Moraza, Moreno y Saloña, 1991)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeus (Epidamaeus) robustus* (Mihelčič, 1955) (Porobelba (Belba)) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Epidamaeus) smirnovi* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (D. (*Hypodamaeus*))
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).
- *Damaeus (Epidamaeus) subiasi* (Pérez-Íñigo, 1995) (E.)
DISTRIBUCIÓN: España.
- Damaeus (Epidamaeus) tatricus* (Kulczynski, 1902) (Oribata)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Damaeus (Epidamaeus) tatricus tatricus* (Kulczynski, 1902)
(=*Epidamaeus pseudotatricus* Bulanova-Zachvatkina, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Damaeus (Epidamaeus) tatricus diversus* (Mihelčič, 1952) (Belba) “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Epidamaeus) tenuisetosus* (Bayartogtokh, 2001) (E.)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Damaeus (Epidamaeus) tenuissimus* (Hammer, 1967) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Damaeus (Epidamaeus) tenuitibialis* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (*D. (Hypodamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte).
- *Damaeus (Epidamaeus) trigonalis* Strenzke, 1952 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Groenlandia.
- *Damaeus (Epidamaeus) tritylos* (Behan-Pelletier y Norton, 1983) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Este de Rusia asiática).
- *Damaeus (Epidamaeus) uenoi* (Aoki, 1966) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Damaeus (Epidamaeus) variabilis* (Fujikawa y Fujita, 1985) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Japón y Norte de China).
- *Damaeus (Epidamaeus) verrucatus* (Enami y Fujikawa, 1989) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Damaeus (Epidamaeus) weigmanni* (Bayartogtokh, 2004) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Epidamaeus) yunnanensis* (Enami, Aoki y Hu, 1994) (*E.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroccidental.

***Damaeus (Eudamaeus)* Pérez-Íñigo, 1987 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Damaeus (Eudamaeus) pomboi* Pérez-Íñigo, 1987

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Damaeus (Eudamaeus) pomboi* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

***Damaeus (Kunstdamaeus)* Miko, 2006 (10 spp. y 2 sspp.)**

ESPECIE TIPO: *Belba lengersdorfi* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Damaeus (Kunstdamaeus) arcticus* (Miko y Monson, 2013) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) diversipilis* (Willmann, 1951) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) fraterculus* (Miko, 2010) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) granulatus* (Willmann, 1951) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) lengersdorfi* (Willmann, 1932) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) lengersdorfi lengersdorfi* (Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) lengersdorfi moraviae* (Willmann, 1954) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) longisetosus* (Willmann, 1953) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) nidicola* (Willmann, 1936) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) nivalis* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Polonia y U.S.A. (Ténesi).

***Damaeus (Kunstdamaeus) tecticola* Michael, 1888 (*D.*)**

DISTRIBUCIÓN: Europea.

- *Damaeus (Kunstdamaeus) tecticola tecticola* Michael, 1888
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) tecticola romaniae* Cooreman, 1951 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Damaeus (Kunstdamaeus) tenuipes* Michael, 1885 (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa occidental: I. Británicas, Oeste de Paleártica oriental, I. Kuriles y Groenlandia).

***Damaeus (Paradamaeus)* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Notaspis clavipes* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Damaeus (Paradamaeus) clavipes* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Oppia glaucina* Koch, 1836)
(=*Damaeus nodipes* Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente).

***Damaeus (Spatiodamaeus)* Bulanova-Zachvatkina, 1957 (12 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Damaeus verticillipes* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Damaeus (Spatiodamaeus) bomeensis* (Xie, D. Huang, Yan, Huang y Yang, 2012) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) boreus* Bulanova-Zachvatkina, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) crassispinosus* Mihelčič, 1964 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) fageti* Bulanova-Zachvatkina, 1957
DISTRIBUCIÓN: Europea y Mongolia.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) glabrisetus* (Willmann, 1930) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (excepto Oeste).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) kamaensis* (Sellnick, 1926) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) mongolicus* (Bayartortogkh, 2000) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia y Norte de China.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) nortoni* (Bayartogtokh, 2004) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Damaeus (Spatiodamaeus) quadrituberculatus* (Bulanova-Zachvatkina, 1957) (*Epidamaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (excepto Oeste).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) setiger* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental (excepto Norte).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) verticillipes* (Nicolet, 1855) (*D.*)
(=*Belba mirabilis* Karpelles, 1893)
(=*Damaeus quadrihastatus* Märkel y Meyer, 1960)
(=*Belba similis* Willmann, 1954)
(=*Damaeus (Spatiodamaeus) subverticillipes* Bulanova-Zachvatkina, 1957)
(?=*Damaeus torvus* Koch, 1835 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, y U.S.A.: Nueva Hampshire).
- *Damaeus (Spatiodamaeus) yushuensis* Xie, Yan, Huang y Yang, 2011 (*D. (Paradamaeus)*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Dameobelba Sellnick, 1928 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata minutissima* Sellnick, 1920

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Dameobelba minutissima* (Sellnick, 1929) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).

Metabelba Grandjean, 1936 (32 spp.)

ESPECIE TIPO: *Damaeus papillipes* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

Metabelba (Metabelba) Grandjean, 1936 (16 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

- *Metabelba (M.) aphelesa* (Woolley e Higgins, 1979) (*Dasybelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Metabelba (M.) benoiti* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Metabelba (M.) heteropoda* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Metabelba (M.) horrida* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Metabelba (M.) limasetosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1962) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Metabelba (M.) obtusa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Norte de India.
- *Metabelba (M.) orientalis* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Metabelba (M.) papillipes* (Nicolet, 1855) (*Damaeus*)
(=*Metabelba cremersi* Hammen, 1952)
(=*Belba globipes* Canestrini y Berlese, 1884)
(=*Belba michaeli* Oudemans, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Oeste de Siberia y U.S.A.).
- *Metabelba (M.) parapulverosa* Moritz, 1966
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (M.) propexa* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Metabelba (M.) propinqua* (Sellnick, 1943) (*Damaeus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Metabelba (M.) pulverulenta* (Koch, 1839) (*Nothrus*)
(=*Nothrus pollinosus* Koch, 1839)
(=*Metabelba pulverosa* Strenzke, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).
- *Metabelba (M.) rara* Bulanova-Zachvatkina, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Oeste de Siberia).
- *Metabelba (M.) rohdendorfi* Bulanova-Zachvatkina, 1965
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Metabelba (M.) singularis* Mihelčič, 1964
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Metabelba (M.) tanganyikensis* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Metabelba (Neobelba) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (15 spp.)

(=*Pateribelba* Mourek, Miko y Bernini, 2011)

ESPECIE TIPO: *Neobelba pseudopapillipes* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Metabelba (Neobelba) centurion* Miko, Mourek y Ermilov, 2014 (*M. (Pateribelba)*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Metabelba (Neobelba) denscanis* Mourek, Miko y Bernini, 2011 (*M. (Pateribelba)*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Metabelba (Neobelba) ericius* Kunst, 1958 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Metabelba (Neobelba) filippovae* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: **Paleártica meridional** (Cáucaso e Irán).
- *Metabelba (Neobelba) flagelliseta* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Metabelba (Neobelba) glabriseta* Mahunka, 1982 (*M.*)
(?= *Metabelba angolensis* Balogh, 1958 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Angola).
- *Metabelba (Neobelba) italica* (Sellnick, 1931) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (Neobelba) machadoi* Pérez-Íñigo, 1986 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Metabelba (Neobelba) monilipeda* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Metabelba (Neobelba) platynota* Grandjean, 1954 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Metabelba (Neobelba) pseudoitalica* Bulanova-Zachvatkina, 1965 (*M.*)
(=*Metabelba paraitalica* Kulijev, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Metabelba (Neobelba) pseudopapillipes* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Metabelba (Neobelba) rhodopeia* Kunst, 1961 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Metabelba (Neobelba) romandiola* (Sellnick, 1943) (*Damaeus*)
(=*Metabelba gladiator* Mihelčič, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Metabelba (Neobelba) sphagni* Strenzke, 1950 (*M.*)
(=*Metabelba lanceolata* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.

Metabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967 (12 spp.)

(=*Allobelba* Kunst, 1961)

ESPECIE TIPO: *Metabelbella zachvatkini* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Metabelbella aculeata* (Kunst, 1961) (*Allobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Metabelbella clavigera* (Willmann, 1954) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Metabelbella epidamaeiformis* Ermilov, Shtanchaeva y Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Metabelbella gratiosa* (Willmann, 1940) (*Belba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental (excepto Norte).
- *Metabelbella interlamellaris* Pérez-Íñigo, 1987

- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Metabelbella janae* Pérez-Íñigo jr., 1991
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Metabelbella kosarovi* Jeleva, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
 - *Metabelbella macerochaeta* Bulanova-Zachvatkina, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Metabelbella phalangioides* (Michael, 1890) (*Damaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Metabelbella soror* Bulanova-Zachvatkina, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Europa oriental central.
 - *Metabelbella tichonravovi* Bulanova-Zachvatkina, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Crimea.
 - *Metabelbella zachvatkini* Bulanova-Zachvatkina, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.

Nortonbelba Bernini, 1980 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Nortonbelba italica* Bernini, 1980

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Nortonbelba italica Bernini, 1980

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Nortonbelba italica italica* Bernini, 1980

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Nortonbelba italica plesiomorphica* (Saloña e Iturrondobeitia, 1989) (*Epidamaeus p.*)

DISTRIBUCIÓN: España.

Parabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967 (31 spp.)

ESPECIE TIPO: *Parabelbella crenatosetosa* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical, Oriental y "Australiana".

Parabelbella (Parabelbella) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (10 spp.)

(=*Akrodamaeus* Norton, 1979)

(=*Heterodamaeus* Mihelčič, 1964, "nom. praec." por Ewing, 1917)

(=*Mirobelba* Pérez-Íñigo y Peña, 1994)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Parabelbella (P.) crenatosetosa* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Centro de Paleártica oriental.

- *Parabelbella (P.) dimidiaspina* Xie, Yan y Yang, 2013

DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

- *Parabelbella (P.) elisabethae* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Centro de Rusia europea y Paleártica oriental meridional).

- *Parabelbella (P.) exilior* (Mihelčič, 1964) (*Damaeus (Heterodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Parabelbella (P.) flagellata* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Metabelba*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Chile).

- *Parabelbella (P.) golosovae* (Ljashev y Tolstikov, 1993) (*Epidamaeus (Akrodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Parabelbella (P.) grancanariae* (Pérez-Íñigo y Peña, 1994) (*Mirobelba*)

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Parabelbella (P.) inaequipipes* (Banks, 1947) (*Belba*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Parabelbella (P.) longiseta* (Banks, 1906) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Parabelbella (P.) meridiana* (Norton, 1979) (*Epidamaeus (Akrodamaeus)*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

Parabelbella (Nododamaeus) Hammer, 1977 (2 spp.)

(=*Dasybelba* Woolley e Higgins, 1979)

ESPECIE TIPO: *Nododamaeus monticola* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Parabelbella (Nododamaeus) monticola* (Hammer, 1977) (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Parabelbella (Nododamaeus) perona* (Woolley e Higgins, 1979) (*Dasybelba*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Parabelbella (Tectodamaeus) Aoki, 1984 (19 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tectodamaeus armatus* Aoki, 1984

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y “Australiana”.

- *Parabelbella (Tectodamaeus) armata* (Aoki, 1984) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: China suroriental e India (Arunachal Pradesh).
- *Parabelbella (Tectodamaeus) bawanglingensis* (Xie, Yan, Zhou y Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) breviseta* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) cuii* (Wang y Lu, 1995) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) daliensis* (Xie y Yang, 2009) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) exserta* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) exspinosa* (Wang y Norton, 1989) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) femurgibbus* (Xie, Yan, Zhou y Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) furcata* (Wang y Lu, 1995) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) heterotricha* (Ermilov y Anichkin, 2014) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) interlamellaris* (Willmann, 1939) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Macaronésica: Madeira, y Crimea).
- *Parabelbella (Tectodamaeus) kuankuoshuiensis* (Xie, Yan, Zhou y Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) macropoda* (Berlese, 1905) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) obscurusgibbus* (Xie, Yan, Zhou y Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) spiniger* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) subtilis* (Canestrini, 1897) (*Belba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) subtilisfinem* (Xie, Yan, Zhou y Yang, 2016) (*Damaeus (T.)*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) wulongensis* (Wang y Cui, 1992) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Parabelbella (Tectodamaeus) yaoi* (Wang, 1994) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Porobelba Grandjean, 1936 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata spinosa* Sellnick, 1920

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Porobelba grandjeanica* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Porobelba spinosa* (Sellnick, 1920) (*Oribata*)
(=*Belba parvula* Mihelčič, 1955)
(=*Belba parvula* Mihelčič, 1956, “nom. praec.” por Mihelčič, 1955)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Porobelba weigmanni* Miko, 2008
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.

Subbelba Bulanova-Zachvatkina, 1967 (15 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Subbelba partiocrispa* Bulanova-Zachvatkina, 1967

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

Subbelba (Subbelba) Bulanova-Zachvatkina, 1967 (3 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- Subbelba (S.) elisae* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba (S.) elisae elisae* Pérez-Íñigo, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba (S.) elisae fuerteventurae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba (S.) elisae grancanariae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Subbelba (S.) montana* (Kulczynski, 1902) (*Oribata*)

- (=*Belba ursina* Thor, 1930)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Euroatlántica, Cáucaso y Asia centrooccidental).
 - *Subbelba (S.) partiocrispa* Bulanova-Zachvatkina, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental y Siberia).

***Subbelba (Dyobelba)* Norton, 1979 (11 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Oribata carolinensis* Banks, 1947

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Subbelba (Dyobelba) armata* (Norton, 1979) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Subbelba (Dyobelba) behanae* (Bayartogtokh y Norton, 2007) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Subbelba (Dyobelba) biclavata* (Wang y Norton, 1993) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Subbelba (Dyobelba) carolinensis* (Banks, 1947) (*Oribata*)
 (= *Oribata diversipes* Banks, 1947)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Subbelba (Dyobelba) crossleyi* (Bayartogtokh y Norton, 2007) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Subbelba (Dyobelba) dindali* (Bayartogtokh y Norton, 2007) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.
- *Subbelba (Dyobelba) granulata* (Bayartogtokh y Norton, 2007) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Subbelba (Dyobelba) kushiroensis* (Enami y Aoki, 2001) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Subbelba (Dyobelba) paucituberculata* (Bayartogtokh, Choi y Aoki, 2001) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Subbelba (Dyobelba) reevesi* (Norton y Rjabinin, 1994) (*D.*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Subbelba (Dyobelba) tectopediosa* (Jacot, 1938) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. suroriental.

***Subbelba (Quatrobrelba)* Norton, 1980 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: (*Quatrobrelba montana* Norton, 1980, "nom. praec." por Kulczynski, 1902) = *Subbelba (Quatrobrelba) neonominata* Subías, 2004

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Subbelba (Quatrobrelba) neonominata* Subías, 2004
 (= *Quatrobrelba montana* Norton, 1980, "nom. praec." por Kulczynski, 1902)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.

***Tamdamaeus* Miko y Ermilov, 2017 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Tamdamaeus staryi* Miko y Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Tamdamaeus staryi* Miko y Ermilov, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

***Weigmannia* Miko y Norton, 2010 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Porobelba parki* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.

- *Weigmannia parki* (Jacot, 1937) (*Porobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental y U.S.A. (Florida).

Polypterozetoidea Grandjean, 1959

Polypterozetidae Grandjean, 1959 (1 gen. y 1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

***Polypterozetes* Berlese, 1916 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Polypterozetes cherubin* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Polypterozetes cherubin* Berlese, 1916
 DISTRIBUCIÓN: Italia.

Podopterotegaeidae Piffel, 1972 (1 gen. y 4 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

***Podopterotegaeus* Aoki, 1969 (4 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Podopterotegaeus tectus* Aoki, 1969

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Podopterotegaeus altimonticola* Piffel, 1972

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Podopterotegaeus bisetus* Pankov, 1984

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Podopterotegaeus miyamaensis* Fujikawa, 2008

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Podopterotegaeus tectus* Aoki, 1969

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental: frecuente, y Neártica septentrional) y Noreste de Oriental.

Eutegaeoidea Balogh, 1965

Compactozetidae Luxton, 1988 (15 gen., 84 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Cepheus Koch, 1835 (26 spp.)

(=*Pelonia* Grube, 1859)

ESPECIE TIPO: *Cepheus latus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australianooriental y "Etiópica").

- *Cepheus brachiatus* Sitnikova, 1975

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa oriental y Paleártica oriental).

- *Cepheus caucasicus* Sitnikova, 1975

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Cepheus cepheiformis* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*)

(=*Cepheus michaeli* Jacot, 1928)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Carolina del Norte) y China suroccidental.

- *Cepheus corae* Jacot, 1928

DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente).

- *Cepheus dentatus* (Michael, 1888) (*Tegeocranus*)

(=*Cepheus grandis* Sitnikova, 1975)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (frecuente) y Este de Rusia asiática.

- *Cepheus foliosus* (Grube, 1859) (*Pelonia*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Cepheus gracilipes* (Canestrini, 1897) (*Tegeocranus*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Cepheus granulatus* Mihelčič, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Cepheus heterosetosus* (Sitnikova, 1975) (*Oribatodes*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental: excepto Norte.

- *Cepheus hokkaiensis* Fujikawa, 1992

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Cepheus incisus* Mihelčič, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Cepheus jindingensis* Wen y Sun, 1990

DISTRIBUCIÓN: China suroccidental.

- *Cepheus kurosawai* Aoki, 1986

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Cepheus latus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Oriental (China suroccidental y Nepal).

- *Cepheus lobatus* Mihelčič, 1953 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Cepheus pegazzanoae* Bernini y Nannelli, 1982

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Cepheus pertusus* Haupt, 1882 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Cepheus pustulatus* (Pearce, 1910) (*Tegeocranus*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Cepheus ramosus* (Thor, 1912) (*Tegeocranus*) "sp. inq." (**juvenil**)

DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).

- *Cepheus similis* Fujikawa, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Cepheus spinosus* Fujikawa, 2004

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Cepheus takasago* Aoki, 1991

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Cepheus transversalis* Balogh, 1958 "sp. inq."

- DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Cepheus transylvanicus* Cooreman, 1951
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Cepheus tuberculatus* Strenzke, 1951
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental: excepto Norte.
 - *Cepheus verrucosus* Bernini, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Compactozetes Hammer, 1966 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Compactozetes rotoruensis* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Compactozetes hastatus* Hammer, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Compactozetes niger* Hammer, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Compactozetes rotoruensis* Hammer, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Compactozetes serratus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Compactozetes zeugus* Luxton, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Conoppia Berlese, 1908 (2 spp.)

(=*Balzanina* Jacot, 1929)

(=*Phyllothegeus* Berlese, 1913)

ESPECIE TIPO: (*Oppia microptera* Berlese, 1885) =*Leiosoma palmicinctum* Michael, 1880

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental y Neotropical).

- *Conoppia palmicincta* (Michael, 1880) (*Leiosoma*)
 (= *Cepheus feideri* Suciú y Panu, 1972)
 (= *Oppia microptera* Berlese, 1885)
 (= *Oribata microptera* Canestrini, 1896, "nom. praec." por Berlese, 1885)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental centromeridional: frecuente, Este de Paleártica oriental y U.S.A.), Oriental: Taiwán [Formosa] e India (Sikkim), y Bolivia.
- *Conoppia setiformis* Golosova y Karppinen, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.

Eupterotegaeus Berlese, 1916 (9 spp.)

(=*Diodontocephalus* Mihelčič, 1958)

ESPECIE TIPO: *Tegeocranus ornatissimus* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Eupterotegaeus armatus* Aoki, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Eupterotegaeus dentatus* Sitnikova, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eupterotegaeus flavus* (Ewing, 1918) (*Cepheus*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Eupterotegaeus nasalis* Sitnikova, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Eupterotegaeus ornatissimus* (Berlese, 1908) (*Tegeocranus*)
 (?=*Cepheus pseudosculptus* Coggi, 1900 "sp. inq.")
 (= *Diodontocephalus steinboecki* Mihelčič, 1958)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica meridional, I. Sajalín y Canadá).
- *Eupterotegaeus rhamphosus* Higgins y Woolley, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (Noroeste de U.S.A. y Canadá).
- *Eupterotegaeus rostratus* Higgins y Woolley, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. occidental y Canadá).
- *Eupterotegaeus spinatus* Higgins y Woolley, 1963
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Eupterotegaeus xizangensis* Wang y Solhøy, 2001
 DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

Hypocephalus Krivolutsky, 1971 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hypocephalus mirabilis* Krivolutsky, 1971

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Hypocephalus helveticus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Europea (Suiza y **Turquía**).
- *Hypocephalus krivolutskyi* Călugăr y Vasiliu, 1976

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Hypocephalus mirabilis* Krivolutsky, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Ommatocephalus Berlese, 1913 (5 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Cepheus ocellatus* Michael, 1882

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Ommatocephalus clavatus* Woolley e Higgins, 1964

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental: Japón e I. Kuriles, y U.S.A. oriental).

- *Ommatocephalus clavatus clavatus* Woolley e Higgins, 1964

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

- *Ommatocephalus clavatus japonicus* Aoki, 1974

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Ommatocephalus crassisetosus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Ommatocephalus ocellatus* (Michael, 1882) (*Cepheus*)

(=*Scutovertex pulcherrimus* Berlese, 1913)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, e India: Himalaya).

- *Ommatocephalus parvilamellatus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996

DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

- *Ommatocephalus reticulatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Oribatodes Banks, 1895 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribatodes mirabilis* Banks, 1895

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Oribatodes crenulatus* Csiszár, 1962

DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.

- *Oribatodes mirabilis* Banks, 1895

(=*Cepheus lamellatus* Banks, 1906)

(=*Tegeocranus longisetus* Berlese, 1910)

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Pilocephalus Pérez-Íñigo, 1992 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pilocephalus azoricus* Pérez-Íñigo, 1992

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Pilocephalus azoricus* Pérez-Íñigo, 1992

DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Protocephalus Jacot, 1928 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tegeocranus hericius* Michael, 1888

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Protocephalus hericius* (Michael, 1888) (*Tegeocranus*)

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

Reticulocephalus Vasiliu y Călugăr, 1977 (5 spp.)

(=*Cubacephalus* Balogh y Mahunka, 1979)

(=*Geocephalus* Sitnikova, 1979)

ESPECIE TIPO: *Reticulocephalus decoui* Vasiliu y Călugăr, 1977

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Holártica.

- *Reticulocephalus areolatus* (Sitnikova, 1979) (*Geocephalus*)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Reticulocephalus decoui* Vasiliu y Călugăr, 1977

(=*Cepheus (Cubacephalus) lobatus* Balogh y Mahunka, 1979)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Reticulocephalus grandis* (Sitnikova, 1979) (*Geocephalus*)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Reticulocephalus mirabiloides* (Jacot, 1938) (*Cepheus*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Reticulocephalus reticulatus* (Sitnikova, 1979) (*Geocephalus*)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Sadocephalus Aoki, 1965 (13 spp. y 1 ssp.)

(=*Hamotegeus* Balogh y Mahunka, 1969)

ESPECIE TIPO: *Sadocephalus undulatus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Pantropical: excepto Etiópica).

- *Sadocephalus breviseta* (P. Balogh, 1986) (*Hamotegeus*)

- DISTRIBUCIÓN: Colombia.
 - *Sadocepheus donvictorianoensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Sadocepheus dubius* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Sadocepheus elevatus* Mahunka, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Sadocepheus foveolatus* Luxton, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Sadocepheus franzi* (P. Balogh, 1986) (*Hamotegeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Sadocepheus granulatus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Hamotegeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).
 - *Sadocepheus longiseta* (P. Balogh, 1986) (*Hamotegeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Colombia.
 - *Sadocepheus makarchevae* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Sadocepheus subniger* (Ewing, 1917) (*Tegeocranus*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Iowa).
 - *Sadocepheus tohokuensis* Fujikawa, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
Sadocepheus undulatus Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Sadocepheus undulatus undulatus* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Sadocepheus undulatus setiger* Fujita y Fujikawa, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Sadocepheus yakuensis* Aoki, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Sphodrocephus Woolley e Higgins, 1963 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sphodrocephus tridactylus* Woolley e Higgins, 1963

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Sphodrocephus anthelionus* Woolley e Higgins, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (Noroeste de U.S.A. y Canadá).
- *Sphodrocephus dentatus* Fujikawa, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Sphodrocephus mitratus* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Sphodrocephus tridactylus* Woolley e Higgins, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. occidental y Cáucaso) y Oriental (Noreste de India).
- *Sphodrocephus tuberculatus* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal) y Méjico.

Tereticepheus S. y F. Bernini, 1990 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tereticepheus annamariae* S. y F. Bernini, 1990

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Tereticepheus annamariae* S. y F. Bernini, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Argelia.
- *Tereticepheus undulatus* (Willmann, 1939) (*Cepheus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Tikizetes Hammer, 1967 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tikizetes spinipes* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Tikizetes spinipes* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tritegeus Berlese, 1913 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Cepheus bifidatus* Nicolet "sensu" Michael, 1880) = *Tritegeus bisulcatus* Grandjean, 1953

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Tritegeus bisulcatus* Grandjean, 1953
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Tritegeus brevisetus* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Tritegeus major* Golosova y Karppinen, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

- *Tritegeus sculptus* S. y F. Bernini, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Cerocephidae Mahunka, 1986 (3 gen. y 6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical).

- Bornebuschia*** Hammer, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Bornebuschia peculiaris* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Bornebuschia binodosa* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Bornebuschia peculiaris* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- Cerocephus*** Trägårdh, 1931 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Cerocephus mirabilis* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Cerocephus mirabilis* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

- Dicrotegaeus*** Luxton, 1988 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dicrotegaeus mirabilis* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Dicrotegaeus incurvus* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Dicrotegaeus mariehammerae* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Dicrotegaeus mirabilis* Luxton, 1988
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Eutegaeidae Balogh, 1965 (9 gen. y 28 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Holártica).

- Atalotegaeus*** Luxton, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eutegaeus mensarosi* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Atalotegaeus mensarosi* (J. y P. Balogh, 1983) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

- Birotegaeus*** Luxton, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Eutegaeus biroi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Birotegaeus biroi* (Balogh, 1970) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- Dudichella*** Balogh, 1970 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Dudichella membranigera* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Dudichella membranigera* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka] y Melanesia (I. Fiji).

- Eutegaeus*** Berlese, 1916 (10 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata bostocki* Michael, 1908
DISTRIBUCIÓN: Australiana, Neotropical y Antártica.
- *Eutegaeus biovatus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Eutegaeus bostocki* (Michael, 1908) (*Oribata*)
(=*Eutegaeus curviseta* Hammer, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Antártica (I. Campbell).
- *Eutegaeus fueginus* Arcidiacono, 1993
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Eutegaeus lagrecai* Arcidiacono, 1993
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Eutegaeus membraniger* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eutegaeus papuensis* Aoki, 1964
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Eutegaeus pinnatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eutegaeus radiatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eutegaeus soror* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Eutegaeus stylesi* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Neoeutegaeus Aoki, 1964 (3 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Eutegaeus silvicola* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).
- *Neoeutegaeus africanus* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
 - *Neoeutegaeus phyllophorus* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Neoeutegaeus silvicola* (Hammer, 1962) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Neseutegaeus Woolley, 1965 (7 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Neseutegaeus spinatus* Woolley, 1965
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Neseutegaeus angustus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Neseutegaeus consimilis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Neseutegaeus denticulatus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Neseutegaeus distentus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Neseutegaeus latus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Neseutegaeus monteithi* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Neseutegaeus spinatus* Woolley, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Pareutegaeus Woolley, 1965 (2 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Eutegaeus similis* Trägårdh, 1931
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Pareutegaeus pulcher* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Pareutegaeus similis* (Trägårdh, 1931) (*Eutegaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

Porrhotegaeus Balogh y Mahunka, 1966 (2 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Porrhotegaeus ornatus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Porrhotegaeus herminae* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
 - *Porrhotegaeus ornatus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Pterozetes Hammer, 1966 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Pterozetes novaezealandicus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Pterozetes novaezealandicus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Salvidae Özdikmen, 2008 (1 gen. y 1 sp.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Salvus Özdikmen, 2008 (1 sp.)

- (=*Brazilobates* Koçak y Kemal, 2008 “nom. praec.” por Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)
(=*Pterobates* Balogh y Mahunka, 1977 “nom. praec.” por Bezzi, 1924)
ESPECIE TIPO: *Pterobates incertus* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Salvus incertus* (Balogh y Mahunka, 1977) (*Pterobates*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Nodocepheidae Piffel, 1972 (2 gen., 7 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica).

Nemacepheus Aoki, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Nemacepheus dentatus* Aoki, 1968

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Nemacepheus dentatus* Aoki, 1968

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).

Nodocepheus Hammer, 1958 (6 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Nodocepheus dentatus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.

- *Nodocepheus baloghi* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Madagascar).

- *Nodocepheus cerebralis* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego) y Cuba.

Nodocepheus dentatus Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Australiana (Nueva Zelanda), Oriental (Vietnam) y subantártica.

- *Nodocepheus dentatus dentatus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Vietnam) y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Nodocepheus dentatus barbatus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda) y subantártica (I. Amsterdam).

- *Nodocepheus hammerae* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Nodocepheus laterodentatus* Piffel, 1972

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Nodocepheus minimus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Tumerozetidae Hammer, 1966 (1 gen. y 5 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Tumerozetes Hammer, 1966 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tumerozetes bifurcatus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Tumerozetes bifurcatus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Tumerozetes circularis* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Tumerozetes indistinctus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Tumerozetes parallelus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Tumerozetes pumilis* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Gustavioidea Oudemans, 1900

Astegistidae Balogh, 1961 (9 gen., 1 subg. y 58 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Astegistes Hull, 1916 (2 spp.)

(=*Cultrozetes* Sellnick, 1922)

ESPECIE TIPO: (*Liacarus bicornis* Warburton y Pearce, 1905) =*Zetes pilosus* Koch, 1841

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Astegistes hallaensis* Choi, 1998

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Astegistes pilosus* (Koch, 1841) (*Zetes*)

(=*Liacarus bicornis* Warburton y Pearce, 1905)

(=*Sphaerozetes comelicensis* Lombardini, 1962)

(?=*Acarus muscorum* Scopoli, 1763 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Paleártica oriental meridional.

Cultroribula Berlese, 1908 (26 spp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis juncta* Michael, 1885

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Cultroribula almagulae* Poltavskaja, 1994
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Cultroribula angulata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cultroribula arctica* Poltavskaja, 1994
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Oeste).
- *Cultroribula argentinensis* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador).
- *Cultroribula berolina* Weigmann, 2006
DISTRIBUCIÓN: Alemania y Mongolia.
- *Cultroribula bicultrata* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)
(=*Cultroribula falcata* Evans, 1952)
(=*Cultroribula szentivanyi* Balogh, 1943)
(=*Cultroribula trifurcata* Jacot, 1939)
(=*Cultroribula trifurcata rotundata* Krivolutsky, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Java.
- *Cultroribula bicuspidata* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Oriental y Neotropical (Centroamérica y Chile).
- *Cultroribula brasiliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1997
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Cultroribula castriensis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Cultroribula confinis* Berlese, 1908
(=*Cultroribula divergens* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Europa meridional).
- *Cultroribula diversa* Oudemans, 1915
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Cultroribula elongata* Fujikawa, 1972
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Cultroribula humerata* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Cultroribula juncta* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Este de Rusia asiática y U.S.A. oriental).
- *Cultroribula lata* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Italia y Paleártica oriental), Oriental y Australiana (Australia y Nueva Zelanda).
- *Cultroribula laticuspsis* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Cultroribula ligulata* Grishina, 1980
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Cultroribula magnifica* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
- *Cultroribula neonominata* Subías, 2004
(=*Cultroribula tridentata* Aoki, 1965, “nom. praec.” por Mihelčič, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Cáucaso y Sureste de Paleártica oriental (frecuente).
- *Cultroribula otagoensis* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Cultroribula quinquesetosa* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Cultroribula shukuminensis* Nakatamari, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cultroribula tridentata* Mihelčič, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Cultroribula tropica* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Angola).
- *Cultroribula variolosa* Fujikawa, 1991
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Cultroribula zicsii* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Furcoppia Balogh y Mahunka, 1969 (18 spp.)

ESPECIE TIPO: *Furcoppia imitans* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Furcoppia (Furcoppia) Balogh y Mahunka, 1969 (10 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Furcoppia (F.) americana* Pérez-Íñigo y Baggio, 1994
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Furcoppia (F.) cattienica* Ermilov y Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Furcoppia (F.) cornuta* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) e India (Bengala Occidental).
- *Furcoppia (F.) groblerae* Subías, 2010
(=*Furcoppia dentata* Grobler, 2003, "nom. praec." por Willmann, 1950)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) horakae* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Furcoppia (F.) imitans* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) longiseta* Grobler, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) minuta* Grobler, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Furcoppia (F.) parva* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Furcoppia (F.) tricornuta* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Furcoppia (Mexicoppia) Mahunka, 1983 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Furcoppia (Mexicoppia) hauseri* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Furcoppia (Mexicoppia) altaica* (Bayartogtokh, 2012) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Furcoppia (Mexicoppia) breviclavata* (Aoki, 1984) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Furcoppia (Mexicoppia) dentata* (Willmann, 1950) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal, Mongolia y China (Tíbet).
- *Furcoppia (Mexicoppia) hauseri* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Furcoppia (Mexicoppia) microdentata* (Krivolutsky, 1962) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Ucrania, y Este de Paleártica oriental) y Méjico.
- *Furcoppia (Mexicoppia) rarisetosa* (Bayartogtokh, 2012) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Furcoppia (Mexicoppia) taigagica* (Bayartogtokh, 2007) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Furcoppia (Mexicoppia) vtorovi* (Krivolutsky, 1971) (*Cultroribula*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica oriental meridional y Neártica).

Furcoribula Balogh, 1943 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis furcillata* Nordenskiöld, 1901

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.

- *Furcoribula bilamellata* (Hall, 1911) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Furcoribula furcillata* (Nordenskiöld, 1901) (*Notaspis*)
(=*Notaspis bicuspidata* Štorkán, 1925)
(=*Eremaeus copulatus* Oudemans, 1906)
(=*Cultroribula confinis magna* Ewing, 1917)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centrooriental, Paleártica oriental y U.S.A.: Illinois) y Etiopía.
- *Furcoribula pacifica* Krivolutsky, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
- *Furcoribula tridentata* Wen, 1991
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Furcoribula yichunensis* Wen y Gao, 1999
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Lamellozetes Covarrubias, 1967 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lamellozetes pseudoareolatus* Covarrubias, 1967

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Lamellozetes chilensis* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Lamellozetes pseudoareolatus* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Maorizetes Hammer, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Maorizetes ferox* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Maorizetes ferox* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Bengala Occidental).

Monofurcoppia Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Furcoppia (Monofurcoppia) austroamericana* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Monofurcoppia austroamericana* (Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995) (*Furcoppia (M.)*)

DISTRIBUCIÓN: Uruguay.

Quadroribula J. y P. Balogh, 1992 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cultroribula quadrisetosa* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Australiana.

- *Quadroribula quadrisetosa* (J. y P. Balogh, 1983) (*Cultroribula*)

DISTRIBUCIÓN: Australia y Japón.

Sulcoribula Hammer, 1971 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sulcoribula laticuspidata* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Sulcoribula filipina* Corpuz-Raros y Lit, 2009

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Sulcoribula laticuspidata* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Multoribulidae Balogh, 1972 (2 gen. y 3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Multoribula Balogh y Mahunka, 1966 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Multoribula multipunctata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Australiana).

- *Multoribula multipunctata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Multoribula suramericana* Balogh y Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Chile.

Peloptoribula Mahunka, 1984 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Peloptoribula spinulosa* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Peloptoribula spinulosa* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ceratoppiidae Kunst, 1971 (16 gen., 1 subg., 67 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Amazoppia Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Amazoppia tricuspidata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Amazoppia tricuspidata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Austroceratoppia Hammer, 1979 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Austroceratoppia dentata* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.

- *Austroceratoppia crassiseta* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Ceratoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).

- *Austroceratoppia dentata* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Austroceratoppia japonica* Aoki, 1984

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.

- *Austroceratoppia sabahna* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Austroceratoppia serapi* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Ceratoppia Berlese, 1908 (22 spp. y 2 sspp.)

(?=*Notaspis* Hermann, 1804 “gen. inq.”)

ESPECIE TIPO: *Notaspis bipilis* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental, Neotropical y “Australiana”.

- *Ceratoppia abchasic* Krivolutsky y Tarba, 1971

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Ceratoppia acuminata* Golosova, 1981

(“non” *Murcia acuminata* Koch, 1841, =*Ceratoppia bipilis*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Norte de Oriental.

- *Ceratoppia altera* (Fujikawa, 2016) (*Ceratoppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Ceratoppia bipilis (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Norte de Oriental y Centroamérica.

- *Ceratoppia bipilis bipilis* (Hermann, 1804)

(=*Murcia acuminata* Koch, 1841)

(=*Oribata badius* Koch, 1839)

(=*Oppia cornuta* Koch, 1844)

(=*Ceratoppia herculeana* Berlese, 1908)

(=*Oribata politus* Koch y Berendt, 1854)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), Noreste de Oriental y ¿Centroamérica?

- *Ceratoppia bipilis curtispilis* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Ceratoppia bipilis spinipes* (Banks, 1906) (*Oppia* s.)

(=*Ceratoppia bipilis brevicuspis* Jacot, 1934)

(=*Oppia candensis* Banks, 1906)

(=*Oppia montana* Banks, 1906)

DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental (frecuente) y U.S.A. (Florida).

- *Ceratoppia clavisensillata* Choi, 1998

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Ceratoppia filipina* Corpuz-Raros y García, 2011

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Ceratoppia hungarica* (Tafner, 1905) (*Notaspis*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Hungría.

- *Ceratoppia incisa* Kaneko y Aoki, 1982

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Ceratoppia indentata* Lindo, 2011

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Ceratoppia longicuspis* Lindo, 2011

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Ceratoppia longifilis* (Canestrini, 1897) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Ceratoppia mongolica* Bayartogtokh, 2010

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Ceratoppia oblectatoria* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Ceratoppia offarostrata* Lindo, 2011

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.

- *Ceratoppia quadridentata* (Haller, 1882) (*Notaspis bipilis* q.)

(=*Ceratoppia quadridentata arctica* Hammer, 1955)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional) y China suroccidental.

- *Ceratoppia rara* Fujikawa, 2008

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Ceratoppia retilia* Li y H. Chen, 1990

DISTRIBUCIÓN: China suroccidental.

- *Ceratoppia sexpilosa* Willmann, 1938

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional).

- *Ceratoppia sphaerica* (L. Koch, 1879) (*Oppia*)

(=*Ceratoppia hoeli* Thor, 1930)

DISTRIBUCIÓN: Boreal.

- *Ceratoppia tofinoensis* Lindo, 2011

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Ceratoppia valerieae* Lindo, 2011

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Ceratoppia violabilis* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Ceratorchestes Balogh y Mahunka, 1969 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratorchestes setosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Ceratorchestes (Ceratorchestes) Balogh y Mahunka, 1969 (4 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ceratorchestes (C.) baloghi* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Ceratorchestes (C.) cornutus* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Ceratorchestes (C.) processus* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Ceratorchestes (C.) setosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).

Ceratorchestes (Paraceratorchestes) Ermilov y Kalúz, 2012 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ceratorchestes (Paraceratorchestes) globosus* Balogh y Mahunka, 1969 (C.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).

- *Ceratorchestes (Paraceratorchestes) melzeri* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Ceratorchestes (Paraceratorchestes) variabilis* Ermilov y Kalúz, 2012

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Comeremaeus Hammer, 1962 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Comeremaeus castaneus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Comeremaeus castaneus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Dendrozetes Aoki, 1970 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dendrozetes caudatus* Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Dendrozetes caudatus* Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Dendrozetes jordani* Lindo, Clayton y Behan-Pelletier, 2010

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Macquarioppia Wallwork, 1964 (1 sp.)

(=*Macquariella* Wallwork, 1963, "nom. praeoc." por Finlay, 1927)

ESPECIE TIPO: *Macquariella striata* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Macquarioppia striata* (Wallwork, 1963) (*Macquariella*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).

Metapyroppia Woolley, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Metapyroppia doratosa* Woolley, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neártica y Oriental.

- *Metapyroppia doratosa* Woolley, 1969

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ténesi).

- *Metapyroppia gigantea* Ermilov y Martens, 2014

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

Negroppia Vasiliu y Călugăr, 1977 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Negroppia cornuta* Vasiliu y Călugăr, 1977

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Negroppia cornuta* Vasiliu y Călugăr, 1977

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Notoppia Balogh y Mahunka, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Notoppia humerata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Notoppia humerata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Paraceratoppia Rjabinin, 1982 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Paraceratoppia meridionalis* Rjabinin, 1982

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Paraceratoppia asiatica* (Krivolutsky, 1965) (*Pyroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Norte de Rusia europea y Paleártica oriental).
- *Paraceratoppia meridionalis* Rjabinin, 1982
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.

Parapyroppia Pérez-Íñigo y Subías, 1979 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Parapyroppia monodactyla* Pérez-Íñigo y Subías, 1979) = *Oribella cornuta* Berlese, 1910
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Parapyroppia cornuta* (Berlese, 1910) (*Oribella*)
(= *Parapyroppia monodactyla* Pérez-Íñigo y Subías, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Parapyroppia filiformis* Hirauchi, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Parapyroppia transitoria* (Berlese, 1908) (*Protoribates*) "sp. inq."
(= *Notaspis lamellata* Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Neártica: U.S.A. (Misuri) y Canadá.

Pseudoceratoppia Hammer, 1967 (8 spp.)

(= *Hauseroceratoppia* Mahunka, 1980)

ESPECIE TIPO: *Pseudoceratoppia sexsetosa* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical austral.

- *Pseudoceratoppia asetosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia clavasetosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia diversa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia horaki* (Mahunka, 1980) (*Hauseroceratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Pseudoceratoppia logipilis* (Moniez, 1894) (*Leiosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia mariannae* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Pseudoceratoppia microsetosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pseudoceratoppia sexsetosa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Pseudopyroppia Rjabinin, 1987 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pseudopyroppia orientalis* Rjabinin, 1987

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Pseudopyroppia orientalis* Rjabinin, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (Este de Rusia asiática e Irán).
- *Pseudopyroppia rotunda* Hirauchi, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Pyroppia Hammer, 1955 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pyroppia lanceolata* Hammer, 1955

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Pyroppia arctica* Krivolutsky, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Pyroppia lanceolata* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (Cáucaso y España), Paleártica oriental (Noreste de Rusia), y Neártica septentrional.
- *Pyroppia serrifrons* (Banks, 1923) (*Notaspis*)
(= *Pyroppia dentata* Krivolutsky, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Alaska).
- *Pyroppia sibirica* Golosova y Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Pyroppia tajikistanica* Krivolutsky y Christov, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Asia centrooccidental) y Méjico.
- *Pyroppia tridentifera* H. y Z. Wang, 1994
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pyroppia ulneungensis* Choi, 1997
DISTRIBUCIÓN: Corea.

Trichoppia Balogh, 1961 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Trichoppia longiseta* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Trichoppia longiseta* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Trichoppia piriformis* (Warburton, 1912) (*Liacarus*)

DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

Metrioppiidae Balogh, 1943 (3 gen. y 11 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.

Ceratoppiella Hammer, 1977 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratoppiella lutea* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Ceratoppiella lutea* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

Metrioppia Grandjean, 1931 (9 spp.)

(=**Peloppia** Sellnick, 1931)

ESPECIE TIPO: *Metrioppia helvetica* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.

- *Metrioppia atlantica* Jacot, 1938 (*M. serrata* a.) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

- *Metrioppia helvetica* Grandjean, 1931

(=*Ceratoppia microseta* Hammer, 1952)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional, Paleártica oriental y Neártica).

- *Metrioppia krivolutskyi* Bayartogtokh, 2000

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Metrioppia oregonensis* Woolley e Higgins, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Metrioppia quadrisetosa* Fujita y Fujikawa, 1986

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Metrioppia serrata* (Sellnick, 1931) (*Peloppia*)

DISTRIBUCIÓN: Méjico y U.S.A. (Virginia).

- *Metrioppia tricuspadata* Aoki y Wen, 1983

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Nepal.

- *Metrioppia walbranensis* Lindo, 2015

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.

- *Metrioppia zlotini* Krivolutsky, 1971

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Paenoppia Woolley e Higgins, 1965 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Paenoppia forficula* Woolley e Higgins, 1965

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Paenoppia forficula* Woolley e Higgins, 1965

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Gustaviidae Oudemans, 1900 (1 gen. y 16 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.

Gustavia Kramer, 1879 (16 spp.)

(=**Neozetes** Berlese, 1885)

(=**Serrarius** Michael, 1883)

ESPECIE TIPO: (*Gustavia sol* Kramer, 1879) =*Leiosoma microcephala* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.

- *Gustavia aethiopica* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Zambia).

- *Gustavia aominensis* Fujikawa, 2008

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Gustavia fusifer* (Koch, 1841) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

- *Gustavia latolamellata* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Gustavia longicornis* (Berlese, 1903) (*Serrarius*)

(?=*Neozetes bicornis* Berlese, 1885 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Oriental.

- *Gustavia longiseta* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.

- *Gustavia magnifica* Golosova y Karppinen, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Gustavia magnilamellata* (Ewing, 1909) (*Liacarus*)
(=*Serrarius connexus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Gustavia maior* (Berlese, 1903) (*Serrarius*)
(=*Gustavia microcephala longirostris* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Gustavia microcephala* (Nicolet, 1855) (*Leiosoma*)
(=*Gustavia sol* Kramer, 1879)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente), Oriental y Méjico.
- *Gustavia oceanica* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental) y Oriental (India: Bengala Occidental, y Filipinas).
- *Gustavia ornata* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Gustavia parvula* (Banks, 1909) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Minesota).
- *Gustavia rugosa* Balogh, 1958 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Gustavia sineornata* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Gustavia transylvanica* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

Liacaridae Sellnick, 1928 (6 gen., 4 subg., 124 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

Adoristes Hull, 1916 (3 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata ovata* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Adoristes (Adoristes) Hull, 1916 (2 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Adoristes (A.) ammonoosuci* Jacot, 1938 (*A. ovatus a.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.

Adoristes (A.) ovatus (Koch, 1839) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental: excepto Este, y U.S.A.: Minesota).

- *Adoristes (A.) ovatus ovatus* (Koch, 1839)
(=*Conoppia grandis* Berlese, 1908)
(=*Leiosoma pyrigerum* Berlese, 1888)
(=*Leiosoma truncatum* Canestrini y Fanzago, 1877)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Asia centrooccidental).
- *Adoristes (A.) ovatus extraneus* Mihelčič, 1955 (*A. e.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Adoristes (A.) ovatus poppei* (Oudemans, 1906) (*Liacarus p.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Oeste de Siberia y U.S.A.: Minesota).

Adoristes (Gordeeviella) Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Adoristes (Gordeeviella) krivolutskyi* Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Adoristes (Gordeeviella) krivolutskyi* Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Birsteinus Krivolutsky, 1965 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Birsteinus clavatus* Krivolutsky, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Birsteinus clavatus* Krivolutsky, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Birsteinus krivolutskyi* Rjabinin, 1979
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Birsteinus microchaetus* Krivolutsky, 1967
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Oeste).
- *Birsteinus mongolicus* (Mahunka, 1964) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Rumanía y Paleártica oriental meridional).
- *Birsteinus monticolus* Wang y Shen, 2001

- DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
 - *Birsteinus perlongoides* Hammer, 1977 (*B. (Cultroribula)*)
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Birsteinus perlongus* Krivolutsky, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
 - *Birsteinus trimucronatus* Yamamoto y Aoki, 2000
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Liacarus Michael, 1898 (112 spp. y 4 sspp.)
 ESPECIE TIPO: *Oribata nitens* Gervais, 1844
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

- Liacarus (Liacarus)*** Michael, 1898 (61 spp. y 3 sspp.)
 (= *Leiosoma* Nicolet, 1855, "nom. praeoc." por Stephens, 1829)
 (= *Leuroxenillus* Woolley e Higgins, 1966)
 (= *Stenoxenillus* Woolley e Higgins, 1966)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.
 - *Liacarus (L.) atraktus* (Woolley e Higgins, 1966) (*Stenoxenillus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
 - *Liacarus (L.) bidentatus* Ewing, 1918
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Liacarus (L.) borealis* Wen, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
Liacarus (L.) brevilamellatus Mihelčič, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
 - *Liacarus (L.) brevilamellatus brevilamellatus* Mihelčič, 1955
 (= *Liacarus internodentatus* Kulijev, 1962)
 (= *Liacarus ovalis* Mihelčič, 1956)
 (?= *Liacarus parvus* Mihelčič, 1954 "sp. inq.")
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
 - *Liacarus (L.) brevilamellatus major* Mihelčič, 1955 (*L. m.*)
 (= *Liacarus latus* Schweizer, 1956, "nom. praeoc." por Ewing, 1909)
 (= *Liacarus schweizeri* Forsslund, 1963)
 (= *Liacarus schweizeri* Woolley, 1968, "nom. praeoc." por Forsslund, 1963)
 (= *Liacarus vastus* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
 - *Liacarus (L.) castaneus* (Banks, 1906) (*Notaspis*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Liacarus (L.) celisi* Balogh, 1958 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Liacarus (L.) cidarus* Woolley, 1968
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
 - *Liacarus (L.) conjunctus* Mihelčič, 1954 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Liacarus (L.) contiguus* Aoki, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Sajalín).
Liacarus (L.) coracinus (Koch, 1841) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica e I. Santa Helena.
 - *Liacarus (L.) coracinus coracinus* (Koch, 1841)
 (= *Liacarus lencoranicus* Krivolutsky, 1967)
 (= *Liacarus nitidulus* Krivolutsky, 1967)
 (= *Liacarus oribatelloides* Winkler, 1956)
 (= *Leiosoma similis* Nicolet, 1855)
 (= *Liacarus vombi* Dalenius, 1950)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) e I. Santa Helena.
 - *Liacarus (L.) coracinus simplex* Mihelčič, 1952 "ssp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Liacarus (L.) curvidentatus* Balogh, 1958 "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Liacarus (L.) detosus* Woolley, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
 - *Liacarus (L.) emeiensis* Wen, 1991
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Liacarus (L.) externus* Aoki, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) flammeus* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- Liacarus (L.) gammatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (L.) gammatus gammatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) gammatus coreanus* Choi, 1994
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Liacarus (L.) gephyrus* (Woolley, 1970) (*Stonyxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Lfbano.
 - *Liacarus (L.) gracilis* Mihelčič, 1954
(=*Liacarus chroniosus* Woolley, 1968)
(=*Liacarus robustus* Mihelčič, 1954, “nom. praeoc.” por Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Liacarus (L.) granulatus* Willmann, 1940
DISTRIBUCIÓN: Centro de Europa meridional.
 - *Liacarus (L.) incisus* (Grobler, Ozman y Cobanoglu, 2003) (*Stenoxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Liacarus (L.) inermis* Aoki, 1965
(=*Liacarus curtus* Djaparidze, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso, Paleártica oriental meridional y "China".
 - *Liacarus (L.) janetscheki* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Liacarus (L.) jordanai* Moraza y Pérez-Íñigo, 1979
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Liacarus (L.) kilchini* Choi, 1985
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Liacarus (L.) koeszegiensis* Balogh, 1943
(=*Liacarus sejunctus* Mihelčič, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Liacarus (L.) latilamellatus* Kaneko y Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) latus* Ewing, 1909
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Liacarus (L.) lectronus* Higgins y Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Liacarus (L.) leleupi* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Liacarus (L.) longilamellatus* Mihelčič, 1954
(=*Liacarus laterostris* Mihelčič, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Liacarus (L.) longipilis* Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España).
 - *Liacarus (L.) luscus* Hirauchi, 1998
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) madeirensis* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Liacarus (L.) marginatus* (Nicolet, 1855) (*Leiosoma*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Francia.
 - *Liacarus (L.) matsabelii* Djaparidze, 1980
(=*Liacarus regeli* Djaparidze, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
 - *Liacarus (L.) medialis* Banks, 1910
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
 - *Liacarus (L.) montanus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) mucronatus* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Mediterránea occidental y U.S.A.: Carolina del Norte).
 - *Liacarus (L.) murotensis* Aoki, 1988
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) nigrescens* Pearce, 1906 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
 - *Liacarus (L.) nitens* (Gervais, 1844) (*Oribata*)
(=*Liacarus robustus* Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Este de Paleártica oriental y U.S.A.).
 - *Liacarus (L.) ocellatus* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) olivaceus* (Grube, 1859) (*Leiosoma*) “sp. inq.”
(=*Pelonia tricuspida* Grube, 1859)

- DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Liacarus (L.) orthogonios* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
 - *Liacarus (L.) ovatus* Mihelčič, 1954
(=*Liacarus mihelcici* Woolley, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
 - *Liacarus (L.) paraborealis* Rjabinin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Liacarus (L.) paratanzicus* Ermilov, Rybalov y Kemal, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Liacarus (L.) perezinigo* Capilla, 1972
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Liacarus (L.) pseudocontiguus* Fujikawa, 1991
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (L.) reticulatus* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Liacarus (L.) rotundatus* Mihelčič, 1954 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Liacarus (L.) spiniger* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
 - *Liacarus (L.) subiasi* Shtanchaeva, 2008
(?= *Liacarus cartalinicus* Djaparidze, 1979 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y Mediterránea occidental).
 - *Liacarus (L.) subterraneus* (Koch, 1844) (*Oribata*)
(=*Oribata globosa* Koch, 1844)
(=*Leiosoma lativentris* Nicolet, 1855)
(?= *Acarus tremellae* Linnaeus, 1761 “sp. inq.”)
(=*Liacarus willmanni* Pschorn-Walcher, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Suroeste de Siberia y U.S.A.: Virginia).
 - *Liacarus (L.) tanzicus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Liacarus (L.) trichionus* (Woolley e Higgins, 1966) (*Leuroxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
 - *Liacarus (L.) tubifer* Djaparidze y Melamud, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Liacarus (L.) unjangensis* Choi, Bayartogtokh y Aoki, 2001
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Liacarus (L.) vietnamensis* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Liacarus (L.) xylariae* (Schrank, 1803) (*Acarus*)
(=*Liacarus cuspidatus* Mihelčič, 1954)
(=*Oribata fusca* Koch, 1841)
(=*Liacarus sphaericus* Djaparidze, 1980)
(=*Liacarus translamellatus* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Nepal.
 - *Liacarus (L.) yayeyamensis* Aoki, 1973
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Liacarus (Dorycranosus) Woolley, 1969 (36 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Liacarus abdominalis* Banks, 1906

DISTRIBUCIÓN: Holártica y tropical (excepto Australiana).

- *Liacarus (Dorycranosus) abdominalis* Banks, 1906 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: California y Alaska).
- *Liacarus (Dorycranosus) acutidens* Aoki, 1965 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica occidental) e India (Bengala Occidental).
- *Liacarus (Dorycranosus) acutus* Pschorn-Walcher, 1951 (*L.*)
(=*Liacarus claviger* Mihelčič, 1956)
(?= *Liacarus coracinus racovitzae* Trägårdh, 1912 “sp. inq.”)
(=*Liacarus ghilarevi* Bashkirova, 1958)
(=*Cultroribula grandis* Mihelčič, 1956)
(=*Liacarus infissus* Gunhold, 1953)
(=*Liacarus moraviacus* Willmann, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte) e Irán.
- *Liacarus (Dorycranosus) aequidentatus* Ewing, 1918 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Liacarus (Dorycranosus) angustatus* (Weigmann, 1976) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

- *Liacarus (Dorycranosus) arcticus* (Banks, 1898) (*Oppia*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Liacarus (Dorycranosus) arduus* Fujikawa, 1989 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Liacarus (Dorycranosus) chiebunensis* Fujita y Fujikawa, 1984 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (Dorycranosus) chiebunensis chiebunensis* Fujita y Fujikawa, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Liacarus (Dorycranosus) chiebunensis akkeshi* Aoki, 2006 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) columbianus* Berlese, 1908 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental: I. Kuriles, y U.S.A.: Misuri).
- *Liacarus (Dorycranosus) coronatus* (Golosoova y Ljashev, 1984) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Dorycranosus) curtipilis* Willmann, 1935 (*L. alatus* c.)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Liacarus (Dorycranosus) dickersoni* (Moraza, 1990) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Liacarus (Dorycranosus) djaparidzae* Subías, 2010
(=*Dorycranosus ovatus* Djaparidze, 1973, “nom. praeoc.” por Mihelčič, 1954)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liacarus (Dorycranosus) floridensis* Berlese, 1908 (*L.*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Liacarus (Dorycranosus) frontinalis* Banks, 1906 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- *Liacarus (Dorycranosus) fusiformis* Ewing, 1917 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Iowa y Utah).
- *Liacarus (Dorycranosus) grenadaensis* (Ermilov, 2016) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Liacarus (Dorycranosus) indentatus* (Aoki, 1973) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) kanekoi* Bayartogtokh y Aoki, 2002 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Dorycranosus) keretinus* Nordenskiöld, 1901 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Paleártica occidental.
- *Liacarus (Dorycranosus) latiusculus* Wen, 1991 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Liacarus (Dorycranosus) lingulatus* (Golosoova y Ljashev, 1984) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Dorycranosus) musaevi* (Shtanchaeva, 2008) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Liacarus (Dorycranosus) neonominatus* Subías, 2004
(=*Dorycranosus arcticus* Grishina, 1984, “nom. praeoc.” por Banks, 1898)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Rusia asiática).
- *Liacarus (Dorycranosus) nitidus* (Banks, 1895) (*Cepheus*)
(=*Liacarus glaber* Ewing, 1909)
(=*Liacarus nitidus fissuratus* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Liacarus (Dorycranosus) paoliensis* (Woolley, 1969) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Liacarus (Dorycranosus) parallelus* Hammer, 1967 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Islas del Este de Rusia asiática y Neártica septentrional).
- *Liacarus (Dorycranosus) polychothomus* Wen, 1991 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Nepal.
- *Liacarus (Dorycranosus) pulcher* (Sergienko y Djaparidze, 1981) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Liacarus (Dorycranosus) punctulatus* Mihelčič, 1956 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea y Este de Rusia asiática: I. Sajalín).
- *Liacarus (Dorycranosus) shipitsyni* Ermilov, Rybalov y Kemal, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Liacarus (Dorycranosus) splendens* (Coggi, 1898) (*Cepheus*)
(=*Liacarus alatus* Berlese, 1904)
(=*Liacarus diversus* Mihelčič, 1956)
(=*Xenillus ibericus* Djaparidze, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (frecuente).
- *Liacarus (Dorycranosus) tenuilamellatus* Hirauchi, 1998 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Liacarus (Dorycranosus) triapicini* (Djaparidze, 1983) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Liacarus (Dorycranosus) yezeensis* Fujikawa y Aoki, 1970 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).
- *Liacarus (Dorycranosus) zachvatkini* Kulijev, 1962 (*L.*)
(=*Dorycranosus ibericus* Djaparidze, 1973)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e Irán.

***Liacarus (Procorynetes)* Woolley, 1969 (8 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Liacarus nigerrimus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

- *Liacarus (Procorynetes) altaicus* (Krivolutsky, 1974) (*Dorycranosus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Asia central rusa y Neártica septentrional).
- *Liacarus (Procorynetes) andinus* (P. Balogh, 1984) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Liacarus (Procorynetes) breviclavatus* Aoki, 1970 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Procorynetes) clavatus* Fujikawa y Aoki, 1970 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Liacarus (Procorynetes) espeletiae* (P. Balogh, 1984) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Liacarus (Procorynetes) globifer* (Kramer, 1897) (*Leiosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Groenlandia y Norte de Europa).
- *Liacarus (Procorynetes) huvsgulensis* Bayartogtokh, 2010 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Liacarus (Procorynetes) nigerrimus* Berlese, 1916 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.

***Liacarus (Rhaphidosus)* Woolley, 1969 (7 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Liacarus carolinensis* Banks, 1906

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Liacarus (Rhaphidosus) acuminatus* (Woolley, 1969) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A.: Colorado, y Norte de Rusia europea).
- *Liacarus (Rhaphidosus) alticola* (P. Balogh, 1984) (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia y ¿Costa Rica?).
- *Liacarus (Rhaphidosus) bacillatus* Fujikawa y Aoki, 1970 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Liacarus (Rhaphidosus) badghysi* Krivolutsky, 1966 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Crimea y Asia centrooccidental).
- *Liacarus (Rhaphidosus) carbonarius* (Banks, 1906) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Liacarus (Rhaphidosus) carolinensis* Banks, 1906 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Liacarus (Rhaphidosus) niger* Ewing, 1909 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).

***Opsioristes* Woolley, 1967 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Opsioristes eurhostus* Woolley, 1967

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Opsioristes eurhostus* Woolley, 1967
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooccidental.

***Planoristes* Iturrondobeitia y Subías, 1978 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Planoristes acuspidatus* Iturrondobeitia y Subías, 1978

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Planoristes acuspidatus* Iturrondobeitia y Subías, 1978
DISTRIBUCIÓN: España.

***Scarabacarus* Shtanchaeva y Subías, 2010 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Scarabacarus longisensillus* Shtanchaeva y Subías, 2010

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Scarabacarus longisensillus* Shtanchaeva y Subías, 2010
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Xenillidae Woolley e Higgins, 1966 (4 gen., 1 subg., 82 spp. y 2 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Choixenillus Subías, 2016 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Xenillus multisetosus* Choi, 1996

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Choixenillus multisetosus* (Choi, 1996) (*Xenillus*)

DISTRIBUCIÓN: Corea.

Neoxenillus Fujikawa, 2004 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Neoxenillus scopulus* Fujikawa, 2004

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Neoxenillus heterosetiger* (Aoki, 1967) (*Xenillus*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

- *Neoxenillus scopulus* Fujikawa, 2004

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Xenilloides Pérez-Íñigo y Baggio, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Xenilloides aenigmaticus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Xenilloides aenigmaticus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839 (76 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Xenillus clypeator* Robineau-Desvoidy, 1839

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Xenillus (*Xenillus*) Robineau-Desvoidy, 1839 (74 spp. y 2 sspp.)

(=*Banksia* Oudemans y Voigts, 1905)

(=*Dinoxenillus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)

(=*Kochia* Oudemans, 1900)

(=*Pseudocephus* Jacot, 1928)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Xenillus* (*X.*) *adela* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Xenillus* (*X.*) *amazonensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1997

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Xenillus* (*X.*) *amazonicus* J. y P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Xenillus* (*X.*) *amicorum* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Xenillus* (*X.*) *anasillus* Woolley e Higgins, 1966

DISTRIBUCIÓN: Líbano.

- *Xenillus* (*X.*) *argentinensis* J. y P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Xenillus* (*X.*) *arilloi* Gil-Martín y Subías, 1997

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Xenillus* (*X.*) *athesis* Schatz, 2004

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Xenillus* (*X.*) *baggioi* P. Balogh, 1995

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Xenillus* (*X.*) *bolivianus* J. y P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

- *Xenillus* (*X.*) *brasilianus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Xenillus* (*X.*) *brevisetosus* Ermilov y Kalúz, 2012

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Xenillus* (*X.*) *butantaniensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Xenillus* (*X.*) *capitatus* Balogh y Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Xenillus* (*X.*) *clavatopilus* Mihelčič, 1966

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Xenillus* (*X.*) *clypeator* Robineau-Desvoidy, 1839

(=*Cepheus latus* Nicolet, 1855)

(=*Cepheus permixtus* André, 1925)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental meridional, y U.S.A.:

Míchigan) y Méjico.

- *Xenillus* (*X.*) *columbianus* P. Balogh, 1984

DISTRIBUCIÓN: Colombia.

- *Xenillus (X.) confusus* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Xenillus (X.) davisorum* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
- *Xenillus (X.) deformatus* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Xenillus (X.) discrepans* Grandjean, 1936 (*X. permixtus d.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
 - *Xenillus (X.) discrepans discrepans* Grandjean, 1936
(=*Xenillus baderi* Mahunka, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
 - *Xenillus (X.) discrepans azorensis* Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Xenillus (X.) discrepans canariensis* Pérez-Íñigo, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) disjunctus* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Xenillus (X.) diversisetosus* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Xenillus (X.) ecuadorensis* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) erbanensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) fazendae* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Brasil y Norte de Neotropical.
- *Xenillus (X.) fecundus* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Xenillus (X.) fernandoi* Morell, 1989
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) forceps* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) fusifer* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Cuba).
- *Xenillus (X.) gelasinus* Woolley e Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Utah).
- *Xenillus (X.) halophilus* Weigmann, 2011
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Xenillus (X.) hammerae* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) heterotrichus* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) imitator* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) ionthadosus* Woolley e Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Xenillus (X.) irregularis* P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Xenillus (X.) itascensis* Freeman y Woolley, 1987
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Minesota).
- *Xenillus (X.) lamellatus* Rjabinin, 1975
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Xenillus (X.) latilamellatus* Willmann, 1939
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
- *Xenillus (X.) lawrencei* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).
- *Xenillus (X.) lebanonensis* Woolley, 1970
DISTRIBUCIÓN: Líbano.
- *Xenillus (X.) longipes* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Xenillus (X.) longipilus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) longisetosus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Xenillus (X.) matskasi* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Xenillus (X.) moonsani* Choi y Aoki, 1993
DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Xenillus (X.) moyae* Pérez-Íñigo y Peña, 1994
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) mutabilis* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Xenillus (X.) neonomnatus* Subías, 2004
(=*Xenillus punctulatus* J. y P. Balogh, 1985, “nom. praeoc.” por Banks, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Xenillus (X.) occultus* Banks, 1947
(=*Xenillus phryxothrixus* Woolley e Higgins, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Xenillus (X.) ornatus* (Covarrubias, 1967) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Xenillus (X.) penicilliger* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Xenillus (X.) peruensis* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Xenillus (X.) pulvillus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Xenillus (X.) punctulatus* (Banks, 1895) (*Cepheus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Xenillus (X.) rohri* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Xenillus (X.) salamoni* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Hungría y Cáucaso).
- *Xenillus (X.) sanctipauli* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) sculptrus* Kulijev, 1963
(=*Xenillus stepensis* Djaparidze, 1974)
DISTRIBUCIÓN: **Paleártica meridional**: Mediterránea (Cáucaso y España) e **Irán**.
- *Xenillus (X.) selgae* Morell, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Xenillus (X.) setiger* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Xenillus (X.) setosus* Grobler, Ozman y Cobanoglu, 2003
DISTRIBUCIÓN: Turquía e Irán.
- *Xenillus (X.) singularis* Golosova y Ljashev, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Sajalín e Irán.
- *Xenillus (X.) subnudus* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) superbus* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (*Dinoxenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Xenillus (X.) tamdaoensis* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: **Vietnam**.
- *Xenillus (X.) tegeocranus* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
(=*Cepheus bifidatus* Nicolet, 1855)
(=*Cepheus vulgaris* Nicolet, 1855)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y China suroriental.
- *Xenillus (X.) tsendsureni* (Bayartogtokh, 1998) (*Procorynetes*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Xenillus (X.) tuberculatus* Subías y Arillo, 2000
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Xenillus (X.) variabilis* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Xenillus (X.) variolosus* (Berlese, 1888) (*Cepheus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Xenillus (X.) venezuelanus* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Venezuela y Centroamérica.
- *Xenillus (X.) ybarrai* Morell, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.

Xenillus (Stonyxenillus) Woolley e Higgins, 1966 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Stonyxenillus spilotos* Woolley e Higgins, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Xenillus (Stonyxenillus) akidosus* (Woolley e Higgins, 1966) (S.)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- *Xenillus (Stonyxenillus) anakolosus* (Woolley e Higgins, 1966) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.

- *Xenillus (Stonyxenillus) spilotus* (Woolley e Higgins, 1966) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Tenuialidae Jacot, 1929 (6 gen. y 16 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- Ceratotenuiala*** Aoki y Maruyama, 1983 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Ceratotenuiala echigoensis* Aoki y Maruyama, 1983
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Ceratotenuiala echigoensis* Aoki y Maruyama, 1983
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- Hafenferrefia*** Jacot, 1939 (4 spp.)
(=***Hafenferferiella*** Sellnick, 1952)
ESPECIE TIPO: *Galumna nitidula* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Hafenferrefia imperialis* (Berlese, 1910) (*Achipteria*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Hafenferrefia lata* Golosova, 1980
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Hafenferrefia nevesi* (Sellnick, 1952) (*Hafenferferiella*)
(=*Hafenferferiella hyrcanica* Krivolutsky, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Nepal.
- *Hafenferrefia nitidula* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- Hafenrefferia*** Oudemans, 1906 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Oribata gilvipes* Koch, 1839
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Hafenrefferia acuta* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente) y Nepal.
- *Hafenrefferia eurycuspis* Zhang y Jin, 2016
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Hafenrefferia gilvipes* (Koch, 1839) (*Oribata*)
(=*Liacarus auritus* Nordenskiöld, 1901)
(=*Liacarus pterotus* Coggi, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, y Paleártica oriental meridional).

- Peltenuiala*** Norton, 1983 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Peltenuiala pacifica* Norton, 1983
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Peltenuiala orbiculata* (Aoki y Ohnishi, 1974) (*Hafenferrefia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Peltenuiala pacifica* Norton, 1983
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de U.S.A.

- Tenuiala*** Ewing, 1913 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tenuiala nuda* Ewing, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Tenuiala crenulata* Woolley e Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Lfbano.
- *Tenuiala hubeiensis* Zhang y Jin, 2016
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Tenuiala kurti* Woolley e Higgins, 1955
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooccidental.
- *Tenuiala nuda* Ewing, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. centrooccidental y Este de Paleártica oriental) y Oriental (China suroriental).

- Tenuialoides*** Woolley e Higgins, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Tenuialoides medialis* Woolley e Higgins, 1966
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Tenuialoides fusiformis* Aoki, 1969
(=*Hafenferrefia translamellata* Aoki, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Tenuialoides medialis* Woolley e Higgins, 1966

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte) y Japón.

Niphocephoidea Travé, 1959

Niphocephidae Travé, 1959 (1 gen., 5 spp. y 3 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Niphocephus Balogh, 1943 (5 spp. y 3 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Cepheus nivalis* Schweizer, 1922

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Niphocephus aborigensis* Behan-Pelletier, 1982
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Niphocephus gadarramicus* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Niphocephus neotrichus* Ermilov, Kalúz y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.

Niphocephus nivalis (Schweizer, 1922) (*Cepheus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: excepto Norte, y Japón), Taiwán [Formosa] y Méjico.

- *Niphocephus nivalis nivalis* (Schweizer, 1922)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Japón) y Taiwán [Formosa].
- *Niphocephus nivalis baloghi* Travé, 1959
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Méjico.
- *Niphocephus nivalis delamarei* Travé, 1959
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Niphocephus nivalis grandjeani* Travé, 1959
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Niphocephus travei* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Zetorcheoidea Michael, 1898

Zetorchestidae Michael, 1898 (6 gen., 24 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Belorchestes Grandjean, 1951 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Belorchestes planatus* Grandjean, 1951

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Belorchestes gebennicus* Grandjean, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Belorchestes planatus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Litholestes Grandjean, 1951 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Litholestes altitudinis* Grandjean, 1951

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Litholestes altitudinis* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa central e India (Maharastra).

Microzetorchestes Balogh, 1943 (1 sp.)

(=*Diorchestes* Grandjean, 1951)

ESPECIE TIPO: *Zetorchestes emeryi* Coggi, 1898

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Microzetorchestes emeryi* (Coggi, 1898) (*Zetorchestes*)
(=*Zetorchestes consanguineus* Oudemans, 1902)
(=*Zetorchestes italicus* Eynhoven, 1942)
(=*Belorchestes sectus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.

Saxicolestes Grandjean, 1951 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Saxicolestes auratus* Grandjean, 1951

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Saxicolestes auratus* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Saxicolestes corsicanus* Grandjean, 1956
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Saxicolestes pollinivorus* Travé, 1963
DISTRIBUCIÓN: Francia.

Strenzkea Travé, 1967 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Strenzkea depilata* Travé, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Strenzkea depilata* Travé, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.

Zetorchestes Berlese, 1888 (16 spp. y 1 ssp.)(=*Leptorchistis* Canestrini y Berlese, 1885, "nom. praeoc." por *Leptorchestes* Thorell, 1870)(=*Phyllorchestes* Mahunka, 1983)ESPECIE TIPO: *Carabodes micronychus* Berlese, 1883

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Zetorchestes aokii* Krisper, 1987

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Nueva Guinea y Noreste de Oriental.

- *Zetorchestes equestris* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental, Noreste de China y Vietnam.

- *Zetorchestes flabrarius* Grandjean, 1951

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Zetorchestes grandjeani* Krisper, 1987

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Zetorchestes micronychus (Berlese, 1883) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).

- *Zetorchestes micronychus micronychus* (Berlese, 1883)(=*Zetorchestes falzonii* Coggi, 1898)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Este de Rusia asiática).

- *Zetorchestes micronychus unicolorulatus* Lombardini, 1961 "ssp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Zetorchestes novaguineanus* Krisper, 1987

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Zetorchestes ornatus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Zambia).

- *Zetorchestes pacificus* Sellnick, 1959 (*Z. micronychus* p.)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai], y Java.

- *Zetorchestes phylliferus* Mahunka, 1983 (*Z. (Phyllorchestes)*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.

- *Zetorchestes phyllosetus* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Zetorchestes reticulatus* Karppinen y Poltavskaja, 1990

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.

- *Zetorchestes saltator* Oudemans, 1915

DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Paleártica: Crimea y Corea.

- *Zetorchestes schusteri* Krisper, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e I. Canarias.

- *Zetorchestes transvaalensis* Coetsee, 1989

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.

- *Zetorchestes trituberculatus* Berlese, 1916 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: "África oriental".

- *Zetorchestes vanderhammeni* Krisper, 1987

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Eremaeidea Oudemans, 1900**Caleremaeidae** Grandjean, 1965 (8 gen., 37 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Anderemaeus Hammer, 1958 (9 spp.)ESPECIE TIPO: *Anderemaeus monticola* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Neotropical austral.

- *Anderemaeus australiensis* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Anderemaeus capitatus* J. y P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Colombia.

- *Anderemaeus chilensis* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Anderemaeus hammerae* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: América austral.

- *Anderemaeus hidasii* P. Balogh, 1995
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Anderemaeus magellanicus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Anderemaeus monticola* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y China suroriental.
- *Anderemaeus sturmi* J. y P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Anderemaeus tridactylus* (Trägårdh, 1907) (*Carabodes*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).

Caleremaeus Berlese, 1910 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Damaeus monilipes* Michael, 1882

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Caleremaeus divisus* Mihelčič, 1952 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Caleremaeus monilipes* (Michael, 1882) (*Damaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente) y Méjico.
- *Caleremaeus retractus* (Banks, 1947) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Cristeremaeus Balogh y Csiszár, 1963 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cristeremaeus humeratus* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Paleártica meridional.

- *Cristeremaeus clavatus* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Cristeremaeus humeratus* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Argentina e Irán.

Epieremulus Berlese, 1916 (11 spp. y 1 ssp.)

(=*Carabodoides* Jacot, 1937)

ESPECIE TIPO: *Eremulus (Epieremulus) geometricus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

- *Epieremulus apicalis* (Banks, 1895) (*Carabodes*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Epieremulus bidupensis* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Epieremulus braziliensis* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico) y Filipinas.
- *Epieremulus circulus* Yamamoto y Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Epieremulus frontatus* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Epieremulus geometricus* (Berlese, 1916) (*Eremulus (Epi.)*)
(=*Carabodoides saccharomycetoides* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Epieremulus granulatus* (Balogh y Mahunka, 1979) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Epieremulus granulatus granulatus* (Balogh y Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Epieremulus granulatus andicola* (P. Balogh, 1988) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Epieremulus humeratus* (Aoki, 1987) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Epieremulus laticeps* (Balogh, 1963) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Epieremulus longicarinatus* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Epieremulus longiseta* (P. Balogh, 1988) (*Carabodoides*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Megeremaeus Higgins y Woolley, 1965 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Megeremaeus montanus* Higgins y Woolley, 1965

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Megeremaeus ditrichosus* Woolley e Higgins, 1968
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Megeremaeus expansus* Aoki y Fujikawa, 1971

- DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Megeremaeus hylaius* Behan-Pelletier, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Megeremaeus keewatin* Behan-Pelletier, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Megeremaeus kootenai* Behan-Pelletier, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Megeremaeus montanus* Higgins y Woolley, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (Noroeste de U.S.A. y Canadá).
 - *Megeremaeus spinosus* Aoki y Yamamoto, 2000
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Luxtoneremaeus J. y P. Balogh, 1992 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Anderemaeus forsteri* J. y P. Balogh, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Luxtoneremaeus forsteri* (J. y P. Balogh, 1985) (*Anderemaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Veloppia Hammer, 1955 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Veloppia pulchra* Hammer, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Veloppia kananaskis* Norton, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Veloppia nortoni* Chen y Wang, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Veloppia pulchra* Hammer, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Este de Paleártica oriental).

Yungaseremaeus Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Yungaseremaeus longisetosus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Yungaseremaeus longisetosus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Aribatidae Aoki, Takaku e Ito, 1994 (1 gen. y 1 sp.)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Aribates Aoki, Takaku e Ito, 1994 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Aribates javensis* Aoki, Takaku e Ito, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Aribates javensis* Aoki, Takaku e Ito, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Java.

Kodiakellidae Hammer, 1967 (1 gen. y 2 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Kodiakella Hammer, 1967 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Kodiakella lutea* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Kodiakella dimorpha* Pérez-Íñigo y Subías, 1978
 (?=*Oribella magna* Mihelčič, 1957)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Kodiakella lutea* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Eremaeidae Oudemans, 1900 (6 gen., 70 spp. y 4 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Asperemaeus Behan-Pelletier, 1982 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Asperemaeus longipilus* Behan-Pelletier, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Asperemaeus longipilus* Behan-Pelletier, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Asperemaeus striganovae* Bayartogtokh, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Carinabella Hammer, 1977 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carinabella pulchra* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Carinabella pulchra* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Carinabella tuberculata* Bayoumi y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Norte de India.

Caucaseremaeus Subías y Shtanchaeva, 2006 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Caucaseremaeus krivolutskyi* Shtanchaeva y Subías, 2006

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Caucaseremaeus krivolutskyi* Shtanchaeva y Subías, 2006

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Eremaeus Koch, 1835 (26 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaeus hepaticus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Eremaeus anichkini* Ermilov y Martens, 2014

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Eremaeus appalachicus* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

- *Eremaeus boreomontanus* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Eremaeus brevitarsus* (Ewing, 1917) (*Damaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Eremaeus californiensis* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).

- *Eremaeus gracilis* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).

- *Eremaeus grandis* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Noreste de Rusia asiática).

Eremaeus hepaticus Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Virginia).

- *Eremaeus hepaticus hepaticus* Koch, 1835

(=*Notaspis dentilamellatus* Štorkán, 1925)

(=*Eremaeus hepaticus acruciata* Mihelčič, 1952)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).

- *Eremaeus hepaticus cordiformis* Grandjean, 1934 (*E. c.*)

(=*Eremaeus magnus* Mihelčič, 1957)

(=*Eremaeus ovalis* Mihelčič, 1955)

(=*Eremaeus setiger* Mihelčič, 1957)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

- *Eremaeus insertus* Grishina, 1980

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

- *Eremaeus kananaskis* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Eremaeus kevani* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Eremaeus longiseta* Djaparidze, 1990

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Eremaeus megistos* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.

- *Eremaeus monticolus* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.

- *Eremaeus neonominatus* Subías, 2004

(=*Eremaeus borealis* Wen, 1988, "nom. praeoc." por Strenzke, 1952)

DISTRIBUCIÓN: China.

- *Eremaeus nortoni* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.

- *Eremaeus occidentalis* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Eremaeus oresbios* Behan-Pelletier, 1993

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.

- *Eremaeus orientalis* Golosova, 1970

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Eremaeus plumosus* Woolley, 1964

DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).

- *Eremaeus porosus* Behan-Pelletier, 1993

- DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
 - *Eremaeus salish* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Eremaeus tenuisetiger* Aoki, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
 - *Eremaeus translamellatus* Hammer, 1952
 (= *Eremaeus oblongus borealis* Strenzke, 1952)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Brasil.
 - *Eremaeus tuberosus* Gordeeva, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
 - *Eremaeus walteri* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. centrooccidental y Canadá).

Eueremaeus Mihelčič, 1963 (33 spp. y 3 sspp.)

(=***Kartoeremaeus*** Higgins, 1979)

ESPECIE TIPO: *Eremaeus oblongus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Eueremaeus acostulatus* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Eueremaeus alvordensis* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
 - *Eueremaeus aridulus* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Eueremaeus aysineep* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá).
 - *Eueremaeus brevifer* (Mahunka, 1980) (*Eremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Eueremaeus carinatus* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nevada).
 - *Eueremaeus chiatous* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
 - *Eueremaeus columbianus* (Berlese, 1916) (*Eremaeus*)
 (= *Eremaeus politus* Banks, 1947)
 (= *Kartoeremaeus reevesi* Higgins, 1979)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
 - *Eueremaeus cornutus* (Lombardini, 1943) (*Eremaeus*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Eueremaeus crassisetosus* Bayartogtokh, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Eueremaeus danos* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
 - *Eueremaeus elongatus* (Fujikawa, 1972) (*Eremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Eueremaeus foveolatus* (Hammer, 1952) (*Eremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Eueremaeus higginsii* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Eueremaeus hokkaiensis* Fujikawa, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Eueremaeus intermedius* (Mihelčič, 1955) (*Eremaeus*)
 (= *Eremaeus areolatus* Kunst, 1959)
 (= *Eueremaeus kuehnelti* Mihelčič, 1963)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Eueremaeus laticostulatus* Bayartogtokh, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Eueremaeus lindquisti* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
 - *Eueremaeus magniporus* (Wallwork, 1972) (*Eremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Eueremaeus marshalli* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Eueremaeus masinasin* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá).
 - *Eueremaeus michaeli* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Eueremaeus nahani* Behan-Pelletier, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá).

- *Eueremaeus nemoralis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- Eueremaeus oblongus* (Koch, 1835) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y China suroriental.
 - *Eueremaeus oblongus oblongus* (Koch, 1835)
(=*Eremaeus figuratus* Winkler, 1956)
(=*Eremaeus granulatus* Mihelčič, 1955)
(=*Eremaeus ornatus* Mihelčič, 1957)
(=*Eremaeus valkanovi* Kunst, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y China suroriental.
 - *Eueremaeus oblongus quadrilamellatus* (Hammer, 1952) (*Eremaeus q.*)
(=*Eremaeus fossulatus* Kunst, 1959)
(=*Eueremaeus tenuisensillatus* Bayartogtokh, 2003)
(=*Eremaeus triglavensis* Tarman, 1958)
(=*Eueremaeus valkanovi debilis* Mihelčič, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional, Paleártica occidental centromeridional y Este de Rusia asiática).
 - *Eueremaeus oblongus silvestris* (Forsslund, 1956) (*Eremaeus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Eueremaeus osoyoosensis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Oeste de U.S.A. y Canadá).
- *Eueremaeus proximus* (Berlese, 1916) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Eueremaeus roissi* (Piffel, 1965) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Eueremaeus stiktos* (Higgins, 1962) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. occidental y Canadá).
- *Eueremaeus tetrosus* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente en U.S.A.).
- *Eueremaeus travei* Mihelčič, 1963
(?=*Eremaeus oblongus major* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Eueremaeus trionus* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Colorado, y Canadá).
- *Eueremaeus woolleyi* (Higgins, 1979) (*Kartoeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Eueremaeus yukonensis* Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Tricheremaeus Berlese, 1908 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis serrata* Michael, 1885

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Tricheremaeus abnobensis* Miko y Weigmann, 2006
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Tricheremaeus conspicuus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Tricheremaeus grandjeani* Bernini, 1970
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Tricheremaeus nemossensis* Grandjean, 1963
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Tricheremaeus serratus* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Tricheremaeus travei* Miko, 1993
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.

Oribellidae Kunst, 1971 (7 gen., 49 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Kaszabobates Balogh, 1972 (3 spp.)

(=*Gobiella* Balogh y Mahunka, 1965, “nom. praeoc.” por Cienkowsky, 1882)

ESPECIE TIPO: *Gobiella kaszabi* Balogh y Mahunka, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Kaszabobates helveticus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Kaszabobates kaszabi* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Gobiella*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Kaszabobates olbiopolitanus* Sergienko, 1980

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Oribella Berlese, 1908 (6 spp.)

(=**Infernobates** Karppinen y Poltavskaja, 1990)

ESPECIE TIPO: *Notaspis pectinata* Michael, 1885

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Oribella adelaidae* Golosova y Karppinen, 1985
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oribella canariensis* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribella citelli* (Karppinen y Poltavskaja, 1990) (*Infernobates*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribella fujikawae* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Grecia e Irán.
- *Oribella matritensis* Arillo, Bordel y Subías, 1988
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribella pectinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
(=*Dameosoma crinitum* Berlese, 1916)
(=*Oribata distincta* Karpelles, 1893)
(=*Xenillus limburgiensis* Oudemans, 1912)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y U.S.A. (Nuevo Méjico).

Pantelozetes Grandjean, 1953 (22 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Xenillus paolii* Oudemans, 1913

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Pantelozetes (Pantelozetes) Grandjean, 1953 (6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Pantelozetes (P.) bayartogtokhi* Ermilov, Salavatulin y Tolstikov, 2015
(=*Montizetes serratus* Bayartogtokh, 2003, "nom. praec." por Wang y Cui, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Asia central.
- *Pantelozetes (P.) berlesei* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Pantelozetes (P.) paolii* (Oudemans, 1913) (*Xenillus*)
(=*Amazoppia caucasica* Djaparidze, 1986)
(=*Oribella dentata* Mihelčič, 1963)
(=*Oribella pannonica* Mahunka, 1968)
(=*Oribella paolii multidentata* Evans, 1954)
(=*Pantelozetes paolii tuxeni* Fujikawa, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centrooccidental y Neártica septentrional) y Java.
- *Pantelozetes (P.) serratus* Wang y Cui, 1996
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Pantelozetes (P.) tianshanicus* Rakhimbajeva, 1995
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Pantelozetes (P.) unitjumenienensis* Ermilov, Salavatulin y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.

Pantelozetes (Montizetes) Kunst, 1971 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Xenillus alpestris* Willmann, 1929

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Pantelozetes (Montizetes) abulensis* (Pérez-Íñigo, 1984) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Pantelozetes (Montizetes) alpestris* (Willmann, 1929) (*Xenillus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
- *Pantelozetes (Montizetes) arcticus* (Pankov, 1993) (*Gemmazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Pantelozetes (Montizetes) delamellatus* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Pantelozetes (Montizetes) mongolicus* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Pantelozetes (Montizetes) rarisetosus* (Bayartogtokh, 1998) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia y Cáucaso.
- *Pantelozetes (Montizetes) tianshanensis* (Wen, 1989) (*Gemmazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Pantelozetes (Oribellopsis) Kunst, 1971 (9 spp. y 1 ssp.)

(=*Gemmazetes* Fujikawa, 1979)

ESPECIE TIPO: *Oribella cavatica* Kunst, 1962

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) cavaticus* (Kunst, 1962) (*Oribella*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Europa centromeridional, Mongolia y Noreste de China, y Neártica septentrional).

- *Pantelozetes (Oribellopsis) clavatus* (Jacot, 1937) (*Oribella crosbyi* c.)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Kentucky).

- *Pantelozetes (Oribellopsis) clavigerus* (Mihelčič, 1958) (*Oribella*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Austria.

Pantelozetes (Oribellopsis) crosbyi (Berlese, 1908) (*Oribella*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Europa central y Noreste de China, y U.S.A. centrooriental).

- *Pantelozetes (Oribellopsis) crosbyi crosbyi* (Berlese, 1908)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa central y U.S.A. centrooriental).

- *Pantelozetes (Oribellopsis) crosbyi maoershanensis* (Wen, 1992) (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) etruscus* (Bernini, 1980) (*Gemmazetes*)

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) forsslundi* (Moritz, 1965) (*Oribella*)

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) grecus* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2010) (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) kushiroensis* (Aoki, 1992) (*Gemmazetes*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Pantelozetes (Oribellopsis) tierradelfuegoensis* Ermilov, 2016 (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).

Proteremaeus Piffel, 1965 (9 spp.)

(=*Sibiremaeus* Krivolutsky, 1975)

ESPECIE TIPO: *Proteremaeus jonasi* Piffel, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Proteremaeus angarensis* (Rjabinin y Krivolutsky, 1975) (*Sibiremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Siberia centrooccidental.

- *Proteremaeus chadaevae* Golosova, 1983

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Proteremaeus elongatus* (Rjabinin y Krivolutsky, 1975) (*Sibiremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

- *Proteremaeus jonasi* Piffel, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

- *Proteremaeus lawariensis* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.

- *Proteremaeus macleani* Behan-Pelletier, 1982

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Proteremaeus mongolicus* (Golosova, 1983) (*Sibiremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Proteremaeus nebaikini* Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Proteremaeus punctulatus* Bayartogtokh, 2000

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Ameroidea Bulanova-Zachvatkina, 1957

Ctenobelbidae Grandjean, 1965 (1 gen., 4 subg. y 34 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Ctenobelba Balogh, 1943 (30 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eremobelba pectinigera* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Ctenobelba (Ctenobelba) Balogh, 1943 (25 spp.)

(=*Elapheremaeus* Grandjean, 1943)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Ctenobelba (C.) apatomorpha* Iturrondobeitia, Saloña, Andrés y Caballero, 1998

(?=*Murcia obsoleta* Koch, 1841 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Ctenobelba (C.) ayıldizi* Baran, 2012

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Ctenobelba (C.) brevopilosa* Mahunka, 1964
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Ctenobelba (C.) csiszarae* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Ctenobelba (C.) foliata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Ctenobelba (C.) foveolata* Subías y Shtanchaeva, 2013
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ctenobelba (C.) grancanariae* Pérez-Íñigo y Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ctenobelba (C.) heterosetosa* Murvanidze y Weigmann, 2007
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ctenobelba (C.) mahnerti* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Ctenobelba (C.) marcuzzii* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Ctenobelba (C.) martyanensis* Ermilov, Khaustov y Wu, 2012
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Ctenobelba (C.) mikaeeli* Ahaniazad, Bagheri, Akrami y Hugo-Coetzee, 2017
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ctenobelba (C.) parafoliata* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ctenobelba (C.) parapulchellula* Subías y Shtanchaeva, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Ctenobelba (C.) pectinigera* (Berlese, 1908) (*Eremobelba*)
(=*Amerobelba bicarinata* Berlese, 1910)
(=*Ctenobelba fenestrata* Pérez-Íñigo jr., 1990)
(?=*Notaspis maculosa* Warburton y Pearce, 1905 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (frecuente).
- *Ctenobelba (C.) perezinigo* Moraza, 1985
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ctenobelba (C.) pilosella* Jeleva, 1962
(=*Ctenobelba tuberculata* Kulijev, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ctenobelba (C.) pseudomahnerti* Subías y Shtanchaeva, 2013
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ctenobelba (C.) pulchellula* Gil-Martín y Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Ctenobelba (C.) serrata* Mahunka, 1964
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Ctenobelba (C.) simplex* (Willmann, 1940) (*Eremulus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Bosnia-Herzegovina.
- *Ctenobelba (C.) translamellata* Iordansky, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Ctenobelba (Aokibelba) Subías y Shtanchaeva, 2013 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ctenobelba longisetosa* Suzuoka y Aoki, 1980

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Ctenobelba (Aokibelba) leei* Choi, 2005 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Ctenobelba (Aokibelba) longisetosa* Suzuoka y Aoki, 1980 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Ctenobelba (Aokibelba) nakatamarii* Aoki, 2007 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ctenobelba (Aokibelba) polysetosa* Aoki y Yamamoto, 2000 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Ctenobelba (Aokibelba) rameus* (Wen y Zhao, 1993) (*Megeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Ctenobelba (Aokibelba) soloduchi* Pankov, 1988 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Ctenobelba (Berndamerus) Mahunka, 1977 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Berndamerus hellenicus* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Ctenobelba (Berndamerus) bicostata* (Berlese, 1910) (*Amerobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ctenobelba (Berndamerus) bugiamapensis* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Ctenobelba (Berndamerus) eremuloides* (Berlese, 1910) (*Amerobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Ctenobelba (Berndamerus) hellenica* (Mahunka, 1977) (*B.*)

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Ctenobelba (Bifurcobelba) Subías y Shtanchaeva, 2010 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Ctenobelba (Bifurcobelba) iberica* Subías y Shtanchaeva, 2010

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Ctenobelba (Bifurcobelba) iberica* Subías y Shtanchaeva, 2010

DISTRIBUCIÓN: España.

Ctenobelba (Caucasiobelba) Subías y Shtanchaeva, 2010 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ctenobelba (Caucasiobelba) reticulata* Subías y Shtanchaeva, 2010

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Ctenobelba (Caucasiobelba) reticulata* Subías y Shtanchaeva, 2010

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Ctenobelba (Caucasiobelba) urhani* Baran, 2015

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Amerobelbidae Grandjean, 1961 (5 gen. y 10 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Paleotropical.

Amerobelba Berlese, 1908 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Amerobelba decedens* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Amerobelba decedens* Berlese, 1908

(=*Eremobelba maxima* Willmann, 1951)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).

- *Amerobelba saboorii* Ahaniazad y Akrami, 2017

DISTRIBUCIÓN: Irán.

Hellenamerus Mahunka, 1974 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Hellenamerus ionicus* Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Hellenamerus ionicus* Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Mongaillardia Grandjean, 1961 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mongaillardia callitoca* Grandjean, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Mongaillardia aeoliana* (Bernini, 1979) (*Amerobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Mongaillardia callitoca* Grandjean, 1961

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Mongaillardia eveana* Grandjean, 1961

DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.

- *Mongaillardia grandjeani* Călugăr y Vasiliu, 1984

DISTRIBUCIÓN: Rumanía y Cáucaso.

- *Mongaillardia magna* Wallwork, 1977

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Rastellobata Grandjean, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Amerobelba rastelligera* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Rastellobata rastelligera* (Berlese, 1908) (*Amerobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Roynortonia Ermilov, 2011 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Roynortonia vietnamica* Ermilov, 2011

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Roynortonia vietnamica* Ermilov, 2011

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Eremulidae Grandjean, 1965 (7 gen., 50 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Austroeremulus Mahunka, 1985 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Austroeremulus glabrus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.

- *Austroeremulus glabrus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.

Caveremulus Mahunka, 1983 (4 spp.)(=*Berndbella* Mahunka, 1985)ESPECIE TIPO: *Caveremulus cordisetus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Caveremulus cordisetus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Caveremulus foliaceus* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Caveremulus salicinus* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Caveremulus serratus* (Mahunka, 1985) (*Berndbella*)

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Eremulus Berlese, 1908 (39 spp.)ESPECIE TIPO: *Eremulus flagellifer* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Eremulus adami* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).

- *Eremulus africanus* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Eremulus antis* Poltavskaja, 1987

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Eremulus arabicus* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Yemen.

- *Eremulus australis* Wen, 1988

DISTRIBUCIÓN: China suoriental.

- *Eremulus avenifer* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Italia y Paleártica oriental meridional), Oriental (frecuente),

Polinesia (Tahití) y Etiópica (Sudáfrica y Camerún).

- *Eremulus baliensis* Hammer, 1982

DISTRIBUCIÓN: Bali.

- *Eremulus berlesei* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Indonesia (Komodo) y Ecuador.

- *Eremulus brasiliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Eremulus cingulatus* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Eremulus clavatoflagellatus* Lombardini, 1962 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Eremulus crispus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Eremulus csuzdii* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Zambia).

- *Eremulus curviseta* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).

- *Eremulus densus* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Eremulus elegans* Gordeeva, 1987

DISTRIBUCIÓN: Crimea.

- *Eremulus flagellifer* Berlese, 1908(=*Eremulus modestus* Berlese, 1908)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Paleártica (menos frecuente en el Norte), Neártica (U.S.A.: Washington D.C.), Etiópica (Congo), Oriental, Australiana, subantártica (I. San Pablo) y Neotropical (Cuba).

- *Eremulus foveolatus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Eremulus hastatus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Eremulus heterotrichus* Chakrabarti y Dasgupta, 1996

DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

- *Eremulus indicus* Sanyal, Saha y Chakraborty, 2008

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Eremulus jyotsnai* Sarkar, 1991
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Eremulus lanceocrinus* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremulus monstrosus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Eremulus nigrisetosus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Tripura).
- *Eremulus pectinatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eremulus pilipinus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas) y Australiana (Nuevas Hébridias [Vanuatu]).
- *Eremulus punctatus* Chakrabarti y Dasgupta, 1996
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus renukae* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus rigidisetus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremulus rimosus* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán (Formosa).
- *Eremulus serratus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Eremulus sigmolamellatus* Chakrabarti y Dasgupta, 1996
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremulus southafricanensis* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eremulus spindleformis* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eremulus spinifer* Woolley e Higgins, 1963
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Eremulus spinosus* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Eremulus tenuis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Eremulus translamellatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremulus truncatus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Australiana (Islas del Pacífico) y Neotropical (I. Galápagos).
- *Eremulus tsurutomiensis* Fujikawa, 2012
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Mahunkana Koçak y Kemal, 2008 (3 spp.)

(=*Fenestrella* Mahunka, 1987, “nom. praec.” por Osborn y Drake, 1916)

ESPECIE TIPO: *Fenestrella bifurcata* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical.

- *Mahunkana bifurcata* (Mahunka, 1987) (*Fenestrella*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Mahunkana japonica* (Aoki y Karasawa, 2007) (*Fenestrella*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Mahunkana sinica* (Zhao y Wen, 1994) (*Fenestrella*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Pseuderemulus Balogh y Mahunka, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pseuderemulus gladiator* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pseuderemulus gladiator* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Reteremuloides Mahunka, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Reteremuloides bifurcatus* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Reteremuloides bifurcatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Vietnam).

Reteremulus Balogh y Mahunka, 1966 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Reteremulus aciculatus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

- Reteremulus aciculatus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica, Nueva Guinea y China suroriental.
- *Reteremulus aciculatus aciculatus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Reteremulus aciculatus papuanus* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y China suroriental.

Damaeolidae Grandjean, 1965 (4 gen. y 12 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- Caudamaeolus** P. Balogh, 1988 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Caudamaeolus petalus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Caudamaeolus petalus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- Damaeolus** Paoli, 1908 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma asperatum* Berlese, 1904
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
- *Damaeolus asperatus* (Berlese, 1904) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: excepto Norte, y U.S.A.: Columbia).
- *Damaeolus bregetovae* Csiszár, 1962
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Damaeolus cellulatus* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Damaeolus magnus* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Damaeolus ornatissimus* Csiszár, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).

- Fosseremus** Grandjean, 1954 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma laciniatum* Berlese, 1905
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Fosseremus americanus* (Jacot, 1938) (*Damaeolus laciniatus a.*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Fosseremus laciniatus* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)
(=*Fosseremus africanus* Balogh, 1958)
(=*Damaeolus ornatus* Mihelčič, 1956)
(=*Damaeolus pistillifer* Berlese, 1913)
(=*Fosseremus quadripertitus* Grandjean, 1965)
(=*Damaeolus saltaensis* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente.
- *Fosseremus sculpturatus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo) y Paleártica meridional (Noreste de China e Irán).

- Gressittolus** Balogh, 1970 (3 spp.)
(=*Fijirella* Hammer, 1971)
ESPECIE TIPO: *Gressittolus marginatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Australiana.
- *Gressittolus marginatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Gressittolus mollis* (Hammer, 1971) (*Fijirella*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Gressittolus ocellatus* (Mahunka, 2000) (*Damaeolus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Hungarobelbidae Miko y Travé, 1996 (2 gen. y 8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- Costeremus** Aoki, 1970 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Costeremus ornatus* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Costeremus barbatus* Choi, 1997
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Costeremus cornutus* Wang, 1996
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Costeremus ornatus* Aoki, 1970

- DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Vietnam.
 - *Costeremus stebaevae* Bayartogtokh y Ermilov, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
 - *Costeremus yezoensis* Fujikawa y Fujita, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Hungarobelba Balogh, 1943 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Belba visnyai* Balogh, 1938

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Hungarobelba baloghi* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Hungarobelba pyrenaica* Miko y Travé, 1996
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Hungarobelba visnyai* (Balogh, 1938) (*Belba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Paleártica oriental).

Eremobelbidae Balogh, 1961 (1 gen. y 44 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Eremobelba Berlese, 1908 (44 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaeus leporosus* Haller, 1884

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Eremobelba asagiriensis* Fujikawa y Tominaga, 2014
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eremobelba balazsi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Eremobelba bella* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eremobelba bellicosa* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Eremobelba bisulcata* Balogh, 1958 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremobelba breviseta* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y **Oriental** (Vietnam y Filipinas).
- *Eremobelba brevispathulata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eremobelba capitata* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Nueva Guinea.
- *Eremobelba cellulosa* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Eremobelba comteae* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Eremobelba coronata* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Eremobelba curtipetata* Wen, 1996
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremobelba editae* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Eremobelba esposi* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eremobelba flexuosa* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Eremobelba foliata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremobelba geographica* Berlese, 1908
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Eremobelba gracilior* Berlese, 1908
(=*Eremobelba leporosa flagellaris* Jacot, 1938)
(=*Oribata neosota* Banks, 1909)
(=*Eremobelba nervosa* Hartenstein, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Cáucaso) y Méjico.
- *Eremobelba graciosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Eremobelba hamata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Eremobelba heterotricha* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Borneo).

- *Eremobelba himalayensis* Mondal y Kundu, 1984
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
- *Eremobelba indica* Ghosh y Bhaduri, 1979
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Eremobelba japonica* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Oriental.
- *Eremobelba leporoides* Jacot, 1938 (*E. leporosus* l.) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eremobelba leporosa* (Haller, 1884) (*Eremaeus*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: "Neotropical".
- *Eremobelba longisetosa* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Eremobelba mahunkai* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Eremobelba miliae* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Eremobelba minuta* Aoki y Wen, 1983
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eremobelba nagaroorica* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Eremobelba obscura* Balogh, 1958 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Eremobelba okinawa* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón y Filipinas.
- *Eremobelba ornata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Eremobelba perrugosa* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: **Oriental (Java y Filipinas).**
- *Eremobelba piffli* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Eremobelba porcella* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Eremobelba pulchella* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).
- *Eremobelba shillongensis* Sanyal, 1988
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Eremobelba truncata* Wen, 1996
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremobelba tuberculata* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Eremobelba wittmeri* Bayoumi y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Norte de India y Tailandia).
- *Eremobelba yunnanensis* Aoki y Yamamoto, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eremobelba zicsii* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Heterobelbidae Balogh, 1961 (3 gen., 17 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Furcodamaeus Pérez-Íñigo y Baggio, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Furcodamaeus bifurcatus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Furcodamaeus bifurcatus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Haplobelba Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Haplobelba simplex* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Haplobelba simplex* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Heterobelba Berlese, 1913 (15 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Heterobelba galerulata* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.
- *Heterobelba africana* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Heterobelba barbata* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Heterobelba crassisetosa* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Heterobelba furcata* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Antillas (La Española: R. Dominicana).
- *Heterobelba galerulata* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Heterobelba magna* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Heterobelba montana* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Heterobelba oxapampensis* Beck, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Heterobelba quezonica* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Heterobelba rostrata* Mondal y Kundu, 1984
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Heterobelba spinitecta* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Heterobelba spinosissima* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Heterobelba spumosa* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- Heterobelba stellifera* Okayama, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
 - *Heterobelba stellifera stellifera* Okayama, 1980
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
 - *Heterobelba stellifera formosana* Aoki, 1990
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
- *Heterobelba zikani* Sellnick, 1922 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Basilobelbidae Balogh, 1961 (2 gen., 23 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Basilobelba Balogh, 1958 (18 spp. y 1 ssp.)

(=***Hammation*** Grandjean, 1959)

ESPECIE TIPO: *Damaeus retarius* Warburton, 1912

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Basilobelba aethiopica* Bernini, 1988
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Basilobelba africana* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Basilobelba atimonensis* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basilobelba baltazarae* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basilobelba barbata* Mondal y Kundu, 1984
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Basilobelba cendanai* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basilobelba foliata* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Basilobelba gigantea* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Basilobelba indica* Bhaduri, Chakrabarti y Raychaudhuri, 1974
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Basilobelba insularis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Sudáfrica, Micronesia: I. Marianas, y Norte de Neotropical).
- *Basilobelba maidililae* Fernández, Theron, Rollard y Leiva, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Basilobelba monstrossetosa* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Basilobelba pacifica* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Basilobelba papillata* Sanyal, Saha y Chakraborti, 2007

- DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Basilobelba parmata* Okayama, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).
Basilobelba retiaria (Warburton, 1912) (*Damaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Japón.
 - *Basilobelba retiaria retiaria* (Warburton, 1912)
 (= *Hammation sollertius* Grandjean, 1959)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Japón.
 - *Basilobelba retiaria symmetrica* Wallwork, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Basilobelba spasmenosi* Fernández y Theron, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
 - *Basilobelba werneri* Mahunka, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Xiphobelba Csiszár, 1961 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Xiphobelba hamanni* Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Xiphobelba barbata* Talukdar y Chakrabarti, 1985
 DISTRIBUCIÓN: India (Assam).
 - *Xiphobelba hamanni* Csiszár, 1961
 (= *Xiphobelba margosetosa* Hammer, 1979)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Xiphobelba ismalia* Haq, 1980
 DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Xiphobelba mindanensis* Corpuz-Raros, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Xiphobelba setosa* Aoki, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (Nueva Bretaña).

Ameridae Bulanova-Zachvatkina, 1957 (7 gen., 1 subg., 21 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Amerus Berlese, 1896 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Belba troisi* Berlese, 1883

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Amerus (Amerus) Berlese, 1896 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Amerus (A.) cuspidatus* Avanzati, Salomone, Baratti y Bernini, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Amerus (A.) polonicus* Kulczynski, 1902
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional e Irán.
 - *Amerus (A.) troisi* (Berlese, 1883) (*Belba*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Amerus (Neamerus) Willmann, 1939 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Amerus (Neamerus) lundbladi* Willmann, 1939

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Amerus (Neamerus) lundbladi* Willmann, 1939
 (?= *Amerus laticephalus* Berlese, 1914 "sp. inq.")
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Andesamerus Hammer, 1962 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Andesamerus peculiaris* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Andesamerus novaezealandiae* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Andesamerus peculiaris* Hammer, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Caenosamerus Higgins y Woolley, 1969 (3 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Caenosamerus litosus* Higgins y Woolley, 1969

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Caenosamerus litosus* Higgins y Woolley, 1969
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Caenosamerus shirakamiensis* Fujikawa, 2002

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Caenosamerus spatiosus Aoki, 1977

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: India (Arunachal Pradesh).

- *Caenosamerus spatiosus spatiosus* Aoki, 1977

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: India (Arunachal Pradesh).

- *Caenosamerus spatiosus maoershanensis* Wen, 1992

DISTRIBUCIÓN: Norte de China.

Ctenamerus J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hymenobelba flagellata* Covarrubias, 1967

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Ctenamerus flagellatus* (Covarrubias, 1967) (*Hymenobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Ctenamerus ramulosus* (Covarrubias, 1967) (*Hymenobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

Haplamerus J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hymenobelba annulus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Haplamerus annulus* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Hymenobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Haplamerus coarctatus* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Hymenobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Hymenobelba Balogh, 1962 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hymenobelba ypsilon* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical austral.

- *Hymenobelba diversisetosa* Luxton, 1988

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Hymenobelba domahidyi* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Hymenobelba exclamationis* Mahunka, 2010

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenobelba flagellatissima* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenobelba flexisetosa* Luxton, 1988

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Hymenobelba ypsilon* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Madagascar e India (Bengala Occidental).

Pteramerus Balogh, 1964 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pteramerus draco* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pteramerus clypeatus* Mahunka, 2010

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Pteramerus draco* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Oxyameridae Aoki, 1965 (1 gen. y 9 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).

Oxyamerus Aoki, 1965 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oxyamerus spathulatus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).

- *Oxyamerus aokii* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Vietnam).

- *Oxyamerus hauserorum* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Oxyamerus himalayensis* Mondal y Kundu, 1999

DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

- *Oxyamerus hyalinus* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).

- *Oxyamerus isabelaensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Oxyamerus latirostris* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Oxyamerus polilloensis* Corpuz-Raros y Lit, 2005

- DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Oxyamerus spathulatus* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) y Japón.
 - *Oxyamerus truncatus* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).

Platyameridae J. y P. Balogh, 1983 (2 gen., 17 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australianooriental.

Gymnodampia Jacot, 1937 (16 spp. y 2 sspp.)

(=*Cristamerus* Hammer, 1977)

(=*Defectamerus* Aoki, 1984)

ESPECIE TIPO: *Amerobelba setata* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Gymnodampia acuta* Chen, Behan-Pelletier, Wang y Norton, 2004
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia australis* (Aoki, 1991) (*Defectamerus crassisetiger a.*)
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Japón.
- Gymnodampia crassisetiger* (Aoki, 1984) (*Defectamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
 - *Gymnodampia crassisetiger crassisetiger* (Aoki, 1984) (*Defectamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Nepal.
 - *Gymnodampia crassisetiger coreana* (Choi y Aoki, 1985) (*Defectamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Gymnodampia fusca* (Fujikawa, 2002) (*Defectamerus*)
 (= *Defectamerus conformis* Fujikawa, 2002)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gymnodampia insularis* (Aoki, 2006) (*Defectamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gymnodampia jacoti* Chen, Norton, Behan-Pelletier y Wang, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Gymnodampia lindquisti* Chen, Norton, Behan-Pelletier y Wang, 2004
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Gymnodampia qinlingensis* Chen, Behan-Pelletier, Wang y Norton, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Gymnodampia setata* (Berlese, 1916) (*Amerobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Oeste).
- *Gymnodampia sichuanensis* Chen, Behan-Pelletier, Wang y Norton, 2004
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia soonkii* (Choi y Aoki, 1985) (*Defectamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Gymnodampia spinosa* (Hammer, 1977) (*Cristamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Gymnodampia sungohi* (Choi, 1994) (*Defectamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Gymnodampia tegularum* Chen, Behan-Pelletier, Wang y Norton, 2004
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia yaoi* Chen, Behan-Pelletier, Wang y Norton, 2004
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gymnodampia yunnanensis* (Aoki y Yamamoto, 2000) (*Cristamerus*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Platyamerus J. y P. Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Platyamerus peculiaris* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Platyamerus peculiaris* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australia.

Staubatidae Grandjean, 1966 (2 gen., 2 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Staubates Grandjean, 1966 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Staubates schusteri* Grandjean, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- Staubates schusteri* Grandjean, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Staubates schusteri schusteri* Grandjean, 1966

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Staurobates schusteri cordobensis* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Paraguay).

Stauroma Grandjean, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Stauroma cephalotum* Grandjean, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Stauroma cephalotum* Grandjean, 1966

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Spinozetidae Balogh, 1972 (4 gen. y 6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Grypoceramerus Suzuki y Aoki, 1970 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Grypoceramerus acutus* Suzuki y Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Grypoceramerus acutus* Suzuki y Aoki, 1970

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Iberoppia Pérez-Íñigo, 1986 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Iberoppia paradoxa* Pérez-Íñigo, 1986

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Iberoppia paradoxa* Pérez-Íñigo, 1986

DISTRIBUCIÓN: España.

Spinozetes Piffel, 1966 (2 spp.)

(=*Mirus* Kulijev, 1967)

ESPECIE TIPO: *Spinozetes inexpectatus* Piffel, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Spinozetes inexpectatus* Piffel, 1966

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Spinozetes pectinatus* (Kulijev, 1967) (*Mirus*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Yambaramerus Aoki, 1996 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Yambaramerus itoi* Aoki, 1996

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Yambaramerus arcuatus* Aoki y Yamamoto, 2000

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Yambaramerus itoi* Aoki, 1996

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Oppioidea Sellnick, 1937

Arceremaeidae Balogh, 1972 (2 gen. y 10 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y Paleártica meridional.

Arceremaeus Hammer, 1961 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Arceremaeus incaensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Arceremaeus cubanus* Balogh y Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Brasil).

- *Arceremaeus incaensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).

- *Arceremaeus jimenezi* Călugăr y Vasiliu, 1977

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Tecteremaeus Hammer, 1961 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tecteremaeus cornutus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y Paleártica meridional.

- *Tecteremaeus anoporosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Tecteremaeus bogorensis* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

- *Tecteremaeus cachoeirensis* Franklin y Woas, 1992

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).

- *Tecteremaeus cornutus* Hammer, 1961

- DISTRIBUCIÓN: Notropical (Perú y Ecuador), Filipinas y Este de Rusia asiática.
 - *Tecteremaeus cristatus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Tecteremaeus hauseri* Mahunka, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
 - *Tecteremaeus incompletus* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam) y Ecuador.

Machadobelbidae Balogh, 1972 (2 gen. y 18 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Machadobelba Balogh, 1958 (17 spp.)

ESPECIE TIPO: *Machadobelba symmetrica* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Machadobelba baloghi* Mondal y Kundu, 1999
 DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Machadobelba barbata* Sanyal, Saha y Chakraborty, 2005
 DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Machadobelba bifurcata* Wen, 1998
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Machadobelba ceylonica* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Machadobelba descombesi* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Machadobelba dispar* Balogh, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana).
- *Machadobelba foliata* Hammer, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Machadobelba longiciliata* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Machadobelba neotropica* P. Balogh, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Machadobelba serrata* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Machadobelba shtanchaevae* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Machadobelba similis* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Machadobelba simplex* Csiszár, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Machadobelba spathulifer* Mahunka, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Machadobelba symmetrica* Balogh, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica e India (Tripura).
- *Machadobelba tanzica* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Machadobelba tuberculata* Csiszár, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Java.

Ramogneta Karppinen, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Ramogneta lamottei* Karppinen, 1966

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Ramogneta lamottei* Karppinen, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Guinea.

Rioppiidae Balogh y Mahunka, 1977 (1 gen y 2 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Rioppia Balogh y Mahunka, 1977 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rioppia nodulifera* Balogh y Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rioppia comteae* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Rioppia nodulifera* Balogh y Mahunka, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Decoroppiidae Mahunka, 2009 (1 gen. y 1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Decoroppia Mahunka, 2009 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Decoroppia prodigiosa* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Decoroppia prodigiosa* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Yemen.

Autognetidae Grandjean, 1960 (6 gen., 2 subg., 34 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y subtropical austral (excepto Etiópica).

Austrogneta Balogh y Csiszár, 1963 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Austrogneta multipilosa* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Austrogneta multipilosa* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda) y Argentina.

- *Austrogneta quadridentata* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Autogneta Hull, 1916 (23 spp. y 1 ssp.)ESPECIE TIPO: *Notaspis longilamellata* Michael, 1885

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

Autogneta (Autogneta) Hull, 1916 (11 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Autogneta (A.) amica* Jacot, 1938 (*A. longilamellata a.*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Autogneta (A.) aokii* Behan-Pelletier, 2015

DISTRIBUCIÓN: U.S.A.(California).

- *Autogneta (A.) flaheyi* Behan-Pelletier, 2015

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.

- *Autogneta (A.) hamata* Ota, 2009

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Autogneta (A.) japonica* Fujikawa, 1972

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Autogneta (A.) kaisilai* Karppinen, 1967

DISTRIBUCIÓN: I. Spitsberg (Svalvard).

- *Autogneta (A.) longilamellata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional).

- *Autogneta (A.) masahittoi* Aoki, 1963

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

- *Autogneta (A.) parva* Forsslund, 1947(=*Autogneta rugosa* Mihelčič, 1956)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Autogneta (A.) penicillum* Grandjean, 1960

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.

- *Autogneta (A.) schusteri* Behan-Pelletier, 2015

DISTRIBUCIÓN: U.S.A.(California).

Autogneta (Conchogneta) Grandjean, 1963 (9 spp. y 1 ssp.)ESPECIE TIPO: (*Autogneta dalecarlica* Forsslund, 1947) =*Dameosoma willmanni* Dyradowska, 1929

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Autogneta (Conchogneta) flumengalei* Jacot, 1939 (*A. longilamellata f.*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).

- *Autogneta (Conchogneta) glabrisensillata* (Bayartogtokh, 2012) (C.)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Autogneta (Conchogneta) intermedia* (Mihelčič, 1952) (*Oppia longilamellata i.*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Autogneta (Conchogneta) inundata* Winkler, 1957 (A.)

DISTRIBUCIÓN: Chequia.

- *Autogneta (Conchogneta) iranica* (Akarmi, 2008) (C.)

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Autogneta (Conchogneta) traegardhi* Forsslund, 1947 (A.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Canadá).

- *Autogneta (Conchogneta) vasiliorum* (Mahunka, 2006) (C.)

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Autogneta (Conchogneta) weigmanni* (Mahunka, 2007) (C.)

- DISTRIBUCIÓN: Europa central.
Autogneta (Conchogneta) willmanni (Dyradowska, 1929) (*Dameosoma*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Autogneta (Conchogneta) willmanni willmanni* (Dyradowska, 1929)
 (= *Autogneta dalecarlica* Forsslund, 1947)
 (= *Oppia talischica* Kulijev, 1962)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Autogneta (Conchogneta) willmanni herzegowinensis* (Willmann, 1941) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Bosnia-Herzegovina.

- Autogneta (Rhaphigneta)*** Grandjean, 1960 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Rhaphigneta numidiana* Grandjean, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Autogneta (Rhaphigneta) akramii* Subías, 2018
 (= *Autogneta (Rhaphigneta) iranica* Akrami, Mortazavi y Hajizadeh, 2010, "nom. praec." por Akrami, 2008)
 DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Autogneta (Rhaphigneta) flagellata* (Mahunka, 1977) (*R.*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Autogneta (Rhaphigneta) numidiana* (Grandjean, 1960) (*R.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

- Cosmogneta*** Grandjean, 1960 (4 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Cosmogneta impedita* Grandjean, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.
 - *Cosmogneta cassolai* Bernini, Baratti y Avanzati, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
 - *Cosmogneta impedita* Grandjean, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa y Méjico.
 - *Cosmogneta kargi* Grandjean, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
 - *Cosmogneta ozkani* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2007
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- Eremobodes*** Jacot, 1937 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Eremobodes pectinatus* Jacot, 1937
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Eremobodes pectinatus* Jacot, 1937
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- Parautogneta*** Golosova, 1974 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Parautogneta silvatica* Golosova, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Parautogneta changbaiensis* Wen y Gao, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Parautogneta golosovae* Rjabinin, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
 - *Parautogneta silvatica* Golosova, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- Triautogneta*** Fujikawa, 2009 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Triautogneta higoensis* Fujikawa, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Triautogneta higoensis* Fujikawa, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Thyrisomidae Grandjean, 1953 (1 gen., 18 spp. y 5 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- Banksinoma*** Oudemans, 1930 (18 spp. y 5 sspp.)
 (= *Thyrisoma* Grandjean, 1953)
 ESPECIE TIPO: (*Notaspis lanceolata* Michael "sensu" Oudemans, 1930) = *Banksinoma lanceolata oudemansi* Fujikawa, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
 - *Banksinoma akhtyamovi* Rjabinin, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática y España.
 - *Banksinoma arcuata* (Hammer, 1958) (*Oribella*)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Banksinoma borealis* (Willmann, 1943) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Suecia.
- *Banksinoma cincta* Zhao y Wen, 1993
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Banksinoma exobothridialis* Bayartogtokh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional (Mongolia e Irán).
- *Banksinoma insignis* Balogh y Mahunka, 1965
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Banksinoma japonica* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Banksinoma lanceolata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Hawái.
 - *Banksinoma lanceolata lanceolata* (Michael, 1885)
(?= *Notaspis castaneus* Hermann, 1804 “sp. inq.”)
(?= *Zetes dorsatus* Koch, 1841 “sp. inq.”)
(?= *Zetes flavipes* Koch, 1841 “sp. inq.”)
(= *Banksinoma lanceolata islandica* Fujikawa, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este): frecuente, Canadá y Hawái.
 - *Banksinoma lanceolata bifurcata* (Jacot, 1938) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: U.S.A. (Illinois) y Este de Rusia asiática.
 - *Banksinoma lanceolata canadensis* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Banksinoma lanceolata lunare* (Hull, 1914) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
 - *Banksinoma lanceolata oudemansi* Fujikawa, 1979
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Banksinoma longisetosa* Bayartogtokh y Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Banksinoma monoceros* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Oribella spinifera* m.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Banksinoma orbiculata* Bayartogtokh, 2006
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Banksinoma ovata* (Wallwork, 1962) (*Thyrisoma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Banksinoma pretiosa* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Banksinoma setosa* Rjabinin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Norte de Europa, Rusia asiática y Canadá).
- *Banksinoma sinica* Wen, 1990
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- Banksinoma spinifera* (Hammer, 1952) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Suroeste de U.S.A. y Canadá) y Neotropical (Bolivia y Argentina).
 - *Banksinoma spinifera spinifera* (Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (Suroeste de U.S.A. y Canadá).
 - *Banksinoma spinifera fissurata* (Hammer, 1958) (*Oribella*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Argentina).
- *Banksinoma tamayura* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Banksinoma watanabei* Aoki, 2002
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Oppiidae Sellnick, 1937 (132 gen., 41 subg., 1.046 spp. y 54 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

[**Antilloppiinae**] Mahunka, 1985 (2 gen. y 6 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Holártica meridional).

Joboppia Ruiz, Mínguez y Subías, 1988 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Neoppia (Joboppia) dichosa* Ruiz, Mínguez y Subías, 1988
DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Joboppia dichosa* (Ruiz, Mínguez y Subías, 1988) (*Neoppia (J.)*)
DISTRIBUCIÓN: España y “U.S.A.”
- *Joboppia expansum* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Neoppia Bhattacharya y Banerjee, 1981 (4 spp.)
(= **Antilloppia** Mahunka, 1985)

- ESPECIE TIPO: *Neoppia minuta* Bhattacharya y Banerjee, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Paleártica meridional).
 - *Neoppia bayoumii* (Al-Assiuty y El-Deeb, 1983) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Neoppia discreta* Ruiz, Mínguez y Subías, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e Irán.
 - *Neoppia minuta* Bhattacharya y Banerjee, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Bengala Occidental) y Filipinas.
 - *Neoppia schauenbergi* (Mahunka, 1985) (*Antilloppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

[**Paternoppiinae**] Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000 (1 gen. y 1 sp.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- Paternoppia** Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Paternoppia andalusicabulensis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Paternoppia andalusicabulensis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000
 DISTRIBUCIÓN: España.

[**Lanceoppiinae**] Balogh, 1983 (18 gen., 6 subg., 138 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Boreal).

- Acutoppia** Balogh, 1983 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Operculoppia crassiseta* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Acutoppia crassiseta* (Hammer, 1968) (*Operculoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Acutoppia jelevae* (Hammer, 1968) (*Operculoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- Basiloppia** Balogh, 1983 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Oppia hexatricha* Balogh y Mahunka, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Basiloppia hexatricha* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.

- Chavinia** Hammer, 1961 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Chavinia paradoxa* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica meridional.
 - *Chavinia paradoxa* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
 - *Chavinia similis* P. Balogh, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Colombia e Irán.

- Cycloppia** Balogh, 1983 (6 spp.)
 ESPECIE TIPO: (*Lanceoppia simplex* Suzuki, 1973) = *Oppia restata* Aoki, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
 - *Cycloppia asetosa* Ermilov y Kalúz, 2013
 DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Cycloppia granulata* Ohkubo, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Cycloppia latisternum* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Cycloppia restata* (Aoki, 1963) (*Oppia*)
 (= *Lanceoppia simplex* Suzuki, 1973)
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).
 - *Cycloppia spindleformis* Ermilov y Kalúz, 2013
 DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Cycloppia szentirmayi* (Balogh, 1970) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- Drepanoppia** Balogh, 1983 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oppia falxa* Kok., 1967
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Drepanoppia falxa* (Kok, 1967) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Drepanoppia koki* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Geminoppia J. y P. Balogh, 1983 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Geminoppia papineai* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Geminoppia ansifera* (Mahunka, 1985) (*Tectoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Geminoppia papineai* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Geminoppia velata* (Franklin y Woas, 1992) (*Globoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Globoppia Hammer, 1962 (15 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Globoppia intermedia* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.

- *Globoppia brinoni* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Globoppia cochlearia* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: América austral.
- *Globoppia curtipes* (Trägårdh, 1907) (*Damaeus*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Globoppia curvicalvata* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Globoppia gibba* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Globoppia globifera* (Mahunka, 1989) (*Membranoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Globoppia hamiltoni* (Mahunka, 1988) (*Pletzenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Globoppia heterotricha* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- Globoppia intermedia* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Antártica y subantártica.
 - *Globoppia intermedia intermedia* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico), Antártica y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
 - *Globoppia intermedia longiseta* Wallwork, 1970
DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente), subantártica y América austral.
- *Globoppia latifasciata* (Willmann, 1932) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Globoppia maior* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Globoppia minor* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Globoppia nidicola* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Globoppia simplex* (Warburton, 1912) (*Notaspis*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Globoppia vermoncrookensis* Hugo-Coetzee, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Laminoppia Hammer, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Laminoppia blocki* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Laminoppia blocki* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia Hammer, 1962 (62 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lanceoppia hexapili* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, austral y "Paleártica".

Lanceoppia (Lanceoppia) Hammer, 1962 (27 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Austral.

- *Lanceoppia (L.) adjuncta* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (L.) bertheti* Hammer, 1968

- DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) csiszarae* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) elegantula* Starý y Block, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
 - *Lanceoppia (L.) haarlovi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) hexapili* Hammer, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Lanceoppia (L.) jacoti* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) knuellei* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) kovacsi* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Lanceoppia (L.) lancearia* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lanceoppia (L.) madagascarensis* Mahunka, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Lanceoppia (L.) maerkeli* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) microlancearia* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lanceoppia (L.) microtricha* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lanceoppia (L.) microtrichoides* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lanceoppia (L.) piffli* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) poppi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) ramsayi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) rigidiseta* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) scytheae* Hugo-Coetzee, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Lanceoppia (L.) seydi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) strenzkei* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) tortile* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
 - *Lanceoppia (L.) translucens* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
 - *Lanceoppia (L.) vanderhammeni* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) willmanni* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (L.) woodringi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

***Lanceoppia (Baioppia)* Luxton, 1985 (5 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Lanceoppia moritzi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana y "Paleártica".

- *Lanceoppia (Baioppia) luxtoni* Hammer, 1968 (*L.*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (Baioppia) menkei* Hammer, 1968 (*L.*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (Baioppia) moritzi* Hammer, 1968 (*L.*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Lanceoppia (Baioppia) talacrensis* Monson, 2000
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Lanceoppia (Baioppia) trapezoides* Ermilov y Minor, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

***Lanceoppia (Bicristoppia)* Subías, 1989 (6 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Oppia bicristata* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral.

- *Lanceoppia (Bicristoppia) archicostulata* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Lanceoppia (Bicristoppia) bicristata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) binodosa* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) cucheana* Mahunka, 1994 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) feideri* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Bicristoppia) kalalao* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Lanceoppia (Convergoppia) Balogh, 1983 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Oppia pletzenae* Hammer, 1968, “nom. praeoc.” por Kok, 1967) =*Lanceoppia (Convergoppia) neonominata* Subías, 2004

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Lanceoppia (Convergoppia) australis* (Balogh, 1982) (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (Convergoppia) ewingi* Hammer, 1968 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Convergoppia) neonominata* Subías, 2004
(=*Oppia pletzenae* Hammer, 1968, “nom. praeoc.” por Kok, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Convergoppia) schusteri* Hammer, 1968 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Convergoppia) sellnicki* Hammer, 1968 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia (Hamoppia) Hammer, 1968 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hamoppia lionsi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Lanceoppia (Hamoppia) lionsi* (Hammer, 1968) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Hamoppia) schweizeri* Hammer, 1968 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Hamoppia) soosi* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Lanceoppia (Hamoppia) thamdrupi* (Hammer, 1968) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Hamoppia) turki* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Lanceoppia (Lancelalmoppia) Subías, 1989 (14 spp.)

(=*Radamoppia* Mahunka, 1994)

ESPECIE TIPO: *Oppia perezinigo* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.

- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) banksi* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) becki* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) berlese* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) consimilis* Mahunka, 1989 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) gressitti* (Wallwork, 1964) (*Globoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) nodosa* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e India (Bengala Occidental).
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) perezinigo* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) pertineata* Mahunka, 1989 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) rattura* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) ravenala* (Mahunka, 1994) (*Radamoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) tasmanica* Mahunka, 1989 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) thori* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) vaneki* Hammer, 1968 (*Lanceop.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lanceoppia (Lancelalmoppia) zicsica* (Mahunka, 1988) (*Pletzenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Loboppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia covarrubiasi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Loboppia covarrubiasi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Membranoppia Hammer, 1968 (14 spp.)

ESPECIE TIPO: *Membranoppia krivolutskyi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y austral (excepto Etiópica).

Membranoppia (Membranoppia) Hammer, 1968 (5 spp.)

(=*Nesoppia* Luxton, 1985)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Membranoppia (M.) breviclava* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Membranoppia (M.) krivolutskyi* Hammer, 1968
(=*Membranoppia karppineni* Hammer, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Membranoppia (M.) sitnikovae* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Membranoppia (M.) truncata* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Membranoppia (M.) tuxeni* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Tripura).

Membranoppia (Pravoppia) Luxton, 1985 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia disjuncta* Wallwork, 1964

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica.

- *Membranoppia (Pravoppia) argentinensis* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Membranoppia (Pravoppia) campbellensis* (Wallwork, 1964) (*Globoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Membranoppia (Pravoppia) disjuncta* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Membranoppia (Pravoppia) loxolineata* (Wallwork, 1965) (*Oppia*)
(=*Oppia loxolineata longipilosa* Covarrubias, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).
- *Membranoppia (Pravoppia) patagonica* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: América austral.
- *Membranoppia (Pravoppia) pseudocorrugata* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Membranoppia (Pravoppia) scotiae* (Wallwork, 1970) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).
- *Membranoppia (Pravoppia) ventrolaminata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Membranoppia (Pravoppia) wallworki* (Mahunka, 1980) (*Globoppia*)
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).

Operculoppia Hammer, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Operculoppia kunsti* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Operculoppia kunsti* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Otoppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia midas* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Otoppia midas* (Balogh, 1964) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Polyoppia Hammer, 1968 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Polyoppia baloghi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical).

- *Polyoppia baloghi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Polyoppia magna* (Sellnick, 1924) (*Dameosoma*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Processoppia Balogh, 1983 (3 spp.)

(=*Rhaphoppia* Balogh, 1983)

ESPECIE TIPO: *Oppia oudemansi* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Processoppia mihelcicana* (Ohkubo, 2003) (*Rhaphoppia*)

(=*Oppia mihelcici* Hammer, 1968, "nom. praeoc." por Pérez-Íñigo, 1965)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Processoppia oudemansi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Processoppia sphagnicola* (J. y P. Balogh, 1986) (*Rhaphoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Pustuloppia Mahunka, 1994 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pustuloppia madagassica* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pustuloppia madagassica* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Setoppia Balogh, 1983 (18 spp.)

(=*Tectoppiella* Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Oppia toeroeki* Balogh, 1982

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y austral.

- *Setoppia angustopili* (Hammer, 1962) (*Lanceoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Setoppia antennata* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Setoppia bornemisszai* (Balogh, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Setoppia clavimera* (Mahunka, 1985) (*Tectoppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Setoppia compressa* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Setoppia fortis* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Setoppia izinyosa* Hugo-Coetzee, 2017

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Setoppia karinae* (Mahunka, 1974) (*Tectoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Zimbabue [Rodesia] y Sudáfrica).

- *Setoppia longisetosa* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Setoppia mahunkai* (Hammer, 1968) (*Lanceoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Setoppia quattuor* (Kok, 1967) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Setoppia strinovichi* (Balogh, 1972) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Setoppia szaboi* (Mahunka, 1988) (*Antennoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Setoppia toeroeki* (Balogh, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Setoppia toxotes* (Balogh, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Setoppia tuberosa* (Mahunka, 1984) (*Tectoppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Setoppia vanga* (Mahunka, 1994) (*Radamoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Setoppia verrucosa* (Mahunka, 1985) (*Tectoppiella*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Trematoppia Balogh, 1964 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Trematoppia cristipes* Balogh, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Trematoppia cristipes* Balogh, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

[**Nosybelbinae**] Mahunka, 1994 (1 gen. y 2 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Nosybelba Mahunka, 1994 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Nosybelba oppiana* Mahunka, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Nosybelba oppiana* Mahunka, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Nosybelba spinipes* (Balogh, 1964) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

[**Oppiinae**] Sellnick, 1937 (24 gén., 4 subg., 168 spp. y 3 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Aeroppia Hammer, 1961 (16 spp.)
 (= *Paraeroppia* Sanyal, 2009)
 ESPECIE TIPO: *Aeroppia peruensis* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y Holártica.
 - *Aeroppia abdita* Pérez-Íñigo y Baggio, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Aeroppia adjacens* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas e I. Galápagos) e Irán.
 - *Aeroppia asymmetrica* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Aeroppia clavata* Higgins, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].
 - *Aeroppia floridana* (Banks, 1896) (*Belba*) "sp. inq."
 (= *Oribata consimilis* Banks, 1910)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
 - *Aeroppia friedrichi* Ermilov, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Aeroppia hammerae* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y Venezuela.
 - *Aeroppia indiana* (Sanyal, 2009) (*A. (Paraeroppia)*)
 DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Aeroppia insularis* Higgins, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Antillas (La Española: R. Dominicana).
 - *Aeroppia longisensilla* Ermilov, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Aeroppia magnipilosa* (Ewing, 1909) (*Damaeus*)
 (= *Aeroppia columbiana* Hammer, 1961)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
 - *Aeroppia mariehammerae* Subías *et al.*, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Panamá).
 - *Aeroppia nasalis* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
 - *Aeroppia peruensis* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Aeroppia sculpturata* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas e Irán.
 - *Aeroppia vacua* (Berlese, 1888) (*Belba concolor* v.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Aethioppia Balogh, 1983 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oppia bacilligera* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Aethioppia bacilligera* (Balogh, 1962) (*Oppia*)

- DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Aethioppia oligochaeta* (Mahunka, 1984) (*Xenoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- Afropia** Koçak y Kemal, 2008 (1 sp.)
 (= *Xenoppia* Mahunka, 1982, "nom. praeoc." por Townsend, 1912)
 ESPECIE TIPO: *Xenoppia brevipila* Mahunka, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Afropia brevipila* (Mahunka, 1982) (*Xenoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- Amerioppia** Hammer, 1961 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Amerioppia rudentigera* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
 - *Amerioppia meruensis* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Amerioppia rudentigera* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- Coetzeella** Ermilov, Hugo-Coetsee y Khaustov, 2107 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Coetzeella navalensis* Ermilov, Hugo-Coetsee y Khaustov, 2107
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Coetzeella navalensis* Ermilov, Hugo-Coetsee y Khaustov, 2107
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- Erioppia** Balogh, 1983 (2 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Multioppia problematica* Balogh, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australiana).
 - *Erioppia malalatinae* (Mahunka, 2009) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
Erioppia problematica (Balogh, 1966) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: África oriental y Polinesia (I. Samoa).
 - *Erioppia problematica problematica* (Balogh, 1966)
 DISTRIBUCIÓN: África oriental.
 - *Erioppia problematica pacifica* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- Exanthoppia** J. y P. Balogh, 1983 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Exanthoppia ornatissima* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.
 - *Exanthoppia ornatissima* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Hawái y Méjico.
- Fusuloppia** Balogh, 1983 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: (*Oppia simplex* Balogh, 1964, "nom. praeoc." por Jacot, 1938) = *Fusuloppia neonominata* Subías, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Fusuloppia fusiliger* (Balogh, 1962) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Fusuloppia neonominata* Subías, 2004
 (= *Oppia simplex* Balogh, 1964, "nom. praeoc." por Jacot, 1938)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Fusuloppia variosetosa* Mahunka, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- Goyoppia** Balogh, 1983 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oppia sexpilosa* Balogh, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.
 - *Goyoppia longissima* (Wen, 1987) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Goyoppia sagami* (Aoki, 1984) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Goyoppia sexpilosa* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- Heteroppia** Balogh, 1970 (4 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Heteroppia globigera* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental, Etiópica y subtropical (Paleártica meridional).

Heteroppia (Heteroppia) Balogh, 1970 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical (Paleártica meridional).

- *Heteroppia (H.) globigera* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Heteroppia (H.) orthodactyla* (Willmann, 1932) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: **Oriental (Java y Filipinas).**

- *Heteroppia (H.) setigera* Aoki, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Heteroppia (Tanzoppia) Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tanzoppia trisetata* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Heteroppia (Tanzoppia) trisetata* (Mahunka, 1988) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Laroppia Subías, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia petiolata* Wallwork, 1977

DISTRIBUCIÓN: Atlántico Sur.

- *Laroppia petiolata* (Wallwork, 1977) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

Lasiobelba Aoki, 1959 (35 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lasiobelba remota* Aoki, 1959

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Lasiobelba (Lasiobelba) Aoki, 1959 (18 spp.)

(=*Cilioppia* Balogh, 1983)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Lasiobelba (L.) arcidiaconoae* (Bernini, 1973) (*Oppia*)

(=*Oppia bayoumii* Shereef y Zaher, 1981)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e India (Tripura).

- *Lasiobelba (L.) daamsae* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Martens, 2014

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Lasiobelba (L.) decui* (Vasiliu e Ivan, 1995) (*Cilioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Israel e Irán.

- *Lasiobelba (L.) gibbosa* (Mahunka, 1985) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Malawi).

- *Lasiobelba (L.) hesperidiana* (Pérez-Íñigo, 1986) (*Cilioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Lasiobelba (L.) insulata* Ohkubo, 2001

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Lasiobelba (L.) kuehmelti* (Csiszár, 1961) (*Oppia*)

(=*Oppia yodai* Aoki, 1965)

DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (frecuente), Australiana y Etiópica, y Paleártica meridional: Irán y Turquía.

- *Lasiobelba (L.) lemuria* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Lasiobelba (L.) longisensilla* Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: **Vietnam.**

- *Lasiobelba (L.) pontica* Vasiliu e Ivan, 2011

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Lasiobelba (L.) pori* (Vasiliu e Ivan, 1995) (*Cilioppia*)

(=*Oppia yodai africana* Kok, 1967, "nom. praeoc." por Evans, 1953)

(=*Lasiobelba arabica* Mahunka, 2000)

(=*Lasiobelba neominata* Subías, 2004)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán), Etiópica y Hawái.

- *Lasiobelba (L.) remota* Aoki, 1959

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.

- *Lasiobelba (L.) rubida* (Wallwork, 1977) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Lasiobelba (L.) sculpta* Wang, 1993

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Lasiobelba (L.) subuligera* (Berlese, 1916) (*Dameosoma denticulatum* s.)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Lasiobelba (L.) suchetae* Sanyal, 1992

- DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Lasiobelba* (*L.*) *vietnamica* Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: **Oriental** (Vietnam y Filipinas).
 - *Lasiobelba* (*L.*) *yunnanensis* Wen, 1999
 DISTRIBUCIÓN: China sureste.

***Lasiobelba* (*Antennoppia*) Mahunka, 1983 (17 spp.)**

(=*Daedaloppia* Hauser y Mahunka, 1983)

ESPECIE TIPO: *Antennoppia minor* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical (Paleártica meridional) y Neártica.

- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *abchasic*a (Golosoova y Tarba, 1974) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *capilligera* (Berlese, 1916) (*Dameosoma*)
 DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *chistyakovi* Ermilov y Kalúz, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *granulata* (Mahunka, 1986) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *heterosa* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad) y Paleártica meridional (Irán).
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *insignis* Balogh, 1970 (*L.*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *izquierdoae* Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994 (*L.*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *major* (Mahunka, 1983) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *minor* (Mahunka, 1983) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *nepalica* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Martens, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *parachistyakovi* Ermilov, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *quadriseta* Subías, 1989 (*L.*)
 (= *Lasiobelba icaria* Mahunka, 2001)
 DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *rigida* (Ewing, 1909) (*Damaeus*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *subnitida* (Sellnick, 1924) (*Dameosoma*)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *trichoseta* (Mahunka, 1983) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *ultraciliata* (Jacot, 1934) (*Dameosoma*)
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Lasiobelba* (*Antennoppia*) *yoshii* (Mahunka, 1987) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

***Lemuropia* Mahunka, 1994 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Lemuropia helleri* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Lemuropia helleri* Mahunka, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

***Neoamerioppia* Subías, 1989 (44 spp. y 1 ssp.)**

ESPECIE TIPO: *Amerioppia decemsetosa* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y **subantártica**.

***Neoamerioppia* (*Neoamerioppia*) Subías, 1989 (37 spp. y 1 ssp.)**

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y **subantártica**.

- *Neoamerioppia* (*N.*) *aelleni* (Mahunka, 1982) (*Amerioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Neoamerioppia* (*N.*) *africana* (Kok, 1967) (*Amerioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Zambia) y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
- *Neoamerioppia* (*N.*) *asiatica* (Hammer, 1977) (*Amerioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Neoamerioppia* (*N.*) *chavinensis* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Bengala Occidental).
- *Neoamerioppia* (*N.*) *chilensis* (Hammer, 1962) (*Amerioppia*)

- DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Neoamerioppia (N.) cocuyana* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Neoamerioppia (N.) csabai* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Neoamerioppia (N.) decemsetosa* (Hammer, 1973) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
 - *Neoamerioppia (N.) deficiens* (Balogh, 1959) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Neoamerioppia (N.) extrusa* (Mahunka, 1983) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
 - *Neoamerioppia (N.) flagellata* (Hammer, 1975) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sahara.
 - *Neoamerioppia (N.) flagelliapex* Ohkubo y Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
 - *Neoamerioppia (N.) foveolata* (Mahunka, 1984) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Neoamerioppia (N.) hamidi* (Al-Assiuty y El-Deeb, 1983) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Neoamerioppia (N.) hexapilis* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Neoamerioppia (N.) hortensis* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2007) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Neoamerioppia (N.) interrogata* (Mahunka, 1976) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China: Hong-Kong, y Filipinas).
 - *Neoamerioppia (N.) lanceolata* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Neoamerioppia (N.) longiclava* (Hammer, 1962) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Guinea).
 - *Neoamerioppia (N.) longiclava longiclava* (Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Nueva Zelanda.
 - *Neoamerioppia (N.) longiclava microseta* (J. y P. Balogh, 1986) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Neoamerioppia (N.) longicoma* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Neoamerioppia (N.) minima* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Neoamerioppia (N.) nagyi* (Mahunka, 1969) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Neoamerioppia (N.) notata* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
 - *Neoamerioppia (N.) papuana* (J. y P. Balogh, 1986) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Neoamerioppia (N.) paripilis* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Neoamerioppia (N.) pectigera* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile).
 - *Neoamerioppia (N.) phoretica* (Franklin y Woas, 1992) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
 - *Neoamerioppia (N.) polygonata* (Mahunka, 1982) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Sudáfrica).
 - *Neoamerioppia (N.) rotunda* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Chile).
 - *Neoamerioppia (N.) similis* (Covarrubias, 1967) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Neoamerioppia (N.) sturmi* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Neoamerioppia (N.) trichosa* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
 - *Neoamerioppia (N.) trichosoides* (Hammer, 1961) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Neoamerioppia (N.) ventrosquamosa* (Hammer, 1979) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia), Australiana (Micronesia: I. Marianas) y Japón.
 - *Neoamerioppia (N.) vicina* (Hammer, 1971) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Java.
 - *Neoamerioppia (N.) vietnamica* (Mahunka, 1988) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).

- *Neoamerioppia (N.) woolleyi* (Hammer, 1968) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Neoamerioppia (Amerigloboppia) Subías, 1989 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Amerioppia espeletiarum* P. Balogh, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica) y "Paleártica".

- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) badensis* (Woas, 1986) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) centraliamericana* (Mahunka, 1983) (*Globoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) costulifera* Mahunka, 1997 (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) espeletiarum* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) extrema* (Mahunka, 1985) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas e I. Galápagos).
- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) salvadoriensis* (Woas, 1986) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Neoamerioppia (Amerigloboppia) senecionis* (P. Balogh, 1984) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Colombia e I. Galápagos).

Niloppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia sticta* Popp, 1960

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Niloppia sticta* (Popp, 1960) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Oligoppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Amerioppia octocoma* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Oligoppia octocoma* (Hammer, 1973) (*Amerioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Oppia Koch, 1836 (20 spp. y 1 ssp.)

(=*Dameosoma* Berlese, 1892)

ESPECIE TIPO: *Oppia nitens* Koch, 1836

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

- *Oppia capense* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y "Alemania".
- *Oppia cephalota* (Hall, 1911) (*Damaeus*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
- *Oppia coloradensis* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Oppia denticulata* (G. y R. Canestrini, 1882) (*Belba*)
(?=*Oppia concolor* Koch, 1839 "sp. inq.")
(=*Oppia cyclosoma* Mihelčič, 1955)
(=*Oppia willmanni* Oudemans, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Sur de Siberia) y Neártica (U.S.A.: Nueva York), y Neotropical: Antillas (La Española: R. Dominicana) y Ecuador.
- *Oppia elegans* (Trägårdh, 1931) (*Dameosoma*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).
- *Oppia elongata* Jacot, 1938 "sp. inq."
(=*Oppia parviaures* Jacot, 1939)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Oppia ewingi* (Berlese, 1916) (*Dameosoma denticulatum e.*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois y Florida).
- *Oppia huangshanensis* Wen y Chen, 1991
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Oppia hungarica* Karpelles, 1893 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Oppia incisirostra* Woas, 1986
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Oppia leleupi* Balogh, 1958 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Oppia neonominata* Subías, 2004
(=*Oppia concolor tridentata* Pérez-Íñigo, 1976, "nom. praec." por Forsslund, 1942)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Oppia nitens Koch, 1836

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Asia centrooccidental y Neártica oriental) y Antártica.

- *Oppia nitens nitens* Koch, 1836

(=*Oppia grandis* Mihelčič, 1955)

(=*Belba minuta* Banks, 1895)

(=*Dameosoma myrmecophilum* Sellnick, 1928)

(=*Oribata perolata* Banks, 1909)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Asia centrooccidental y Neártica oriental).

- *Oppia nitens brachytrichina* Dalenius, 1958 “ssp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Crozet).

- *Oppia orientalis* Sanyal y Bhaduri, 1989

DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

- *Oppia quadrisetosa* (Kramer, 1898) (*Notaspis*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).

- *Oppia samadi* Kardar, 1977 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).

- *Oppia seminuda* Scull, Jeleva y Cruz, 1984

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Oppia speciosa* Golosova, 1981

DISTRIBUCIÓN: Noreste de Rusia asiática.

- *Oppia vitrea* (Tseng, 1982) (*Brachioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Paroppia Hammer, 1968 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Paroppia lebruni* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Paroppia breviseta* (Balogh, 1962) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).

- *Paroppia flagellata* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Paroppia hawaiiensis* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Paroppia lebruni* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Andhra Pradesh).

- *Paroppia patagonica* Kun, 2012

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Pluritrichoppia Subías y Arillo, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pluritrichoppia insolita* Subías y Arillo, 1989

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Pluritrichoppia insolita* Subías y Arillo, 1989

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Pseudomultioppia Subías, 2018 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Multioppia jandiae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Pseudomultioppia jandiae* (Pérez-Íñigo y Peña, 1996) (*Multioppia*)

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Quinquoppia Tseng, 1982 (2 spp.)

(=*Damaeoppia* Ohkubo, 1995)

ESPECIE TIPO: *Quinquoppia nobilis* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.

- *Quinquoppia formosana* (Ohkubo, 1995) (*Damaeoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Japón.

- *Quinquoppia nobilis* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Sphagnoppia J. y P. Balogh, 1986 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sphagnoppia biflagellata* J. y P. Balogh, 1986

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana) y subtropical (Neártica meridional).

- *Sphagnoppia biflagellata* J. y P. Balogh, 1986

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Sphagnoppia durhamensis* (Metz y Sharma, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Taiwanoppia Tseng, 1982 (16 spp.)ESPECIE TIPO: *Taiwanoppia subtropica* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Taiwanoppia (Taiwanoppia) Tseng, 1982 (10 spp.)(=**Vietoppia** Mahunka, 1988)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Neotropical.

- *Taiwanoppia (T.) flagellifera* (Wang, 1993) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Taiwanoppia (T.) fujianensis* (Wang, 1993) (*Vietoppia*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Taiwanoppia (T.) hungarorum* (Mahunka, 1988) (*Vietoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam y Méjico.
- *Taiwanoppia (T.) insitiva* (Mahunka, 2008) (*Vietoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Taiwanoppia (T.) nepalica* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Taiwanoppia (T.) papillaris* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Taiwanoppia (T.) paraflagellifera* Ermilov y Kalúz, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Taiwanoppia (T.) paranepalica* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Taiwanoppia (T.) pauciseta* (Hammer, 1971) (*Globoppia (Aeroppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.
- *Taiwanoppia (T.) subtropica* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Taiwanoppia (Paragloboppia) Subías, 1989 (6 spp.)ESPECIE TIPO: *Oppia diversiseta* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical.

- *Taiwanoppia (Paragloboppia) calva* (Warburton, 1912) (*Notaspis clavipectinata* c.) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) diversiseta* (Mahunka, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) mercedesae* (Arillo y Subías, 1997) (*Vietoppia (P.)*)
DISTRIBUCIÓN: **Mediterránea occidental**.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) pacifica* (Ohkubo y Aoki, 1995) (*Vietoppia (P.)*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) senegalensis* (Mahunka, 1975) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Taiwanoppia (Paragloboppia) trichotos* (Balogh y Mahunka, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Tectoppia Wallwork, 1961 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Tectoppia nigricans* Wallwork, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

- *Tectoppia costulata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Tectoppia longisetosa* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Tectoppia nigricans* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Ghana y Ecuador.

[**Multioppiinae**] Balogh, 1983 (19 gen., 9 subg., 194 spp. y 9 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Anomaloppia Subías, 1978 (11 spp.)ESPECIE TIPO: *Anomaloppia canariensis* Subías, 1978

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica, Neotropical y subantártica).

- *Anomaloppia alborzi* Akrami, Keshavarz y Saboori, 2015
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Anomaloppia arcuata* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Anomaloppia canariensis* Subías, 1978
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Anomaloppia chitinofineta* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central rusa).
 - *Anomaloppia differens* Mahunka y Topercer, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Anomaloppia dispariseta* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral, **subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]**, e Irán.
 - *Anomaloppia madeirensis* Arillo y Subías, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
 - *Anomaloppia manifera* (Hammer, 1955) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Alaska).
 - *Anomaloppia mazandaranica* Akrami y Subías, 2007
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
 - *Anomaloppia ozkani* Ayyildiz, 1989
 (= *Anomaloppia iranica* Bayartogtokh y Akrami, 2000)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).
 - *Anomaloppia peregovitsi* (Mahunka, 1986) (*Insculptoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Condyloppia Balogh, 1983 (2 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia condylifer* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Condyloppia condylifer* (Hammer, 1979) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
Condyloppia pilosella (Balogh, 1959) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Condyloppia pilosella pilosella* (Balogh, 1959)
 DISTRIBUCIÓN: Congo y Etiopía.
 - *Condyloppia pilosella longiseta* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Chad.

Cryptoppia Csiszár, 1961 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cryptoppia elongata* Csiszár, 1961

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Cryptoppia brevisetiger* Wen, Aoki y Wang, 1984
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Cryptoppia elongata* Csiszár, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
 - *Cryptoppia mahunkai* (Wang y Li, 1997) (*Pulchroppia*)
 (= *Pulchroppia elegans* Mahunka, 1988, "nom. praeoc." por Hammer, 1979)
 (= *Pulchroppia mahunkarum* J. y P. Balogh, 2002)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Cubaoppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia fusisetosa* Balogh y Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cubaoppia fusisetosa* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Graptoppia Balogh, 1983 (18 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: (*Dameosoma foveolatum* Paoli "sensu" Bernini, 1973) = *Graptoppia paraanalis* Subías y Rodríguez, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana), subtropical y austral.

Graptoppia (Graptoppia) Balogh, 1983 (11 spp. y 1 ssp.)

(= *Fronddoppia* Mahunka, 1983)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

- *Graptoppia (G.) alzueti* Martínez y Palacios-Vargas, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Graptoppia (G.) arenaria* Ohkubo, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Graptoppia (G.) exigua* (Mahunka, 1983) (*Fronddoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil y Norte de Neotropical.
 - *Graptoppia (G.) jyotikanae* Sanyal, Saha y Chakraborty, 2006
 DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Graptoppia (G.) neominata* Subías, 2004
 (= *Oppia parva* Kok, 1967, "nom. praeoc." por Lombardini, 1952)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Congo) y Paleártica meridional (Europa meridional e Irán).
 - *Graptoppia (G.) nukusia* (Shtanchaeva, 1984) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Graptoppia (G.) paraanalis* Subías y Rodríguez, 1985

(=*Stenoppia italica quinquepilosa* Morell, 1987)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

- *Graptoppia (G.) paradoxa* Ivan y Vasiliu, 1997

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Graptoppia (G.) pentagona* (Alzuet, 1981) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Graptoppia (G.) sundensis (Hammer, 1979) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.

- *Graptoppia (G.) sundensis sundensis* (Hammer, 1979)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Graptoppia (G.) sundensis acuta* Ayyildiz, 1989

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.

- *Graptoppia (G.) tanaitica* Karppinen y Poltavskaja, 1990

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Graptoppia (Apograptoppia) Subías y Rodríguez, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Dameosoma foveolatum* Paoli, 1908

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Graptoppia (Apograptoppia) foveolata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)

(=*Graptoppia (Apograptoppia) paolii* Ohkubo, 1993)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica meridional: Mediterránea e Irán, y Canadá).

Graptoppia (Stenoppia) Balogh, 1983 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Oppia heterotricha* Bernini, 1969) =*Oppia italica* Bernini, 1973

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical (excepto Australiana).

- *Graptoppia (Stenoppia) africana* Mahunka, 1987 (*G.*)

DISTRIBUCIÓN: Nigeria.

- *Graptoppia (Stenoppia) angusta* (Hammer, 1962) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Graptoppia (Stenoppia) cristata* Ohkubo, 1996

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Graptoppia (Stenoppia) italica* (Bernini, 1973) (*Oppia*)

(=*Oppia heterotricha* Bernini, 1969, "nom. praeoc." por Balogh y Mahunka, 1969)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Graptoppia (Stenoppia) multicorugata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Graptoppia (Stenoppia) quathlambae* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Helioppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia sol* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Helioppia sol* (Balogh, 1959) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.

Intermedioppia Subías y Rodríguez, 1987 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia alvarezii* Pérez-Íñigo, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Intermedioppia alvarezii* (Pérez-Íñigo, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].

Javieroppia Mínguez y Subías, 1986 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Javieroppia cervus* Mínguez y Subías, 1986

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Australiana.

- *Javieroppia cervus* Mínguez y Subías, 1986

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental, Irán y Australia.

Multioppia Hammer, 1961 (49 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Multioppia radiata* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Multioppia (Multioppia) Hammer, 1961 (28 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Multioppia (M.) australis* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Multioppia (M.) biciliata* Akrami y Bastan, 2015
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Multioppia (M.) callatisiana* Vasiliu e Ivan, 2009
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (M.) chilensis* Ermilov y Pešić, 2011
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Multioppia (M.) engelmanni* (Călugăr y Vasiliu, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Multioppia (M.) furugelma* Rjabinin, 1987
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Multioppia (M.) gapsaensis* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Multioppia (M.) ghiljarovi* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Rusia asiática).
- *Multioppia (M.) gilmartinoi* Subías y Arillo, 1996
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Multioppia (M.) glabra* (Mihelčič, 1955) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Oeste de Siberia).
- *Multioppia (M.) indica* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Multioppia (M.) integra* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Multioppia (M.) neglecta* Pérez-Íñigo, 1969
(=*Multioppia excisa* Moritz, 1971)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: excepto Este, y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Hawái.
- *Multioppia (M.) orghidani* Vasiliu e Ivan, 2009
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (M.) pakistanensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Paleártica oriental.
- *Multioppia (M.) pauciramosa* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Multioppia (M.) perfecta* Mahunka y Topercer, 1983
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Multioppia (M.) pseudoglabra* Ermilov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Multioppia (M.) pulchra* Littlewood y Wallwork, 1972
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Multioppia (M.) radiata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Noreste de India e Irán.
- *Multioppia (M.) rangifera* Ivan y Vasiliu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Multioppia (M.) shinanoensis* Fujita, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Multioppia (M.) simplitricha* Sanyal y Bhaduri, 1989
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Multioppia (M.) stellifera* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú, India e Irán.
- *Multioppia (M.) tamdao* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Multioppia (M.) tenue* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Multioppia (M.) turcica* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Multioppia (M.) xinjiangensis* L. Wang, Zheng, X. Wang, X. Zhang y Wen, 1990
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Multioppia (Furculoppia) Balogh, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia furcata* Kunst, 1958

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y "Oriental".

- *Multioppia (Furculoppia) furcata* (Kunst, 1958) (*Oppia*)

(=*Oppia bulgarica* Mahunka, 1987)

(=*Oppia ramulifera* Kunst, 1959)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Multioppia (Furculoppia) himachalensis* (Kardar y Mattu, 1999) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: India (Himachal Pradesh).

Multioppia (Hammeroppia) Vasiliu e Ivan, 2009 (13 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Multioppia wilsoni* Aoki, 1964

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Multioppia (Hammeroppia) bacilliseta* Ohkubo, 1996 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Multioppia (Hammeroppia) canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Multioppia (Hammeroppia) gracilis* Hammer, 1972 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Tropical: Polinesia (Tahití), Norte de Oriental y Brasil, y Japón.

- *Multioppia (Hammeroppia) insolita* Ivan y Vasiliu, 1999 (*M.*)

("non" *Oppia insolita* Mihelčič, 1956, ?=*Multioppia (Hammeroppia) wilsoni laniseta*)

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Multioppia (Hammeroppia) insulana* Pérez-Íñigo, 1982 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], Hawái y Paleártica (Macaronésica: Madeira, e

Irán).

- *Multioppia (Hammeroppia) longisetosa* Mahunka, 1986 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

- *Multioppia (Hammeroppia) moritzi* Mahunka y Topercer, 1983 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

- *Multioppia (Hammeroppia) similis* Mahunka, 1982 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

- *Multioppia (Hammeroppia) spinifera* Mahunka, 1982 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Multioppia (Hammeroppia) translamellaris* J. y P. Balogh, 1986 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Multioppia (Hammeroppia) trembleyi* Mahunka, 1977 (*M.*)

(=*Multioppia calcarata* Mahunka, 1992)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Multioppia (Hammeroppia) wilsoni Aoki, 1964 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni wilsoni* Aoki, 1964

(?=*Oppia carolinae* Jacot, 1938 "sp. inq.")

(?=*Oppia carolinae barbatis* Jacot, 1938 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neotropical y Antártica).

- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni hungarica* Mahunka, 1983 (*M. laniseta h.*)

DISTRIBUCIÓN: Hungría.

- *Multioppia (Hammeroppia) wilsoni laniseta* Moritz, 1966 (*M. l.*)

(?=*Oppia caporiacci* Valle, 1955 "sp. inq.")

(?=*Dameosoma clavipectinatum lamellatum* Thamdrup, 1932 "sp. inq.", "nom. praeoc." por Halbert, 1923)

(?=*Oppia insolita* Mihelčič, 1956 "sp. inq.")

(?=*Oppia sexmaculata* Dalenius, 1950 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente), Paleártica oriental (excepto Este), "U.S.A." y

Neotropical (Venezuela y Cuba).

- *Multioppia (Hammeroppia) yamatogracilis* Fujikawa, 2003 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Multioppia (Multilanceoppia) Subías, 1989 (6 spp. y 1ssp.)

ESPECIE TIPO: *Multioppia ramulifera carpatica* Schalk, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y Neotropical.

Multioppia (Multilanceoppia) brevipectinata Suzuki, 1976 (*Multiop.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.

- *Multioppia (Multilanceoppia) brevipectinata brevipectinata* Suzuki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.

- *Multioppia (Multilanceoppia) brevipectinata lenis* Fujita y Fujikawa, 1986 (*Multiop.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Multioppia (Multilanceoppia) carpatica* Schalk, 1966 (*Multiop. ramulifera c.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Multioppia (Multilanceoppia) crassuta* Fujikawa, 2003 (*Multiop.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Multioppia (Multilanceoppia) formosana* Tseng, 1982 (*Multioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Multioppia (Multilanceoppia) insularis* Mahunka, 1985 (*Multiop.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Multioppia (Multilanceoppia) pankovi* Rjabinin, 1987 (*Multiop.*)

DISTRIBUCIÓN: Islas del Este de Rusia asiática.

Octoppia Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Octoppia irmayi* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Octoppia irmayi* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Pararamusella Mahunka y Palacios-Vargas, 1998 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pararamusella disjuncta* Mahunka y Palacios-Vargas, 1998

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pararamusella disjuncta* Mahunka y Palacios-Vargas, 1998

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Pseudoamerioppia Subías, 1989 (9 spp.)

(=**Minoricoppia** Pérez-Íñigo jr., 1991)

ESPECIE TIPO: *Oppia barrancensis paraguayensis* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical (Paleártica meridional) y Neártica.

- *Pseudoamerioppia ankae* (Mahunka, 1974) (*Amerioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].

- *Pseudoamerioppia balearica* (Pérez-Íñigo jr., 1991) (*Minoricoppia*)

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Pseudoamerioppia barrancensis* (Hammer, 1961) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Filipinas) y Etiópica (Camerún).

- *Pseudoamerioppia circumciliata* (Balogh, 1959) (*Oppia deficiens* c.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Camerún).

- *Pseudoamerioppia floralis* (Ohkubo, 1990) (*Ramusella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Pseudoamerioppia javensis* (Hammer, 1979) (*Amerioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Australiana (Hawái).

- *Pseudoamerioppia lamellata* (Wallwork, 1961) (*Oppia deficiens* l.)

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Pseudoamerioppia minuta* (Ewing, 1917) (*Damaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.

- *Pseudoamerioppia paraguayensis* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Oppia barrancensis* p.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e I. Canarias.

Pulchroppiella Balogh, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia plurisetosa* Mihelčič, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Pulchroppiella littlewoodae* Subías, 1989

DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

- *Pulchroppiella plurisetosa* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Ramonoppia Morell, 1990 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ramonoppia amparoae* Morell, 1990

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Ramonoppia aequiseta* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Multioppia*)

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Ramonoppia amparoae* Morell, 1990

DISTRIBUCIÓN: España.

Ramusella Hammer, 1962 (85 spp. y 4 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Ramusella puertomontensis* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Ramusella (Ramusella) Hammer, 1962 (27 spp. y 1 ssp.)

(=**Alcioppia** Balogh, 1983)

(=**Amolops** Hull, 1916, "nom. praeoc." por Cope, 1865)

(=**Bioppia** Mahunka y Paoletti, 1984)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Ramusella (R.) arcuata* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Ramusella (R.) assimiloides* Subías y Rodríguez, 1987

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Ramusella (R.) baichengensis* (Zhao y Wen, 1992) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Norte de China.

- *Ramusella (R.) chulumaniensis* (Hammer, 1958) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.

- *Ramusella (R.) clavipectinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
(=*Oppia alamellata* Kardar, 1977)
(=*Dameosoma alces* Jacot, 1934)
(=*Oppia assimilis* Mihelčič, 1956)
(=*Oppia taminae* Rjabinin, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Malgache, Oriental y Hawái).
 - *Ramusella (R.) confusa* Arillo y Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira) e Irán.
 - *Ramusella (R.) cordobensis* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Ramusella (R.) curtipilus* Hammer, 1971 (*R. chulumaniensis* c.)
(=*Oppia nana* Woas, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana: Islas del Pacífico, Neotropical y Oriental: Bali) y Paleártica meridional (Irán).
 - *Ramusella (R.) defectuosa* Subías y Rodríguez, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Ramusella (R.) filamentosa* (Mahunka, 1985) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Ramusella (R.) filigera* (Mahunka, 1985) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Ramusella (R.) gyrata* (Mahunka y Paoletti, 1984) (*Bioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Italia e Irán.
 - *Ramusella (R.) hainardorum* (Mahunka, 1992) (*Uroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
 - *Ramusella (R.) hippy* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Ramusella (R.) junonis* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y Neotropical.
 - *Ramusella (R.) kumaensis* Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Ramusella (R.) lyroseta* (Wallwork, 1964) (*Oppia fusiformis* l.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Camerún).
 - *Ramusella (R.) paillei* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
 - *Ramusella (R.) persica* Akrami, Behmanesh y Subías, 2015
(=*Ramusella iranica* Behmanesh, Akrami y Subías, 2012, “nom. praeoc.” por Akrami y Subías, 2008)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Ramusella (R.) philippinensis* (Mahunka, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Ramusella (R.) pinifera* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Ramusella (R.) puertomonttensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tropical (India: Bengala Occidental, Melanesia: I. Fiji, y Neotropical: Chile y Brasil) y subtropical: Paleártica meridional (Mediterránea, Irán y Este de Rusia asiática).
 - *Ramusella (R.) remyi* (Karppinen, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Guinea.
 - *Ramusella (R.) sengbuschi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.
 - *Ramusella (R.) sengbuschi sengbuschi* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y subtropical.
 - *Ramusella (R.) sengbuschi tokyoensis* (Aoki, 1974) (*Oppia t.*)
(=*Ramusella tuberculata* Mahunka y Topercer, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Ramusella (R.) tasetata* Subías, 1980
DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Congo.
 - *Ramusella (R.) translamellata* Subías, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Ramusella (R.) triacantha* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- Ramusella (Insculptoppia)*** Subías, 1980 (40 spp.)
ESPECIE TIPO: *Dameosoma insculptum* Paoli, 1908
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Ramusella (Insculptoppia) alata* (Mahunka, 1997) (*Sphagnoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Ramusella (Insculptoppia) alejnicovae* (Krivolutsky y Gatilova, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).

- *Ramusella (Insculptoppia) ananthakrishni* (Sanyal y Bhaduri, 1989) (*Brachioppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Ramusella (Insculptoppia) anuncata* Subías y Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Insculptoppia) bagnalli* (Hull, 1916) (*Amolops*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Ramusella (Insculptoppia) berninii* (Pérez-Íñigo, 1975) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ramusella (Insculptoppia) cavernalis* (Ohkubo y Cokendolpher, 2002) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.
- *Ramusella (Insculptoppia) claudelionsi* (Călugăr y Vasiliu, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Ramusella (Insculptoppia) corniculata* Pérez-Íñigo y Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ramusella (Insculptoppia) crenata* (Mahunka, 1992) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Ramusella (Insculptoppia) elliptica* (Berlese, 1908) (*Lohmannia*)
(=*Ramusella abarkouhiensis* Bayartogtokh y Akrami, 2000)
(=*Insculptoppia lamellata* Pérez-Íñigo jr., 1991)
DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical: Paleártica (Mediterránea: frecuente, e Irán), U.S.A. (Nuevo Méjico), Neotropical (Costa Rica) y Oriental (Vietnam).
- *Ramusella (Insculptoppia) elmela* Subías y Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Ramusella (Insculptoppia) ermani* Baran, 2010 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) farsi* Akrami, Subías y Behmanesh, 2011
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (Insculptoppia) florisbadensis* Hugo-Coetsee, 2016
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Camerún).
- *Ramusella (Insculptoppia) furcata* (Willmann, 1928) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Ramusella (Insculptoppia) fusiformis* (Wallwork, 1961) (*Oppia soror f.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ramusella (Insculptoppia) golosovae* (Rjabinin, 1987) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Ramusella (Insculptoppia) golbasiensis* Baran, 2010 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) insculpta* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
(=*Oppia shaldybiniae* Kulijev, 1962)
(=*Ramusella insularis* Rjabinin, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte): frecuente, Paleártica oriental (Este de Paleártica oriental e Irán) y Vietnam.
- *Ramusella (Insculptoppia) iranica* Akrami y Subías, 2008
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (Insculptoppia) krivolutskyi* (Kulijev, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Ramusella (Insculptoppia) lata* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramusella (Insculptoppia) lunata* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Ramusella (Insculptoppia) luxtoni* (Ayyildiz, 1989) (*Gressittoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) merimna* (Balogh y Mahunka, 1977) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Ramusella (Insculptoppia) mussardi* (Mahunka, 1992) (*Graptoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Ramusella (Insculptoppia) neonominata* Subías, 2004
(=*Ramusella (Insculptoppia) corniculata* Ivan y Vasiliu, 1999, “nom. praec” por Pérez-Íñigo y Peña, 1997)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Ramusella (Insculptoppia) paolii* Ivan y Vasiliu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Ramusella (Insculptoppia) pinarbasiensis* Ayyildiz, Toluk y Taskiran, 2010
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) ramulifera* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ramusella (Insculptoppia) remota* (Ohkubo y Aoki, 1995) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).

- *Ramusella (Insculptoppia) salmani* Toluk y Ayyildiz, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ramusella (Insculptoppia) seniczakae* Hugo-Coetzee, 2016
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Ramusella (Insculptoppia) sensiclavata* (Kardar, 1977) (*Oppia*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
- *Ramusella (Insculptoppia) sheshanensis* (Wen, Aoki y Wang, 1984) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: China suroccidental.
- *Ramusella (Insculptoppia) soror* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental y Cáucaso.
- *Ramusella (Insculptoppia) suciui* (Hammer, 1968) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Ramusella (Insculptoppia) terricola* Subías y Rodríguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Insculptoppia) tobiasi* Hugo-Coetzee, 2016
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Camerún).

Ramusella (Insculptoppiella) Subías y Rodríguez, 1986 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia alfonsii* Bernini, 1980

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Paleotropical.

- *Ramusella (Insculptoppiella) aepyornis* Mahunka, 1994 (R.)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Ramusella (Insculptoppiella) alfonsii* (Bernini, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Ramusella (Insculptoppiella) bicillata* Ohkubo, 1996 (R. (*Insculptoppia*))
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ramusella (Insculptoppiella) elongata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ramusella (Insculptoppiella) flagellaris* Ohkubo, 1996 (R. (*Insculptoppia*))
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ramusella (Insculptoppiella) humicola* Wang y Li, 1997 (R. (*Insculptoppia*))
DISTRIBUCIÓN: China.
- *Ramusella (Insculptoppiella) pocsi* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Ramusella (Insculptoppiella) varians* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana e I. Santa Helena), Mediterránea oriental y Suroeste de Paleártica oriental.

Ramusella (Rectoppia) Subías, 1980 (10 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia mihelcici* Pérez-Íñigo, 1965

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

- *Ramusella (Rectoppia) damavandica* Akrami y Subías, 2008
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Ramusella (Rectoppia) eduardoi* Arillo y Subías, 1996
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: excepto Norte, “U.S.A.: Florida”, Somalia, India: Tripura, y subantártica: I. Amsterdam).
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata fasciata* (Paoli, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional, Irán y Corea), “U.S.A. (Florida)”, Somalia, India (Tripura) y subantártica (I. Amsterdam).
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata sahariensis* (Hammer, 1975) (*Oppia s.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente).
- *Ramusella (Rectoppia) fasciata sudamericana* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1998
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Ramusella (Rectoppia) ginchiensis* Ermilov y Rybalov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ramusella (Rectoppia) incisiva* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Ramusella (Rectoppia) mihelcici* (Pérez-Íñigo, 1965) (*Oppia*)
(=*Oppia guelticola* Hammer, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Venezuela.
- *Ramusella (Rectoppia) paradiata* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Ramusella (Rectoppia) radiata* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).
- *Ramusella (Rectoppia) rhinina* Subías y Mínguez, 1981

- DISTRIBUCIÓN: España.
Ramusella (Rectoppia) strinatii (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Ramusella (Rectoppia) strinatii strinatii* (Mahunka, 1980)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
 - *Ramusella (Rectoppia) strinatii curtiramosa* Subías y Rodríguez, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).

- Ramusella (Sabahoppia)*** Mahunka, 1987 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: (*Sabahoppia hauseri* Mahunka, 1987) = *Xenillus blattarum* Oudemans, 1911
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Ramusella (Sabahoppia) blattarum* (Oudemans, 1911) (*Xenillus*)
 (= *Sabahoppia hauseri* Mahunka, 1987)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- Ramuselloppia*** Subías y Rodríguez, 1986 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Ramuselloppia anomala* Subías y Rodríguez, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.
 - *Ramuselloppia anomala* Subías y Rodríguez, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Ramuselloppia japonica* (Aoki, 1983) (*Brachioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Ramuselloppia vietnamica* Ermilov y Anichkin, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- Sceletoppia*** Mahunka y Mahunka-Papp, 2009 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Sceletoppia tana* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Sceletoppia tana* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.

- Tainsculptoppia*** Subías y Shtanchaeva, 2011 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Tainsculptoppia graptoppioides* Subías y Shtanchaeva, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Tainsculptoppia graptoppioides* Subías y Shtanchaeva, 2011
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Tainsculptoppia subiasi* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Oxyoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: España.

- Uroppia*** Balogh, 1983 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oppia akusiensis* Wallwork, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
 - *Uroppia akusiensis* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana e India (Tripura).
 - *Uroppia kenyaensis* Mahunka, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.

[**Pulchroppiinae**] Balogh, 1983 (2 gen., 16 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

- Multipulchroppia*** Subías, 1989 (8 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Multioppia berndhauseri* Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).
 - *Multipulchroppia amazonica* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Multipulchroppia berndhauseri* (Mahunka, 1978) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión) y Japón.
 - *Multipulchroppia graeca* (Mahunka, 1977) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Multipulchroppia gyoergyi* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Multipulchroppia pectinata* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Multioppia*)
 (= *Multioppia vietnamica* Balogh, 1983)
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
Multipulchroppia schauenbergi (Mahunka, 1978) (*Multioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión) y Japón.
 - *Multipulchroppia schauenbergi schauenbergi* (Mahunka, 1978)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).

- *Multipulchroppia schauenbergi punctulata* Ohkubo, 1992

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Multipulchroppia siamensis* (Suzuki, 1976) (*Multioppia*)

(=*Multioppia pectinata* Aoki, 1967, "nom. praeoc." por Balogh y Mahunka, 1967)

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Multipulchroppia similis* (Hammer, 1979) (*Pulchroppia*)

DISTRIBUCIÓN: Java y Vietnam.

Pulchroppia Hammer, 1979 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pulchroppia elegans* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pulchroppia burckhardti* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Pulchroppia elegans* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).

- *Pulchroppia granulata* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pulchroppia malapectinata* (Corpuz-Raros, 1979) (*Brachioppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Pulchroppia pendula* (Balogh, 1970) (*Brachioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Pulchroppia ramifera* Wang y Li, 1997

DISTRIBUCIÓN: China.

- *Pulchroppia roynortoni* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Pulchroppia sculpturata* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

[**Arcoppiinae**] Balogh, 1983 (6 gen., 2 subg., 78 spp. y 9 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Arcoppia Hammer, 1977 (58 spp. y 9 sspp.)

(=***Chuoppia*** Tseng, 1982)

ESPECIE TIPO: *Arcoppia brachyramosa* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Arcoppia aequivoca* Subías, 1989

(=*Arcoppia sabahensis* Mahunka, 1988, "nom. praeoc." por Mahunka, 1987)

(=*Arcoppia kalimantanensis* Ohkubo y Aoki, 1995)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Arcoppia arborea* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Arcoppia arcualis (Berlese, 1913) (*Dameosoma*)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

- *Arcoppia arcualis arcualis* (Berlese, 1913)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente).

- *Arcoppia arcualis curtiseta* Rodríguez y Subías, 1984

(=*Arcoppia arcualis novaezealandiae* J. y P. Balogh, 1986)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Arcoppia arcualis enghoffi* Rodríguez y Subías, 1984

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Arcoppia arcualis novaeguineae* J. y P. Balogh, 1986

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Andhra Pradesh).

- *Arcoppia bacilligera* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Arcoppia bidentata Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridias [Vanuatu]).

- *Arcoppia bidentata bidentata* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridias [Vanuatu]).

- *Arcoppia bidentata sabahensis* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).

- *Arcoppia bifilis* (Canestrini, 1898) (*Belba*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Arcoppia biflagellata* J. y P. Balogh, 1986

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

- *Arcoppia brachyramosa* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Méjico.

- *Arcoppia campinarianensis* (Franklin y Woas, 1992) (*Oppia* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Arcoppia corniculifera* (Mahunka, 1978) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Malgache: I. Mauricio, y Uganda), ¿Centroamérica?, Australiana (I. Fiji) y Oriental.
- *Arcoppia corniculifera corniculifera* (Mahunka, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Malgache: I. Mauricio, y Uganda), ¿Centroamérica? y Vietnam.
- *Arcoppia corniculifera fijiensis* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Nepal.
- *Arcoppia cronus* (Jacot, 1934) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Arcoppia cronus cronus* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Arcoppia cronus papua* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia cronus winkleri* (Hammer, 1968) (*Oppia w.*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Polinesia: Tahití).
- *Arcoppia cryptomeriae* (Mondal y Kundu, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Arcoppia curtipila* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia curvirostrata* Ohkubo y Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Arcoppia dechambrierorum* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Arcoppia dissimilis* (Berlese, 1905) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Arcoppia dissimiloides* (Sellnick, 1925) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Arcoppia fenestralis* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Arcoppia fenestralis fenestralis* (Wallwork, 1961)
DISTRIBUCIÓN: África occidental.
- *Arcoppia fenestralis orientalis* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India nororiental.
- *Arcoppia fenestralis sinensis* (Mahunka, 1976) (*Oppia arcualis s.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Arcoppia flagellata* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Arcoppia grucheti* (Mahunka, 1978) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Arcoppia guineana* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Arcoppia hammerae* Rodríguez y Subías, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Arcoppia inaequirostris* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia incerta* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Arcoppia indica* Sanyal, Sengupta, Saha y Chakraborty, 2000
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Arcoppia interrupta* Ohkubo, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Arcoppia kaindicola* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia longisetosa* Balogh, 1982
DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
- *Arcoppia luzonensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Arcoppia mahunkai* Rodríguez y Subías, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Arcoppia mcadami* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Tripura).
- *Arcoppia meghalayensis* Sanyal, Sengupta, Saha y Chakraborty, 2000
DISTRIBUCIÓN: India (Megalaya).
- *Arcoppia montana* Sanyal, Sengupta, Saha y Chakraborty, 2000
DISTRIBUCIÓN: India (Himachal Pradesh).

- *Arcoppia obtusa* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia palmaria* (Tseng, 1982) (*Chuoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Arcoppia perezini* Rodríguez y Subías, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Arcoppia perisi* Rodríguez y Subías, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Arcoppia piffli* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia porifera* (Franklin y Woas, 1992) (*Oppia* (A.))
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Arcoppia praeaeuata* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia radiata* (Wallwork, 1961) (*Oppia angolensis* r.)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Arcoppia rangifer* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arcoppia robusta* Mahunka, 1988
(=*Arcoppia confusa* Subías, 1989)
DISTRIBUCIÓN: **Oriental** (Borneo y Filipinas).
- *Arcoppia robustia* (Berlese, 1913) (*Dameosoma arcuale* r.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Arcoppia rotunda* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Tripura).
- *Arcoppia rugosa* (Mahunka, 1974) (*Oppia*)
(=*Arcoppia pergeli* Mahunka, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Zimbabue [Rodesia] y Etiopía.
- *Arcoppia sambhui* Sanyal, Sengupta, Saha y Chakraborty, 2000
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Arcoppia secata* Mahunka, 1999
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Arcoppia semicostulata* (Mahunka, 1985) (*Pletzenoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Arcoppia serrulata* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Oriental (Vietnam).
- *Arcoppia teraja* Mahunka, 2001
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Arcoppia tripartita* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
(=*Oppia gilva* Wallwork, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y África centrooccidental.
- *Arcoppia tripuraensis* Sanyal, Sengupta, Saha y Chakraborty, 2000
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Arcoppia triramosa* (Tseng, 1982) (*Chuoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Arcoppia varia* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Brasil.
- *Arcoppia viperea* (Aoki, 1959) (*Oppia*)
(=*Arcoppia baloghi* Rodríguez y Subías, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente), Oriental y Sudáfrica.
- *Arcoppia vittata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Arcoppia waterhousei* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia y **Oriental** (Vietnam y Filipinas).

Basidoppia Mahunka, 1983 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Basidoppia basidii* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Basidoppia angolensis* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Uganda).
- *Basidoppia basidii* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Basidoppia curtispinosa* (Ohkubo, 1996) (*Arcoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Basidoppia demeteri* (Mahunka, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Madagascar).
- *Basidoppia pocsorum* Mahunka, 1993

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Basidoppia psyla* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Mimoppia Balogh, 1983 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oppia tenuiseta* Wallwork, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

Mimoppia (Mimoppia) Balogh, 1983 (2 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
 - *Mimoppia (M.) dendropectinata* (Woas, 1986) (*Arcoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
 - *Mimoppia (M.) tenuiseta* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.

Mimoppia (Dysarcoppia) Mahunka y Palacios-Vargas, 1998 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Arcoppia (Dysarcoppia) mexicana* Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Mimoppia (Dysarcoppia) mexicana* (Mahunka y Palacios-Vargas, 1998) (*Arcoppia (D.)*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Porrhoppia Balogh, 1970 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Porrhoppia crux* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Porrhoppia crux* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Similoppia Mahunka, 1983 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Similoppia halterata* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Similoppia (Similoppia) Mahunka, 1983 (1 sp.)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Similoppia (S.) halterata* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Similoppia (Reductoppia) P. Balogh, 1984 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Reductoppia espeletiae* P. Balogh, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Similoppia (Reductoppia) espeletiae* (P. Balogh, 1984) (*R.*)
 DISTRIBUCIÓN: Colombia.

Wallworkoppia Subías, 1989 (8 spp.)
 (= *Wallworkella* Balogh, 1983, "nom. praeoc." por *Wallworkiella* Hammer, 1979)
 ESPECIE TIPO: *Oppia trimucronata* Wallwork, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.
 - *Wallworkoppia cervifer* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
 (= *Arcoppia longiramosa* Woas, 1986)
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Wallworkoppia directa* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2007) (*Arcoppia (W.)*)
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Wallworkoppia machadoi* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
 (= *Arcoppia granulata* Mahunka, 1986)
 DISTRIBUCIÓN: África centrooriental (frecuente) y Ecuador.
 - *Wallworkoppia minima* (Ermilov, Rybalov y Hundama, 2014) (*Arcoppia (W.)*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Wallworkoppia parasensillus* (Mahunka, 1999) (*Arcoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Uganda.
 - *Wallworkoppia trimucronata* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Uganda).
 - *Wallworkoppia tuberosa* (Mahunka, 1988) (*Arcoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Wallworkoppia vibrissa* (Mahunka, 1983) (*Wallworkella*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).

[**Brachioppiinae**] Subías, 1989 (11 gen., 2 subg., 72 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y austral.

Austroppia Balogh, 1983 (2 spp.)ESPECIE TIPO: (*Oppia magellanicus* Hammer, 1962) = *Notaspis crozetensis* Richters, 1908

DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y Austral (Neotropical y Australiana).

- *Austroppia crozetensis* (Richters, 1908) (*Notaspis*)(=*Oppia crozetensis anarensis* Dalenius, 1958)(=*Oppia magellanicus* Hammer, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica (frecuente), América austral (Tierra del Fuego) y Nueva Zelanda.

- *Austroppia petrohuensis* (Hammer, 1962) (*Brachioppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Brachioppia Hammer, 1961 (12 spp.)ESPECIE TIPO: *Brachioppia cuscensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical.

- *Brachioppia cajamarcensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil) e India (Bengala Occidental).

- *Brachioppia cuscensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), Norte de India y Japón.

- *Brachioppia deliciosa* Hammer, 1961(=*Oppia guarani* Balogh y Mahunka, 1981)(=*Oppia pseudocostulata* Balogh y Mahunka, 1969)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical: frecuente.

- *Brachioppia excrescens* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Brachioppia glabra* Franklin y Woas, 1992

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Brachioppia insolita* Ermilov y Tolstikov, 2015

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Brachioppia koki* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Brachioppia louwi* Hugo-Coetzee, 2014

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Brachioppia palmata* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Brachioppia triglochis* (Balogh y Mahunka, 1977) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Brachioppia tiramosa* (Sellnick, 1924) (*Dameosoma*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Brachioppia tropicalis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).

Brachioppiella Hammer, 1962 (29 spp. y 1 ssp.)ESPECIE TIPO: *Brachioppiella periculosa* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y austral.

Brachioppiella (Brachioppiella) Hammer, 1962 (14 spp.)(=*Ugandoppia* Mahunka, 1998)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Brachioppiella (B.) bifurcata* (Mahunka, 1998) (*Ugandoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Uganda.

- *Brachioppiella (B.) biseriata* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.

- *Brachioppiella (B.) dawidi* Hugo-Coetzee, 2014

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Brachioppiella (B.) goblina* Hugo-Coetzee, 2014

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Brachioppiella (B.) hannecarti* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

- *Brachioppiella (B.) higginsii* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).

- *Brachioppiella (B.) nasalis* (Evans, 1953) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Brachioppiella (B.) paranasalis* Lee y Subías, 1991

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Brachioppiella (B.) periculosa* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India.

- *Brachioppiella (B.) rajsikii* Hammer, 1968

- DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Brachioppiella (B.) ramosa* (Karppinen, 1966) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Guinea.
 - *Brachioppiella (B.) tenuicoma* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
 - *Brachioppiella (B.) triramosa* Hammer, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Brachioppiella (B.) walkeri* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Brachioppiella (Gressittoppia) Balogh, 1983 (15 spp. y 1 ssp.)
 (= *Jermyia* Mahunka, 2002)

ESPECIE TIPO: *Brachioppia moresonensis* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Austral y subtropical austral.

- *Brachioppiella (Gressittoppia) baderi* (Hammer, 1968) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) corallifera* (Mahunka, 1985) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) hartensteini* (Hammer, 1968) (*Brachioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) incisa* Martínez y Palacios-Vargas, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) magna* Lee y Subías, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) martinezi* Hugo-Coetzee, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) minima* Lee y Subías, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) moresonensis* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) orkneyensis* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Orcadas del Sur (I. Orkney).
Brachioppiella (Gressittoppia) pepitensis (Hammer, 1962) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica (I. Shetland del Sur).
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) pepitensis pepitensis* (Hammer, 1962)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y Antártica.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) pepitensis brevipectinata* (Covarrubias, 1968) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur).
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) pocsi* (Mahunka, 2002) (G.)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) pseudohigginsii* Lee y Subías, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) ricknuttalli* Hugo-Coetzee, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) sensilla* (Mahunka, 2002) (*Jermyia*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Brachioppiella (Gressittoppia) usheri* (P. Balogh, 1988) (*Solenoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Brassoppia Balogh, 1983 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia brassi* Balogh, 1981

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical austral.

Brassoppia (Brassoppia) Balogh, 1983 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Brassoppia (B.) brassi* (Balogh, 1982) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Brassoppia (B.) lamellata* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Brassoppia (Plaesioppia) Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Brachioppiella peullaensis* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Brassoppia (Plaesioppia) peullaensis* (Hammer, 1962) (*Brachioppiella*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.

Ctenoppia Balogh, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia variopectinata* Balogh y Mahunka, 1975

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Ctenoppia eupectinata* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Ctenoppia variopectinata* (Balogh y Mahunka, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Gittella Hammer, 1961 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Gittella punctata* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Gittella ecuadoriensis* Ermilov y Kalúz, 2012

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Gittella flagellata* (Mahunka, 1983) (*Pulchroppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Gittella insularis* Mahunka, 1998

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Antillas y Bolivia).

- *Gittella maxima* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Multioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Gittella minor* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Gittella punctata* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Gittella variabilis* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Perú).

Kokoppia Balogh, 1983 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachioppia longisetosa* Kok, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Kokoppia dendricola* (Jeleva y Vü, 1987) (*Cryptoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Kokoppia dudichi* (Balogh, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Kokoppia euramosa* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Centroamérica).

- *Kokoppia gracilis* (Woas, 1986) (*Arcoppia*)

DISTRIBUCIÓN: El Salvador.

- *Kokoppia longisetosa* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Kokoppia mandelai* Hugo-Coetzee, 2014

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Kokoppia murvanidzeae* Hugo-Coetzee, 2017

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Kokoppia pectinata* (Kok, 1967) (*Brachioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Tripura).

- *Kokoppia rafalskii* (Hammer, 1968) (*Brachioppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Leptoppia Mahunka, 1997 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Leptoppia procera* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Leptoppia benyovszkyi* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Leptoppia procera* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Pletzenoppia Balogh, 1983 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia pletzenae* Kok, 1967

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

- *Pletzenoppia aeta* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Pletzenoppia inclinata* (Hammer, 1962) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Cuba).

- *Pletzenoppia pletzenae* (Kok, 1967) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Setuloppia Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia newelli* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Setuloppia newelli* (Hammer, 1968) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Trapezoppia Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tanzoppia longipectinata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Trapezoppia longipectinata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).

- *Trapezoppia nova* Franklin y Woas, 1992

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

[**Medioppiinae**] Subías y Mínguez, 1985 (11 gen., 3 subg., 79 spp. y 5 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Congoppia Balogh, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia debois sezoni* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Congoppia debois sezoni* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Oppia*)

(=*Congoppia extrema* Mahunka, 1987)

DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental y Vietnam.

- *Congoppia ramisetosa* (Sanyal y Bhaduri, 1989) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

Discoppia Balogh, 1983 (5 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia limae* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical.

Discoppia (*Discoppia*) Balogh, 1983 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Discoppia* (*D.*) *limae* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: **Oriental** (Península Malaya y Filipinas).

Discoppia (*Cylindroppia*) Subías y Rodríguez, 1986 (4 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia minus cylindrica* Pérez-Íñigo, 1965

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical.

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *casuarina* (Abd-el-Hamid, Hussein, Bayoumi y Al-Assiuty, 1983) (*Oppia*)

(=*Oppia bifidus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1985)

(=*Oppia sitnikovae* Shereef, 1976, "nom. praeoc." por Kulijev, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Discoppia (*Cylindroppia*) *cylindrica* (Pérez-Íñigo, 1965) (*Oppia minus c.*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental y Centroamérica.

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *cylindrica cylindrica* (Pérez-Íñigo, 1965)

(=*Oppia agricola* Fujikawa, 1982)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y tropical: Vietnam y Panamá.

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *cylindrica rostroincisa* Subías y Rodríguez, 1986

DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental y Antillas (La Española: R. Dominicana).

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *pentasetata* Subías y Rodríguez, 1986

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Discoppia* (*Cylindroppia*) *tenuis* (Hammer, 1958) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Medioxyoppia Subías, 1989 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia yuwana* Aoki, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Medioxyoppia actirostrata* (Aoki, 1983) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Medioxyoppia acuta* (Aoki, 1984) (*Oxyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Medioxyoppia hamata* Fujikawa, 2004

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Medioxyoppia mastigophora* (Golosova, 1970) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Medioxyoppia nagasatoensis* Fujikawa, 2010

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Medioxyoppia nagoyae* Ohkubo, 1991

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Medioxyoppia trionus* Fujikawa, 2015
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Medioxyoppia yuwana* (Aoki, 1983) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Microppia Balogh, 1983 (2 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Dameosoma minus* Paoli, 1908

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Microppia arcuata* Gordeeva y Tarba, 1990

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

Microppia minus (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Microppia minus minus* (Paoli, 1908)

(=*Oppia minus simplex* Jacot, 1938)

(=*Oppia minutissima* Sellnick, 1950)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente en Paleártica).

- *Microppia minus longisetosa* Subías y Rodríguez, 1988

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Argentina.

Miropia Hammer, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Miropia zealandica* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Miropia zealandica* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Multimedioppia Subías, 1991 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Multimedioppia mirena* Subías, 1991

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Multimedioppia mirena* Subías, 1991

DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Quattoppiella Hugo-Coetzee, 2014 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppiella (Quattoppiella) goldengatensis* Hugo-Coetzee, 2014

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Quattoppiella goldengatensis* (Hugo-Coetzee, 2014) (*Oppiella (Q.)*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ramuloppia Balogh, 1961 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia ramiseta* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

Ramuloppia ramiseta (Balogh, 1959) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Cáucaso.

- *Ramuloppia ramiseta ramiseta* (Balogh, 1959)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Etiopía) y Cáucaso.

- *Ramuloppia ramiseta atypica* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

Rhinoppia Balogh, 1983 (46 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia nasuta* Moritz, 1965

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Oriental y Antártica).

Rhinoppia (Rhinoppia) Balogh, 1983 (40 spp. y 3 sspp.)

(=*Kunoppia* Mahunka, 1987)

(=*Medioppia* Subías y Mínguez, 1985)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Oriental y Antártica).

- *Rhinoppia (R.) alidagensis* Toluk, 2016

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Rhinoppia (R.) arilloi* Subías y Shtanchaeva, 2011

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Rhinoppia (R.) artvinensis* Toluk y Ayyildiz, 2008

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Rhinoppia (R.) berzosai* Subías y Shtanchaeva, 2011

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Rhinoppia (R.) centrodentata* (Gordeeva y Niemi, 1990) (*Medioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.

- *Rhinoppia (R.) debililamellata* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Rhinoppia (R.) eduardoi* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) elifae* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) epilata* (Miko, 2006) (*Oppiella (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Rhinoppia (R.) exobothridialis* Toluk y Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) gomozovae* (Gordeeva y Karppinen, 1988) (*Ctenoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Rhinoppia (R.) heterotricha* (Ivan y Vasiliu, 1997) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- Rhinoppia (R.) hygrophila* (Mahunka, 1987) (*Kunoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
 - *Rhinoppia (R.) hygrophila hygrophila* (Mahunka, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
 - *Rhinoppia (R.) hygrophila multiciliata* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).
- *Rhinoppia (R.) incognita* (Vasiliu e Ivan, 2011) (*Lauroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Rhinoppia (R.) lamellata* (Golosova y Karppinen, 1985) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Rhinoppia (R.) loksai* (Schalk, 1966) (*Oppia*)
(=*Ctenoppiella oblongata* Gordeeva y Melamud, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Europa suroriental.
- *Rhinoppia (R.) mahunkai* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia (R.) media* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
(=*Medioppia templadoi* Pérez-Íñigo, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente) y Perú.
- *Rhinoppia (R.) melisi* (Valle, 1949) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Rhinoppia (R.) mikoi* (Mahunka, 2007) (*Oppiella (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Rhinoppia (R.) minidentata* (Subías y Rodríguez, 1988) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Rhinoppia (R.) minimedia* (Arillo y Subías, 1990) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: **Mediterránea occidental.**
- *Rhinoppia (R.) monicae* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) nasuta* (Moritz, 1965) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- Rhinoppia (R.) obsoleta* (Paoli, 1908) (*Dameosoma fallax o.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente, Groenlandia y Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
 - *Rhinoppia (R.) obsoleta obsoleta* (Paoli, 1908)
(=*Dameosoma vitrinum* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente, Groenlandia y Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
 - *Rhinoppia (R.) obsoleta curtiramosa* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Rhinoppia (R.) ordunensis* (Iturrondobeitia y Saloña, 1988) (*Lauroppia*)
(=*Oppiella acutirostris* Pérez-Íñigo jr., 1990)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooccidental e Irán).
- *Rhinoppia (R.) parapectinata* (Rjabinin, 1987) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Rhinoppia (R.) paraundulata* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).
- *Rhinoppia (R.) parva* (Lombardini, 1952) (*Oppia*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Rhinoppia (R.) pinsapi* (Arillo y Subías, 1996) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) producta* (Iturrondobeitia y Arillo, 1997) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia (R.) samaina* (Mahunka, 2001) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Rhinoppia (R.) subpectinata* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)

(=*Dameosoma subpectinatum aberratum* Thamdrup, 1932)

(=*Oppia globosa* Mihelčič, 1956)

(=*Oppia paoliana* Cooreman, 1941)

(=*Oppia tuberculata* Bulanova-Zachvatkina, 1964)

DISTRIBUCIÓN: Holártica: excepto Este de Paleártica oriental (frecuente en Paleártica occidental), y Senegal.

- *Rhinoppia* (*R.*) *tridentata* (Subías y Mínguez, 1985) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Ibérica y Rumanía).
- *Rhinoppia* (*R.*) *trilobata* (Khanbekyan y Gordeeva, 1991) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Rhinoppia* (*R.*) *truncata* (Iturrondobeitia y Saloña, 1988) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Rhinoppia* (*R.*) *undulata* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2010) (*Lauropia* (*R.*))
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Rhinoppia* (*R.*) *vera* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Rhinoppia* (*R.*) *zaballosi* Subías y Shtanchaeva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
- *Rhinoppia* (*R.*) *zachvatkini* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
(=*Oppia bulanovae* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

***Rhinoppia* (*Paramedioppia*)** Mahunka y Mahunka-Papp, 2000 (7 spp.)

(=*Bipectinoppia* Subías y Shtanchaeva, 2011)

ESPECIE TIPO: *Paramedioppia helvetica* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *bipectinata* (Akrami y Subías, 2007) (*Medioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso e Irán).
- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *emarginata* Toluk y Ayyildiz, 2009 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *helvetica* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2000) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *ouereloi* Subías y Shtanchaeva, 2011 (*R.* (*Bipectinoppia*))
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *plumata* (Gordeeva y Karppinen, 1988) (*Ctenoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *tasdemiri* Toluk y Ayyildiz, 2008 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía e Irán.
- *Rhinoppia* (*Paramedioppia*) *variopectinata* Toluk y Ayyildiz, 2010 (*R.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Serratoppia Subías y Mínguez, 1985 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia serrata* Mihelčič, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

- *Serratoppia duffyi* (Evans, 1954) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Serratoppia guanicola* Subías y Arillo, 1996
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Serratoppia intermedia* Subías y Rodríguez, 1988
(?=*Serratoppia toletana* Muñoz-Mingarro, 1987 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Serratoppia iranica* Akrami, Subías y Saboori, 2009
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Serratoppia minima* Subías y Rodríguez, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ibérica y Costa Rica.
- *Serratoppia mitrofanovi* (Gordeeva y Karppinen, 1988) (*Berniniella*)
DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Serratoppia serrata* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte) y Venezuela.

Solenoppia Hammer, 1968 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Solenoppia grandjeani* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Austral (Australiana, antártica y subantártica).

***Solenoppia* (*Solenoppia*)** Hammer, 1968 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana austral.

- *Solenoppia* (*S.*) *grandjeani* Hammer, 1968

- DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Solenoppia (S.) taberlyi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Solenoppia (S.) travei* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Solenoppia (Campbelloppia) Luxton, 1985 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia diaphora* Wallwork, 1964

DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica.

- *Solenoppia (Campbelloppia) diaphora* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
 - *Solenoppia (Campbelloppia) pernettyae* P. Balogh, 1988 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

[**Oppiellinae**] Seniczak, 1975 (17 gen., 5 subg., 153 spp. y 21 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Abchasiella Gordeeva y Tarba, 1990 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Abchasiella dentata* Gordeeva y Tarba, 1990

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Abchasiella dentata* Gordeeva y Tarba, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Belloppia Hammer, 1968 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Belloppia wallworki* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Austral (Australiana y Antártica) y Oriental.

- *Belloppia beemanensis* (Wallwork, 1964) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
 - *Belloppia evansi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Belloppia shealsi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
 - *Belloppia wallworki* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Australiana austral.

Berniniella Balogh, 1983 (30 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia aeoliana* Bernini, 1973

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica, Oriental y Neotropical).

Berniniella (Berniniella) Balogh, 1983 (29 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica, Oriental y Neotropical).

- *Berniniella (B.) aeoliana* (Bernini, 1973) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Berniniella (B.) berninii* Ivan y Vasiliu, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Berniniella (B.) bicarinata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
 (= *Oppia similis* Mihelčič, 1953)
 (= *Oppia triconica* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente), Madagascar y Vietnam.
 - *Berniniella (B.) carinatissima* Subías, Rodríguez y Mínguez, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Berniniella (B.) conjuncta* (Strenzke, 1951) (*Oppia sigma c.*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Berniniella (B.) extrudens* Subías, Rodríguez y Mínguez, 1987
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Berniniella (B.) fissurata* Ivan y Vasiliu, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Berniniella (B.) formosa* Gordeeva y Karppinen, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Crimea.
 - *Berniniella (B.) grandis* Gordeeva, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
 - *Berniniella (B.) hungarica* (Bayoumi, 1979) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Berniniella (B.) inornata* (Mihelčič, 1957) (*Oppia*)
 (= *Oppia simplex* Mihelčič, 1956, "nom. praec." por Jacot, 1938)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente).
 - *Berniniella (B.) intrudens* Subías, Rodríguez y Mínguez, 1987

- DISTRIBUCIÓN: España y Cuba.
 - *Berniniella (B.) iranica* Akrami, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Berniniella (B.) jahnae* (Sellnick, 1961) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Berniniella (B.) kazakovi* Gordeeva y Melamud, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
 - *Berniniella (B.) latidens* Subías, Rodríguez y Mínguez, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Berniniella (B.) lunaris* (Evans, 1952) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Berniniella (B.) minuta* (Bulanova-Zachvatkina, 1964) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
 - *Berniniella (B.) nana* Gordeeva, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Centro de Rusia europea y Asia centrooccidental).
 - *Berniniella (B.) parasigma* Iturrondobeitia, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Turquía).
 - *Berniniella (B.) robusta* Ivan y Vasiliu, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Berniniella (B.) rossica* Gordeeva, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Centro de Rusia europea.
Berniniella (B.) serratiostris (Golosoova, 1970) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica centromeridional y U.S.A.: Carolina del Norte).
 - *Berniniella (B.) serratiostris serratiostris* (Golosoova, 1970)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional, Este de Paleártica oriental y U.S.A.: Carolina del Norte).
 - *Berniniella (B.) serratiostris hauseri* (Mahunka, 1974) (*Oppia h.*)
 (= *Berniniella coronata* Mahunka y Paoletti, 1984)
 (= *Oppiella rafalskii* Oplotna y Rajski, 1983)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte) y Asia centrooccidental.
 - *Berniniella (B.) serratiostris oscensis* Pérez-Íñigo jr., 1990 (*B. coronata o.*)
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Berniniella (B.) setilonga* Iturrondobeitia y Saloña, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
 - *Berniniella (B.) sigma* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)
 (= *Berniniella sakeni* Gordeeva y Tarba, 1990)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental y Asia centrooccidental.
 - *Berniniella (B.) silvatica* (Vasiliu y Călugăr, 1976) (*Oppia*)
 (?= *Oppia azerbeidjanica* Kulijev, 1962 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Berniniella (B.) tenuis* Gordeeva y Melamud, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
 - *Berniniella (B.) tequila* (Mahunka, 1983) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Berniniella (B.) tichomirovae* (Rjabinin, 1974) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Noreste de Rusia asiática y Ucrania).

Berniniella (Canaloppia) Mahunka y Palacios-Vargas, 1998 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Berniniella (Canaloppia) borhidii* Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Berniniella (Canaloppia) borhidii* Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Dissorhina Hull, 1916 (12 spp. y 4 sspp.)
 (= *Cosmoppia* Balogh, 1983)
 ESPECIE TIPO: (*Notaspis splendens* Koch “sensu” Michael, 1888) = *Eremaeus ornatus* Oudemans, 1900
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
 - *Dissorhina bulganensis* Bayartogtokh, 1999
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Dissorhina carpatica* (Gordeeva y Melamud, 1991) (*Cosmoppia longipilosa c.*)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
 - *Dissorhina cretensis* Mahunka, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Grecia (Creta).
 - *Dissorhina longipilosa* (Kunst, 1958) (*Oppia ornata l.*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
 - *Dissorhina longispina* Mahunka, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Dissorhina muranyii* Mahunka, 2007
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Dissorhina neotropicalis* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- Dissorhina ornata* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y África oriental.
 - *Dissorhina ornata ornata* (Oudemans, 1900)
(=*Oppia bolei* Tarman, 1958)
(=*Dameosoma captator* Hull, 1915)
(=*Dameosoma tricarinatum* Paoli, 1908)
(=*Dameosoma vetula* Hull, 1914)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: frecuente en Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental) y África oriental.
 - *Dissorhina ornata corniculata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma tricarinatum* c.)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
 - *Dissorhina ornata globosa* (Paoli, 1908) (*Dameosoma tricarinatum* g.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Europa meridional y U.S.A.: Florida).
 - *Dissorhina ornata peloponnesiaca* (Mahunka, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Dissorhina ornata tunisica* (Mahunka, 1980) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Túnez.
- *Dissorhina shqipetarica* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Dissorhina signata* (Schwalbe, 1989) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (excepto Oeste).
- *Dissorhina tricarinatoides* (Dubinina, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Dissorhina uludagensis* Ayyildiz, Toluk y Taskiran, 2010
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Elaphoppia Balogh, 1983 (3 spp.)

(=*Parasynoppia* Aoki, 1983)

ESPECIE TIPO: *Oppia quadripilosa* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australianooriental) y Paleártica meridional.

- *Elaphoppia lapelerii* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Elaphoppia longisensillata* (Aoki, 1983) (*Parasynoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Elaphoppia quadripilosa* (Balogh, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.

Hypogeoppia Subías, 1981 (6 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Hypogeoppia terricola* Subías, 1981

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, "Oriental" y Neotropical.

- *Hypogeoppia belgicae* Wauthy y Ducarme, 2006
DISTRIBUCIÓN: Bélgica.
- *Hypogeoppia dungeri* Schwalbe, 1995
DISTRIBUCIÓN: Europea (Alemania e Italia).
- *Hypogeoppia exempta* (Mihelčič, 1958) (*Oppia*)
(?=*Oppia ornatissima* Mihelčič, 1953 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Hypogeoppia hypogea* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Hypogeoppia perezinigo* Subías y Arillo, 1996
DISTRIBUCIÓN: España.
- Hypogeoppia terricola* Subías, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa, Java y Cuba.
 - *Hypogeoppia terricola terricola* Subías, 1981
(=*Hypogeoppia festoneata* Moraza y Moreno, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa, Java y Cuba.
 - *Hypogeoppia terricola salmanticensis* Morell, 1987 (*H. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Kulievia Vasiliu e Ivan, 1999 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia paradecipiens* Kulijev, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Kulievia paradecipiens* (Kulijev, 1967) (*Oppia*)

(=*Neotrichoppia (Confinoppia) calugarae* Mahunka, 2006)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional (excepto Oeste).

Lauroppia Subías y Mínguez, 1986 (29 spp. y 3 sspp.)

(=*Ctenoppiella* Gordeeva y Karppinen, 1988)

ESPECIE TIPO: *Dameosoma fallax* Paoli, 1908

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Lauroppia articrostata* (Aoki, 1988) (*Oppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Lauroppia baetica* Arillo y Subías, 1996

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Lauroppia beskidensis* (Niemi y Skubala, 1993) (*Medioppia*)

DISTRIBUCIÓN: Europea (Polonia y Albania).

- *Lauroppia breviseta* Vasiliu e Ivan, 1999

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Lauroppia brevisimile* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Lauroppia commutata* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzziella*)

DISTRIBUCIÓN: "Siberia".

- *Lauroppia compositocarinata* (Mihelčič, 1958) (*Oppia*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Lauroppia decempectinata* (Fujikawa, 1986) (*Mahunkella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Lauroppia dentata* (Golosova y Karppinen, 1985) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Lauroppia denticulata* (Grishina, 1980) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.

- *Lauroppia distincta* (Vasiliu y Călugăr, 1981) (*Oppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Lauroppia doris* (E. Pérez-Iñigo, 1978) (*Oppia*)

(=*Lauroppia obscura* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).

- *Lauroppia editae* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2002) (*Oppiella*)

DISTRIBUCIÓN: Hungría.

Lauroppia falcata (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Lauroppia falcata falcata* (Paoli, 1908)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica e Irán.

- *Lauroppia falcata marginedentata* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)

(=*Hypogeoppia quadrituberculata* Mahunka, 1987)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa central e Irán).

- *Lauroppia fallax* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)

(=*Oppia aligarhiensis* Kardar, 1977)

(=*Oppiella dubia* Hammer, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Paleártica occidental, India: Uttar Pradesh, Nueva Zelanda y Chile).

- *Lauroppia feideri* Vasiliu e Ivan, 1999

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Lauroppia getica* (Vasiliu y Călugăr, 1981) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Lauroppia iranica* Akrami y Subías, 2008

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Lauroppia lebedevi* (Rjabinin, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Lauroppia maritima (Willmann, 1928) (*Dameosoma falcatum m.*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).

- *Lauroppia maritima maritima* (Willmann, 1928)

(=*Oppia fissurata* Hammer, 1952)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: menos frecuente en el Sur, y Neártica septentrional).

- *Lauroppia maritima acuminata* (Strenzke, 1951) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europea, Mongolia y Neártica septentrional).

- *Lauroppia maritima carinthiaca* (Mihelčič, 1963) (*Oppia*) "ssp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Lauroppia motasi* Vasiliu e Ivan, 1999

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Lauroppia notabilis* (Golosova y Karppinen, 1983) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Lauropia orientalis* (Wen y Bu, 1988) (*Belloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Lauropia persiangulfia* Akrami y Subías, 2008
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Lauropia similifallax* Subías y Mínguez, 1986
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Lauropia tenuipectinata* Subías y Rodríguez, 1988
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Lauropia trapezoida* (Grishina, 1981) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sur de Rusia europea y Paleártica oriental meridional).
- *Lauropia tridentata* (Forsslund, 1942) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Euroatlántica y Cáucaso).

Liacaroppia Subías y Rodríguez, 1986 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppiella doryphoros* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Liacaroppia doryphoros* (J. y P. Balogh, 1983) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.

Moritzoppia Subías y Rodríguez, 1988 (18 spp. y 6 sspp.)

(=*Moritzella* Balogh, 1983, “nom. praeoc.” por Börner, 1908)

(=*Tetroppia* Gordeeva, 1999)

ESPECIE TIPO: *Oppia keilbachi* Moritz, 1969

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y subtropical.

- *Moritzoppia acuta* Toluk y Ayyildiz, 2010
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Moritzoppia clavata* (Mihelčič, 1953) (*Oppia*) “sp. inq.”
(=*Oppia nasuta* Mihel čič, 1953, “non” Moritz, 1965)
(=*Oppia punctata* Mihelčič, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Moritzoppia cryptisetosa* (Bayartogtokh, 2010) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia cuneocostulata* Bayartogtokh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Moritzoppia diversicostulata* Bayartogtokh, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- Moritzoppia escotata* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzella*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Moritzoppia escotata escotata* (Subías y Rodríguez, 1986)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Moritzoppia escotata sharipovi* Niemi y Skubala, 1993 (*M. s.*)
DISTRIBUCIÓN: Polonia.
- *Moritzoppia guanicola* Vasiliu e Ivan, 2011
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Moritzoppia hamata* (Pearce, 1906) (*Notaspis*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Moritzoppia incisa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000
(=*Moritzoppia problematica* Mahunka y Mahunka-Papp, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Moritzoppia jamalica* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzella*)
DISTRIBUCIÓN: “Siberia”.
- *Moritzoppia keilbachi* (Moritz, 1969) (*Oppia*)
(=*Moritzella uherkovichii* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Etiopía y Neotropical.
- *Moritzoppia longilamellata* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzella*)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Moritzoppia longohisterosoma* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- Moritzoppia myrmophila* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzella*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
 - *Moritzoppia myrmophila myrmophila* (Gordeeva y Grishina, 1991)
DISTRIBUCIÓN: “Siberia”.
 - *Moritzoppia myrmophila altaica* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Moritzoppia oreia* Colloff y Seyd, 1991
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Moritzoppia sitnikovae* (Kulijev, 1962) (*Oppia*)

- DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Moritzoppia turcica* Toluk y Ayyildiz, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
Moritzoppia unicarinata (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Norte de Neotropical.
 - *Moritzoppia unicarinata unicarinata* (Paoli, 1908)
 (= *Oppia fixa* Mihelčič, 1956)
 (= *Dameosoma formosum* Hull, 1914)
 (= *Dameosoma minus lamellata* Halbert, 1923)
 (= *Moritzziella similis* Gordeeva y Grishina, 1991)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Norte de Neotropical.
 - *Moritzoppia unicarinata clavigera* (Hammer, 1952) (*Oppia c.*)
 DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.
 - *Moritzoppia unicarinata cristata* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzziella*)
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Moritzoppia unicarinata unicarinatoides* (Subías y Rodríguez, 1986) (*Moritzziella*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Moritzoppia unicarinata yozgatensis* Toluk, Ayyildiz y Subías, 2007
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Neostrinatina Mahunka, 1980 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Neostrinatina mixoppia* Mahunka, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Neostrinatina mixoppia* Mahunka, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

Neotrichoppia Subías e Iturrondobeitia, 1980 (8 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Neotrichoppia pseudoconfinis* Subías e Iturrondobeitia, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Neotrichoppia (Neotrichoppia) Subías e Iturrondobeitia, 1980 (1 sp.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Neotrichoppia (N.) pseudoconfinis* Subías e Iturrondobeitia, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

Neotrichoppia (Ancestroppia) Subías y Rodríguez, 1986 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Neotrichoppia (Ancestroppia) berninii* Subías y Rodríguez, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Neotrichoppia (Ancestroppia) berninii* Subías y Rodríguez, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Neotrichoppia (Confinoppia) Subías y Rodríguez, 1986 (7 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Dameosoma confine* Paoli, 1908
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) adanata* Iturrondobeitia y Saloña, 1988
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) beresi* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
Neotrichoppia (Confinoppia) confinis (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) confinis confinis* (Paoli, 1908)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) confinis tenuiseta* Subías y Rodríguez, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) gibber* (Mahunka, 1982) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) hauseri* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2000) (*Lauropoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa central y Cáucaso.
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) variabilis* Iturrondobeitia y Subías, 1981
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Neotrichoppia (Confinoppia) zushi* (Aoki, 1984) (*Oppiella*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Oppiella Jacot, 1937 (25 spp. y 3 sspp.)
 ESPECIE TIPO: (*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1904) = *Eremaeus novus* Oudemans, 1902
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Oppiella (Oppiella) Jacot, 1937 (5 spp. y 4 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Oppiella (O.) baburini* Rjabinin, 1979
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Oppiella (O.) besucheti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Oppiella (O.) neominata* Subías, 2004
(=*Oppiella distincta* Rjabinin, 1989, "nom. praeoc." por Vasiliu y Călugăr, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- Oppiella (O.) nova* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
 - *Oppiella (O.) nova nova* (Oudemans, 1902)
(=*Oppia neerlandica adauriculata* Mihelčič, 1953)
(=*Oppiella aegyptiaca* Elbadry y Nasr, 1974)
(=*Oppiella chistyakovi* Rjabinin, 1975)
(=*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1904)
(=*Oppiella corrugata apicalis* Jacot, 1937)
(=*Dameosoma corrugatum intralamellatum* Thamdrup, 1932)
(=*Oppiella corrugata squarrosa* Jacot, 1937)
(=*Dameosoma krygeri* Trägårdh, 1931)
(=*Oppia neerlandica sumatrensis* Willmann, 1932)
(=*Oppiella orientata* Rjabinin, 1975)
(=*Oppia rossica* Bulanova-Zachvatkina, 1964)
(=*Notaspis sculptilis* Warburton y Pearce, 1905)
(=*Oppia washburni* Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
 - *Oppiella (O.) nova mazandaranica* Akrami y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Oppiella (O.) nova palustris* Laskova, 1980
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
 - *Oppiella (O.) nova propinqua* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000 (*O. p.*)
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
 - *Oppiella (O.) nova uliginosa* (Willmann, 1919) (*Dameosoma u.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Oppiella (O.) primorica* (Golosova, 1969) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centrooriental y Paleártica oriental meridional).

Oppiella (Moritzoppiella) Gordeeva, 2000 (14 spp.)(=*Dentoppia* Gordeeva, 2001)(=*Drukoppia* Gordeeva, 2001)ESPECIE TIPO: *Moritzziella microdentata* Gordeeva y Grishina, 1991

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y "Australiana".

- *Oppiella (Moritzoppiella) brevicostulata* (Bayartogtokh, 2010) (*Berniniella (Hypogeoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oppiella (Moritzoppiella) dentifera* (Bayartogtokh y Gordeeva, 2001) (*Tetropia (Drukoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oppiella (Moritzoppiella) metulifera* (Bayartogtokh y Gordeeva, 2001) (*Tetropia (Dentoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oppiella (Moritzoppiella) microdentata* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzziella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oppiella (Moritzoppiella) minuta* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzziella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oppiella (Moritzoppiella) montana* (Gordeeva y Bayartogtokh, 2001) (*Tetropia (Drukoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oppiella (Moritzoppiella) nana* (Gordeeva y Bayartogtokh, 2001) (*Tetropia (Drukoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oppiella (Moritzoppiella) neerlandica* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus longilamellatus n.*)
(=*Oppia camiolica* Tarman, 1958)
(=*Dameosoma translamellatum* Willmann, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Oppiella (Moritzoppiella) nitens* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzziella*)
DISTRIBUCIÓN: "Siberia".
- *Oppiella (Moritzoppiella) pinea* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzziella*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oppiella (Moritzoppiella) praestans* (Gordeeva y Grishina, 1991) (*Moritzziella*)
DISTRIBUCIÓN: "Siberia".
- *Oppiella (Moritzoppiella) splendens* (Koch, 1841) (*Oppia*)

- (=*Oppia lignivora* Jacot, 1939)
 (= *Moritzziella nikolskii* Gordeeva y Grishina, 1991)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y “Australiana”.
 - *Oppiella (Moritzzoppiella) subfallax* Mahunka, 1998 (*Moritzzoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Oppiella (Moritzzoppiella) volcanensis* Hammer, 1962 (*O.*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.

Oppiella (Perspicuoppia) Pérez-Íñigo, 1971 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia perspicua* Mihelčič, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Oppiella (Perspicuoppia) minidentata* (Subías, 1977) (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Oppiella (Perspicuoppia) ozkani* Baran, Ayyildiz y Kence, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oppiella (Perspicuoppia) perspicua* (Mihelčič, 1956) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oppiella (Perspicuoppia) rara* Ivan y Vasiliu, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oppiella (Perspicuoppia) turcica* Toluk y Ayyildiz, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Pseudobrachioppiella Tseng, 1982 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pseudobrachioppiella ramosa* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pseudobrachioppiella ramosa* Tseng, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Ptiloppia Balogh, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppiella bulanovae* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Ptiloppia bulanovae* (Hammer, 1968) (*Oppiella*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Ptiloppia lienhardi* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Tripiloppia Hammer, 1968 (9 spp.)

(=*Autoppia* Golosova y Karppinen, 1983)

ESPECIE TIPO: *Tripiloppia aokii* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Tripiloppia algicola* (Golosova y Karppinen, 1983) (*Autoppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática: I. Sajalín.
- *Tripiloppia alpina* Ermilov y Minor, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia aokii* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia dalenii* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia forsslundi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia frigida* Ermilov y Minor, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia subiasi* Balogh, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Tripiloppia tarraswahlbergi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Tripiloppia traegardhi* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tuberoppia Golosova, 1974 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Tuberoppia rotundata* Golosova, 1974) = *Oppia rotundata* Golosova, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Tuberoppia paradoxa* Golosova, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Tuberoppia rotundata* (Golosova, 1970) (*Oppia*)
 (= *Tuberoppia rotundata* Golosova, 1974)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

[**Oxyoppiinae**] Subías, 1989 (14 gen., 8 subg., 86 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acroppia Balogh, 1983 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Stachyoppia processigera* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Acroppia amazonica* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acroppia antillensis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Acroppia curvispina* (Mahunka, 1983) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Acroppia monstrosa* (Mahunka, 1989) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Acroppia processigera* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Stachyoppia*)
(=*Acroppia papua* J. y P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo), Oriental y Australiana (Nueva Guinea).
- *Acroppia translamellata* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Baloghoppia Mahunka, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Baloghoppia dentata* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Baloghoppia dentata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Baloghoppia inornata* Franklin y Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Foraminoppia Subías y Arillo, 1998 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Foraminoppia iturrondobeitai* Subías y Arillo, 1998

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Foraminoppia iturrondobeitai* Subías y Arillo, 1998
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Foraminoppia saloniae* Subías y Arillo, 1998
DISTRIBUCIÓN: España.

Fossoppia Mahunka, 1994 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Fossoppia calcarata* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Fossoppia (Fossoppia) Mahunka, 1994 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Fossoppia (F.) calcarata* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Fossoppia (Multifossoppia) Subías, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Fossoppia pirata* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Fossoppia (Multifossoppia) pirata* Mahunka, 1994 (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Foveolatoppia Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Foveolatoppia foveolata* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Foveolatoppia foveolata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Lineoppia J. y P. Balogh, 1983 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lineoppia frouini* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Lineoppia frouini* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Lineoppia mastax* (Balogh y Mahunka, 1977) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Paraguay).
- *Lineoppia microseta* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Lineoppia tuberosa* (Mahunka, 2009) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Mahunkella Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oppiella transitoria* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mahunkella transitoria* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).

Oxybrachioppia Subías, 1989 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachioppiella ctenifera barbata* Choi, 1986

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Oxybrachioppia barbata* (Choi, 1986) (*Brachioppiella ctenifera b.*)
DISTRIBUCIÓN: Corea y Vietnam.
- *Oxybrachioppia ctenifera* (Golosoova, 1970) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa centromeridional (excepto Oeste) y Este de Paleártica oriental.
- *Oxybrachioppia glabriseta* Wang y Shen, 1999
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

Oxyoppia Balogh y Mahunka, 1969 (35 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia spinosa* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Boreal).

Oxyoppia (Oxyoppia) Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Oxyoppia (O.) polita* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Oxyoppia (O.) spinosa* (Hammer, 1958) (*Oppia*)
(=*Oxyoppia espozi* J. y P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Oxyoppia (Aciculoppia) Subías y Rodríguez, 1986 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oxyoppia genavensium* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Neotropical, Etiópica, Paleártica y Oriental).

- *Oxyoppia (Aciculoppia) clavata* Aoki, 1983 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón (frecuente) y Vietnam.
- *Oxyoppia (Aciculoppia) complicata* Mahunka, 1986 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Oxyoppia (Aciculoppia) genavensium* Mahunka, 1982 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Chile).
- *Oxyoppia (Aciculoppia) zsuzsankae* (Mahunka, 2002) (*Oxyoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Oxyoppia (Dzarogneta) Kulijev, 1978 (14 spp.)

(=*Fineoppia* Khanbekyan y Gordeeva, 1991)

(=*Pectinoppia* Subías y Rodríguez, 1986)

ESPECIE TIPO: *Oppia dubia* Kulijev, 1966

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Oxyoppia (Dzarogneta) baranae* Toluk y Ayyildiz, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) cristata* Hammer, 1977 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) dubia* (Kulijev, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) ilicaensis* Baran y Ayyildiz, 2007
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) intermedia* Subías y Rodríguez, 1986 (*O. (Pectinoppia)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Ibérica e Irán).
- *Oxyoppia (Dzarogneta) iranensis* Akrami y Subías, 2008
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) khosrovica* (Khanbekyan y Gordeeva, 1991) (*Fineoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) latisternalis* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Oxyoppia (Dzarogneta) pluripectinata* (Balogh, 1958) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Oxyoppia (Dzarogneta) pustulata* Mahunka, 1997 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Oxyoppia (Dzarogneta) sabbina* (Shtanchaeva, 1984) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Oxyoppia (Dzarogneta) taurus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1997 (*O. (Oxyoppiella)*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Oxyoppia (Dzarogneta) uncinata* Wen, 1993 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Norte de China.

- *Oxyoppia (Dzarogneta) yepesensis* Muñoz-Mingarro, 1987 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).

Oxyoppia (Oxyoppiella) Subías y Rodríguez, 1986 (14 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppiella polynesia* Hammer, 1972

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Boreal).

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) antillensis* Mahunka, 1998 (*Oxyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) baliensis* (Hammer, 1982) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Bali.

Oxyoppia (Oxyoppiella) bituberculata (Balogh, 1958) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) bituberculata bituberculata* (Balogh, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) bituberculata cognata* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) crassata* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) cubana* Balogh y Mahunka, 1980 (*Oxyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) minuscula* Hugo-Coetzee, Lotfollahi, Abbasi-Kalo y Movahedzade, 2017

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) mustaciata* Kun, 2014

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) polynesia* (Hammer, 1972) (*Oppiella*)

(=*Oxyoppia pilosa* Balogh y Mahunka, 1981)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Polinesia: Tahití), Oriental y Neotropical.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) quadrioveolata* (Bayoumi, Al-Assiuty, Abd-el-Hamid y El-Shereef, 1983) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) saskai* (Balogh, 1961) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) scalifera* (Hammer, 1958) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Perú) y Filipinas.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) spiculifera* Mahunka, 1985 (*Oxyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) struthio* Mahunka, 1983 (*Oxyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) suramericana* (Hammer, 1958) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), India y Australiana (Nueva Zelanda y Australia).

- *Oxyoppia (Oxyoppiella) vtorovi* (Rjabinin, 1987) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Oxymystroppia Subías y Shtanchaeva, 2011 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oxymystroppia phylloseta* Subías y Shtanchaeva, 2011

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Oxymystroppia phylloseta* Subías y Shtanchaeva, 2011

DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Oxyoppioides Subías y Mínguez, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Dameosoma decipiens* Paoli, 1908

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Oxyoppioides decipiens* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: excepto Norte, y Sur de Siberia).

Sacculoppia Balogh y Mahunka, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Sacculoppia singularis* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Sacculoppia singularis* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Separatoppia Mahunka, 1983 (7 spp.)ESPECIE TIPO: *Oppia africana* Evans, 1953

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.

- *Separatoppia acutipes* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Separatoppia africana* (Evans, 1953) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Separatoppia concava* Ermilov y Rybalov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Separatoppia gracilis* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Separatoppia horvathae* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Separatoppia indica* Ermilov y Pešić, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Andhra Pradesh).
- *Separatoppia robusta* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Subiasella Balogh, 1983 (19 spp.)ESPECIE TIPO: *Oppia exigua* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australianooriental y Neotropical).

Subiasella (Subiasella) Balogh, 1983 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australianooriental y Neotropical) y subtropical.

- *Subiasella (S.) exigua* (Hammer, 1971) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana e I. Galápagos.
- *Subiasella (S.) extrema* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Subiasella (S.) segmella* (Golosoova, 1970) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).

Subiasella (Dividoppia) Mahunka, 1987 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Dividoppia aperta* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Subiasella (Dividoppia) aperta* (Mahunka, 1987) (*D.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa suroriental.

Subiasella (Lalmoppia) Subías y Rodríguez, 1986 (12 spp.)(=*Cassioppia* Poltavskaja, 1994)(=*Pararectoppia* Mahunka, 1987)ESPECIE TIPO: (*Oppia ventronodosa* Hammer, 1962) =*Oppia maculata* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Subiasella (Lalmoppia) boninensis* Ohkubo, 1996
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Subiasella (Lalmoppia) europaea* (Mahunka, 1982) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Subiasella (Lalmoppia) gracilis* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: Bulgaria, y U.S.A.: Misuri).
- *Subiasella (Lalmoppia) incurva* (Aoki, 1983) (*Oxyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Subiasella (Lalmoppia) khaolak* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Subiasella (Lalmoppia) krivolutskyi* (Poltavskaja, 1994) (*Cassioppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Subiasella (Lalmoppia) maculata* (Hammer, 1952) (*Oppia*)
(=*Oppia ventronodosa* Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica occidental, Paleártica oriental y Neártica septentrional),
Nepal y **Neotropical (Chile y Brasil)**.
- *Subiasella (Lalmoppia) quadrimaculata* (Evans, 1952) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Paleártica oriental meridional).
- *Subiasella (Lalmoppia) septentrionalis* (Fujikawa, 2003) (*Microppia*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Subiasella (Lalmoppia) simplissima* (Jacot, 1938) (*Oppia minus s.*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Illinois, y Canadá).
- *Subiasella (Lalmoppia) subiasi* (Mahunka, 1987) (*Pararectoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Subiasella (Lalmoppia) zeyensis* (Rjabinin, 1975) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

Subiasella (Lucioppia) Mahunka, 1985 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lucioppia hauseri* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).

- *Subiasella (Lucioppia) hauseri* (Mahunka, 1985) (*L.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Chile).

- *Subiasella (Lucioppia) swiftae* Subías y Arillo, 2003

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

Subiasella (Paralalmoppia) Subías y Shtanchaeva, 2012 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Subiasella (Paralalmoppia) barbulata* Subías y Shtanchaeva, 2012

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Subiasella (Paralalmoppia) barbulata* Subías y Shtanchaeva, 2012

DISTRIBUCIÓN: España.

[**Mytropsiinae**] Balogh, 1983 (7 gen., 2 subg., 54 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Cheloppia Hammer, 1971 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cheloppia hyalina* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical).

- *Cheloppia americana* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Cheloppia hyalina* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Corynoppia Balogh, 1983 (8 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Stachyoppia kosarovi* Jeleva, 1962

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

Corynoppia andulau Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Borneo y Turquía.

- *Corynoppia andulau andulau* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Corynoppia andulau sakaryaensis* Baran y Gökyeşil, 2015

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Corynoppia foliata* (Mihelčič, 1957) (*Damaeolus*)

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Corynoppia foliatoides* Subías y Rodríguez, 1986

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Corynoppia hispanica* Subías y Shtanchaeva, 2011

DISTRIBUCIÓN: España.

Corynoppia kosarovi (Jeleva, 1962) (*Stachyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Irán y Panamá.

- *Corynoppia kosarovi kosarovi* (Jeleva, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Irán y Panamá.

- *Corynoppia kosarovi matritensis* (Pérez-Íñigo, 1967) (*Stachyoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Corynoppia maritima* Pérez-Íñigo jr., 1991 (*C. kosarovi m.*)

DISTRIBUCIÓN: España (I. Baleares).

- *Corynoppia papillisetigera* Iturrondobeitia y Saloña, 1998

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Corynoppia weigmanni* (Murvanidze y Behan-Pelletier, 2011) (*Striatoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Karenella Hammer, 1962 (12 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Karenella lobata* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Neártica.

Karenella (Karenella) Hammer, 1962 (7 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Karenella (K.) acuta* (Csiszár, 1961) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Karenella (K.) bruneiiana* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Karenella (K.) lanceoseta (Balogh, 1959) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana).

- *Karenella (K.) lanceoseta lanceoseta* (Balogh, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Karenella (K.) lanceoseta occidentalis* (Wallwork, 1961) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Karenella (K.) lanceosetoides* (Hammer, 1971) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico) y Oriental (Java).
- *Karenella (K.) lobata* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Karenella (K.) pilisinopia* Fredes y Martínez, 2014
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Karenella (K.) turgiseta* (Mahunka, 1985) (*Corynopopia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Karenella (Glabroppia) Subías y Rodríguez, 1986 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia minutisetosa* Hammer, 1982

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Karenella (Glabroppia) cohici* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).
- *Karenella (Glabroppia) minutisetosa* (Hammer, 1982) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Bali.

Karenella (Stakarenoppia) Subías y Rodríguez, 1986 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Stachyoppia granulosa* Subías y Sarkar, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Neártica.

- *Karenella (Stakarenoppia) foveolata* Mahunka, 1992 (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Karenella (Stakarenoppia) granulosa* (Subías y Sarkar, 1983) (*Stachyoppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Karenella (Stakarenoppia) stipularis* (Jacot, 1937) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

Mystroppia Balogh, 1959 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mystroppia sellnicki* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Mystroppia dallaii* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Mystroppia rethejumi* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Mystroppia sellnicki* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional e India (Tripura).

Rugoppia Mahunka, 1986 (5 spp.)

(=*Mahnertella* Mahunka, 1997)

ESPECIE TIPO: *Rugoppia luisiae* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Rugoppia boraha* (Mahunka, 1994) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rugoppia lamellicornis* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Rugoppia luisiae* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Rugoppia quadrituberculata* (Mahunka, 1997) (*Mahnertella*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Rugoppia vilagiorum* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Uganda.

Stachyoppia Balogh, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Stachyoppia muscicola* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Stachyoppia muscicola* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Congo y Cáucaso.

Striatoppia Balogh, 1958 (22 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Stiatoppia machadoi* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Striatoppia asiatica* Sanyal, 2009
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Striatoppia baloghi* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Striatoppia breviclava* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Striatoppia foliosa* (Jacot, 1937) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Striatoppia hammeni* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Striatoppia lanceolata* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Polinesia: Tahití), Oriental y Neotropical (I. Galápagos).
- *Striatoppia luisae* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Striatoppia machadoi* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Striatoppia madagascarensis* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.
- *Striatoppia margaritata* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Striatoppia margaritifera* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Striatoppia milii* Sanyal y Basu, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Isla Agatti).
- *Striatoppia modesta* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Striatoppia multilineata* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Striatoppia niliaca* (Popp, 1960) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e India (Bengala Occidental).
- *Striatoppia opuntiseta* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Japón.
- *Striatoppia papillata* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Congo, Vietnam y Cuba) y subtropical (Egipto).
- *Striatoppia quadrilineata* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Striatoppia silvicola* Franklin y Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- Striatoppia similis* Subías y Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura) y Polinesia (Tahití).
 - *Striatoppia similis similis* Subías y Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Striatoppia similis polynesica* Subías y Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Striatoppia tribuliformis* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Striatoppia tripurensis* Subías y Sarkar, 1983
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Epimerellidae Ayyildiz y Luxton, 1989 (3 gen., 10 spp. y 1 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y subtropical (Paleártica meridional).

Enisella Ayyildiz y Luxton, 1989 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Enisella turcica* Ayyildiz y Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Enisella turcica* Ayyildiz y Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Epimerella Kulijev, 1967 (8 spp. y 1 ssp.)
ESPECIE TIPO: *Oppia smirnovi* Kulijev, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Epimerella ankaraensis* Baran, Ayyildiz y Kence, 2012
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella distenta* Ayyildiz y Luxton, 1989
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella luxtoni* Toluk, Ayyildiz y Baran, 2008
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Epimerella marasensis* Toluk y Ayyildiz, 2013
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

- *Epimerella puzanovi* Gordeeva y Karppinen, 1988

DISTRIBUCIÓN: Crimea.

- *Epimerella rubeni* Khanbekyan y Gordeeva, 1991

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Epimerella smirnovi (Kulijev, 1962) (*Oppia*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental e Irán).

- *Epimerella smirnovi smirnovi* (Kulijev, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.

- *Epimerella smirnovi longisetosa* Kulijev, 1967

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Epimerella subiasi* Toluk, Ayyildiz y Baran, 2008

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Luxtonia Mahunka, 2001 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Luxtonia hauseri* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Luxtonia hauseri* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Lyropiidae Balogh, 1983 (1 gen. y 6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Lyroppia Balogh, 1961 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lyroppia scutigera* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Lyroppia anareolata* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).

- *Lyroppia delicata* Wang y Lu, 1995

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Lyroppia dongnaiensis* Ermilov y Anichkin, 2013

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Lyroppia neotropica* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Lyroppia scutigera* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Cogo y Camerún) y Neotropical (Perú y Brasil).

- *Lyroppia similis* Balogh y Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).

Granuloppiidae Balogh, 1983 (5 gen., 4 subg. y 31 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

Enantioppia Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Enantioppia multituberculata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Enantioppia multituberculata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Gigantoppia Mahunka, 2008 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Gigantoppia magna* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Gigantoppia magna* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Gigantoppia zryanini* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Granuloppia Balogh, 1958 (10 spp.)

(=*Pocsoppia* Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Granuloppia congoensis* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

- *Granuloppia conflata* Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Camerún.

- *Granuloppia congoensis* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).

- *Granuloppia extrema* (Mahunka, 1984) (*Pocsoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Granuloppia ghanensis* Wallwork, 1961 (*G. congoensis* g.)

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Granuloppia kamerunensis* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún y Vietnam.
- *Granuloppia major* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Granuloppia neonominata* Subías, 2004
(=*Dameosoma megacephalum* Berlese, 1905, “nom. praeoc.” por Berlese, 1901)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Granuloppia nuda* Wallwork, 1961 (*G. major n.*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Granuloppia stigmata* (Hammer, 1979) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java) y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Granuloppia vietnamensis* Ermilov y Bayartogtokh, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Hammerella Balogh, 1983 (13 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachioppiella gracilis* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Neotropical y “Australiana”) y subtropical (Paleártica meridional).

Hammerella (Hammerella) Balogh, 1983 (4 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y “Australiana”) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Hammerella (H.) excisa* Ermilov y Kalúz, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Arunachal Pradesh) y Nepal.
- *Hammerella (H.) gracilis* (Hammer, 1977) (*Brachioppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Hammerella (H.) pectinata* (Aoki, 1983) (*Senectoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Taiwán [Formosa] y Nepal).
- *Hammerella (H.) pinnatifilis* (Canestrini, 1898) (*Belba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Hammerella (Bornemiszaella) P. Balogh, 1994 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Bornemiszaella furnieri* P. Balogh, 1994

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Hammerella (Bornemiszaella) furnieri* (P. Balogh, 1994) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hammerella (Bornemiszaella) ramirezi* (P. Balogh, 1994) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Hammerella (Bornemiszaella) salasi* (P. Balogh, 1994) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Hammerella (Interoppia) Mahunka, 1987 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Interoppia mirabilis* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Hammerella (Interoppia) kerangas* (Mahunka, 2001) (*Senectoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hammerella (Interoppia) mirabilis* (Mahunka, 1987) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo e India: Bengala Occidental).
- *Hammerella (Interoppia) rostroreticulata* (Ohkubo, Aoki y Hu, 1993) (*I.*)
DISTRIBUCIÓN: China surentrional.

Hammerella (Parawoasella) Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2012 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Hammerella (Parawoasella) bayartogtokhi* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2012

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Hammerella (Parawoasella) bayartogtokhi* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).

Hammerella (Varioppia) Mahunka, 1985 (4 spp.)

(=*Woasella* J. y P. Balogh, 2002)

ESPECIE TIPO: *Varioppia radiata* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Hammerella (Varioppia) huanucoensis* Ermilov, 2016 (*H. (Woasella)*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hammerella (Varioppia) parasufflata* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013 (*H. (Woasella)*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hammerella (Varioppia) radiata* (Mahunka, 1985) (*V.*)
(=*Pulchroppia curarii* Franklin y Woas, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Hammerella (Varioppia) sufflata* (Franklin y Woas, 1992) (*Pulchroppia*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil y Perú.

Senectoppia Aoki, 1976 (3 spp.)

(=*Macrosoma* Hammer, 1979)

ESPECIE TIPO: *Senectoppia rugosa* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Senectoppia complicata* (Paoli, 1908) (*Dameosoma*)
(=*Ptiloppia castagnoliae* Mahunka y Mahunka-Papp, 1995)
(=*Dameosoma corrugatum* Berlese, 1905, "nom. praeoc." por Berlese, 1904)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Senectoppia multisulcatum* (Berlese, 1913) (*Dameosoma*)
(=*Senectoppia hammerae* Aoki, 1983)
(=*Macrosoma rugosa* Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia).
- *Senectoppia rugosa* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Teratoppiidae Balogh, 1983 (3 gen., 2 subg. y 21 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Granuloteratoppia P. Balogh, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Granuloteratoppia annulata* P. Balogh, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Granuloteratoppia annulata* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Leoppia Pérez-Íñigo, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Leoppia longicoma* Pérez-Íñigo, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Leoppia (Leoppia) Pérez-Íñigo, 1983 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Leoppia (L.) longicoma* Pérez-Íñigo, 1983
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].

Leoppia (Brasiloppia) Pérez-Íñigo y Baggio, 1986 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Brasiloppia flechtmanni* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Leoppia (Brasiloppia) flechtmanni* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1986) (**B.**)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Teratoppia Balogh, 1959 (18 spp.)

ESPECIE TIPO: *Teratoppia calcarata* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

Teratoppia (Teratoppia) Balogh, 1959 (10 spp.)

(=*Cretoppia* Mahunka, 1986)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Teratoppia (T.) brasiliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1996
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Teratoppia (T.) calcarata* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Teratoppia (T.) ciliata* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Teratoppia (T.) creta* (Mahunka, 1986) (*Cretoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Teratoppia (T.) minor* Wallwork, 1961
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Teratoppia (T.) nasalis* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Teratoppia (T.) parareducta* Ermilov y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Teratoppia (T.) reducta* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teratoppia (T.) translamellata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Teratoppia (T.) uspiensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).

Teratoppia (Teratoppiella) Balogh, 1983 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Teratoppia brevipectinata* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Teratoppia (Teratoppiella) ardua* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1997) (*Teratoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Teratoppia (Teratoppiella) brevipectinata* Balogh y Mahunka, 1978 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teratoppia (Teratoppiella) centroamericana* Woas, 1986 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Teratoppia (Teratoppiella) fimbriata* (Mahunka, 1983) (*Teratoppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Teratoppia (Teratoppiella) pectinata* Balogh, 1961 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Teratoppia (Teratoppiella) pluripectinata* Balogh y Mahunka, 1978 (*Teratoppia*)
(=*Teratoppia baloghi* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)
(=*Teratoppia pectinata* Balogh y Mahunka, 1969, "nom. praec." por Balogh, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Teratoppia (Teratoppiella) regalis* Mahunka, 1983 (*Teratoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico y Brasil).
- *Teratoppia (Teratoppiella) reticulata* (Alzuet, 1981) (*Oppiella*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Sternoppiidae Balogh y Mahunka, 1969 (1 gen. y 14 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Sternoppia Balogh y Mahunka, 1968 (14 spp.)

(=*Synoppia* Balogh y Mahunka, 1969)

ESPECIE TIPO: *Sternoppia mirabilis* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Sternoppia boliviana* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Sternoppia brasiliensis* Franklin y Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).
- *Sternoppia fissurata* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sternoppia incisa* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Ecuador).
- *Sternoppia minor* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Sternoppia mirabilis* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Sternoppia paraincisa* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sternoppia paramirabilis* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sternoppia pocsiiana* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Sternoppia quadriseta* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Synoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Ecuador).
- *Sternoppia reticulata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Sternoppia sphaerodendron* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Sternoppia striata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Guatemala y Ecuador).
- *Sternoppia vicina* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Machuellidae Balogh, 1983 (2 gen., 6 spp. y 5 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica.

Gredosella Gil-Martín, Arillo y Subías, 2000 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Gredosella fraternalis* Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Gredosella capitata* (Kulijev, 1967) (*Machuella*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Gredosella fraternalis* Gil-Martín, Arillo y Subías, 2000
DISTRIBUCIÓN: España.

Machuella Hammer, 1961 (4 spp. y 5 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Machuella ventrisetosa* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica.

- *Machuella draconis* Hammer, 1961

(=*Machuella africana* Mahunka, 1978)

DISTRIBUCIÓN: Subtropical: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte), Malgache (I. Reunión) y Méjico.

- *Machuella lineata* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) y Vietnam.

- *Machuella turcica* Baran y Ayyildiz, 2007

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Machuella ventrisetosa Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica.

- *Machuella ventrisetosa ventrisetosa* Hammer, 1961

(=*Machuella hellenica* Mahunka, 1982)

(=*Machuella hippy* Niemi y Gordeeva, 1991)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Paleártica meridional.

- *Machuella ventrisetosa bilineata* Weigmann, 1976 (*M. b.*)

DISTRIBUCIÓN: Europea.

- *Machuella ventrisetosa plicata* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Machuella ventrisetosa pyriformis* Hammer, 1968 (*M. p.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Machuella ventrisetosa robusta* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

- *Machuella ventrisetosa zehntneri* Mahunka, 1977 (*M. z.*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Malgache (I. Reunión).

Papillonotidae Balogh, 1983 (1 gen. y 4 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Papillonotus Wallwork, 1961 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Papillonotus maculatus* Wallwork, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Papillonotus granulatus* Wallwork, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Ghana y Congo).

- *Papillonotus hauseri* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Borneo y Congo.

- *Papillonotus maculatus* Wallwork, 1961

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Papillonotus tricarinatus* Sarkar y Subías, 1983

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Tuparezetidae Balogh, 1972 (1 gen. y 2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Tuparezetes Spain, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tuparezetes christineae* Spain, 1969

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Tuparezetes christineae* Spain, 1969

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Tuparezetes philodendrus* Spain, 1969

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Quadropiidae Balogh, 1983 (3 gen., 1 subg. y 29 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Borhidia Balogh y Mahunka, 1974 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Borhidia cubana* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Borhidia andina* P. Balogh, 1988

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Borhidia cubana* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Hexoppia Balogh, 1958 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Hexoppia heterotricha* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Hexoppia heterotricha* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana) e India (Mizoram).

Quadroppia Jacot, 1939 (26 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis quadricarinata* Michael, 1885

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Quadroppia (Quadroppia) Jacot, 1939 (9 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Quadroppia (Q.) cristata* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Quadroppia (Q.) hammerae* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica centromeridional, U.S.A.: Carolina del Norte, Australiana: Nueva Zelanda y Hawái, y Costa Rica).
- *Quadroppia (Q.) illinoisensis* (Jacot, 1938) (*Oppia quadricarinata* i.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: U.S.A. (Illinois) y Este de Rusia asiática.
- *Quadroppia (Q.) longisetosa* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Paleártica occidental.
- *Quadroppia (Q.) maritalis* Lions, 1982 (*Q. quadricarinata* m.)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Quadroppia (Q.) minima* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Quadroppia (Q.) obsoleta* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 (*Q. longisetosa* o.)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Quadroppia (Q.) quadricarinata* (Michael, 1885) (*Notaspis*)
(=*Quadroppia skookumchucki* Jacot, 1939)
(=*Quadroppia quadricarinata virginalis* Lions, 1982)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente), China suroriental y Malgache (I. Mauricio).
- *Quadroppia (Q.) squarrosa* Toluk y Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Quadroppia (Coronoquadroppia) Ohkubo, 1995 (17 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: (*Coronoquadroppia parallela* Ohkubo, 1995) =*Oppia circumita* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Quadroppia (Coronoquadroppia) abchasica* Gordeeva y Tarba, 1990 (*Q.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso e Ibérica).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) circumita* (Hammer, 1961) (*Oppia*)
(?=*Oppia quadricarinata ferrumequina* Jacot, 1938 "sp. inq.")
(=*Coronoquadroppia parallela* Ohkubo, 1995)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) crenata* Mahunka, 1984 (*Q.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Cáucaso.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) erzurumensis* (Baran y Ayyildiz, 2007) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) expansa* (Ohkubo, 1995) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) foveolata* Toluk y Ayyildiz, 2009
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) galaica* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 (*Q. pseudocircumita* g.)
(=*Quadroppia bellula* Luxton, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental y Cuba.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) guttata* (Weigmann, 2010) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) iranica* Akrami y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) media* Gordeeva, 1983 (*Q.*)
(=*Quadroppia ritza* Gordeeva y Tarba, 1990)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli* Mahunka, 1977 (*Q.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli michaeli* Mahunka, 1977

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
 - *Quadroppia (Coronoquadroppia) michaeli turcica* Baran, Toluk y Ayyildiz, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) monstrosa* Hammer, 1979 (*Q.*)
 (= *Quadroppia lesleyae* Monson, 2000)
 (= *Quadroppia mahunkai* Mínguez, 1981)
 (= *Quadroppia omodeoi* Mahunka y Paoletti, 1984)
 (= *Quadroppia paolii* Woas, 1986)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: excepto Norte, y U.S.A.: Carolina del Norte) y Java.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) nana* Gordeeva, 1983 (*Q.*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) nasalis* Gordeeva, 1983 (*Q.*)
 (= *Quadroppia gumista* Gordeeva y Tarba, 1990)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) pseudocircumita* Mínguez, Ruiz y Subías, 1985 (*Q.*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Oeste de Paleártica occidental y Canadá) y Perú.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) sezeki* Baran y Ayyildiz, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Quadroppia (Coronoquadroppia) trapezoidea* (Fujikawa, 2004) (*C.*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Trizetoidea Ewing, 1917

Cuneoppiidae Balogh, 1983 (1 gen. y 2 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).

- Cuneoppia*** Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Cuneoppia laticeps* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
 - *Cuneoppia dogmai* Corpuz-Raros, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Cuneoppia laticeps* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Suctobelbidae Jacot, 1938 (21 gen., 6 subg., 340 spp. y 19 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- Allosuctobelba*** Moritz, 1970 (17 spp. y 3 sspp.)
 ESPECIE TIPO: *Suctobelba grandis* Paoli, 1908
 DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- Allosuctobelba (Allosuctobelba)*** Moritz, 1970 (16 spp. y 3 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.
- *Allosuctobelba (A.) bicuspidata* Aoki, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Allosuctobelba (A.) bidentata* Wen, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Allosuctobelba (A.) centroamericana* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: El Salvador.
- *Allosuctobelba (A.) diceros* (Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: América austral.
- *Allosuctobelba (A.) gigantea* (Hammer, 1955) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- Allosuctobelba (A.) grandis*** (Paoli, 1908) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.
- *Allosuctobelba (A.) grandis grandis* (Paoli, 1908)
 (= *Suctobelba grandis europaea* Willmann, 1933)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Noreste de Oriental.
- *Allosuctobelba (A.) grandis philippinensis* Corpuz-Raros, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Allosuctobelba (A.) hauseri* Mahunka y Mahunka-Papp, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Allosuctobelba (A.) huangshanensis* Wen, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Allosuctobelba (A.) japonica* Chinone, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Allosuctobelba (A.) malakipinae* (Corpuz-Raros, 1979) (*Suctobelba*)

- DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Allosuctobelba* (A.) *menglunensis* Wen, 1997
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Allosuctobelba* (A.) *nova* (Krivolutsky, 1971) (*Rhynchobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
 - *Allosuctobelba* (A.) *obtusa* (Jacot, 1938) (*Suctobelba grandis* o.)
 DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
 - *Allosuctobelba* (A.) *serrata* (Chinone, 2003) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
Allosuctobelba (A.) *tricuspidata* Aoki, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Allosuctobelba* (A.) *tricuspidata tricuspidata* Aoki, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Allosuctobelba* (A.) *tricuspidata satsumaensis* Chinone, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Allosuctobelba* (A.) *tricuspidata tokara* Aoki, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Allosuctobelba* (A.) *vietnamensis* Ermilov y Anickin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- Allosuctobelba* (*Helvetobelba*)** Mahunka y Mahunka-Papp, 1999 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Helvetobelba dichotoma* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Allosuctobelba* (*Helvetobelba*) *dichotoma* (Mahunka y Mahunka-Papp, 1999) (*H.*)
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- Coartobelba*** Mahunka, 2001 (13 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Coartobelba pauper* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Oriental, Neotropical y Paleártica meridional.
 - *Coartobelba bifoveolata* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Coartobelba campestris* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Suctobelba pontigera* c.)
 DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
 - *Coartobelba carinata* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Coartobelba latirostrata* (Chinone, 2003) (*Novosuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Coartobelba loksai* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
 - *Coartobelba longiclava* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Panamá).
 - *Coartobelba microclava* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Coartobelba monobina* (Fujikawa, 2003) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Coartobelba monodentis* (Chinone, 2003) (*Novosuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Coartobelba pauper* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Coartobelba pontigera* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Coartobelba shogranensis* (Hammer, 1977) (*Novosuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Coartobelba transversalis* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Argentina).

- Condylobelba*** Mahunka, 2001 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Condylobelba agathis* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Condylobelba agathis* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Condylobelba bruneiensis* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Condylobelba sculpturata* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- Fenestrobella*** Balogh, 1970 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Fenestrobela annulata* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Fenestrobela annulata* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Fenestrobela nodosa* (Hammer, 1966) (*Zeasuctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Fenestrobela octo* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Fenestrobela transitoria* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).

Interbela Mahunka y Mahunka-Papp, 2012 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Interbela solifera* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Interbela solifera* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Kuklosuctobela Chinone, 2003 (11 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Kuklosuctobela perbella* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y pantropical.

Kuklosuctobela (Kuklosuctobela) Chinone, 2003 (6 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y pantropical.

Kuklosuctobela (K.) claviseta (Hammer, 1961) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador), Hawái, Malgache (I. Mauricio) y Japón.

- *Kuklosuctobela (K.) claviseta claviseta* (Hammer, 1961)

(=*Suctobela claviseta mauritii* Mahunka, 1978)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador), Hawái, Malgache (I. Mauricio) y Japón.

- *Kuklosuctobela (K.) claviseta nipponica* (Fujikawa, 1986) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Kuklosuctobela (K.) finlayi* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Cuba y Vietnam.

- *Kuklosuctobela (K.) perbella* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Kuklosuctobela (K.) tenuis* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Kuklosuctobela (K.) tuberculata* (Strenzke, 1950) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Paleártica oriental).

- *Kuklosuctobela (K.) yamizoensis* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Kuklosuctobela (Niosuctobela) Chinone, 2003 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Niosuctobela ruga* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica) y Paleártica meridional.

- *Kuklosuctobela (Niosuctobela) asinus* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Kuklosuctobela (Niosuctobela) multituberculata* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).

- *Kuklosuctobela (Niosuctobela) plumata* (Hammer, 1966) (*Suctobela*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Kuklosuctobela (Niosuctobela) ruga* (Chinone, 2003) (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Kuklosuctobela (Niosuctobela) sphagnicola* (Ermilov, 2017) (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).

- *Kuklosuctobela (Niosuctobela) tamurai* (Chinone, 2003) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Neosuctobela Balogh y Mahunka, 1969 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Neosuctobela transitoria* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental y Paleártica meridional.

- *Neosuctobela bituberculata* (Ermilov y Anichkin, 2013) (*Suctobelbata*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Neosuctobela planeta* (Fujikawa, 2004) (*Rhynchobela*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Neosuctobela quatuor* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Fenestrobela*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).

- *Neosuctobela transitoria* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Novosuctobelba Hammer, 1977 (27 spp.)

ESPECIE TIPO: *Novosuctobelba dentissima* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

Novosuctobelba (Novosuctobelba) Hammer, 1977 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental y Etiópica.

- *Novosuctobelba (N.) dentissima* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán e India (Tripura).

- *Novosuctobelba (N.) horrida* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún).

Novosuctobelba (Leptosuctobelba) Chinone, 2003 (24 ssp.)

(=*Madabelba* Mahunka, 2009)

(=*Nasobelba* Mahunka, 2005)

ESPECIE TIPO: *Leptosuctobelba vulgaris* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) agathis* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) andrassyi* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) armata* (Hammer, 1982) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Bali.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) baculifera* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Suctobelba perdentata b.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) bercziki* (Mahunka, 2009) (*Madabelba*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) coronata* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) crisposetosa* (Hammer, 1979) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) dispersosetosa* (Hammer, 1979) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) duplicondyla* (Mahunka, 2009) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) geometrica* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) hauseri* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) inenodabilis* (Hammer, 1979) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) lauta* (Chinone, 2003) (*L.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) madegassica* (Mahunka, 2011) (*Neosuctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) margarita* (Fujikawa, 2004) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) monofenestrella* (Chinone, 2003) (*L.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) nondivisa* (Hammer, 1966) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia), Oriental (India: Bengala Occidental, y Filipinas) y Etiópica (Sudáfrica).

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) perdentata* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) roigi* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) sabahensis* (Mahunka, 1988) (*Suctobelbella*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) undosa* (Mahunka, 2005) (*Nasobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) vietnamica* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Suctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) vulgaris* (Chinone, 2003) (*L.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Novosuctobelba (Leptosuctobelba) xena* (Mahunka, 1978) (*Neosuctobelba*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).

Novosuctobelba (Suctobelboides) Pankov, 1997 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Suctobelbella kurilica* Golosova, 1980

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Novosuctobelba (Suctobelboides) kurilica* (Golosova, 1980) (*Suctobelbella*)
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.

Parasuctobelba Hammer, 1977 (13 spp.)ESPECIE TIPO: *Suctobelba fijiensis* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Parasuctobelba compacta* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Parasuctobelba complexa* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: frecuente, y Oriental).
- *Parasuctobelba elegantissima* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Parasuctobelba fijiensis* (Hammer, 1971) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Parasuctobelba fragilis* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Parasuctobelba hamifera* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Parasuctobelba medialis* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Parasuctobelba mirabilis* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Parasuctobelba monstrosa* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Parasuctobelba quinquecostata* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Parasuctobelba subcomplexa* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (Borneo).
- *Parasuctobelba tricornuta* (Mahunka, 1989) (*Suctobelbella*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Nigeria y Camerún).
- *Parasuctobelba vohimana* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Parisuctobelba Higgins y Woolley, 1976 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Parisuctobelba septenia* Higgins y Woolley, 1976

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Parisuctobelba septenia* Higgins y Woolley, 1976
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Persuctobelba Mahunka, 2000 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Persuctobelba divisa* Mahunka, 2000

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Persuctobelba divisa* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Persuctobelba flagellatissima* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Persuctobelba monster* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Rhynchobelba Willmann, 1953 (7 spp.)(=*Rhinosuctobelba* Woolley e Higgins, 1969)ESPECIE TIPO: *Rhynchobelba inexpectata* Willmann, 1953

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Rhynchobelba altaica* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia central rusa y Eslovenia).
- *Rhynchobelba dicerosa* (Woolley e Higgins, 1969) (*Rhinosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington).
- *Rhynchobelba inexpectata* Willmann, 1953
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.
- *Rhynchobelba machadoi* Pérez-Íñigo, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Rhynchobelba ornithorhyncha* (Willmann, 1953) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Rhynchobelba ozkani* Sarial y Baran, 2013
DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Rhynchobelba simplex* (Fujikawa, 1972) (*Allosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Rhynchoppia Balogh, 1968 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rhynchoppia sedlaceki* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: **Pantropical.**

- *Rhynchoppia azaisi* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Rhynchoppia capillata* (Balogh, 1963) (*Suctobelbila*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Ruanda).
- *Rhynchoppia hauseri* (Mahunka, 1976) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Rhynchoppia puertoincaensis* Ermilov y Friedrich, 2017
DISTRIBUCIÓN: **Perú.**
- *Rhynchoppia sedlaceki* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Arunachal Pradesh).
- *Rhynchoppia widagdoi* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Serratobelba Mahunka, 1984 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Suctobelbila multidentata* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Serratobelba multidentata* (Mahunka, 1983) (*Suctobelbila*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Serratobelba rugosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Sucteremaeus Golosova y Krivolutsky, 1975 (1 sp.)

(=*Kathetosuctobelba* Chinone, 2003)

ESPECIE TIPO: *Rhinosuctobelba makarchevae* Krivolutsky y Golosova, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Sucteremaeus makarchevae* (Krivolutsky y Golosova, 1974) (*Rhinosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Suctobelba Paoli, 1908 (19 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis trigona* Michael, 1888

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Suctobelba aliena* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Europea e Irán.
- *Suctobelba altvateri* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional e Irán).
- *Suctobelba atomaria* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba beringiana* Krivolutsky, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (I. Kuriles, Polonia y Turquía).
- *Suctobelba chinonei* Subías, 2017
(=*Suctobelba simplex* Chinone, 2003, "nom. praeoc." por Balogh, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelba consimilis* Mahunka y Mahunka-Papp, 2001
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Suctobelba cornigera* Shtanchaeva y Subías, 2009
(=*Suctobelba cornuta* Shtanchaeva y Subías, 2009, "nom. praeoc." por Hammer, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Suctobelba discrepans* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba flagellisetia* Shtanchaeva y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Suctobelba granulata* Hammen, 1952 (*S. trigona* g.)
(=*Suctobelba saetosa* Kulijev, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Suctobelba lapidaria* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Suctobelba media* Mihelčič, 1953 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelba regia* Moritz, 1970

- DISTRIBUCIÓN: Europea.
 - *Suctobelba reticulata* Moritz, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
Suctobelba scalpellata Moritz, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelba scalpellata scalpellata* Moritz, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelba scalpellata caucasica* Shtanchaeva y Subías, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Suctobelba secta* Moritz, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelba sorrentensis* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelba trigona* (Michael, 1888) (*Notaspis*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Groenlandia.
 - *Suctobelba tumulata* Higgins y Woolley, 1976
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

Suctobelbata Gordeeva, 1991 (10 spp. y 1 ssp.)

(=*Unicobelba* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999)

ESPECIE TIPO: *Suctobelbata nova* Gordeeva, 1991

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

- *Suctobelbata aomoriensis* (Fujikawa, 2004) (*Unicobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbata arcuata* (Hammer, 1968) (*Zeasuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Suctobelbata elizabethae* (Jacot, 1938) (*Suctobelbata*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Suctobelbata hirauchiae* Chinone, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbata nova* Gordeeva, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Rusia europea central.
- *Suctobelbata prelli* (Märkel y Meyer, 1958) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centrooccidental y Canadá).
- *Suctobelbata punctata* (Hammer, 1955) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Alaska y Japón).
- Suctobelbata spicata* (Jacot, 1938) (*Suctobelbata*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Suctobelbata spicata spicata* (Jacot, 1938)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
 - *Suctobelbata spicata lanceolata* (Jacot, 1938) (*Suctobelbata*) “ssp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Suctobelbata truncicola* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Suecia y “Japón”).
- *Suctobelbata ypsilonsignata* (Mahunka y Mahunka-Papp, 1999) (*Unicobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.

Suctobelbella Jacot, 1937 (158 spp. y 11 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Suctobelbella serratiostrum* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

***Suctobelbella* (*Suctobelbella*)** Jacot, 1937 (74 spp. y 8 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Suctobelbella* (*S.*) *acuta* Chinone, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Suctobelbella* (*S.*) *acutidens* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica y Argentina.
 - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens acutidens* (Forsslund, 1941)
 (?=*Dameosoma cornigerum* Berlese, 1902 “sp. inq.”)
 (= *Suctobelba glabroclava* Kulijev, 1965)
 (= *Suctobelba perpendicularata* Forsslund, 1958)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Argentina.
 - *Suctobelbella* (*S.*) *acutidens duplex* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba d.*)
 (= *Suctobelba brachyodon* Mihelčič, 1958)
 (= *Suctobelba hammerae* Krivolutsky, 1965)
 (= *Suctobelba tuberosa* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Canadá).

- *Suctobelbella (S.) acutidens lobata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
(=*Suctobelba ornata* Krivolutsky, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Suctobelbella (S.) acutidens pilosetoseta* Shtanchaeva y Subías, 2009
(?= *Suctobelbella trichosa* Bayoumi, 1979 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Suctobelbella (S.) acutidens sarekensis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba s.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Este de Rusia asiática y Neártica).
- *Suctobelbella (S.) alpina* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) amurica* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Norte) e India (Tripura).
- *Suctobelbella (S.) angulata* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) arcana* Moritz, 1970
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Europa centromeridional y Este de Rusia asiática) y Neártica (U.S.A.: Luisiana, y Canadá).
- *Suctobelbella (S.) biangulata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella (S.) bullocki* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Suctobelbella (S.) cornuta* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Suctobelbella (S.) crispirhina* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) decorata* (P. Balogh, 1984) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbella (S.) delessei* (Strenzke, 1955) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Groenlandia.
- *Suctobelbella (S.) flabellifera* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Suctobelbella (S.) frondosa* Aoki y Fukuyama, 1976
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Suctobelbella (S.) frothinghami* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Suctobelbella (S.) granifera* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (oriental: Japón y Sur de Siberia, y occidental: Cáucaso y España).
- *Suctobelbella (S.) harteni* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Suctobelbella (S.) hokkaidoensis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) hurshi* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).
- *Suctobelbella (S.) italica* (Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)
(=*Suctobelbella diffissa* Moritz, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Paleártica occidental (excepto Norte) e Irán.
- *Suctobelbella (S.) laevis* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A.: Carolina del Norte, e I. Kuriles).
- *Suctobelbella (S.) laiae* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Suctobelbella (S.) latipectoralis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbella (S.) latirostris* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Oeste de Siberia) y Vietnam.
- *Suctobelbella (S.) liacariformis* Shtanchaeva y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso y España).
- *Suctobelbella (S.) lienhardi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Suctobelbella (S.) lobodentata* (Mihelčič, 1957) (*Suctobelba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Suctobelbella (S.) longicurva* (Hammer, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Hawái).
- *Suctobelbella (S.) longicuspis* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Neártica oriental, Europa e I. Kuriles), El Salvador, Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Suctobelbella (S.) longicuspis longicuspis* Jacot, 1937
(=*Suctobelba falcata* Forsslund, 1941)

- DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (Neártica oriental, Europa: frecuente, e I. Kuriles), El Salvador, Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Suctobelbella (S.) longicuspis lanceolata* Jacot, 1939
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
 - *Suctobelbella (S.) longidentata* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) longirostris* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Europa: frecuente en el Norte, y Paleártica oriental) y Neártica (U.S.A.: Alaska y Carolina del Norte).
 - *Suctobelbella (S.) longisensillata* Fujita y Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) longisetosa* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Cuba).
 - *Suctobelbella (S.) macrodentata* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Ecuador).
 - *Suctobelbella (S.) messneri* Moritz, 1971
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelbella (S.) microdentata* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Suctobelbella (S.) minor* (Mihelčič, 1958) (*Suctobelba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Suctobelbella (S.) naranensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán e Irán.
 - *Suctobelbella (S.) nayloroensis* Fujita y Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) nitida* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) obtusa* Liu y Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Suctobelbella (S.) opistodentata* (Golosova, 1970) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa meridional y Paleártica oriental).
 - *Suctobelbella (S.) ornatissima* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Suctobelbella (S.) palustris* (Forsslund, 1951) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Suctobelbella (S.) paracarinata* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Suctobelbella (S.) paracutidens* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
 - *Suctobelbella (S.) parapinnata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Suctobelbella (S.) perarmata* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Suctobelbella (S.) perforata* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Suctobelbella (S.) pinnigera* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Suctobelbella (S.) prominens* (Moritz, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelbella (S.) pseudoornatissima* (Balogh y Mahunka, 1981) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
 - *Suctobelbella (S.) pulchra* (Mihelčič, 1958) (*Suctobelba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Suctobelbella (S.) pumila* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) reticulatoides* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) rotunda* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) scrofa* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Paraguay).
 - *Suctobelbella (S.) semidentata* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
 - *Suctobelbella (S.) serratirostrum* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Suctobelbella (S.) sexdentata* (Mihelčič, 1958) (*Suctobelba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Suctobelbella (S.) shironeseta* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) similidentata* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Suctobelbella (S.) similis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Rusia asiática).
 - *Suctobelbella (S.) singularis* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: excepto Oeste, Irán y Este de Paleártica oriental) y Taiwán [Formosa].
 - *Suctobelbella (S.) spiculigera* (Berlese, 1913) (*Suctobelba cornigera* s.) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Suctobelbella (S.) squamiseta* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Suctobelbella (S.) subcornigera* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Oriental y Nueva Zelanda.
 - *Suctobelbella (S.) subcornigera subcornigera* (Forsslund, 1941)
(=*Suctobelba delicata* Krivolutsky, 1966)
(?= *Suctobelbella laxtoni* Jacot, 1937 “sp. inq.”)
(=*Suctobelba macrodon* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Nueva Zelanda.
 - *Suctobelbella (S.) subcornigera hamata* Moritz, 1970 (*S. h.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centrooccidental y U.S.A.: Luisiana).
 - *Suctobelbella (S.) subcornigera maculata* Shtanchaeva y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Cáucaso e Ibérica).
 - *Suctobelbella (S.) subcornigera vera* (Moritz, 1964) (*Suctobelba* v.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa, Oeste de Siberia).
 - *Suctobelbella (S.) toelgyesii* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Suctobelbella (S.) tohokuensis* Enami y Chinone, 1997
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) triangulata* Liu y Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Suctobelbella (S.) tschabovskiyi* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
 - *Suctobelbella (S.) tumida* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (S.) variabilis* (Hammer, 1962) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Suctobelbella (S.) yezoensis* Fujita y Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Suctobelbella (Flagrosuctobelba)* Hammer, 1979 (61 spp. y 3 sspp.)**
 ESPECIE TIPO: *Flagrosuctobelba multiplumosa* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) acutissima* (Balogh, 1958) (*Suctobelba*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Angola.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) affinis* Hammer, 1977 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) alloenasuta* Moritz, 1971 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Europa centromeridional y U.S.A.: Carolina del Norte).
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) ancorhina* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Japón).
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) aokii* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) arcuata* Hammer, 1977 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) baloghi* (Forsslund, 1958) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) biarcuata* Hammer, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) carcharodon* Moritz, 1966 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional e India (Tripura).
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) chabarica* Rjabinin, 1975 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) chitralensis* Hammer, 1977 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Suctobelbella (Flagrosuctobelba) conica* Zhao y Wen, 1993 (*S.*)

- DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *dargoltsiana* (Krivolutsky, 1966) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
 - Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *diversosetososa* (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Cáucaso.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *diversosetososa diversosetososa* (Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *diversosetososa arilloi* Shtanchaeva y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *elegantula* (Hammer, 1958) (*Suctobelba*)
(=*Suctobelba* *naginata* Aoki, 1961)
(=*Suctobelba* *quadricarina* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental, Holártica meridional (Paleártica meridional y U.S.A.: Luisiana) y Etiópica (Sudáfrica).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *flabella* (Mondal, 1984) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *flagellifera* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Japón).
 - Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *forsslundi* (Strenzke, 1950) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *forsslundi forsslundi* (Strenzke, 1950)
(=*Suctobelbella* *besucheti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *forsslundi moritzi* Mahunka, 1987 (*S. m.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *hastata* Pankov, 1986 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *ibarakiensis* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *indica* (Haq, 1978) (*Suctobelba* *semiplumosa* i.)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *insulana* (Hammer, 1972) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *kaliurangensis* Hammer, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *kantoensis* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *kontschani* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2007) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *lata* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *lineata* (Balogh, 1970) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *macroseta* Mahunka, 1996 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *magnicava* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *magnifera* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *memorabilis* (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *meridionalis* (Kahwash, Subías y Ruiz, 1991) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *multiplumosa* (Hammer, 1979) (*F.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Filipinas), Neotropical y Cáucaso.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *munonokiensis* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *nana* Shtanchaeva y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y España) e Irán.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *nasalis* (Forsslund, 1941) (*Suctobelba*)
(?=*Dameosoma* *bellum* Berlese, 1904 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nueva Zelanda.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *parallelodentata* Hammer, 1979 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Vietnam).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *parva* Chinone, 2003 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *penicillata* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Suctobelba*)

- DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical (Panamá y Ecuador).
- *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *peracuta* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica (Sudáfrica).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *pilifera* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio) y Ecuador.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *plicata* Pankov, 1986 (S.)
DISTRIBUCIÓN: I. Kuriles.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *plumata* (Hammer, 1979) (F.)
(=*Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *praeoccupata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *plumosa* Chinone, 2003 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *ponticula* (Hammer, 1971) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e India (Bengala Occidental).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *quadrata* (Mahunka, 1978) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *quinquedentata* (Hammer, 1970) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *ramosa* (Mahunka, 1974) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *ruzsinszkyi* Mahunka, 1983 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *sanjiangensis* Liu y Wu, 2013 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *semiplumosa* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Australiana, Neotropical (Brasil y Ecuador) y Etiópica (Sudáfrica y Camerún).
- *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *semiplumosa semiplumosa* (Balogh y Mahunka, 1967)
(=*Flagrosuctobelba* *simillima* J. y P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Nueva Guinea y Neotropical (Brasil y Ecuador).
- *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *semiplumosa tahitiensis* (Hammer, 1972) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: "Oriental", Australiana y Etiópica (Sudáfrica y Camerún).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *sensillinuda* Shtanchaeva y Subías, 2009
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y España) e Irán.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *setosa* (Hammer, 1979) (F.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia) e I. Galápagos.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *setosoclavata* (Hammer, 1952) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *sicilifera* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *simplex* (Balogh, 1968) (*Suctobelba* *semiplumosa* s.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *sinuata* (Hammer, 1982) (F.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Bali), Australiana (Hawái) y subantártica (I. Amsterdam).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *solita* Chinone, 2003 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *subtrigona* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
(=*Suctobelba* *intermedia* Willmann, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente en Paleártica occidental, y Neártica septentrional), Méjico y Vietnam.
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *tatarica* (Krivolutsky, 1968) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Europa occidental).
 - *Suctobelbella* (*Flagrosuctobelba*) *verrucosa* Chinone, 2003 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

***Suctobelbella* (*Ussuribata*) Rjabinin, 1975 (21 spp.)**

(=***Bruneibelba*** Mahunka, 2001)

(=***Discosuctobelba*** Hammer, 1979)

ESPECIE TIPO: *Ussuribata clavata* Rjabinin, 1975

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Suctobelbella* (*Ussuribata*) *acutodentata* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbella* (*Ussuribata*) *baliensis* Hammer, 1982 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Suctobelbella* (*Ussuribata*) *bivittata* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Suctobelbella* (*Ussuribata*) *chinonei* Subías, 2017
(=*Suctobelbella* *reticulata* Chinone, 2003, "nom. praeoc." por Hammer, 1982)

- DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) clavata* (Rjabinin, 1975) (U.)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) flagellata* (Balogh, 1959) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) foliosa* Mahunka, 1988 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) latodentata* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) magnodentata* Hammer, 1982 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Bali.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) papuana* (Balogh, 1968) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) permixta* J. y P. Balogh, 2002 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) phylliformis* Ermilov, Shtanchaeva y Subías, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) reticulata* (Hammer, 1982) (*Discosuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Bali.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) separata* (Mahunka, 2001) (*Bruneibelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) sexsetosa* (Hammer, 1979) (*Discosuctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Vietnam).
 - *Suctobelbella (Ussuribata) silva* Fujikawa, 2004 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) sinica* Wen, 1997 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) spirochaeta* Mahunka, 1983 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Japón.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) tuberosa* (Mahunka, 2001) (*Bruneibelba*)
 (“non” *Suctobelba tuberosa* Mihelčič, 1956, =*Suctobelbella acutidens*)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) variosetosa* (Hammer, 1961) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y Japón.
 - *Suctobelbella (Ussuribata) womersleyi* (Balogh, 1968) (*Suctobelba*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

Suctobelbilla Jacot, 1937 (38 spp. y 1 ssp.)

(=*Reticobella* Hammer, 1962)

(=*Rhynchobella* Hammer, 1961)

(=*Suctoppia* Balogh, 1958)

ESPECIE TIPO: *Suctobelbilla punctillata* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Suctobelbilla approximata* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Suctobelbilla baderi* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Suctobelbilla cornuta* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Suctobelbilla densipunctata* Chinone, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Suctobelbilla dentata (Hammer, 1961) (*Rhynchobella*)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical, Australiana, Etiópica e India: Bengala Occidental) y Paleártica (Europa centromeridional y Paquistán).

- *Suctobelbilla dentata dentata* (Hammer, 1961)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: Perú y Panamá, Australiana, Etiópica (Etiopía y Sudáfrica) e India: Bengala Occidental) y subtropical (Paquistán).

- *Suctobelbilla dentata europaea* Moritz, 1974

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Suctobelbilla endroedyoungai* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Suctobelbilla excavata* Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Camerún.

- *Suctobelbilla fissurata* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

- *Suctobelbilla fonticula* Hammer, 1975

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Argelia) y Etiópica (Congo y Sudáfrica).

- *Suctobelbilla globulifera* (Balogh, 1958) (*Suctoppia*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Suctobelbilla hauseri* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Suctobelbilla kiyosumiensis* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbilla longitudinalis* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Suctobelbilla margaritata* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Suctobelbilla minima* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Suctobelbilla multituberculata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Suctobelbilla neominata* Subías, 2004
(=*Suctobelbilla ornata* Hammer, 1979, “nom. praeoc.” por Balogh y Mahunka, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Suctobelbilla ornata* Balogh y Mahunka, 1969
(=*Suctobelbella neominata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Suctobelbilla penniseta* Chinone, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Suctobelbilla peruensis* Woas, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Suctobelbilla pocsi* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Suctobelbilla popovi* Gordeeva, 2004
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Suctobelbilla pseudornata* (Woas, 1986) (*Suctobelba*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (El Salvador y Ecuador).
- *Suctobelbilla pulchella* (Hammer, 1962) (*Rhynchobella*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Suctobelbilla punctillata* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Suctobelbilla punctocostulata* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Suctobelbilla quinquenodosa* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Suctobelbilla scutata* Hammer, 1972 (*S. squamosa* s.)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Oriental (Borneo y Vietnam).
- *Suctobelbilla sexnodosa* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).
- *Suctobelbilla squamosa* (Hammer, 1961) (*Rhynchobella*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Melanesia (I. Fiji).
- *Suctobelbilla suctobelboides* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Suctobelbilla transrugosa* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Vietnam.
- *Suctobelbilla trifasciata* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Suctobelbilla tripartita* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Suctobelbilla tuberculata* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Suctobelbilla tumida* Mahunka y Mahunka-Papp, 2012
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Suctobelbilla undulata* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Suctobelbilla waterhousei* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Suctobelbiloides Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Suctobelbiloides armatus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Suctobelbiloides armatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Zeasuctobelba Hammer, 1966 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Zeasuctobelba quinquenodosa* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

- *Zeasuctobelba quinquenodosa* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.- *Zeasuctobelba tierradelfuegoensis* Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: Chile (Tierra del Fuego).

- *Zeasuctobelba trinodosa* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Rhynchoribatidae Balogh, 1961 (3 gen., 4 subg. y 39 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Eurhynchoribates Miko, 2016 (15 spp.)ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates borhidii* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Eurhynchoribates (Eurhynchoribates) Miko, 2016 (13 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Eurhynchoribates (E.) acutus* (Balogh, 1958) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Eurhynchoribates (E.) borhidii* (Mahunka, 1986) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Eurhynchoribates (E.) excelsior* (Mahunka, 1985) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Eurhynchoribates (E.) genavensium* (Mahunka, 1997) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Eurhynchoribates (E.) misamisensis* Miko, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Eurhynchoribates (E.) montanus* (Balogh, 1962) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Eurhynchoribates (E.) obtusus* (Mahunka, 1985) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Eurhynchoribates (E.) poci* (Mahunka, 1986) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Eurhynchoribates (E.) radula* (Mahunka, 1983) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Eurhynchoribates (E.) robinsoni* (Balogh, 1962) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Eurhynchoribates (E.) serratus* (Balogh, 1958) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Eurhynchoribates (E.) subaequalis* (Balogh, 1962) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Eurhynchoribates (E.) nuevavizcayaensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Eurhynchoribates (Orinchobates) Miko, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Eurhynchoribates (Orinchobates) samarensis* Miko, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Eurhynchoribates (Orinchobates) orientalis* (Balogh, 1970) (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Eurhynchoribates (Orinchobates) samarensis* Miko, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Rhynchoribates Grandjean, 1929 (18 spp.)ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates rostratus* Grandjean, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Rhynchoribates (Rhynchoribates) Grandjean, 1929 (8 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhynchoribates (R.) amazonicus* Woas, 1986

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Rhynchoribates (R.) danbartai* Miko, 2016

DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.

- *Rhynchoribates (R.) edentatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhynchoribates (R.) insignis* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

- *Rhynchoribates (R.) longisetosus* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2014

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Rhynchoribates (R.) rostratus* Grandjean, 1929

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Rhynchoribates (R.) spathulatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhynchoribates (R.) spectabilis* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

***Rhynchoribates (Parhynchoribates)* Miko, 2016 (3 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates parafabulosus* Ermilov y Kalúz, 2014

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhynchoribates (Parhynchoribates) fabulosus* Beck, 1961 (R.)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Rhynchoribates (Parhynchoribates) grandis* Hammer, 1961 (R.)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Rhynchoribates (Parhynchoribates) parafabulosus* Ermilov y Kalúz, 2014 (R.)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

***Rhynchoribates (Rhynchoribatodes)* Miko, 2016 (6 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) dynastes* Miko, 2016

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) brasiliensis* Woas, 1986 (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: **Neotropical (Brasil y Perú).**

- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) dilatatus* Balogh y Mahunka, 1969 (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).

- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) dynastes* Miko, 2016

DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.

- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) ecuadoriensis* P. Balogh, 1988 (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) mirus* Beck, 1961 (*Rhynchoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Rhynchoribates (Rhynchoribatodes) rioyuyapichisensis* Ermilov y Friedrich, 2017

DISTRIBUCIÓN: Perú.

***Rhynchoribates (Tectorhynchoribates)* Miko, 2016 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Rhynchoribates (Tectorhynchoribates) jurobales* Miko, 2016

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhynchoribates (Tectorhynchoribates) jurobales* Miko, 2016

DISTRIBUCIÓN: Guayana francesa.

***Suctoribates* Balogh, 1963 (6 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Suctoribates suctorius* Balogh, 1963

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Suctoribates carinatus* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Suctoribates crassisetosus* Franklin y Woas, 1992

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Suctoribates foliatus* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Suctoribates neotropicus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Suctoribates palawanensis* Corpuz-Raros y Gruèzo, 2009

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Suctoribates suctorius* Balogh, 1963

DISTRIBUCIÓN: Angola.

***Trizetidae* Ewing, 1917 (1 gen. y 1 sp.)**

DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional).

***Trizetes* Berlese, 1904 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Trizetes pyramidalis* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional).

- *Trizetes pyramidalis* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Otocephoidea Balogh, 1961**Dampfiellidae** Balogh, 1961 (2 gen. y 58 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Beckiella Grandjean, 1964 (33 spp.)ESPECIE TIPO: *Dampfiella cejansis* Beck, 1962

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Beckiella acuta* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella africana* (Balogh, 1958) (*Dampfiella*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Beckiella arcta* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).
- *Beckiella bloszyki* Starý, 1989
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella borhidii* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Beckiella bucephala* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Beckiella capitulum* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella carinata* (Beck, 1962) (*Dampfiella*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella cejansis* (Beck, 1962) (*Dampfiella*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Beckiella clavata* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Beckiella costulata* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Beckiella cubana* Starý, 1989
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella deficiens* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella discoidalis* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella disiuncta* Mahunka, 2006
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Beckiella duplicata* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Beckiella elongata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Beckiella foveolata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Beckiella fratercula* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella garciai* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella inca* Starý, 1992
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella interlamellaris* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella irmayi* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Beckiella lamellata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Beckiella latirostris* Starý, 1992
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Beckiella microseta* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella opposita* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Beckiella recta* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).
- *Beckiella reticulofemorata* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Beckiella sellnicki* (Hammer, 1961) (*Dampfiella*)

- DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Beckiella silvai* Balogh y Mahunka, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Beckiella synlamellata* Balogh y Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Beckiella vitiosa* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Dampfiella Sellnick, 1931 (25 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dampfiella procera* Sellnick, 1931

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Dampfiella ambigua* Pérez-Íñigo, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Dampfiella angusta* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Dampfiella dubia* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Dampfiella euaensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Dampfiella foliata* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).
- *Dampfiella jandai* Starý, 1993
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Dampfiella kinabalu* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dampfiella luzonica* Corpuz-Raros, 1997
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella mahunkai* Starý, 1993
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Dampfiella nebulosa* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dampfiella ovalis* Corpuz-Raros, 1997
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella papuana* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dampfiella paratina* (Mahunka, 1983) (*Beckiella*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dampfiella peseki* Starý, 1993
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Dampfiella philippica* Corpuz-Raros, 1997
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella procera* Sellnick, 1931
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Dampfiella prostrata* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Dampfiella putinglupa* Corpuz-Raros, 1997
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella sepilok* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dampfiella setosa* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Dampfiella similis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.
- *Dampfiella similoides* Corpuz-Raros, 1997
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella tupi* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Dampfiella vanalinearum* Corpuz-Raros, 1997
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dampfiella zellwegeri* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Tetracondylidae Aoki, 1961 (23 gen., 4 subg., 316 spp. y 11 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Afrotocepheus Mahunka, 1985 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Afrotocepheus sinarmatus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Afrotocepheus (Afrotocepheus) Mahunka, 1985 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Afrotocepheus sinarmatus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Afrotocepheus (Didierotocepheus) Mahunka, 1994 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Didierotocepheus berndi* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Afrotocepheus (Didierotocepheus) berndi* (Mahunka, 1994) (*D.*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Borneremaeus Mahunka, 1991 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Borneremaeus hauseri* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Borneremaeus hauseri* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Bulbocepheus Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bulbocepheus hauserorum* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Bulbocepheus hauserorum* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Carabocepheus Berlese, 1910 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes (Carabocepheus) lounsburyi* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Carabocepheus carinatus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Carabocepheus hyalinus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Carabocepheus latior* Balogh y Mahunka, 1966 (*C. lounsburyi* l.)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Carabocepheus lounsburyi* (Berlese, 1910) (*Carabodes (Caraboceph.)*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Sudáfrica y Zimbabue [Rodesia].

Cavernocephus Balogh y Mahunka, 1969 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cavernocephus monstruosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cavernocephus acutus* P. Balogh y Palacios-Vargas, 1997

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

- *Cavernocephus furcatus* P. Balogh y Palacios-Vargas, 1997

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

- *Cavernocephus fusifer* P. Balogh y Palacios-Vargas, 1997

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

- *Cavernocephus monstruosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cavernocephus monticola* P. Balogh, 1989

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Cavernocephus obliquus* P. Balogh, 2002

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Cavernocephus undulatus* P. Balogh, 2002

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Dolicheremaeus Jacot, 1938 (184 spp. y 9 sspp.)

(=*Dicondyla* Aoki, 1965)

(=*Tetracondyla* Newell, 1956)

ESPECIE TIPO: *Dolicheremaeus rubripedes* Jacot, 1938

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Dolicheremaeus absolon* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Tetracondyla*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Dolicheremaeus aethiopicus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Dolicheremaeus africanus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)

DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Dolicheremaeus agusanus* Corpuz-Raros, 2000

- DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus almerodai* Corpuz-Raros, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus alticola* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Dolicheremaeus alveolatus* (Oudemans, 1915) (*Carabodes*)
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus alviolai* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus amazonicus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
 - *Dolicheremaeus andulauensis* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus aokii* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Dicondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Dolicheremaeus attenuatus* Wen, 1998
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Dolicheremaeus auritus* (Aoki, 1965) (*Dicondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia e India: Kerala).
 - *Dolicheremaeus baguioensis* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus balikous* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus baloghi* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).
 - *Dolicheremaeus bartkei* Rajski y Szudrowicz, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Dolicheremaeus baseyensis* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus batarazaensis* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus bengalensis* Sanyal, 1992
 DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Dolicheremaeus bifidus* (Csiszár, 1961) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Dolicheremaeus bolivianus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Dolicheremaeus borbolai* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Dolicheremaeus brasilianus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Dolicheremaeus bruneiensis* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Noreste de India).
 - *Dolicheremaeus bugiamapensis* Ermilov, Anichkin y Wu, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Dolicheremaeus caneteae* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
Dolicheremaeus capillatus (Balogh, 1959) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
 - *Dolicheremaeus capillatus capillatus* (Balogh, 1959)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
 - *Dolicheremaeus capillatus neonominatus* Subías, 2004
 (= *Tetracondyla capillata minor* Wallwork, 1962, “nom. praeoc.” por Berlese, 1913)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Dolicheremaeus capizensis* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus capreolatus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Dolicheremaeus carinatus* Aoki, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Dolicheremaeus cebuensis* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus ceylonicus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus cicatricosus* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus claviger* Mahunka, 2000

- DISTRIBUCIÓN: Borneo y Japón.
- *Dolicheremaeus conjunctus* Mahunka, 1973
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus contactus* Ermilov y Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Dolicheremaeus coronarius* Chakrabarti, Bhaduri y Kundu, 1981
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Dolicheremaeus crispus* (Balogh, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Dolicheremaeus csuzdii* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Dolicheremaeus curvisetus* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
 - *Dolicheremaeus cuspidatus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Dolicheremaeus cuyi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus damoeoides* (Berlese, 1913) (*Otocepheus*)
(=*Dolicheremaeus berlesei* J. y P. Balogh, 2002)
(=*Tetracondyla pallida* Newell, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental (Java y Vietnam), Australiana y Neotropical (I. Juan Fernández).
 - *Dolicheremaeus densefoveolatus* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus distinctus* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón e India (Arunachal Pradesh).
 - *Dolicheremaeus donacunarensis* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Dolicheremaeus dorni* (Balogh, 1937) (*Oppia*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Dolicheremaeus duplicarinatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Dolicheremaeus duplicatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
 - *Dolicheremaeus dwalteri* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Dolicheremaeus elisabethae* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus elongatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
 - *Dolicheremaeus euaensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
 - *Dolicheremaeus eusebioi* Corpuz-Raros y Lit, 2005
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus fijiensis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
 - *Dolicheremaeus filipinus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus fujikawae* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus furcatus* (Balogh, 1961) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Dolicheremaeus furcillatus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus furcula* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus gapudi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus garciai* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus geminus* Mondal y Kundu, 1986
DISTRIBUCIÓN: India.
 - *Dolicheremaeus genitalis* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus georgii* Bulanova-Zachvatkina, 1967
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
 - *Dolicheremaeus giganticus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.

- *Dolicheremaeus grafatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus granulatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus gruezoii* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus gyroplicatus* Wen, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Dolicheremaeus hammerae* Corpuz-Raros, 2000
(=*Dolicheremaeus obsessus* Subías, 2004)
(=*Dolicheremaeus lineolatus* Hammer, 1981, “nom. praeoc.” por Balogh y Mahunka, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Tripura).
- *Dolicheremaeus heterotrichus* J. y P. Balogh, 1986
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus himalayensis* Chakrabarti, Bhaduri y Kundu, 1981
DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).
- *Dolicheremaeus hirsutus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus imadatei* Aoki, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dolicheremaeus inaequalis* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus indicus* Haq, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Dolicheremaeus infrequens* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Noreste de Oriental.
 - *Dolicheremaeus infrequens infrequens* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Dolicheremaeus infrequens amamiensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Dolicheremaeus infrequens coreanus* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Dolicheremaeus infrequens hachijoensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
 - *Dolicheremaeus infrequens taiwanus* Aoki, 1991
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Japón.
- *Dolicheremaeus inopinatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Dolicheremaeus insolitus* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus junichiaokii* Subías, 2010
(=*Dolicheremaeus magnus* Aoki, 2006, “nom. praeoc.” por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Dolicheremaeus keralensis* Sanyal, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Dolicheremaeus krantzi* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus kummeri* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus leytensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus lineatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus lineolatus* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus liti* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus longipilus* (Higgins y Woolley, 1963) (*Autogneta*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Dolicheremaeus losbanosensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus lucidus* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus luxtoni* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus luzonicellus* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Dolicheremaeus luzonicus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus machadoi* (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Dolicheremaeus magnus* (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Ghana).
 - *Dolicheremaeus magnus magnus* (Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Dolicheremaeus magnus ghanensis* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Dolicheremaeus magnus iteratus* Subías, 2004
(=*Tetracondyla magna minor* Wallwork, 1962, "nom. praec." por Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Dolicheremaeus magnus longiseta* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Ghana.
- *Dolicheremaeus mahabasensillus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus mahnerti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Dolicheremaeus malakicondylus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus malakius* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus malangensis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Dolicheremaeus maliit* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus mambusaoensis* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus manifera* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus mariehammerae* Corpuz-Raros, 1991
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus markusi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus matulis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus mauritii* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Dolicheremaeus mindanaoensis* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus minor* (Berlese, 1913) (*Otocepheus longior m.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus misamisensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus montanus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Dolicheremaeus mutabilis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus nagpalae* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus nasalis* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus nepalensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Dolicheremaeus niedbalai* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus nimbus* Karppinen, 1966
DISTRIBUCIÓN: Guinea.
- *Dolicheremaeus obtusisetus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus oginoi* (Aoki, 1965) (*Dicondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).
- *Dolicheremaeus ohmensis* Aoki, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Dolicheremaeus orientalis* (Aoki, 1965) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) y Japón.

- *Dolicheremaeus ornatus* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Dicondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Dolicheremaeus oroquietaensis* Corpuz-Raros, 2010
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus pahabaeus* Corpuz-Raros y Gruèzo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus palawanus* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus panayensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus pannosus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Dolicheremaeus papuensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India.
- *Dolicheremaeus pectinatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus perisi* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Dolicheremaeus perreti* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Dolicheremaeus philippinensis* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Dolicheremaeus phyllotrichus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus porcinolus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Dolicheremaeus praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Dolicheremaeus curvisetus* Hammer, 1981, "nom. praeoc." por Mahunka, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus pseudofurcatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus punctatus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Dolicheremaeus pustulatus* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Dolicheremaeus quezonensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus rawisensis* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus renukae* Sanyal, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Dolicheremaeus repetitus* Subías, 2004
(=*Dolicheremaeus elongatus* Balogh, 1968, "nom. praeoc." por Aoki, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Dolicheremaeus reyesi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus rimandoi* Corpuz-Raros, 2008
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus robustus* Mahunka, 1973
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Dolicheremaeus romyi* Corpuz-Raros, 2000
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus rubripedes* Jacot, 1938
DISTRIBUCIÓN: Suereste de U.S.A.
- *Dolicheremaeus russiae* Mondal, Kundu y Roy, 1999
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Dolicheremaeus sabahnus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Dolicheremaeus samarensis* Corpuz-Raros, 1990
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Dolicheremaeus semicapillatus* (Balogh, 1962) (*Tetracondyla*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Dolicheremaeus semilunatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Dolicheremaeus seychellensis* (Warburton, 1912) (*Amerus*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Dolicheremaeus siamensis* Aoki, 1967

- DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Dolicheremaeus simplex* (Balogh, 1962) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Dolicheremaeus singaporensis* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Dolicheremaeus spatulatus* Corpuz-Raros y Gruèzo, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus speciosus* (Pearce, 1906) (*Amerus*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
 - *Dolicheremaeus subiasi* Corpuz-Raros, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus subsimilis* Balogh, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Dolicheremaeus sulcatus* Mahunka, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus sumatranus* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
 - *Dolicheremaeus szentivanyi* Balogh, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Dolicheremaeus taidinchani* Mahunka, 1976
 DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
 - *Dolicheremaeus tamurai* Aoki, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Dolicheremaeus tenuisetus* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus triangularis* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus tricorutus* Mahunka, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Dolicheremaeus trimucronatus* Mahunka, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Dolicheremaeus upicentenarios* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus variolatus* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Dolicheremaeus variolobatus* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Java.
Dolicheremaeus vilhenarum (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana).
 - *Dolicheremaeus vilhenarum vilhenarum* (Balogh, 1958)
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Dolicheremaeus vilhenarum barbatula* (Wallwork, 1962) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Ghana.
 - *Dolicheremaeus visayasensis* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus viscaensis* Corpuz-Raros, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus vitraeus* (Balogh, 1958) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Dolicheremaeus wallacei* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus wallworki* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Dolicheremaeus wangi* Aoki y Hu, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Dolicheremaeus waray* Corpuz-Raros, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Dolicheremaeus yoshii* Mahunka, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Dolicheremaeus yunnanensis* (Wen, 1999) (*Dicondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Fernandocepheus Mahunka, 1982 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Fernandocepheus franzi* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Fernandocepheus franzi* Mahunka, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

Fissicepheus Balogh y Mahunka, 1967 (22 spp. y 2 sspp.)
 ESPECIE TIPO: *Fissicepheus elegans* Balogh y Mahunka, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

Fissicepheus (Fissicepheus) Balogh y Mahunka, 1967 (20 spp. y 2 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Fissicepheus (F.) chinensis* Wen, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Fissicepheus (F.) clavatus* (Aoki, 1959) (*Tetracondyla*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente) y China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) claviopsis* Mahunka, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- Fissicepheus (F.) coronarius* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
- *Fissicepheus (F.) coronarius coronarius* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Fissicepheus (F.) coronarius koreensis* Mahunka, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) corniculatus* Aoki, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) curvisetosus* Kubota, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) defectus* Aoki, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Fissicepheus (F.) elegans* Balogh y Mahunka, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Fissicepheus (F.) gracilis* Aoki, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Fissicepheus (F.) mitis* Aoki, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Fissicepheus (F.) mitis mitis* Aoki, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) mitis takara* Aoki, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Nepal.
- *Fissicepheus (F.) mitratus* Mahunka, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) nakanei* Aoki, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) ornithorrhynchus* Wen, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Fissicepheus (F.) sitnikovae* Sergienko, 1976
 DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Fissicepheus (F.) steinmanni* Mahunka, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) striganovae* Ermilov y Anichkin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Fissicepheus (F.) subclavatus* Mahunka, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Fissicepheus (F.) takenouchiensis* Fujikawa y Nishi, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (F.) thaiensis* Mahunka, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Fissicepheus (F.) vicinus* Aoki, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Japón.

Fissicepheus (Psammocephus) Aoki, 1970 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Fissicepheus (Psammocephus) amabilis* Aoki, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Fissicepheus (Psammocephus) amabilis* Aoki, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fissicepheus (Psammocephus) haradai* Choi, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Corea.

Flagellocephus P. Balogh, 1984 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Flagellocephus sagittatus* P. Balogh, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Flagellocepheus sagittatus* P. Balogh, 1984
DISTRIBUCIÓN: Colombia.

Hydroecocepheus Corpuz-Raros, 1979 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Hydroecocepheus romeroi* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Hydroecocepheus romeroi* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Leptotocepheus Balogh, 1961 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Leptotocepheus trimucronatus* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Leptotocepheus angustus* (Hammer, 1981) (*Dolicheremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Leptotocepheus flagellifer* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Leptotocepheus macromucronatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Leptotocepheus mahunkai* Corpuz-Raros, 1999
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Leptotocepheus murphyi* (Mahunka, 1989) (*Dolicheremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Vietnam).
- *Leptotocepheus orientalis* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Leptotocepheus trimucronatus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: África oriental.

Longocepheus Balogh y Mahunka, 1966 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Longocepheus australis* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Longocepheus australis* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Longocepheus globosus* Grobler, 1995
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Longocepheus longus* (Balogh, 1961) (*Pseudotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Longocepheus youngai* (Mahunka, 1984) (*Nesotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Lophotocepheus J. y P. Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Lophotocepheus simplex* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Lophotocepheus simplex* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia e India (Bengala Occidental).

Neotrichocepheus Hammer, 1973 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Dolicheremaeus (Neotrichocepheus) tongaensis* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Neotrichocepheus tongaensis* (Hammer, 1973) (*Dolicheremaeus (N.)*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Papillocepheus Balogh y Mahunka, 1966 (10 spp.)

(=*Clavazetes* Hammer, 1966)

ESPECIE TIPO: *Papillocepheus heterotrichus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y subtropical austral.

- *Papillocepheus areolatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Papillocepheus decoratus* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Papillocepheus decorus* (Hammer, 1966) (*Clavazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Papillocepheus deficiens* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Papillocepheus heterotrichus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Papillocepheus longisetosus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Yemen.

- *Papillocepheus neotropicus* (J. y P. Balogh, 1988) (*Clavazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Papillocepheus primus* Ermilov, Anichkin y Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Papillocepheus reductus* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Papillocepheus tuberculatus* (Mahunka, 1978) (*Clavazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Paradolicheremaeus Tseng, 1982 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Paradolicheremaeus tabulatus* Tseng, 1982

DISTRIBUCIÓN: Paletropical.

- *Paradolicheremaeus plurisetus* (Mahunka, 1988) (*Dolicheremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Paradolicheremaeus tabulatus* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Pentacepheus Corpuz-Raros, 2004 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pentacepheus malindangensis* Corpuz-Raros, 2004

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pentacepheus malindangensis* Corpuz-Raros, 2004
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Plenotocepheus Hammer, 1966 (12 spp.)

ESPECIE TIPO: *Plenotocepheus mollicoma* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral, Neotropical y Oriental.

Plenotocepheus (Plenotocepheus) Hammer, 1966 (10 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral, Neotropical y Oriental.

- *Plenotocepheus (P.) africanus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) crinitus* Grobler, 1995
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) delicatissimus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Plenotocepheus (P.) dentatus* Grobler, 1995
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) discrepans* Grobler, 1995
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Plenotocepheus (P.) mollicoma* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Plenotocepheus (P.) neotropicus* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Plenotocepheus (P.) trinidadensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Plenotocepheus (P.) undatus* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Plenotocepheus (P.) verrucosus* Grobler, 1995
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).

Plenotocepheus (Neotocepheus) Hammer, 1966 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Neotocepheus colliger* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Plenotocepheus (Neotocepheus) colliger* (Hammer, 1966) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Plenotocepheus (Neotocepheus) longipilus* (Trägårdh, 1931) (*Otocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

Pseudotocepheus Balogh, 1961 (44 spp.)

(=*Constrictocepheus* Grobler, 1998)

(=*Nesotocepheus* Hammer, 1972)

ESPECIE TIPO: *Pseudotocepheus pauliani* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical austral.

- *Pseudotocepheus amonstruosus* Mahunka, 1973
(=*Pseudotocepheus septemtuberculatus* Balogh y Mahunka, 1978)
- (=*Pseudotocepheus simplex* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)
- (=*Pseudotocepheus transversalis* Mahunka, 1978)

- DISTRIBUCIÓN: Tropical: Etiópica (Sudáfrica y Malgache), Ceilán [Sri Lanka] y Neotropical.
- *Pseudotocepheus andinus* (Fernández, Martínez y Eguaras, 1990) (*Nesotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Pseudotocepheus aokii* Grobler, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus asymmetricus* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pseudotocepheus atolanaro* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Pseudotocepheus australis* (Mahunka, 1980) (*Nesotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
 - *Pseudotocepheus bacilliger* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pseudotocepheus clavigerus* (Mahunka, 1978) (*Nesotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
 - *Pseudotocepheus coarctatus* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pseudotocepheus contractus* Grobler, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).
 - *Pseudotocepheus curtipilus* (Trägårdh, 1931) (*Odontocepheus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).
 - *Pseudotocepheus curtiseta* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Pseudotocepheus dentatus* Grobler, 1998
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus flagellatus* (Mahunka, 1987) (*Plenotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Pseudotocepheus foveolatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Pseudotocepheus geminatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Pseudotocepheus gobletus* Chakrabarti y Mondal, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Pseudotocepheus granulatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus hammerae* Chakrabarti y Kundu, 1978
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Pseudotocepheus hauseri* (Mahunka, 1980) (*Nesotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Pseudotocepheus lanceolatus* Grobler, 1998
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus lienhardi* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Pseudotocepheus medius* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus monteithi* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pseudotocepheus neonomatus* Subías, 2004
(=*Pseudotocepheus longus* Mahunka, 1973, “nom. praec.” por Balogh, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Pseudotocepheus orientalis* Mondal y Kundu, 1984
DISTRIBUCIÓN: Noreste de Oriental.
 - *Pseudotocepheus parallelus* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pseudotocepheus pauliani* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Pseudotocepheus pauliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Pseudotocepheus promissus* Grobler, 1998
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus punctatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Chile.
 - *Pseudotocepheus puntaarenasensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Pseudotocepheus pygmaeus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Pseudotocepheus radiatus* Hammer, 1973

- DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
 - *Pseudotocepheus setiger* (Hammer, 1972) (*Nesotocepheus*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití), Etiópica (Congo) y Vietnam.
 - *Pseudotocepheus sexdentatus* (Trägårdh, 1931) (*Odontocepheus*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).
 - *Pseudotocepheus sexidimorphus* (Vasiliu y Călugăr, 1977) (*Nesotocepheus*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Pseudotocepheus shauni* Grobler, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Pseudotocepheus sturmi* P. Balogh, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Colombia.
 - *Pseudotocepheus subtilis* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Pseudotocepheus szentivanyorum* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Pseudotocepheus tenuiseta* Hammer, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Pseudotocepheus tolanaro* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Pseudotocepheus vicarius* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- Seboetocepheus*** Mahunka, 1985 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Seboetocepheus coronatus* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Seboetocepheus coronatus* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- Spinotocepheus*** Hammer, 1981 (5 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Spinotocepheus javensis* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Oriental y **Paleártica meridional**.
 - *Spinotocepheus agerus* Fujikawa, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Spinotocepheus foveolatus* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Bengala Occidental).
 - *Spinotocepheus javensis* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Spinotocepheus nigromaculatus* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Spinotocepheus tjibodensis* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- Trichocepheus*** Balogh y Mahunka, 1966 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Trichocepheus lamellatus* Balogh y Mahunka, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Trichocepheus auriculus* Grobler, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Trichocepheus lamellatus* Balogh y Mahunka, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- Trichocondyla*** J. y P. Balogh, 1986 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Trichocondyla multisetosa* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Australiana.
 - *Trichocondyla multisetosa* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- Umashtanchaeviella*** Ermilov, Anichkin y Tolstikov, 2014 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Umashtanchaeviella plethotricha* Ermilov, Anichkin y Tolstikov, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Umashtanchaeviella plethotricha* Ermilov, Anichkin y Tolstikov, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- Otocepheidae** Balogh, 1961 (12 gen., 6 subg., 109 spp. y 3 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).
- Basiceramerus*** Corpuz-Raros, 1979 (6 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Basiceramerus upelbensis* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Basiceramerus babalus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basiceramerus bangladeshensis* Corpuz-Raros y Gruèzo, 2008
DISTRIBUCIÓN: Bangladés.
- *Basiceramerus igorotus* Corpuz-Raros y Gruèzo, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Basiceramerus makilingensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basiceramerus rosaeus* (Corpuz-Raros, 2004) (*Leptotocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Basiceramerus upelbensis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Eurostocepheus Aoki, 1965 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eurostocepheus aquilinus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Eurostocepheus (Eurostocepheus) Aoki, 1965 (6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Eurostocepheus (E.) aquilinus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Tailandia y Vietnam.
- *Eurostocepheus (E.) heterotrichus* Wen, 1999
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Eurostocepheus (E.) mahunkai* Mondal y Kundu, 1999
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Eurostocepheus (E.) peterjaegeri* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Eurostocepheus (E.) sajisei* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurostocepheus (E.) wojciechniedbalai* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Eurostocepheus (Cerostocepheus) Mahunka, 1973 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eurostocepheus trisetosus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Eurostocepheus (Cerostocepheus) baloghi* (Corpuz-Raros, 1999) (C.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurostocepheus (Cerostocepheus) isarogensis* (Corpuz-Raros, 2007) (C.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eurostocepheus (Cerostocepheus) trisetosus* Balogh, 1970 (E.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] y Filipinas).

Ikarotocepheus Mahunka, 1988 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ikarotocepheus alatus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Ikarotocepheus alatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Ikarotocepheus gruezoi* Corpuz-Raros, 2004
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Kalayaan Corpuz-Raros, 1998 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Kalayaan bonifacioi* Corpuz-Raros, 1998

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Kalayaan (Kalayaan) Corpuz-Raros, 1998 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Kalayaan (K.) bonifacioi* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (K.) centenarius* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (K.) rizali* Corpuz-Raros, 1998
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Kalayaan (Rimandocepheus) Corpuz-Raros, 1998 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rimandocepheus leoi* Corpuz-Raros, 1998

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Kalayaan (Rimandocephus) brevisetosus* (Corpuz-Raros, 1998) (R.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (Rimandocephus) leoi* (Corpuz-Raros, 1998) (R.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Kalayaan (Rimandocephus) longisetosus* (Corpuz-Raros, 1998) (R.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Megalotocephus Aoki, 1965 (20 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Megalotocephus japonicus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.

Megalotocephus (Megalotocephus)Aoki, 1965 (12 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.

- *Megalotocephus (M.) aokii* Mondal y Kundu, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Megalotocephus (M.) ceylonicus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Megalotocephus (M.) darjeelingensis* Mondal y Kundu, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Megalotocephus (M.) fornicatus* Wen, 1999
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocephus (M.) hainanensis* Wen y Zhao, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocephus (M.) himalayensis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- Megalotocephus (M.) japonicus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
 - *Megalotocephus (M.) japonicus japonicus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
 - *Megalotocephus (M.) japonicus setosus* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Megalotocephus (M.) loksai* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Megalotocephus (M.) mahunkarum* J. y P. Balogh, 2002
(=*Megalotocephus ceylanicus* Mahunka, 1973, "nom. praeoc." por Balogh, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Megalotocephus (M.) mindanensis* Corpuz-Raros, 2004
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Megalotocephus (M.) nigrolobatus* Hammer, 1981
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Megalotocephus (M.) tianshanicus* Krivolutsky, 1969
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Megalotocephus (Archegotocephus) Mahunka, 1988 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Archegotocephus singularis* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica.

- *Megalotocephus (Archegotocephus) bengalensis* Mondal y Kundu, 1990 (M.)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Megalotocephus (Archegotocephus) brevisetus* (Mahunka, 1989) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocephus (Archegotocephus) crinitus* (Berlese, 1905) (*Carabodes (Otocephus)*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam) y Este de Paleártica oriental.
- *Megalotocephus (Archegotocephus) latus* Aoki, 1965 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocephus (Archegotocephus) polyptychus* Wen, 1999 (M.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Megalotocephus (Archegotocephus) robustus* (Sanyal, Saha y Chakraborty, 2006) (A.)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Megalotocephus (Archegotocephus) singularis* (Mahunka, 1988) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Megalotocephus (Archegotocephus) undulatus* Hammer, 1981 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java e India: Bengala Occidental).

Ocellotocephus Mahunka, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Ocellotocephus tuberculatus* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Ocellotocephus tuberculatus* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Otocepheus Berlese, 1905 (53 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes (Otocepheus) longior* Berlese, 1905

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Australiana y “Neotropical”) y subtropical (Paleártica meridional).

Otocepheus (Otocepheus) Berlese, 1905 (9 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Australiana y “Neotropical”) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Otocepheus (O.) cristatus* (Canestrini, 1897) (*Eremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Java.

- *Otocepheus (O.) durian* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Otocepheus (O.) hauseri* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Otocepheus (O.) heterosetiger* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Myanmar [Birmania]).

- *Otocepheus (O.) longior* (Berlese, 1905) (*Carabodes (O.)*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Tailandia) y Cáucaso.

- *Otocepheus (O.) negrosensis* Corpuz-Raros, 1991

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Otocepheus (O.) pacificus* Trägårdh, 1931 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

- *Otocepheus (O.) plumosus* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

- *Otocepheus (O.) spatulatus* Mahunka, 2000

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).

Otocepheus (Acrotocepheus) Aoki, 1965 (43 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Otocepheus (Acrotocepheus) quateorum* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y subtropical (Paleártica meridional).

- *Otocepheus (Acrotocepheus) bajau* Mahunka, 2000 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo y Filipinas.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) banahawensis* (Corpuz-Raros, 1999) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) berndhauseri* Mahunka, 2000 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) besucheti* (Mahunka, 1973) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Otocepheus (Acrotocepheus) brevisetiger* (Aoki, 2009) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) bucephalus* (Balogh, 1970) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Otocepheus (Acrotocepheus) burckhardti* (Mahunka, 1987) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) caudatus* Hammer, 1981

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) consimilis* (Balogh, 1970) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Otocepheus (Acrotocepheus) curvisetiger* (Aoki, 1984) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) diehli* (Mahunka, 1989) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).

Otocepheus (Acrotocepheus) duplicornutus Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) duplicornutus duplicornutus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) duplicornutus discrepans* (Balogh y Mahunka, 1967) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) excelsus* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) gracilis* (Aoki, 1973) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) grandis* (Mahunka, 1973) (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Otocepheus (Acrotocepheus) heterotrichus* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Otocepheus (Acrotocepheus) holtmanni* Aoki, 1965

- DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) horakae* (Mahunka, 1987) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) kadazan* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) keningau* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) lienhardi* (Mahunka, 1989) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) lienhardorum* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) loebli* (Mahunka, 1973) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) macrodentatus* Hammer, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) malindangensis* (Corpuz-Raros, 2007) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) nepenthes* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) orangutan* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) palawanus* (Corpuz-Raros, 1999) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) pangasuganensis* (Corpuz-Raros, 1990) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) paraduplicornutus* (Corpuz-Raros y Gruèzo, 2009) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) philippinensis* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas e India: Kerala).
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) punctatus* (Sanyal, Saha y Chakraborty, 2006) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) quateorum* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) rafflesiae* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) reniformis* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) samarus* (Corpuz-Raros, 2007) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) surigaoensis* (Corpuz-Raros, 1979) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) taftensis* (Corpuz-Raros, 2007) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) triplicicornutus* (Balogh y Mahunka, 1967) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) tupasae* (Corpuz-Raros, 1990) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) verrucosus* Mahunka, 2000 (O.)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) vietnamicus* Ermilov y Anichkin, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal).
 - *Otocephalus (Acrotocephalus) wallacei* (Mahunka, 1989) (A.)
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

***Otocephalus (Hexatocephalus)* Wen, 1993 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Acrotocephalus (Hexatocephalus) emeiensis* Wen, 1993

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Otocephalus (Hexatocephalus) emeiensis* (Wen, 1993) (*Acrotocephalus (H.)*)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

***Otopentacepheus* Corpuz-Raros, 2007 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Otopentacepheus heterosetus* Corpuz-Raros, 2007

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Otopentacepheus heterosetus* Corpuz-Raros, 2007

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

***Papuacepheus* Balogh, 1968 (4 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Megalotocepheus (Papuacepheus) geminatus* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Papuacepheus garciai* Corpuz-Raros, 2004

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Papuacepheus geminatus* (Balogh, 1968) (*Megalotocepheus* (P.))

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Papuacepheus hermosaensis* Corpuz-Raros, 2007

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Papuacepheus vagorum* Corpuz-Raros, 1990

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Philippotocepheus J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Papuacepheus siniloanensis* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Philippotocepheus siniloanensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Papuacepheus*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Philippotocepheus visayasensis* Corpuz-Raros, 2007

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Samarocepheus Corpuz-Raros, 1990 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Samarocepheus cavernicolus* Corpuz-Raros, 1990

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Samarocepheus (Samarocepheus) Corpuz-Raros, 1990 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Samarocepheus cavernicolus* Corpuz-Raros, 1990

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Samarocepheus* (S.) *cavernicolus* Corpuz-Raros, 1990

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Samarocepheus (Kaibacepheus) Corpuz-Raros, 2004 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Kaibacepheus contiguus* Corpuz-Raros, 2004

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Samarocepheus (Kaibacepheus) contiguus* (Corpuz-Raros, 2004) (K.)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Trichotocepheus Aoki, 1965 (3 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Trichotocepheus erabuensis* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Trichotocepheus amamiensis* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Trichotocepheus erabuensis Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

- *Trichotocepheus erabuensis erabuensis* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

- *Trichotocepheus erabuensis modestus* Aoki, 1973

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trichotocepheus parvus* Aoki, 2009

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tokunocepheidae Aoki, 1966 (1 gen. y 2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Tokunocepheus Aoki, 1966 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tokunocepheus mizusawai* Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Tokunocepheus chiranensis* Fujikawa, 2014

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Tokunocepheus mizusawai* Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente).

Carabodoidea Koch, 1837

Carabodidae Koch, 1837 (33 gen., 15 subg., 363 spp. y 6 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Afticarabodes Fernández, Theron y Rollard, 2013 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Afticarabodes anjavidilavai* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Afticarabodes anjavidilavai* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Antongilibodes Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Antongilibodes paulae* Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Antongilibodes paulae* Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Aokiella Balogh y Mahunka, 1967 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Aokiella florens* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Aokiella florens* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Aokiella latiseta* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Aokiella rotundus* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Aokiella xuansoni* Vù, Ermilov y Dao, 2010

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Apotomocephus Aoki, 1965 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Apotomocephus gressitti* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Apotomocephus gressitti* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Archegocephus Aoki, 1965 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Archegocephus imadatei* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Archegocephus imadatei* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).

- *Archegocephus macrofoliatus* Wen, 1997

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Austrocarabodes Hammer, 1966 (94 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes ensifer* Sellnick, 1931

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Boreal).

Austrocarabodes (Austrocarabodes) Hammer, 1966 (83 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Boreal).

- *Austrocarabodes (A.) agalawatta* P. Balogh, 1988

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Austrocarabodes (A.) agressor* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Austrocarabodes (A.) albidus* (Balogh, 1961) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Austrocarabodes (A.) alveolatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Vietnam.

- *Austrocarabodes (A.) angulatus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Austrocarabodes (A.) armatus* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Austrocarabodes (A.) arrogans* Pérez-Íñigo, 1967

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Austrocarabodes (A.) australis* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina e I. Galápagos).

- *Austrocarabodes (A.) bacilliger* Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Austrocarabodes (A.) bellicosus* P. Balogh, 1988

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Austrocarabodes (A.) bituberculatus* Aoki, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón y Filipinas.

- *Austrocarabodes (A.) blancharti* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Austrocarabodes (A.) boninensis* (Aoki, 1978) (*Carabodes australis b.*)

- DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrocarabodes (A.) brasiliensis* Ermilov y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Austrocarabodes (A.) butiae* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Uruguay y Brasil).
 - *Austrocarabodes (A.) cadeti* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
 - *Austrocarabodes (A.) cellularis* (Balogh, 1962) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Austrocarabodes (A.) corpulentus* (Trägårdh, 1931) (*Cepheus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).
 - *Austrocarabodes (A.) costulatus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
 - *Austrocarabodes (A.) crassimarginatus* Hugo-Coetzee, 2011
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Austrocarabodes (A.) crenellatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Austrocarabodes (A.) crinitus* (Trägårdh, 1931) (*Cepheus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).
 - *Austrocarabodes (A.) curvisetiger* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Austrocarabodes (A.) davisii* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Austrocarabodes (A.) elegans* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Austrocarabodes (A.) ensifer* (Sellnick, 1931) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
 - *Austrocarabodes (A.) erectus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Austrocarabodes (A.) falcatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga), Neotropical (Costa Rica) y Oriental (Vietnam).
 - *Austrocarabodes (A.) fenestralis* (Hammer, 1979) (*Gibbicepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Austrocarabodes (A.) fenestratus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
 - *Austrocarabodes (A.) flabellifer* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Angola.
 - *Austrocarabodes (A.) foliaceisetus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
 - *Austrocarabodes (A.) foliaceisetus foliaceisetus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
 - *Austrocarabodes (A.) foliaceisetus georgiensis* Murvanidze y Weigmann, 2007
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.
 - *Austrocarabodes (A.) glabrus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Austrocarabodes (A.) gressitti* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Austrocarabodes (A.) haradai* (Aoki, 1978) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Austrocarabodes (A.) hendriksi* Hugo, 2008
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Austrocarabodes (A.) heterosetosus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Austrocarabodes (A.) horridus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
 - *Austrocarabodes (A.) imperfectus* (Sellnick, 1959) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
 - *Austrocarabodes (A.) imperfectus imperfectus* (Sellnick, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
 - *Austrocarabodes (A.) imperfectus squamosus* Hammer, 1970
DISTRIBUCIÓN: I. de Pascua (I. Easter).
 - *Austrocarabodes (A.) intermedius* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Austrocarabodes (A.) lateoalveolatus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Austrocarabodes (A.) latissimus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Yemen.

- *Austrocarabodes (A.) latohumeralis* (Hammer, 1979) (*Gibbicepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Austrocarabodes (A.) lepidus* (Aoki, 1978) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Filipinas.
- *Austrocarabodes (A.) lineasetosa* Hugo-Coetzee, 2010
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) longisetosus* Hugo-Coetzee, 2011
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) longulus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (A.) luciensis* Hugo, 2008
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) lunaris* (Balogh, 1962) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) maculatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Austrocarabodes (A.) mahunkai* Hugo-Coetzee, 2010
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) microlaminatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (A.) mixtus* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) nodosus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Antártica (I. Auckland).
- *Austrocarabodes (A.) nortoni* Hugo-Coetzee, 2011
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) obscurus* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrocarabodes (A.) obsoletus* (Berlese, 1916) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Austrocarabodes (A.) ocellatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Austrocarabodes (A.) parapustulatus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) patakii* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Austrocarabodes (A.) picturatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Austrocarabodes (A.) pinnatus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Austrocarabodes (A.) planisetus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) pseudoreticulatus* Covarrubias, 1967
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Méjico).
- *Austrocarabodes (A.) pustuloreticulatus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) rimosus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Austrocarabodes (A.) rugosus* Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Austrocarabodes (A.) schauenbergi* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Austrocarabodes (A.) schwartzi* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Austrocarabodes (A.) semilunatus* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Austrocarabodes (A.) similis* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Austrocarabodes (A.) sinuosociliatus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Austrocarabodes (A.) sordidus* (Balogh, 1958) (*Carabodes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Austrocarabodes (A.) spathulatus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Austrocarabodes (A.) sphaeroideus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Austrocarabodes (A.) sphaerula* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Austrocarabodes (A.) szentivanyi* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam y Japón.

- *Austrocarabodes (A.) tarandus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Austrocarabodes (A.) travei* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Costa Rica).

- *Austrocarabodes (A.) vaucheri* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Paraguay y Vietnam.

- *Austrocarabodes (A.) ventrostriatus* (Hammer, 1979) (*Gibbicepheus*)

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Austrocarabodes (A.) versoncrookensis* Hugo, 2008

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Austrocarabodes (A.) verrucatus* (Trägårdh, 1931) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

Austrocarabodes (Baloghodes) Mahunka, 1986 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Baloghodes heterotrichosus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Austrocarabodes (Baloghodes) heterotrichosus* (Mahunka, 1986) (*B.*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Austrocarabodes (Baloghodes) secundus* (Mahunka, 1993) (*B.*)

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Austrocarabodes (Uluguroides) Mahunka, 1983 (9 spp. y 1 ssp.)

(=*Ngorongobodes* J. y P. Balogh, 1992)

ESPECIE TIPO: *Uluguroides trichosus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Australiana.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) aethiopicus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) arboreus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) grandis* (Mahunka, 1984) ("*Ulugurozetes*")

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) incrustatus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) klutzi* Ermilov, Winchester, Lowman y Wassie, 2012

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) minitricha* (Mahunka, 1993) (*U.*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Austrocarabodes (Uluguroides) pentatrichus (Balogh, 1962) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania e I. Santa Helena).

- *Austrocarabodes (Uluguroides) pentatrichus pentatrichus* (Balogh, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) pentatrichus clavatus* (Wallwork, 1977) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) polytrichus* Balogh y Mahunka, 1978 (*A.*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Austrocarabodes (Uluguroides) trichosus* (Mahunka, 1983) (*U.*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Bathocephus Aoki, 1978 (2 spp.)

(=*Philippobodes* J. y P. Balogh, 1992)

ESPECIE TIPO: *Bathocephus concavus* Aoki, 1978

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica oriental.

- *Bathocephus concavus* Aoki, 1978

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Bathocephus manguiati* (Corpuz-Raros, 1979) (*Machadocephus*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Bovicarabodes Fernández, Theron y Rollard, 2013 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Bovicarabodes deharvengi* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Bovicarabodes deharvengi* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Bovicarabodes fort-dauphini* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Bovicarabodes jacquelinae* Fernández, Theron y Rollard, Leiva y Tiedt, 2015

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Bovicarabodes levyi* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Bunabodes Fujikawa, 2004 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bunabodes truncatus* Fujikawa, 2004

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Bunabodes truncatus* Fujikawa, 2004

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Carabodes Koch, 1835 (136 spp. y 3sspp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes coriaceus* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Carabodes (Carabodes) Koch, 1835 (73 spp. y 1 ssp.)

(=*Neocephus* Willmann, 1936)

(=*Tegeocranus* Nicolet, 1855)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica y pantropical (excepto Australiana).

- *Carabodes (C.) affinis* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Carabodes (C.) apuanicus* Bernini, 1979

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Carabodes (C.) arduinii* Valle, 1955

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Carabodes (C.) areolatus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica).

- *Carabodes (C.) auriculatus* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Carabodes (C.) azoricus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996

DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

- *Carabodes (C.) basilewskyi* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Carabodes (C.) bellus* Aoki, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Este de Paleártica oriental y Cáucaso).

- *Carabodes (C.) berninii* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Carabodes (C.) bicolor* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Carabodes (C.) brevis* Banks, 1896

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

- *Carabodes (C.) cephalotes* Koch, 1836 "sp. inq."

(=*Nothrus cynocephalus* Koch, 1839)

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Carabodes (C.) cerebrum* Fujikawa, 1993

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Carabodes (C.) cherokee* Reeves, 1993

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

- *Carabodes (C.) chirstlus* Mahunka, 1987

(=*Carabodes foliatus* Morell, 1990)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Carabodes (C.) clavatus* Warburton, 1912 (*C. labyrinthicus* c.) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

- *Carabodes (C.) cochleaformis* Reeves, 1990

DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.

- *Carabodes (C.) colorado* Reeves y Behan-Pelletier, 1998

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Carabodes (C.) comas* Kulijev, 1979

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Carabodes (C.) coriaceus* Koch, 1835

(=*Carabodes nepos* Hull, 1914)

(=*Carabodes papillosus* Lucas, 1849)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (frecuente) y "U.S.A. (Virginia)".

- *Carabodes (C.) coweetaensis* Reeves, 1995

DISTRIBUCIÓN: U.S.A.

- *Carabodes (C.) erectus* Reeves, 1992

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Carabodes (C.) falcatus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Carabodes (C.) femoralis* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental meridional).
- *Carabodes (C.) flagellifer* Mihelčič, 1966
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) floridus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Carabodes (C.) fossatus* (Kramer, 1897) (*Tegeocranus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Carabodes (C.) gibbiceps* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Carabodes (C.) grandjeani* Bernini, 1977
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Carabodes (C.) granulatus* Banks, 1895
(=*Carabodes omo* Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Paleártica occidental: Cáucaso) y Neotropical.
- *Carabodes (C.) gregorioi* Gil-Martín y Subías, 1997
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) guadarramicus* Subías y Arillo, 2001
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Carabodes (C.) hispanicus* Pérez-Íñigo, 1966
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Carabodes (C.) hoh* Reeves y Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Carabodes (C.) hummelincki* (Willmann, 1936) (*Neocephus*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Carabodes (C.) hungaricus* Balogh, 1943
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Carabodes (C.) interruptus* Reeves, 1992
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Carabodes (C.) kintrishiana* Murvanidze, 2008
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Carabodes (C.) labyrinthicus* (Michael, 1879) (*Tegeocranus*)
(=*Cepheus heimi* Oudemans, 1903)
(=*Carabodes marginepunctatus* Trägårdh, 1902)
(=*Carabodes scymnus* Hull, 1914)
(=*Carabodes vermiculatus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) y Méjico.
- *Carabodes (C.) magnus* Kunst, 1961
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Carabodes (C.) marginatus* (Michael, 1884) (*Tegeocranus*)
(=*Carabodes marginatus pontiger* Berlese, 1913)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Noroeste de Siberia).
- *Carabodes (C.) montanus* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Carabodes (C.) nantahalaensis* Reeves, 1993
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Carabodes (C.) neonomatus* Subías, 2004
(=*Carabodes gibbiceps clavatus* Jacot, 1938, “nom. praeoc.” por Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Carabodes (C.) niger* Banks, 1895
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Carabodes (C.) oenipontanus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Carabodes (C.) ornatus* Štorkán, 1925
(=*Carabodes forsslundi* Sellnick, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente.
- *Carabodes (C.) palmifer* Berlese, 1904
(=*Carabodes peniculatus* Aoki, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental, y Neártica oriental), Norte de Oriental y Norte de Neotropical.
- *Carabodes (C.) pentasetosus* Reeves, 1992
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Carabodes (C.) perezinigo* Salinas, 1971
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Carabodes (C.) phylliformis* Reeves, 1993

- DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Carabodes (C.) pirenaicus* Subías y Arillo, 2001
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Carabodes (C.) pirinensis* Kunst, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
 - *Carabodes (C.) polyporetetes* Reeves, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Carabodes (C.) procerus* Weigmann y Murvanidze, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Carabodes (C.) prunum* Fujikawa, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Carabodes (C.) quadrangulus* Bernini, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (excepto Este).
 - *Carabodes (C.) reticulatus* Berlese, 1913 (*C. coriaceus* r.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
 - *Carabodes (C.) rimosus* Aoki, 1959
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Taiwán [Formosa].
 - *Carabodes (C.) rugosior* Berlese, 1916 (*C. femoralis* r.)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional).
 - *Carabodes (C.) scaber* Monson, 2009
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Carabodes (C.) silvosus* Fujikawa, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Carabodes (C.) spiniformis* Reeves, 1995
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Carabodes (C.) spinosus* Štokán, 1925
 DISTRIBUCIÓN: Chequia.
 - *Carabodes (C.) subalpinus* Thor, 1937 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Noruega.
 - *Carabodes (C.) subarcticus* Trägårdh, 1902 (*C. elongatus* s.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: menos frecuente en el Sur, y Paleártica oriental).
 - *Carabodes (C.) subcarinatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2000
 (= *Carabodes carinatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999, “nom. praeoc.” por Wallwork, 1977)
 DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Carabodes (C.) tenuis* Forsslund, 1953
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Paquistán.
 - *Carabodes (C.) thaleri* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.
 - *Carabodes (C.) transversarius* Choi y Aoki, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
Carabodes (C.) tsushimaensis Aoki, 1970 (*C. rimosus* t.)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Carabodes (C.) tsushimaensis tsushimaensis* Aoki, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Carabodes (C.) tsushimaensis dorsalis* Choi y Aoki, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Carabodes (C.) tyrrhenicus* Salomone, Avanzati, Baratti y Bernini, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Carabodes (C.) wettsteini* Mahunka, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.
 - *Carabodes (C.) wonalancetanus* Reeves, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

***Carabodes (Flexa)* Kulijev, 1977 (8 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Carabodes dubius* Kulijev, 1968

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Carabodes (Flexa) bidens* (Djaparidze, 1990) (*F.*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Carabodes (Flexa) breviclava* Aoki, 1970 (*C.*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Carabodes (Flexa) djaparidzae* Murvanidze y Weigmann, 2007 (*C.*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Carabodes (Flexa) dubius* Kulijev, 1968 (*C.*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Carabodes (Flexa) horreo* (Djaparidze, 1990) (*F.*)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Carabodes (Flexa) intermedius* Willmann, 1951 (*C.*)

- (=*Carabodes tenuis longisetosus* Kulijev, 1968)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Carabodes (Flexa) scopulae* Kulijev, 1968 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Carabodes (Flexa) tarbae* (Shtanchaeva, 2004) (F.)
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- Carabodes (Klapperiches)*** Mahunka, 1979 (49 spp. y 2 sspp.)
 ESPECIE TIPO: *Klapperiches nigrosetosus* Mahunka, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
 - *Carabodes (Klapperiches) afrominusculus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Carabodes (Klapperiches) agenjoi* Pérez-Íñigo, 1969 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
 - *Carabodes (Klapperiches) andasibe* Mahunka, 1993 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Carabodes (Klapperiches) atrichosus* Mahunka, 1984 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Carabodes (Klapperiches) borhidii* Balogh y Mahunka, 1979 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Carabodes (Klapperiches) californica* Reeves y Behan-Pelletier, 1998 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de U.S.A.
 - *Carabodes (Klapperiches) chandleri* Reeves, 1992 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
 - *Carabodes (Klapperiches) coronatus* Mahunka, 1986 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Carabodes (Klapperiches) csikii* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Albania.
 - *Carabodes (Klapperiches) depilatus* Balogh y Mahunka, 1969 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Carabodes (Klapperiches) dickinsoni* Reeves y Behan-Pelletier, 1998 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
 - *Carabodes (Klapperiches) dilatatus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Carabodes (Klapperiches) dissimilis* Bernini, 1976 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
 - *Carabodes (Klapperiches) dudichi* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Carabodes (Klapperiches) ecuadoriensis* P. Balogh, 1988 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Carabodes (Klapperiches) excellens* Balogh y Mahunka, 1969 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Carabodes (Klapperiches) globiger* Balogh, 1970 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Carabodes (Klapperiches) granosus* Sellnick, 1959 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Polinesia.
 - *Carabodes (Klapperiches) higginsii* Reeves, 1988 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Carabodes (Klapperiches) ikeharai* Aoki, 1988 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Carabodes (Klapperiches) jamaicaensis* Woolley, 1967 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Carabodes (Klapperiches) kusseri* J. y P. Balogh, 1983 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia e India (Bengala Occidental).
 - *Carabodes (Klapperiches) littoristicus* (Reeves, 1997) (K.)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Carabodes (Klapperiches) luteoauratus* Hammer, 1972 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
 - *Carabodes (Klapperiches) manganoi* Bernini, 1976 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Carabodes (Klapperiches) manifera* Hammer, 1977 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Carabodes (Klapperiches) microtrichus* Mahunka, 1984 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Carabodes (Klapperiches) mikhaetandreorum* Ermilov y Anichkin, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Carabodes (Klapperiches) minusculus* Berlese, 1923 (C.)

- (=*Carabodes castrii* Mahunka, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental meridional) y “U.S.A.”
- *Carabodes (Klapperiches) nigrosetosus* (Mahunka, 1979) (K.)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Carabodes (Klapperiches) ornatissimus* Hammer, 1966 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Carabodes (Klapperiches) paravenezolanus* Ermilov, 2016 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Carabodes (Klapperiches) penicillatus* Berlese, 1916 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
 - *Carabodes (Klapperiches) penicillus* (Mahunka, 1998) (K.)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Carabodes (Klapperiches) pocsi* Mahunka, 1983 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Carabodes (Klapperiches) poggii* Bernini, 1976 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Carabodes (Klapperiches) problematicus* Mahunka, 1985 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Carabodes (Klapperiches) pulcher* Bernini, 1976 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Carabodes (Klapperiches) pulcher pulcher* Bernini, 1976
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Carabodes (Klapperiches) pulcher occidentalis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (C.)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Carabodes (Klapperiches) purpurarius* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (C.)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Carabodes (Klapperiches) radiatus* Berlese, 1916 (C.)
(=*Carabodes dendroetus* Reeves, 1987)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
 - *Carabodes (Klapperiches) samoensis* J. y P. Balogh, 1986 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) y Vietnam.
 - *Carabodes (Klapperiches) schatzi* Bernini, 1976 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
 - *Carabodes (Klapperiches) semengok* (Mahunka, 1996) (*Gymnobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Carabodes (Klapperiches) similis* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Carabodes (Klapperiches) similis similis* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989
(?*Carabodes egregius* Djaparidze, 1990)
(?*Carabodes paraspinosus* Kulijev, 1968 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea e Irán.
 - *Carabodes (Klapperiches) similis translamellatus* Pérez-Íñigo jr., 1990 (C. t.)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Carabodes (Klapperiches) strinovichi* Balogh y Mahunka, 1978 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Australia y Vietnam.
 - *Carabodes (Klapperiches) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1976 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Carabodes (Klapperiches) variabilis* Hammer, 1966 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Carabodes (Klapperiches) venezolanus* Subías y Arillo, 2004 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Carabodes (Klapperiches) willmanni* Bernini, 1975 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Irán y Neártica septentrional).

***Carabodes (Phyllocarabodes)* Balogh y Mahunka, 1969 (5 spp.)**

(=*Antillobodes* Mahunka, 1985)

(=*Pentabodes* P. Balogh, 1984)

ESPECIE TIPO: *Phyllocarabodes octogonalis* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.

- *Carabodes (Phyllocarabodes) calcaratus* (Mahunka, 1985) (*Antillobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) inopinatus* (Mahunka, 1985) (*Antillobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y Vietnam.
- *Carabodes (Phyllocarabodes) insolitus* (P. Balogh, 1984) (*Pentabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia e India (Bengala Occidental).
- *Carabodes (Phyllocarabodes) octogonalis* (Balogh y Mahunka, 1969) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Carabodes (Phyllocarabodes) schatzi* Subías, 2010
(=*Phyllocarabodes ornatus* P. Balogh, 1986, "nom. praec." por Štorkán, 1925)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Vietnam.

Cavaecarabodes Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cavaecarabodes pulchritude* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Cavaecarabodes anouchkae* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Cavaecarabodes hauseri* (Mahunka, 1989) (*Congocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Cavaecarabodes orientalis* (Mahunka, 1987) (*Congocepheus*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Cavaecarabodes polilloensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Cavaecarabodes pulchritude* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Gabón.

Cavernocarabodes Mahunka, 1974 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cavernocarabodes perreti* Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Cavernocarabodes perreti* Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Camerún.
- *Cavernocarabodes trigonosternum* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Ceylobodes J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Trichocarabodes capillatus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Ceylobodes capillatus* (Balogh, 1970) (*Trichocarabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Ceylobodes hettigei* (Balogh, 1970) (*Trichocarabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Chistyakovella Ermilov, Aoki y Anichkin, 2013 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Chistyakovella insolita* Ermilov, Aoki y Anichkin, 2013

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Chistyakovella insolita* Ermilov, Aoki y Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Congocepheus Balogh, 1958 (12 spp.)

ESPECIE TIPO: *Congocepheus heterotrichus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Congocepheus (Congocepheus) Balogh, 1958 (9 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Congocepheus (C.) ektactesi* Fernández, Theron, Rollard y Tiedt, 2013
DISTRIBUCIÓN: Gabón.
- *Congocepheus (C.) gabonensis* Fernández, Theron, Rollard y Tiedt, 2013
DISTRIBUCIÓN: Gabón.
- *Congocepheus (C.) germani* Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Congocepheus (C.) heterotrichus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Ghana).
- *Congocepheus (C.) involutus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Congocepheus (C.) kardiae* Fernández, Theron y Leiva, 2016
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Congocepheus (C.) kayoveae* Fernández, Theron y Leiva, 2016
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Congocepheus (C.) rwandensis* Fernández, Theron y Leiva, 2016
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.
- *Congocepheus (C.) taurus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.

Congocepheus (Fernandezbodes) Subías, 2018 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Congocepheus ornatus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Congocephus (Fernandezbodes) latilamellatus* Mahunka, 1984 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Congocephus (Fernandezbodes) ornatus* Mahunka, 1983 (C.)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Congocephus (Fernandezbodes) velatus* Mahunka, 1986 (C.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Cubabodes Balogh y Mahunka, 1974 (5 spp.)ESPECIE TIPO: *Cubabodes hexagonalis* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cubabodes confertus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cubabodes hexagonalis* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cubabodes radiatus* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Cubabodes spathulatus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cubabodes verrucatus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

Gibbicepheus Balogh, 1958 (23 spp.)ESPECIE TIPO: *Gibbicepheus elevatus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

Gibbicepheus (Gibbicepheus) Balogh, 1958 (19 spp.)(=*Diplobodes* Aoki, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Gibbicepheus (G.) africanus* (Mahunka, 1987) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Gibbicepheus (G.) aokii* (Mahunka, 1989) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Gibbicepheus (G.) austroamericanus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Gibbicepheus (G.) baccanensis* Jeleva y Vű, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Gibbicepheus (G.) chinensis* Wen, 1992
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gibbicepheus (G.) elevatus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Gibbicepheus (G.) ensifer* Balogh, 1958 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Gibbicepheus (G.) floridus* (Mahunka, 1978) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Gibbicepheus (G.) frondosus* (Aoki, 1959) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Australiana: Islas del Pacífico) y Este de Paleártica oriental.
- *Gibbicepheus (G.) kanekoi* (Aoki, 1958) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón (frecuente) y Oriental (Tailandia y China suroriental).
- *Gibbicepheus (G.) karubei* (Aoki, 2002) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Gibbicepheus (G.) micheli* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles, Japón y Filipinas.
- *Gibbicepheus (G.) novus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
- *Gibbicepheus (G.) rugosus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles y Filipinas.
- *Gibbicepheus (G.) sisiri* Sanyal, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Gibbicepheus (G.) superbus* (Mahunka, 1978) (*Diplobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Gibbicepheus (G.) tuberculatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Península Malaya.
- *Gibbicepheus (G.) waterhousei* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Gibbicepheus (Gibbibodes) Mahunka, 1986 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Gibbibodes similis* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Gibbicepheus (Gibbibodes) similis* (Mahunka, 1986) (*Gibbibodes*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

Gibbicepheus (Kalloia) Mahunka, 1985 (3 spp.)

(=*Mauribodes* J. y P. Balogh, 1992)

ESPECIE TIPO: *Kalloia simpliseta* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Etiópica.

- *Gibbicepheus (Kalloia) foveolatus* (Mahunka, 1978) (*Machadocephus*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Gibbicepheus (Kalloia) mahunkai* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1989) (*K.*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Gibbicepheus (Kalloia) simpliseta* (Mahunka, 1985) (*K.*)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Gibbicepheus (Neocarabodes) Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Neocarabodes seipilosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental).

- *Gibbicepheus (Neocarabodes) seipilosus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*N.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá) y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).

Gymnobodes Balogh, 1965 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes fraterculus* Balogh, 1963

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

- *Gymnobodes fraterculus* (Balogh, 1963) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: África centrooccidental.

- *Gymnobodes minimus* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Gymnobodes subnudus* (Balogh, 1963) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Congo.

Hardybodes Balogh, 1970 (4 spp.)

(=*Carabodella* Mahunka, 1986)

ESPECIE TIPO: *Hardybodes mirabilis* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

- *Hardybodes calcaratus* (Mahunka, 1986) (*Carabodella*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Hardybodes flabellatus* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Hardybodes mirabilis* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Borneo).

- *Hardybodes penicillatus* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Machadocephus Balogh, 1958 (10 spp.)

ESPECIE TIPO: *Machadocephus excavatus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Machadocephus (Machadocephus) Balogh, 1958 (8 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Machadocephus (M.) excavatus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Méjico.

- *Machadocephus (M.) filiferus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Machadocephus (M.) leoneae* Fernández, Theron, Rollard y Leiva, 2014

DISTRIBUCIÓN: Gabón.

- *Machadocephus (M.) pauliani* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Machadocephus (M.) phyllophorus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Machadocephus (M.) rachii* Fernández, Theron, Rollard y Leiva, 2014

DISTRIBUCIÓN: Gabón.

- *Machadocephus (M.) taprobanicus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Machadocephus (M.) tuberculatus* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Machadocephus (Sagittabodes) J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

(=***Zimbabweae*** Fernández, Theron y Leiva, 2016)

ESPECIE TIPO: *Machadocephus sagitta* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Machadocephus (Sagittabodes) pluosiae* (Fernández, Theron y Leiva, 2016) (***Zimbabweae***)

DISTRIBUCIÓN: Zimbabwe [Rodesia].

- *Machadocephus (Sagittabodes) sagitta* Balogh y Mahunka, 1966 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Malgasodes Mahunka, 2000 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Malgasodes curvisetus* Mahunka, 2000

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Malgasodes curvisetus* Mahunka, 2000

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Malgasodes hungarorum* Mahunka, 2000

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Meriocephus Aoki, 1973 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Meriocephus peregrinus* Aoki, 1973

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Meriocephus peregrinus* Aoki, 1973

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Odontocephus Berlese, 1913 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tegeocranus elongatus* Michael, 1879

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australianooriental.

Odontocephus (Odontocephus) Berlese, 1913 (14 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

- *Odontocephus (O.) bandae* Subías y Arillo, 2001

DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

- *Odontocephus (O.) beijingensis* Wang, 1997

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

- *Odontocephus (O.) curtiseta* Ruiz, Subías y Kahwash, 1989

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Odontocephus (O.) elongatus* (Michael, 1879) (*Tegeocranus*)

(=*Hermannia oblonga* Karpelles, 1893)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Sureste de U.S.A.).

- *Odontocephus (O.) espatulatus* Saloña e Iturrondobeitia, 1989

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Odontocephus (O.) hungaricus* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Odontocephus (O.) immarginatus* Jacot, 1934

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Odontocephus (O.) morikawai* Fujikawa, 2012

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Odontocephus (O.) oblongus* (Banks, 1895) (*Carabodes*) "sp. inq."

("non" *Hermannia oblonga* Karpelles, 1893, =*Odontocephus elongatus*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

- *Odontocephus (O.) oglasae* Baratti y Bernini, 1994

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Odontocephus (O.) pyramidalis* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Odontocephus (O.) rumblesatus* Reeves, 1995

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. y norte de Neotropical.

- *Odontocephus (O.) villosus* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Odontocephus (O.) zaballosi* Subías y Arillo, 2001

DISTRIBUCIÓN: Marruecos.

Odontocephus (Indotocephus) Mondal y Kundu, 1999 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Indotocephus himalayensis* Mondal y Kundu, 1999

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Odontocephus (Indotocephus) himalayensis* (Mondal y Kundu, 1999) (*I.*)

DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).

Pasocephus Aoki, 1976 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pasocephus triarcuatus* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

Pasocephus (*Pasocephus*) Aoki, 1976 (4 spp.)

(=*Opisthocephus* Aoki, 1976)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Pasocephus* (*P.*) *bako* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Pasocephus* (*P.*) *eremaeozetoides* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Pasocephus* (*P.*) *kirai* (Aoki, 1976) (*Opisthocephus*)

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Pasocephus* (*P.*) *triarcuatus* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Pasocephus (*Guineobodes*) Mahunka, 1987 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Machadocephus papuanus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Pasocephus* (*Guineobodes*) *papuanus* (Balogh, 1970) (*Machadocephus*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Pseudocarabodes Mahunka, 1991 (3 spp.)

(=*Bakobodes* Mahunka, 1996)

(=*Yemenobodes* Mahunka, 2000)

ESPECIE TIPO: *Pseudocarabodes xenus* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Pseudocarabodes improvisus* (Mahunka, 2000) (*Yemenobodes*)

DISTRIBUCIÓN: Yemen.

- *Pseudocarabodes orangutan* (Mahunka, 1996) (*Bakobodes*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Pseudocarabodes xenus* Mahunka, 1991

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Rugocephus Mahunka, 2009 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rugocephus formosus* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

- *Rugocephus costaricensis* Fernández, Theron, Leiva y Tiedt, 2017

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Rugocephus formosus* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Rugocephus joffrevillei* Fernández, Theron y Rollard, 2013

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Singabodes Mahunka, 1998 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Singabodes rarus* Mahunka, 1998

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Singabodes rarus* Mahunka, 1998

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

Spathulocephus Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Spathulocephus amazonicus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Spathulocephus amazonicus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Spathulocephus plumiger* Balogh y Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Tansocephus Mahunka, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tansocephus serratus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Tansocephus serratus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Tectocarabodes Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tectocarabodes monstruosus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Tectocarabodes monstruosus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Trichocarabodes Balogh, 1961 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes celisi* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Trichocarabodes celisi* (Balogh, 1958) (*Carabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Trichocarabodes costulatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Tuberocephus Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Machadocephus longus* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Tuberocephus (Tuberocephus) Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Tuberocephus (T.) longus* (Balogh, 1964) (*Machadocephus*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Tuberocephus (Mangabebodes) Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Mangabebodeskymatismosi* Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Tuberocephus (Mangabebodes) kymatismosi* (Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Yoshiobodes Balogh y Mahunka, 1986 (13 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carabodes irmayi* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

Yoshiobodes (Yoshiobodes) Balogh y Mahunka, 1986 (9 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Holártica meridional).

- *Yoshiobodes (Y.) arcuatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Yoshiobodes (Y.) camerunensis* Fernández, Theron, Leiva y Tiedt, 2017
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

- *Yoshiobodes (Y.) humidus* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Yoshiobodes (Y.) irmayi* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Carabodes*)
(=*Yoshiobodes aokii* Mahunka, 1987)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente), U.S.A. meridional y Oriental.

- *Yoshiobodes (Y.) nakatamarii* (Aoki, 1973) (*Austrocarabodes*)
(?= *Carabodes humeratus* Berlese, 1913 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Este de Paleártica oriental.

- *Yoshiobodes (Y.) neotrichorostralis* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Yoshiobodes (Y.) papuanus* (Balogh, 1970) (*Austrocarabodes humeratus p.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Yoshiobodes (Y.) plumosulus* (Balogh, 1970) (*Austrocarabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Yoshiobodes (Y.) plumosus* (Balogh, 1970) (*Austrocarabodes*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Yoshiobodes (Berndobodes) Mahunka, 1986 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Berndobodes spiculifer* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Yoshiobodes (Berndobodes) hauseri* (Mahunka, 1996) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Yoshiobodes (Berndobodes) spiculifer* (Mahunka, 1986) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Yoshiobodes (Dongnaibodes) Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Yoshiobodes (Dongnaibodes) hexasetosus* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Yoshiobodes (Dongnaibodes) biconcavus* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Yoshiobodes (Dongnaibodes) hexasetosus* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2014

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Nippobodidae Aoki, 1959 (2 gen. y 17 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.

Leobodes Aoki, 1965 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Leobodes mirabilis* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Leobodes anulatus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Leobodes carinatus* Chen y Wang, 2007
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Leobodes lijiangensis* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Nepal).
- *Leobodes mirabilis* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Leobodes praeconcaucus* Chen y Wang, 2007
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Leobodes yinae* Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Nippobodes Aoki, 1959 (11 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nippobodes insolitus* Aoki, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Nippobodes brevisetiger* Aoki, 1981
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nippobodes chejuensis* Choi, 1996
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Nippobodes flagellifer* Chen y Wang, 2007
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nippobodes insolitus* Aoki, 1959
DISTRIBUCIÓN: Japón y Noreste de Oriental.
- *Nippobodes latus* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Nippobodes monstruosus* (Jeleva y Vü, 1987) (*Leobodes*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Nippobodes peniculatus* Chen y Wang, 2007
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nippobodes pseudobrevisetiger* Chen y Wang, 2007
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Nippobodes tamlaensis* Choi, 1996
DISTRIBUCIÓN: Corea y China suroriental.
- *Nippobodes tokaraensis* Aoki, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Nippobodes yuwanensis* Aoki, 1984 (*N. brevisetiger* y.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tectocephoidea Grandjean, 1954

Tectocephidae Grandjean, 1954 (2 gen., 16 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Tectocephus Berlese, 1896 (13 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Tegeocranus velatus* Michael, 1880

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Tectocephus acutus* Nakamura, Y.-N. Nakamura y Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocephus alatus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Tectocephus americanus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Tectocephus cervus* Balogh y Mahunka, 1969 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Tectocephus iheyaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocephus knuellei* Vaněk, 1960
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Tectocephus kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Tectocephus minor* Berlese, 1903
(=*Tectocephus bisignatus* Moritz, 1968)
(=*Tectocephus cuspidentatus* Knülle, 1954)
(=*Tectocephus velatus novus* Hammer, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Irán y Japón), U.S.A. (Virginia), Oriental, Neotropical (Ecuador e I. Galápagos) y Nueva Zelanda.
- *Tectocephus minutus* Kardar y Mattu, 1999
DISTRIBUCIÓN: India (Himachal Pradesh).
- *Tectocephus punctulatus* Djaparidze, 1985
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Rusia asiática).
- *Tectocephus shirakamiensis* Fujikawa, 2001
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- Tectocephus velatus* (Michael, 1880) (*Tegeocranus*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
 - *Tectocephus velatus velatus* (Michael, 1880)
(=*Tectocephus coniunctus* Knülle, 1954)
(=*Tectocephus spinosus* Mahunka, 1984)
(=*Tectocephus tenuis* Knülle, 1954)
(=*Tectocephus titanius* Ohkubo, 1982)
(=*Tectocephus translamellaris* Kardar, 1974)
(=*Tectocephus translamellatus* Knülle, 1954)
(=*Tectocephus velatus granulatus* Mihelčič, 1957)
(=*Tectocephus vicarius* Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
 - *Tectocephus velatus clavatus* Mahunka, 1983 (*T. c.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e India (Tripura).
 - *Tectocephus velatus elegans* Ohkubo, 1981 (*T. e.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Méjico y Vietnam.
 - *Tectocephus velatus sarekensis* Trägårdh, 1910
(=*Tectocephus concurvatus* Knülle, 1954)
(=*Tectocephus depressus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989)
(=*Tectocephus latilamellaris* Kardar, 1974)
(=*Tectocephus minor expansus* Berlese, 1914)
(=*Tectocephus velatus angulatus* Mihelčič, 1957)
(=*Tectocephus velatus ibericus* Mihelčič, 1957)
(=*Tectocephus velatus inflexus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (frecuente).
 - *Tectocephus velatus universitatum* Abd-el-Hamid, 1965
DISTRIBUCIÓN: Egipto.

Tegeozetes Berlese, 1913 (3 spp. y 1 ssp.)ESPECIE TIPO: *Tegeozetes tunicatus* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Tegeozetes angolensis* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Tegeozetes miyajima* Fujikawa, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Tegeozetes tunicatus Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional (Hungría y Japón).

- *Tegeozetes tunicatus tunicatus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Europa (Hungría).
- *Tegeozetes tunicatus breviclava* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.

Tegeocranellidae P. Balogh, 1987 (1 gen. y 18 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Tegeocranellus Berlese, 1913 (18 spp.)ESPECIE TIPO: *Tegeocranus laevis* Berlese, 1905

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Tegeocranellus alas* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Tegeocranellus barbarae* Behan-Pelletier, 1997
DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- *Tegeocranellus bolivianus* Balogh y Mahunka, 1969

- DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Paraguay).
 - *Tegeocranellus bosniae* (Frank, 1961) (*Carabodes*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Bosnia-Herzegovina.
 - *Tegeocranellus concavus* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Tegeocranellus convexus* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Tegeocranellus hungarorum* Mahunka, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Tegeocranellus kethleyi* Behan-Pelletier, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
 - *Tegeocranellus knysnaensis* Kok, 1968
 (= *Tegeocranellus africanus* Mahunka, 1985)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Tegeocranellus laevis* (Berlese, 1905) (*Tegeocranus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea, Oriental: Filipinas y Ceilán [Sri Lanka], y Melanesia (I. Fiji).
 - *Tegeocranellus martinezi* Ermilov y Anichkin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Tegeocranellus mediolamellatus* Behan-Pelletier, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
 - *Tegeocranellus mississippii* Behan-Pelletier, 1997
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional
 - *Tegeocranellus muscorum* Behan-Pelletier, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Neártica y U.S.A. (Florida).
 - *Tegeocranellus nubatamae* Fujikawa, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Tegeocranellus opcus* Tseng, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Tegeocranellus punctatus* Saha, Sanyal y Chakraborty, 2004
 DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
 - *Tegeocranellus sacchareus* Kok, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Charassobatoidea Grandjean, 1958

Microtegeidae Balogh, 1972 (2 gen. y 33 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

Microtegeus Berlese, 1916 (31 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tegeocranus (Microtegeus) undulatus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Microtegeus alvarezi* Pérez-Íñigo, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Microtegeus asiaticus* Aoki y Yamamoto, 2000
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Microtegeus borhidii* Balogh y Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Oriental (Filipinas y Vietnam) y Japón.
- *Microtegeus cardosensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Microtegeus cervus* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtegeus ceylonicus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Microtegeus cornutus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] y Vietnam).
- *Microtegeus curvisetosus* Wen, 1997
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Microtegeus foveolatus* Balogh, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Guinea) y Oriental.
- *Microtegeus globifer* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Brasil) e India (Bengala Occidental).
- *Microtegeus granulatus* Wang y Shen, 2001
 DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Microtegeus hauseri* Mahunka, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Microtegeus hirashimai* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Microtegeus humeratus* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Filipinas.
- *Microtegeus khaustovi* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Microtegeus labyrinthicus* Balogh, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Microtegeus lucianus* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Microtegeus mexicanus* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Microtegeus modestus* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Microtegeus papillosus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtegeus paracervus* Mahunka, 1997
(=*Microtegeus cervus* Mahunka, 1996, "nom. praeoc." por Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Microtegeus quadrisetosus* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Ceilán [Sri Lanka] y Etiópica (Congo).
- *Microtegeus quadristriatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paraguay y Vietnam.
- *Microtegeus reticulatus* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y "Este de Paleártica oriental".
- *Microtegeus rimosus* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Microtegeus rugosus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Microtegeus sabahnus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo e India: Bengala Occidental).
- *Microtegeus similis* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Microtegeus undulatus* (Berlese, 1916) (*Tegeocranus* (M.))
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Somalia y Tanzania) y Paleártica meridional (Cáucaso).
- *Microtegeus variabilis* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microtegeus zigzag* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Suctotegeus Mahunka, 1987 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Suctotegeus tumescitus* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Suctotegeus philippinensis* Corpuz-Raros, 1991
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Suctotegeus tumescitus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Charassobatidae Grandjean, 1958 (1 gen. y 7 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Charassobates Grandjean, 1929 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Charassobates cavernosus* Grandjean, 1929

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Charassobates baudii* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Charassobates cavernosus* Grandjean, 1929
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Charassobates incipatus* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Charassobates minimus* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
- *Charassobates ornatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Charassobates simplex* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).
- *Charassobates tuberosus* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Nosybeidae Mahunka, 1993 (2 gen. y 7 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical.

Lamellocephus Balogh, 1961 (2 spp.)

(=*Nosybea* Mahunka, 1993)

(=*Tessacarus* Grandjean, 1962)

ESPECIE TIPO: *Tectocephus personatus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.

- *Lamellocephus genavensis* (Mahunka, 1993) (*Nosybea*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Lamellocephus personatus* (Berlese, 1910) (*Tectocephus*)

(=*Lamellocephus ambitus* Kulijev, 1966)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Topalia Balogh y Csiszár, 1963 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Topalia problematica* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral.

- *Topalia africana* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Topalia clavata* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Topalia granulata* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Topalia problematica* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Topalia velata* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Hydrozetoidea Grandjean, 1954

Hydrozetidae Grandjean, 1954 (1 gen., 33 spp. y 3 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hydrozetes Berlese, 1902 (33 spp. y 3 sspp.)

(=*Argentinobates* Fernández, 1984)

(=*Heloribates* Grandjean, 1966)

(=*Ojaithrus* Habeeb, 1982)

ESPECIE TIPO: *Notaspis lacustris* Michael, 1882

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Hydrozetes amudariensis* Koshchanova, 1984

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Hydrozetes californiensis* Habeeb, 1974

(=*Ojaithrus nymphoides* Habeeb, 1982)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).

- *Hydrozetes capensis* Engelbrecht, 1974

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Corea.

- *Hydrozetes confervae* (Schrank, 1781) (*Acarus*)

(=*Hydrozetes terrestris* Berlese, 1910)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Hydrozetes dimorphus Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Brasil).

- *Hydrozetes dimorphus dimorphus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Hydrozetes dimorphus virginalis* Fernández y Travé, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Brasil).

- *Hydrozetes edentulus* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

- *Hydrozetes eichhornia* (Soliman, Hussein y Ramadan, 1991) (*Linobia*) "sp. inq." (**juvenil**)

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Hydrozetes escobari* Fernández y Travé, 1984

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Hydrozetes gueyae* Mahunka, 1990

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Senegal y Etiopía).

- *Hydrozetes harundinosus* Kuriki, 2010

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Hydrozetes indicator* Habeeb, 1974

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).

- *Hydrozetes inquirenda* Subías, 2010 “sp. inq.” (juvenil)
(=*Linobia nilotica* Soliman, Hussein y Ramadan, 1991, “nom. praeoc.” por Trägårdh, 1905)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes japonicus* Kuriki, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Hydrozetes laccosis* Woolley, 1969
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- Hydrozetes lacustris* (Michael, 1882) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Siberia centrooccidental, Japón y Canadá).
 - *Hydrozetes lacustris lacustris* (Michael, 1882)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (Eurosiberiana y Canadá).
 - *Hydrozetes lacustris octosetosus* Willmann, 1931
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Paleártica occidental).
 - *Hydrozetes lacustris parisiensis* Grandjean, 1948 (*H. p.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Hydrozetes lemnae* (Coggi, 1897) (*Notaspis*)
(=*Hydrozetes mollicoma* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental: Irán, Neártica: U.S.A.; Nueva York, Etiópica: Yemen, Oriental: Bali, Australiana: frecuente, y Neotropical: frecuente).
- *Hydrozetes longisetosus* S. y A. Seniczak, 2009
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Hydrozetes megacephalum* (Berlese, 1901) (*Dameosoma*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Hydrozetes mindanaensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Hydrozetes niloticus* (Trägårdh, 1905) (*Notaspis*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Sudán.
- *Hydrozetes paulista* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hydrozetes petrunkevitchi* Newel, 1945
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Hydrozetes platensis* Berlese, 1902 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Hydrozetes replacemtica* (Soliman, Hussein y Ramadan, 1991) (*Linobia*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes ringueleti* Fernández, 1984 (*H. (Argentinobates)*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Pequeñas Antillas).
- *Hydrozetes sphagnicolus* Ermilov, Hugo-Coetsee y Theron, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Hydrozetes tamarae* Tolstikov, 1996 (*H. (Heloribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Siberia.
- *Hydrozetes thienemanni* Strenzke, 1943
(=*Hydrozetes incisus* Grandjean, 1948)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (excepto Sur), Irán y Alaska.
- *Hydrozetes tobaicus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Hydrozetes tridactylus* Abd-el-Hamid, 1964
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Hydrozetes uberabensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1996
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hydrozetes vicarius* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Hydrozetes videor* Habeeb, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

Ameronothroidea Vitzthum, 1943

Ameronothridae Vitzthum, 1943 (8 gen., 39 spp. y 8 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Alaskozetes Hammer, 1955 (3 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Alaskozetes coriaceus* Hammer, 1955

DISTRIBUCIÓN: Anfi polar.

Alaskozetes antarcticus (Michael, 1903) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y Nueva Zelanda.

- *Alaskozetes antarcticus antarcticus* (Michael, 1903)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente) y Nueva Zelanda.

- *Alaskozetes antarcticus grandjeani* (Dalenius, 1958) (*Halozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Alaskozetes antarcticus intermedius* Wallwork, 1967
DISTRIBUCIÓN: Antártica, subantártica y Neotropical austral.
- *Alaskozetes bouvetoyaensis* Pletzen y Kok, 1971
DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Alaskozetes coriaceus* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Alaska y Nueva Zelanda.

Ameronothrus Berlese, 1896 (13 spp.)

(=*Hygorribates* Jacot, 1934)

ESPECIE TIPO: *Eremaeus lineatus* Thorell, 1871

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

- *Ameronothrus bilineatus* (Michael, 1888) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa y Sudáfrica.
- *Ameronothrus dubinini* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Erosiberiana (Norte de Europa y Oeste de Siberia).
- *Ameronothrus harioti* (Michael, 1891) (*Scutovertex*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Ameronothrus lapponicus* Dalenius, 1963
DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
- *Ameronothrus lineatus* (Thorell, 1871) (*Eremaeus*)
(=*Scutovertex corrugatus* Michael, 1888)
(=*Scutovertex occidentalis* Hull, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Boreal y ¿Méjico?
- *Ameronothrus maculatus* (Michael, 1882) (*Scutovertex*)
(=*Scutovertex maculatus groenlandicus* Trägårdh, 1904)
(=*Scutovertex pseudomaculatus* Hull, 1914)
(=*Scutovertex pseudomaculatus insularis* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (excepto Paleártica oriental) y Pequeñas Antillas.
- *Ameronothrus marinus* (Banks, 1896) (*Nothrus*)
(?= *Ameronothrus fuciculum* Brady, 1875 “sp. inq.”)
(=*Scutovertex spoofi* Oudemans, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (excepto Paleártica oriental).
- *Ameronothrus nidicola* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Erosiberiana.
- *Ameronothrus nigrofemoratus* (L. Koch, 1879) (*Nothrus*)
(=*Ameronothrus lineatus brevipes* Willmann, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (excepto Paleártica oriental).
- *Ameronothrus oblongus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).
- *Ameronothrus schneideri* (Oudemans, 1903) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Ameronothrus schubarti* Weigmann y Schulte, 1975
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Ameronothrus schusteri* Schubart, 1970
DISTRIBUCIÓN: Croacia.

Aquanothrus Engelbrecht, 1975 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Aquanothrus montanus* Engelbrecht, 1975

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Aquanothrus montanus* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: **Etiópica** (Sudáfrica y **Botsuana**).

Capillibates Hammer, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Capillibates stagaardi* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Capillibates stagaardi* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Chudalupia Wallwork, 1981 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Chudalupia meridionalis* Wallwork, 1981

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Chudalupia meridionalis* Wallwork, 1981
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Halozetes Berlese, 1916 (16 spp. y 5 sspp.)

(=*Anarea* Dalenius, 1958)

(=*Pertorgunia* Dalenius, 1958)

ESPECIE TIPO: *Notaspis marina* Lohmann, 1907

DISTRIBUCIÓN: Austral.

- *Halozetes bathamae* Luxton, 1984

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Halozetes belgicae (Michael, 1903) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Halozetes belgicae belgicae* (Michael, 1903)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).

- *Halozetes belgicae brevipilis* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).

- *Halozetes belgicae longisetae* Wallwork, 1967

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Halozetes belgicae mickii* Coetzee, 2000

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Príncipe Eduardo).

- *Halozetes capensis* Coetzee y Marshall, 2003

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Halozetes crozetensis* (Richters, 1908) (*Scutovertex*)

(=*Pertorgunia colobanthi* Dalenius, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica (frecuente), y Neotropical austral.

- *Halozetes edwardensis* Pletzen y Kok, 1971

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Príncipe Eduardo).

- *Halozetes fulvus* Engelbrecht, 1975

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Príncipe Eduardo).

- *Halozetes impeditus* Niedbala, 1986

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur).

- *Halozetes intermedius* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Halozetes littoralis* Wallwork, 1970

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).

- *Halozetes macquariensis* (Dalenius, 1958) (*Pertorgunia*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Halozetes marinus (Lohmann, 1907) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Austral (Antártica, subantártica, Neotropical y Nueva Zelanda).

- *Halozetes marinus marinus* (Lohmann, 1907)

(=*Anarea macquariensis* Dalenius, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica (frecuente) y Nueva Zelanda.

- *Halozetes marinus devilliersi* Engelbrecht, 1974

DISTRIBUCIÓN: Antártica y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Halozetes marinus minor* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Halozetes marionensis* Engelbrecht, 1974

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Halozetes necrophagus* Wallwork, 1967

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur).

- *Halozetes otagoensis* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Halozetes plumosus* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).

- *Halozetes scotiae* (Trouessart, 1912) (*Notaspis*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Orcadas del Sur (I. Orkney).

Podacarus Grandjean, 1955 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Podacarus auberti* Grandjean, 1955

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Podacarus auberti Grandjean, 1955

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Podacarus auberti auberti* Grandjean, 1955

DISTRIBUCIÓN: Antártica (frecuente).

- *Podacarus auberti occidentalis* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Pseudantarctica Balogh, 1970 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pseudantarctica tropica* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Austral.

- *Pseudantarctica aquatica* Ermilov y Pešić, 2011

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Pseudantarctica georgiae* (Wallwork, 1970) (*Antarctica*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Pseudantarctica tropica* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Selenoribatidae Schuster, 1963 (7 gen. y 27 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

Arotrobates Luxton, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Arotrobates lanceolatus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.

- *Arotrobates granulatus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong) y Japón.

- *Arotrobates lanceolatus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Carinozetes Pfungstl y Schuster, 2012 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Carinozetes trifoveolatus* Pfungstl y Schuster, 2012

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Carinozetes bermudensis* Pfungstl y Schuster, 2012

DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

- *Carinozetes mangrovi* Pfungstl, Lienhard y Jagersbacher-Baumann, 2014

DISTRIBUCIÓN: Antillas.

- *Carinozetes trifoveolatus* Pfungstl y Schuster, 2012

DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

Psednobates Luxton, 1992 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Psednobates unguis* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Psednobates unguis* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Schusteria Grandjean, 1968 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Schusteria littorea* Grandjean, 1968

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.

- *Schusteria littorea* Grandjean, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil e I. Galápagos).

- *Schusteria marina* Pfungstl y Lienhard, 2017

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Schusteria nagisa* Karasawa y Aoki, 2005

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Schusteria saxea* Karasawa y Aoki, 2005

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Selenoribates Strenzke, 1961 (10 spp.)

ESPECIE TIPO: *Selenoribates foveiventris* Strenzke, 1961

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Oriental) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Selenoribates arotroventer* Pfungstl, 2015

DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.

- *Selenoribates asmodaeus* Pfungstl, 2015

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Selenoribates divergens* Pfungstl, 2015

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Selenoribates elegans* Pfungstl, 2013

DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

- *Selenoribates foveiventris* Strenzke, 1961

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Selenoribates ghardaqensis* Abd-el-Hamid, 1973

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Selenoribates mediterraneus* Grandjean, 1966

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Selenoribates niccus* Pfungstl, 2015

DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.

- *Selenoribates quasimodo* Pfungstl, 2013

DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

- *Selenoribates satanicus* Pfungstl, 2013

DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

Thalassozetes Schuster, 1963 (6 spp.)

(=***Rhizophobates*** Karasawa y Aoki, 2005)

ESPECIE TIPO: *Thalassozetes riparius* Schuster, 1963

DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y subtropical.

- *Thalassozetes barbara* Pflingstl, 2013

DISTRIBUCIÓN: Antillas.

- *Thalassozetes melanomerus* (Marshall y Pugh, 2000) (*Schusteria*)

DISTRIBUCIÓN: África oriental.

- *Thalassozetes riparius* Schuster, 1963

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Thalassozetes shimojanai* (Karasawa y Aoki, 2005) (*Rhizophobates*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Thalassozetes tenuisetosus* Bayartogtokh y Chatterjee, 2010

DISTRIBUCIÓN: India (Goa).

- *Thalassozetes ugraseni* (Marshall y Pugh, 2000) (*Schusteria*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Thasecazetes Pflingstl, Baumann, Lienhard y Schatz, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Thasecazetes falcidactylus* Pflingstl, Baumann, Lienhard y Schatz, 2017

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Thasecazetes falcidactylus* Pflingstl, Baumann, Lienhard y Schatz, 2017

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Fortuyniidae Hammen, 1963 (4 gen., 24 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Alismobates Luxton, 1992 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Alismobates reticulatus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

- *Alismobates galapagoensis* Pflingstl y Schatz, 2017

DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.

- *Alismobates inexpectatus* Pflingstl y Schuster, 2012

DISTRIBUCIÓN: Antillas.

- *Alismobates keniaensis* Pflingstl, 2016

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

- *Alismobates pseudoreticulatus* Pflingstl, 2015

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Alismobates reticulatus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong) y Japón.

- *Alismobates rotundus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Circellobates Luxton, 1992 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Circellobates venustus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Circellobates venustus* Luxton, 1992

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

Fortuynia Hammen, 1960 (15 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Fortuynia marina* Hammen, 1960

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Fortuynia arabica* Bayartogtokh, Chatterjee e Ingole, 2009

DISTRIBUCIÓN: India (Goa).

- *Fortuynia atlantica* Krisper y Schuster, 2008

DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.

- *Fortuynia dimorpha* Pflingstl, 2015

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Fortuynia elamellata Luxton, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda, Sudáfrica y Japón.

- *Fortuynia elamellata elamellata* Luxton, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Fortuynia elamellata micromorpha* Marshall y Pugh, 2002

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Fortuynia elamellata shibai* Aoki, 1974

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Fortuynia hawaiiensis* Pflugstl y Jagersbacher-Baumann, 2016
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Fortuynia inhambanensis* Marshall y Pugh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Mozambique.
- *Fortuynia longiseta* Pflugstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.
- *Fortuynia maculata* Luxton, 1986
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Fortuynia maledivensis* Pflugstl, 2015
DISTRIBUCIÓN: I. Maldivas.
- *Fortuynia marina* Hammen, 1960
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Fortuynia rotunda* Marshall y Pugh, 2002
DISTRIBUCIÓN: Mozambique y Japón.
- *Fortuynia sinensis* Luxton, 1992
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Fortuynia smiti* Ermilov, Tolstikov, Mary y Schatz, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia y Península Malaya.
- *Fortuynia taiwanica* Bayartogtokh, Chatterjee y Chan, 2009
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Fortuynia yunkerii* Hammen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Panamá.

***Litoribates* Pflugstl y Schatz, 2017 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Litoribates caelestis* Pflugstl y Schatz, 2017

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Litoribates bonairensis* Pflugstl, Baumann, Lienhard y Schatz, 2017
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Litoribates caelestis* Pflugstl y Schatz, 2017
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.

Cymbaeremaeoidea Sellnick, 1928

Adhaesozetidae Hammer, 1973 (1 gen. y 2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

***Adhaesozetes* Hammer, 1966 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Adhaesozetes barbara* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Adhaesozetes barbara* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Adhaesozetes polyphyllos* Walter y Behan-Pelletier, 1993
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Tasmania).

Cymbaeremaeidae Sellnick, 1928 (6 gen. y 122 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

***Bulleremaeus* Hammer, 1966 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Bulleremaeus reticulatus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Bulleremaeus reticulatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Bulleremaeus tuberculatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

***Cymbaeremaeus* Berlese, 1896 (3 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Eremaeus cymba* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Oriental y Neotropical.

- *Cymbaeremaeus cymba* (Nicolet, 1855) (*Eremaeus*)
(=*Cymbaeremaeus pulvillifer* Willmann, 1931)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Paleártica oriental: excepto Este) e India (Sikkim).
- *Cymbaeremaeus foliatus* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Cymbaeremaeus silva* Fujikawa, 2002
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Glanderemaeus Balogh y Csiszár, 1963 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Glanderemaeus hammerae* Balogh y Csiszár, 1963

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Glanderemaeus hammerae* Balogh y Csiszár, 1963
- DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Scapheremaeus Berlese, 1910 (114 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaeus patella* Berlese, 1886

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Scapheremaeus alisonae* Colloff, 2010
- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus allmani* Colloff, 2010
- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus alvarezius* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
- DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus alveolatus* Hammer, 1961
- DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scapheremaeus angusi* Colloff, 2009
- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus anteriorugosus* Mahunka, 2011
- DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Scapheremaeus arboreus* Corpuz-Raros, 1979
- DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scapheremaeus arcuatus* Hammer, 1971
- DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Scapheremaeus argentinensis* Travé y Fernández, 1986
- DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus ascisuratus* Ermilov y Anichkin, 2015
- DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus balazsi* Mahunka, 1983
- DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Cuba) y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Scapheremaeus baloghius* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
- DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus baylyi* Colloff, 2010
- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus bicornutus* Hammer, 1971
- DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Scapheremaeus bisculpturatus* Mahunka, 1984
- DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).
- *Scapheremaeus bituberculatus* Wang, 1998
- DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus bulbosensillatus* Colloff, 2010
- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus carinatus* Willmann, 1936
- DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Scapheremaeus cellulatifer* Mahunka, 1987
- DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus chaac* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
- DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus chaquensis* Fernández y Cleva, 2009
- DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus cheloniella* Colloff, 2009
- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus clavifer* Hammer, 1958
- DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus clavisetus* Mahunka, 1978
- DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Scapheremaeus convexus* Hammer, 1979
- DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Scapheremaeus corniger* (Berlese, 1908) (*Cymbaeremaeus*)
- (=*Scapheremaeus madeirensis* Willmann, 1939)
- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Scapheremaeus cornutus* Balogh, 1958
- DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Scapheremaeus crassus* Mahunka, 1988
- DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scapheremaeus cuspidatus* Pérez-Íñigo, 1982

- DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
- *Scapheremaeus cyclops* (Oudemans, 1915) (*Cymbaeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Scapheremaeus demeteri* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Scapheremaeus digitatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Scapheremaeus emarginatus* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Scapheremaeus eugenius* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Scapheremaeus euthemellus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scapheremaeus ewani* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scapheremaeus fimbriatus* (Michael, 1890) (*Eremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Argelia.
 - *Scapheremaeus fisheri* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Oriental: India (Bengala Occidental) y Vietnam.
 - *Scapheremaeus flamíferus* Palacios-Vargas y Ríos, 1998
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Scapheremaeus foveolatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Scapheremaeus fungisetosus* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Scapheremaeus gibbus* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Scapheremaeus glaber* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Scapheremaeus grahamius* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Scapheremaeus guerini* (Berlese, 1908) (*Cymbaeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Francia.
 - *Scapheremaeus hectorperezii* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Scapheremaeus hieroglyphicus* (Hall, 1911) (*Hermannia*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Scapheremaeus humeratus* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Scapheremaeus hungarorum* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
 - *Scapheremaeus insularis* Hammer, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Scapheremaeus johnsi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Scapheremaeus lambieae* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scapheremaeus latirostris* Willmann, 1936
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Argentina).
 - *Scapheremaeus latus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
 - *Scapheremaeus longicuspis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
 - *Scapheremaeus longilamellatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Scapheremaeus luxtoni* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Scapheremaeus magdalenae* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Scapheremaeus mahunkaius* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Scapheremaeus marginalis* (Banks, 1896) (*Eremaeus*)
(=*Cymbaeremaeus* (*Scapheremaeus*) *marmoratus* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Scapheremaeus minjambuta* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scapheremaeus morenoi* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Scutovertex*)

- DISTRIBUCIÓN: Cuba e Irán.
- *Scapheremaeus morulisensillatus* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus nashiroi* Nakatamari, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón y China suroriental.
- *Scapheremaeus nivalis* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus nogueraius* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus notoverrucatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus nuciferosa* Ramani y Haq, 1998
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Scapheremaeus obliterated* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú y U.S.A. (Nuevo Méjico)?
- *Scapheremaeus ornatus* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).
- *Scapheremaeus ovivorus* (Packard, 1868) (*Nothrus*) "sp. inq."
(=*Oribata aspidioli* Ashmead, 1879)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Scapheremaeus pacificus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Scapheremaeus palaciosi* Ríos, 1996
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus palustris* (Sellnick, 1924) (*Cymbaeremaeus* (*S.*))
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Mongolia y Neártica), I. Santa Helena y Méjico.
- *Scapheremaeus parvulus* (Banks, 1909) (*Cymbaeremaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental y Norte de Neotropical.
- *Scapheremaeus patella* (Berlese, 1886) (*Eremaeus*)
(=*Scapheremaeus hammerae* J. y P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y Nueva Zelanda.
- *Scapheremaeus pauliani* Fernández y Cleva, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Scapheremaeus petrosus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Scapheremaeus pinguis* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Scapheremaeus pisacensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Scapheremaeus polysetosus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Scapheremaeus pseudoreticulatus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Scapheremaeus pulchellus* (Berlese, 1910) (*Cymbaeremaeus* (*S.*))
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Scapheremaeus pulleni* Colloff, 2009
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus pundamiliaensis* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scapheremaeus quadrilineatus* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Scapheremaeus quadrireticulatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Scapheremaeus rodickae* Norton, Franklin y Crossley jr., 2010
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Scapheremaeus retestriatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus reticulatus* (Berlese, 1910) (*Cymbaeremaeus* (*S.*))
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Scapheremaeus rustenburgensis* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scapheremaeus schatzi* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus semiconvexus* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Scapheremaeus semiornatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Scapheremaeus simplex* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus sinuosus* Aoki, 1964
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scapheremaeus stratus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Scapheremaeus striatomarginatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Scapheremaeus subcorniger* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Scapheremaeus subglaber* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Scapheremaeus taurus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Scapheremaeus tegulatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus tillandsiae* Fernández y Cleva, 1997
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scapheremaeus tillandsiophilus* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus tonatiuh* Palacios-Vargas, Ríos y Vázquez, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus tosaensis* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scapheremaeus tricarinatus* Sitnikova, 1975
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Scapheremaeus trirugis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina y Japón.
- *Scapheremaeus truncatus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus tuberculosus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus tumidus* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Scapheremaeus uncinatus* Wang, 1998
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Scapheremaeus volcanicus* Ríos y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scapheremaeus walteri* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scapheremaeus yamashitai* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Scapheremaeus zephyrus* Colloff, 2010
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Australia y Nueva Zelanda).

Seteremaeus Hammer, 1971 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Setermaeus spinosus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Seteremaeus spinosus* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Spineremaeus Colloff, 2011 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Spineremaeus smithi* Colloff, 2011

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Spineremaeus smithi* Colloff, 2011
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).

Ametroproctidae Subías, 2004 (2 gen., 1 subg. y 9 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Ametroproctus Higgins y Woolley, 1968 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ametroproctus oresbios* Higgins y Woolley, 1968

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Ametroproctus (Ametroproctus) Higgins y Woolley, 1968 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Ametroproctus (A.) aridus* Behan-Pelletier, 1987

- DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
 - *Ametroproctus (A.) oresbios* Higgins y Woolley, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Ametroproctus (A.) tuberculosus* Behan-Pelletier, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- Ametroproctus (Coropoculia)*** Aoki y Fujikawa, 1972 (5 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Coropoculia reticulata* Aoki y Fujikawa, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Ametroproctus (Coropoculia) beringianus* Behan-Pelletier, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Canadá y Este de Rusia asiática).
 - *Ametroproctus (Coropoculia) canningsi* Behan-Pelletier, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Ametroproctus (Coropoculia) lamellatus* (Schweizer, 1956) (*Cymbaeremaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
 - *Ametroproctus (Coropoculia) mongolicus* Bayartogtokh, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Ametroproctus (Coropoculia) reticulatus* (Aoki y Fujikawa, 1972) (*C.*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Este de Paleártica oriental).

- Scapuleremaeus*** Behan-Pelletier, 1989 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Scapuleremaeus kobauensis* Behan-Pelletier, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Scapuleremaeus kobauensis* Behan-Pelletier, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Eremellidae Balogh, 1961 (4 gen. y 14 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- Archeremella*** Balogh y Mahunka, 1974 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Eremella (Archeremella) leowae* Balogh y Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
 - *Archeremella africana* Pérez-Íñigo, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
 - *Archeremella bartlae* Mahunka, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Archeremella leowae* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Eremella (A.)*)
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- Eremella*** Berlese, 1913 (7 spp.)
 (= ***Proteremella*** Balogh, 1959)
 ESPECIE TIPO: *Eremella vestita* Berlese, 1913
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
 - *Eremella africana* (Balogh, 1966) (*Proteremella*)
 DISTRIBUCIÓN: Chad.
 - *Eremella ensifera* Balogh y Mahunka, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Argentina e Irán.
 - *Eremella funnagasatoensis* Y.- N. Nakamura, Hashimoto, Nishi, Nakamura y Fujikawa, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Eremella induta* Berlese, 1913
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical: Oriental, Japón, Australiana: I. Tonga, Neotropical: Brasil, y Etiópica: Congo y Madagascar.
 - *Eremella matildebellae* Mahunka y Palacios-Vargas, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Eremella pulchella* (Balogh, 1959) (*Proteremella*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Eremella vestita* Berlese, 1913
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- Licnocephus*** Woolley, 1969 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Licnocephus reticulatus* Woolley, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Licnocephus reticulatus* Woolley, 1969
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).

- Triteremella*** Kunst, 1971 (3 spp.)
 (= ***Afreremella*** Mahunka, 1974)

ESPECIE TIPO: *Eremella kaszabi* Csiszár, 1962

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Triteremella kaszabi* (Csiszár, 1962) (*Eremella*)
(?= *Licneremaeus tuberculatus* Paoli, 1908 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Triteremella luisiae* (Mahunka, 1974) (*Afreremella*)
DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].
- *Triteremella simpliseta* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Infraorden PORONOTICAE Grandjean, 1954

Licneremaeoidea Grandjean, 1954

Dendroeremaeidae Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005 (1 gen. y 2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Dendroeremaeus Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dendroeremaeus krantzi* Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Dendroeremaeus foveolatus* Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005
DISTRIBUCIÓN: Oeste de U.S.A.
- *Dendroeremaeus krantzi* Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005
DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.

Micreremidae Grandjean, 1954 (5 gen. y 21 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Fenichelia Balogh, 1970 (3 spp.)

(= **Porofenichelia** Mahunka, 1985)

ESPECIE TIPO: *Fenichelia biroi* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australiana).

- *Fenichelia biroi* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Fenichelia latipilosa* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo).
- *Fenichelia porosa* (Mahunka, 1985) (*Porofenichelia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Mexiceremus J. y P. Balogh, 1998 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Micreremus rafaelius* Mahunka y Palacios-Vargas, 1995

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mexiceremus rafaelius* (Mahunka y Palacios-Vargas, 1995) (*Micreremus*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.

Micreremus Berlese, 1908 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaeus brevipes* Michael, 1888

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica y Paleotropical).

- *Micreremus africanus* Balogh, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Malgache: I. Reunión).
- *Micreremus brevipes* (Michael, 1888) (*Eremaeus*)
(= *Micreremus gracilior* Willmann, 1931)
(= *Eremaeus minimus* Berlese, 1891)
(= *Eremaeus minutipes* Berlese, 1902)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Paleártica occidental).
- *Micreremus elongatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Micreremus faviger* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Micreremus florens* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Micreremus granulatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Micreremus longisetus* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Micreremus macrofissura* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Micreremus subglaber* Ito, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Phylleremus Behan-Pelletier y Walter, 2007 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Phylleremus leei* Behan-Pelletier y Walter, 2007

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Phylleremus hunti* Behan-Pelletier y Walter, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Phylleremus leei* Behan-Pelletier y Walter, 2007
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Phylloribatula Balogh y Mahunka, 1978 (6 spp.)

(=*Balazsella* Mahunka, 1983)

ESPECIE TIPO: *Phylloribatula pulchella* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.

- *Phylloribatula ilhabellae* (Balogh y Palacios-Vargas, 1996) (*Balazsella*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phylloribatula luzonensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Tuberemaues*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Phylloribatula mexicana* (Balogh y Palacios-Vargas, 1996) (*Balazsella*)
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Phylloribatula pilosetosa* (Mahunka, 1983) (*Balazsella*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Phylloribatula pulchella* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.
- *Phylloribatula xanthoparmeliae* Martínez y Palacios-Vargas, 1998
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Lamellareidae Balogh, 1972 (4 gen. y 13 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepo Neártica).

Cultroribella Mahunka, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cultroribella lineata* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Cultroribella lineata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Lamellarea Kok, 1968 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lamellarea ardua* Kok, 1968

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Lamellarea ardua* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea digitata* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea forceps* Kok, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea koki* Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Lamellarea quadrata* Coetzee, 1987
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Microlamellarea Coetzee, 1987 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Microlamellarea engelbrechti* Coetzee, 1987

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Australiana.

- *Microlamellarea coetzeeae* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Microlamellarea engelbrechti* Coetzee, 1987
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Microlamellarea minuta* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Tenuelamellarea Subías e Iturrondobeitia, 1978 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tenuelamellarea hispanica* Subías e Iturrondobeitia, 1978

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepo Neártica).

- *Tenuelamellarea argentinensis* Martínez, Velis, Eguaras y Fernández, 1995
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Tenuelamellarea hawaiiensis* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Tenuelamellarea hispanica* Subías e Iturrondobeitia, 1978

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso), Etiópica (Sudáfrica) y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).

- *Tenuelamellarea taprobanae* (Oudemans, 1915) (*Carabodes*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Licneremaeidae Grandjean, 1954 (2 gen. y 19 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Huilicheremaeus Fernández, Marcangeli y Eguaras, 1997 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Huilicheremaeus michaii* Fernández, Marcangeli y Eguaras, 1997

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Huilicheremaeus atypicus* (Mahunka, 1984) (*Licneremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).

- *Huilicheremaeus michaii* Fernández, Marcangeli y Eguaras, 1997

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Licneremaeus Paoli, 1908 (17 spp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis licnophorus* Michael, 1882

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Licneremaeus altiplanicus* Covarrubias, 2005

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Licneremaeus braziliensis* Bomfim, Silva y Oliveira, 2017

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Licneremaeus costulatus* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Licneremaeus cristatus* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Licneremaeus cubanus* Balogh y Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Brasil).

- *Licneremaeus discoidalis* Willmann, 1930

(=*Licneremaeus antillensis* Mahunka, 1985)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Centroamérica y Brasil).

- *Licneremaeus embeyisztini* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Licneremaeus exornatus* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Licneremaeus giustii* Bernini, 1973

DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).

- *Licneremaeus licnophorus* (Michael, 1882) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Carolina del Norte), Neotropical y Oriental (Vietnam).

- *Licneremaeus lineatus* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Licneremaeus novaeguineae* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental, Australiana: Nueva Guinea y Komodo, y Neotropical: Perú y Brasil) y Japón.

- *Licneremaeus novus* Karppinen y Shtanchaeva, 1987

(=*Licneremaeus similis* Pérez-Íñigo jr., 1990)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Licneremaeus polygonalis* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico, Vietnam y Madagascar.

- *Licneremaeus prodigiosus* Schuster, 1958

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centomeridional y Asia centrooccidental).

- *Licneremaeus propinquus* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Licneremaeus semiareolatus* Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Scutoverticidae Grandjean, 1954 (8 gen. y 68 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Arthrovertex Balogh, 1970 (8 spp.)

(=*Argentinovortex* Fernández y Cleve, 2002)

ESPECIE TIPO: *Arthrovertex segmentatus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Arthrovertex baloghi* Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Antillas.
- *Arthrovertex bispinatus* (Hammer, 1961) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Arthrovertex coineaui* (Fernández y Cleva, 2002) (*Argentinovertext*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Arthrovertex hauseri* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Brasil).
- *Arthrovertex ilocanus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Arthrovertex leucaena* Corpuz-Raros, 1991
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Arthrovertex segmentatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Arthrovertex xena* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Malgache.

Ethiovertex Mahunka, 1982 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ethiovertex macrosetosus* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y Paleártica meridional.

- *Ethiovertex elisae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Ethiovertex laminipes* (Hammer, 1961) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Oriental (India: Uttarakhand).
- *Ethiovertex macrosetosus* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ethiovertex mahunkai* Subías, 2017
(=*Scutovertex bidactylus* Mahunka, 1989, "nom. praeoc." por Coggi, 1900)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Ethiovertex sculperens* (Kok, 1968) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
- *Ethiovertex vanharteni* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Emiratos Árabes.

Exochoepheus Woolley e Higgins, 1968 (7 spp.)

(=*Latovertext* Mahunka, 1987)

ESPECIE TIPO: *Exochoepheus eremitus* Woolley e Higgins, 1968

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Exochoepheus borealis* (Rjabinin, 1984) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica Oriental (excepto Oeste).
- *Exochoepheus contiguus* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Exochoepheus eremitus* Woolley e Higgins, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Exochoepheus hungaricus* (Mahunka, 1987) (*Latovertext*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Exochoepheus laticuspis* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sureste de Rusia europea y Paleártica oriental meridional).
- *Exochoepheus stenolamellatus* (Golosova, 1984) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Exochoepheus tuberculatus* (Golosova, 1984) (*Hypovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Hypovertex Krivolutsky, 1969 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hypovertex mirabilis* Krivolutsky, 1969

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental, Etiópica y Neotropical.

- *Hypovertex africanus* (Evans, 1953) (*Scutovertex*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hypovertex arcualis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Hypovertex bajartogtokhi* Netuzhilin y Shtanchaeva, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Hypovertex cendsureni* (Netuzhilin y Shtanchaeva, 2003) (*Provertex*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Hypovertex lenticulatus* Kahwash, Ruiz y Subías, 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hypovertex mirabilis* Krivolutsky, 1969

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
 - *Hypovertex saxicola* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).
 - *Hypovertex transversalis* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Scutovertex*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina) y Oriental (India: Bengala Occidental).

Lamellovertex Bernini, 1976 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Scutovertex caelatus* Berlese, 1895
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Lamellovertex caelatus* (Berlese, 1895) (*Scutovertex*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Provertex Mihelčič, 1959 (6 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Provertex kuehnelti* Mihelčič, 1959
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Provertex delamarei* Travé, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
 - *Provertex forsslundi* Krivolutsky, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
 - *Provertex kuehnelti* Mihelčič, 1959
 DISTRIBUCIÓN: Borealpina (Europa occidental).
 - *Provertex mailloli* Travé, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Francia.
 - *Provertex nepalensis* Piffel, 1971 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Provertex travei* Netuzhilin y Shtanchaeva, 2003
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Scutovertex Michael, 1879 (30 spp.)

(=*Neoscutovertex* Mihelčič, 1957)

- ESPECIE TIPO: *Scutovertex sculptus* Michael, 1879
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Antártica y Neotropical).
 - *Scutovertex alpinus* Willmann, 1953
 DISTRIBUCIÓN: Europea (Austria y Cáucaso).
 - *Scutovertex arenocolus* Pflingstl y Schäffer, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
 - *Scutovertex armazi* Murvanidze y Weigmann, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Scutovertex bulgaricus* Kunst, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
 - *Scutovertex clypeatus* (Nicolet, 1855) (*Tegeocranus*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Francia.
 - *Scutovertex evansi* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Scutovertex fossatus* Wallwork, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Chad.
 - *Scutovertex glandulosus* Balogh y Mahunka, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Rusia europea y Mongolia).
 - *Scutovertex granulatus* Mihelčič, 1957 (*S. (Neoscutovertex)*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia central rusa).
 - *Scutovertex ianus* Pflingstl, Schäffer, Ebermann y Krisper, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Europa central.
 - *Scutovertex inlenticulatus* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Cáucaso y Portugal) y Asia centrooccidental.
 - *Scutovertex japonicus* Aoki, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Scutovertex jindianensis* Wen, 1985
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Scutovertex marginatus* Mahunka, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
 - *Scutovertex mikoi* Weigmann, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Scutovertex minutus* (Koch, 1836) (*Cepheus*)
 (= *Eremaeus ovalis siculus* Berlese, 1887)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y Groenlandia.
 - *Scutovertex neonommatatus* Subías, 2004
 (= *Scutovertex perforatus* Sitnikova, 1975, “nom. praeoc.” por Berlese, 1910)

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Oeste) e Irán.
 - *Scutovertex niger* Moskacheva, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Bielorrusia.
 - *Scutovertex ornatus* Bulanova-Zachvatkina, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Rusia (Este de Europa y Asia central).
 - *Scutovertex pannonicus* Schuster, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Paleártica oriental meridional).
 - *Scutovertex perforatulus* Mihelčič, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Scutovertex petrophagus* Banks, 1906
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
 - *Scutovertex pictus* Kunst, 1959
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Scutovertex pileatus* Schäffer, Krisper, Pflingstl y Sturmbauer, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Scutovertex pilosetosus* Polderman, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Europa central.
 - *Scutovertex punctatus* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea, Asia centrooccidental y Mongolia).
 - *Scutovertex sculptus* Michael, 1879
 (= *Scutovertex* (*Neoscutovortex*) *glaber* Mihelčič, 1957)
 (?= *Cepheus ovalis* Koch, 1841 “sp. inq.”)
 (= *Scutovertex rugosus* Mihelčič, 1957)
 (= *Scutovertex steineri* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) y Nueva Zelanda.
 - *Scutovertex serratus* Sitnikova, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Paleártica oriental meridional).
 - *Scutovertex spinipes* Berlese, 1916 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Somalia.
 - *Scutovertex subspinipes* Balogh, 1959
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

***Scutoverticosus* Kok, 1968 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Scutoverticosus arcanus* Kok, 1968

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Scutoverticosus arcanus* Kok, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scutoverticosus insperatus* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
 DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

Passalozetidae Grandjean, 1954 (3 gen., 1 subg., 48 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).

***Bipassalozetes* Mihelčič, 1957 (30 spp. y 1 ssp.)**

ESPECIE TIPO: *Passalozetes* (*Bipassalozetes*) *permixtus* Mihelčič, 1957

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y **Neotropical**.

***Bipassalozetes* (*Bipassalozetes*) Mihelčič, 1957 (26 spp. y 1 ssp.)**

(= *Salpasozetes* Mahunka, 1977)

- DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y **Neotropical**.
- *Bipassalozetes* (*B.*) *bidactylus* (Coggi, 1900) (*Scutovertex*)
 (= *Passalozetes vicinus* Mihelčič, 1957)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Kenia.
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *californicus* (Wallwork, 1972) (*Passalozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. meridional y Canadá) y Méjico.
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *deserticus* Bayartogtokh y Aoki, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia y Yemen.
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *elegans* (Sitnikova, 1975) (*Passalozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *gobiensis* (Mahunka, 1964) (*Passalozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *intermedius* (Mihelčič, 1954) (*Passalozetes*)
 (= *Passalozetes variatepictus* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *lineolatus* (Sitnikova, 1975) (*Passalozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
 - *Bipassalozetes* (*B.*) *macedonicus* (Tarman, 1962) (*Passalozetes*)

- DISTRIBUCIÓN: Macedonia.
- *Bipassalozetes (B.) mahunkai* Bayartogtokh y Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Bipassalozetes (B.) microsculptatus* Bayartogtokh y Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Bipassalozetes (B.) mongolicus* Bayartogtokh y Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Bipassalozetes (B.) moniles* (Higgins y Woolley, 1975) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
 - *Bipassalozetes (B.) neomexicanus* (Wallwork, Weems y Kamill, 1984) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico) y Méjico.
 - *Bipassalozetes (B.) neomexicanus neomexicanus* (Wallwork, Weems y Kamill, 1984)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico) y Méjico.
 - *Bipassalozetes (B.) neomexicanus neonominatus* (Subías, 2004) (*Passalozetes*)
(=*Passalozetes neomexicanus granulatus* Wallwork, Weems y Kamill, 1984, “nom. praec.” por Mihelčič, 1955)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
 - *Bipassalozetes (B.) nesebarensis* (Vaněk, 1966) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Bulgaria.
 - *Bipassalozetes (B.) niger* (Mahunka, 1987) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
 - *Bipassalozetes (B.) nitidus* (Bayoumi y Al-Khalifa, 1984) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
 - *Bipassalozetes (B.) orientalis* (Wallwork, Weems y Kamill, 1984) (*Passalozetes californicus o.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).
 - *Bipassalozetes (B.) pectinatus* (Wallwork, 1964) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
 - *Bipassalozetes (B.) perforatus* (Berlese, 1910) (*Scutovertex*)
(=*Passalozetes granulatus* Mihelčič, 1955)
(=*Passalozetes propinquus* Mihelčič, 1956)
(?=*Eremaeus tibialis* Nicolet, 1855 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
 - *Bipassalozetes (B.) permixtus* (Mihelčič, 1957) (*Passalozetes (B.)*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Bipassalozetes (B.) pilosus* Bayartogtokh y Smelyansky, 2003
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
 - *Bipassalozetes (B.) reticulatus* (Mihelčič, 1957) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Bipassalozetes (B.) rugosus* (Sitnikova, 1975) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sureste de Europa y Oeste de Paleártica oriental).
 - *Bipassalozetes (B.) strenzkei* (Weigmann, 2006) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Bipassalozetes (B.) striatus* (Mihelčič, 1955) (*Passalozetes*)
(=*Passalozetes kaszabi* Mahunka, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Bipassalozetes (B.) wolwekransensis* (Engelbrecht, 1974) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

***Bipassalozetes (Passalobates)* Pérez-Íñigo y Peña, 1996 (4 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Passalobates asper* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.

- *Bipassalozetes (Passalobates) asper* (Pérez-Íñigo y Peña, 1996) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Bipassalozetes (Passalobates) berndhauseri* (Mahunka, 1997) (*Passalozetes (B.)*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Bipassalozetes (Passalobates) linearis* (Higgins y Woolley, 1962) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (U.S.A.: Utah, y Mediterránea).
- *Bipassalozetes (Passalobates) sabulosus* (Shtanchaeva, 1986) (*Passalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.

***Passalomonia* Mahunka, 1987 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Passalozetes (Passalomonia) demeteri* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Passalomonia demeteri* (Mahunka, 1987) (*Passalozetes (Passalom.)*)
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.

***Passalozetes* Grandjean, 1932 (17 spp.)**

- ESPECIE TIPO: *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Etiópica y Neotropical).
- *Passalozetes africanus* Grandjean, 1932
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (frecuente) y Guinea Ecuatorial.
 - *Passalozetes agricola* Mínguez y Subías, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Passalozetes alumbrensis* Martínez y Herrero, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Passalozetes douglasensis* Engelbrecht, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Passalozetes hauseri* Mahunka, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Passalozetes hispanicus* Mihelčič, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Passalozetes imperfectus* Pérez-Íñigo jr., 1991
 DISTRIBUCIÓN: **Mediterránea occidental.**
 - *Passalozetes inlenticulatus* Mihelčič, 1959
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Passalozetes karppineni* Mikhaltzova, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.
 - *Passalozetes lienhardi* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Passalozetes onubensis* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Passalozetes paucesculptus* Bernini, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
 - *Passalozetes prominens* Balogh y Mahunka, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Argentina e Irán.
 - *Passalozetes ruderalis* Mínguez y Subías, 1983
 DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Passalozetes scholzi* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
 DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Passalozetes stellatus* Mikhaltzova, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Rusia europea.
 - *Passalozetes stellifer* Pérez-Íñigo y Peña, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Phenopeloidea Petrunkevitch, 1955

Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955 (4 gen., 1 subg., 99 spp. y 7 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Eupelops Ewing, 1917 (67 spp. y 7 sspp.)

(=*Allopelops* Hammer, 1952)

(=*Celaeno* Koch, 1835, "nom. praeoc." por Leach, 1821)

(=*Globonothrus* Tseng, 1982)

(=*Pelops* Koch, 1836, "nom. praeoc." por Gistel, 1834)

(=*Phenopelops* Petrunkevitch, 1955)

(=*Tectopelops* Jacot, 1929)

ESPECIE TIPO: (*Pelops hirsutus* Koch, 1844) =*Notaspis acromios* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Eupelops absalom* (Berlese, 1916) (*Pelops*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: "África oriental".

Eupelops acromios (Hermann, 1804) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica, Norte de Oriental, Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) y Argentina.

- *Eupelops acromios acromios* (Hermann, 1804)

(=*Pelops hirsutus* Koch, 1844)

(=*Pelops kochi* Jacot, 1929)

(=*Pelops phytophilus* Berlese, 1916)

(?=*Acarus planicornis* Schrank, 1803 "sp. inq.")

(=*Celaeno spinosa* Koch, 1835)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica (frecuente), Norte de Oriental, Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) y Argentina.

- *Eupelops acromios minor* Chakrabarti, Bhaduri y Raychaudhuri, 1973

DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Bengala Occidental) y Nepal.

- *Eupelops apicalis* (Hammer, 1962) (*Pelops*)

- DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador).
- *Eupelops berlesei* (Oudemans, 1929) (*Peloptulus*) "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Eupelops brevopilus* (Jacot, 1937) (*Pelops*) "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Eupelops capensis* Grobler, 1989
 - DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Eupelops caucasicus* Sitnikova, 1975
 - DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - Eupelops claviger* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
 - DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Paleártica oriental).
 - *Eupelops claviger claviger* (Berlese, 1916)
 - DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Este de Paleártica oriental).
 - *Eupelops claviger fuerteventurae* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
 - DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
 - *Eupelops contaminatus* Choi, 1986
 - DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Eupelops costulatus* Mahunka, 2011
 - DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Eupelops crinitus* (Grube, 1859) (*Pelonia*) "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Eupelops distinctus* Grobler, 1989
 - DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Eupelops ecuadoriensis* P. Balogh, 1988
 - DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Eupelops engelbrechti* Grobler, 1989
 - DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Eupelops erinaceus* Balogh y Mahunka, 1979
 - DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - Eupelops eximius* Sitnikova, 1967
 - DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
 - *Eupelops eximius eximius* Sitnikova, 1967
 - DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
 - *Eupelops eximius dicornus* Sitnikova, 1967
 - DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Eupelops forsslundi* (Balogh, 1959) (*Pelops*)
 - DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Vietnam.
 - *Eupelops fusiformis* Ermilov, 2016
 - DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Eupelops foveolatus* Engelbrecht, 1975
 - DISTRIBUCIÓN: Etiópica e India (Bengala Occidental).
 - *Eupelops geminus* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
 - DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).
 - *Eupelops gibbus* (Mihelčič, 1957) (*Pelops*)
 - DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Eupelops grandis* (Mihelčič, 1958) (*Pelops*) "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Eupelops halophilus* Pérez-Íñigo, 1969
 - DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Eupelops heegi* (Balogh, 1958) (*Pelops*) "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Eupelops higginsi* Balogh, 1970
 - DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Eupelops hygrophilus* (Knülle, 1954) (*Pelops*)
 - DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Eupelops incompletus* Mahunka, 1978
 - DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Eupelops intermedius* (Hammer, 1979) (*Nesopelops*)
 - DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
 - *Eupelops japonensis* Fujikawa, 1990
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Eupelops kivuensis* (Balogh, 1958) (*Pelops*) "sp. inq."
 - DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Eupelops kumaensis* Fujikawa, 2009
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Eupelops kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
 - DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Eupelops latipilosus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. centrooriental, Cáucaso y Asia centrooccidental).
- *Eupelops limbulatus* (Tseng, 1982) (*Globonothrus*) "sp. inq." (**juvenil**)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Eupelops longisetosus* Chakrabarti y Mondal, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- Eupelops major* (Hull, 1914) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional, Paquistán y Neártica septentrional).
 - *Eupelops major major* (Hull, 1914)
(=*Pelops differens* Mihelčič, 1953)
(?*=Pelops farinosus* Nicolet, 1855 "sp. inq.")
 - (=*Pelops hirtus* Berlese, 1916)
 - (=*Pelops perarmatus* Hull, 1916)
 - (=*Pelops simplex* Berlese, 1916)
 - DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional: frecuente, Paquistán y Canadá).
 - *Eupelops major franconia* (Jacot, 1939) (*Pelops simplex f.*) "ssp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
- *Eupelops margatensis* Engelbrecht, 1975
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops minutus* Grobler, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops miyamaensis* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Eupelops mongolicus* Bayartogtokh y Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Eupelops occultus* (Koch, 1835) (*Pelops*)
(=*Pelops brevicuspis* Knülle, 1954)
(=*Pelops parvus* Mihelčič, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: frecuente.
- *Eupelops oudemansi* (Hammen, 1952) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Eupelops philippinensis* (Corpuz-Raros y García, 2011) (*Nesopelops*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Eupelops plicatus* (Koch, 1835) (*Celaeno*)
(=*Pelops acromios diversipilus* Mihelčič, 1957)
(=*Pelops approximatus* Hull, 1916)
(=*Pelops auritus* Koch, 1839)
(=*Pelops fuliginus* Koch, 1839)
(=*Pelops fusiger* Mihelčič, 1957)
(=*Pelops laevigatus* Nicolet, 1855)
(=*Pelops siculus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Alaska y Virginia).
- *Eupelops pocsi* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Eupelops rapaensis* (Sellnick, 1959) (*Phenopelops*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
- *Eupelops reticulatus* (Willmann, 1939) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Macaronesica (Madeira).
- *Eupelops sculptus* (Haupt, 1882) (*Pelops*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Eupelops septentrionalis* (Trägårdh, 1910) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal.
- *Eupelops shagdarsureni* Bayartogtokh y Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Eupelops silvestris* (Jacot, 1937) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eupelops similis* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Eupelops somalicus* (Berlese, 1916) (*Pelops curtipilus s.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Ibérica y Cáucaso) y Somalia.
- *Eupelops spongiosus* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y Venezuela.
- *Eupelops strenzkei* (Knülle, 1954) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Eupelops subexutus* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
(?*=Pelops glaber* G. y R. Canestrini, 1882 "sp. inq.")
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- Eupelops subulatus* (Berlese, 1916) (*Pelops*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Eupelops subuliger* (Berlese, 1916) (*Pelops*)
(=*Pelops longifissus* Willmann, 1951)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- Eupelops sulcatus* (Oudemans, 1914) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Groenlandia) y Sudáfrica.
 - *Eupelops sulcatus sulcatus* (Oudemans, 1914)
(=*Pelops bilobus* Sellnick, 1928)
(=*Pelops curtipilus* Berlese, 1916)
(=*Pelops depilatus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (excepto Este) y Groenlandia.
 - *Eupelops sulcatus thabazimbiensis* Engelbrecht, 1975 (*E. curtipilus* t.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Eupelops suramericanus* (Hammer, 1961) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Eupelops tahitiensis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Eupelops tardus* (Koch, 1835) (*Pelops*)
(=*Pelops nepotulus* Berlese, 1916)
(=*Pelops pulchellus* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este).
- *Eupelops terminalis* (Banks, 1909) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Carolina del Norte, y Canadá).
- *Eupelops tibialis* (Banks, 1910) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- Eupelops torulosus* (Koch, 1839) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este) y Etiopía.
 - *Eupelops torulosus torulosus* (Koch, 1839)
(=*Pelops duplex* Berlese, 1916)
(=*Pelops variolosus* Nicolet, 1855)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este): frecuente, y Etiopía.
 - *Eupelops torulosus macroporosus* Pérez-Íñigo jr., 1991
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Eupelops torulosus meridionalis* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Eupelops uraceus* (Koch, 1839) (*Pelops*)
(=*Pelops affinis* Berlese, 1916)
(=*Pelops diversus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental) y Groenlandia.
- *Eupelops variatus* (Mihelčič, 1957) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Nesopelops Hammer, 1973 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nesopelops caudatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Nesopelops caudatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Nesopelops crassus* (Hammer, 1972) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Nesopelops laensis* (Balogh, 1970) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Nesopelops monodactylus* (Hammer, 1966) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nesopelops polynesius* (Hammer, 1972) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Nesopelops punctatus* (Hammer, 1966) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Nesopelops samoensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Nesopelops tongatapuensis* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Nesopelops transversus* (Balogh, 1970) (*Eupelops*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Peloptulus Berlese, 1908 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pelops phaenotus* Koch, 1844

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Peloptulus (Peloptulus) Berlese, 1908 (14 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Peloptulus (P.) americanus* (Ewing, 1907) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Peloptulus (P.) borgesii* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Peloptulus (P.) denticuspidatus* Bayartogtokh y Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Peloptulus (P.) foveolatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador) y Oriental (India: Himalaya).
- *Peloptulus (P.) gibbus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Peloptulus (P.) ibericus* Subías, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Peloptulus (P.) laticuspidatus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Peloptulus (P.) latilamellatus* Bayartogtokh y Aoki, 1997
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Peloptulus (P.) latirostris* Pérez-Íñigo, 1969
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Peloptulus (P.) montanus* Hull, 1914
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia centrooccidental).
- *Peloptulus (P.) phaenotus* (Koch, 1844) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
- *Peloptulus (P.) reticulatus* Mihelčič, 1957
(=*Peloptulus trinacriae* Arcidiacono, 1975)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Peloptulus (P.) tanytrichosus* Higgins y Woolley, 1972
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Peloptulus (P.) wadatsumi* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Peloptulus (Sacculoptulus) Subías, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Peloptulus sacculiferus* Weigmann, 2008

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Peloptulus (Sacculoptulus) sacculiferus* Weigmann, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Portugal.

Propelops Jacot, 1937 (8 spp.)

(=***Hammeria*** Sellnick, 1944)

ESPECIE TIPO: *Propelops pinicus* Jacot, 1937

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Propelops alaskensis* (Hammer, 1955) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Alaska.
- *Propelops canadensis* (Hammer, 1952) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Paleártica oriental).
- *Propelops groenlandicus* (Sellnick, 1944) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Este de Rusia asiática).
- *Propelops minnesotensis* (Ewing, 1913) (*Pelops*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Propelops monticolus* (Ewing, 1918) (*Eupelops*)
(=*Eupelops monticolus subborealis* Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Propelops pacificus* Krivolutsky, 1971
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Propelops pinicus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Neártica y norte de Neotropical.
- *Propelops rossicus* (Shaldybina, 1971) (*Hammeria*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Unduloribatoidea Kunst, 1971

Unduloribatidae Kunst, 1971 (3 gen. y 8 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Scutoribates Sellnick, 1918 (2 spp.)

(=~~Koreoribates~~ Choi, 1994)

(=~~Kunstella~~ Krivolutsky, 1974)

ESPECIE TIPO: *Scutoribates perornatus* Sellnick, 1918 [†]

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Scutoribates foliatus* (Choi, 1994) (~~Koreoribates~~)

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Scutoribates foveolatus* (Krivolutsky, 1974) (~~Kunstella~~)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

Unduloribates Balogh, 1943 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Tectoribates) undulatus* Berlese, 1914

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.

- *Unduloribates brevisetosus* Nübel-Reidelbach y Woas, 1992

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Unduloribates diana* Behan-Pelletier y Walter, 2009

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Unduloribates hebes* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Himalaya y Asia centrooccidental.

- *Unduloribates medusa* Piffel, 1972

DISTRIBUCIÓN: Nepal.

- *Unduloribates undulatus* (Berlese, 1914) (*Sphaerozetes (Tectoribates)*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional e Himalaya).

Valbehanella Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Valbehanella freestatensis* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Valbehanella freestatensis* Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Eremaozetidae Piffel, 1972 (6 gen. y 52 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Eremaozetes Berlese, 1913 (34 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaozetes tuberculatus* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Eremaozetes acutus* Covarrubias, 1967

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Eremaozetes aokii* Colloff, 2012

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Eremaozetes araucanus* Monetti, Oppedisano y Fernández, 1994

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Eremaozetes arboreus* Nübel-Reidelbach y Woas, 1992

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Eremaozetes bilunatifer* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Paraguay.

- *Eremaozetes capensis* Schatz, 2001

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Eremaozetes chancanii* Fernández y Cleva, 2000

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Eremaozetes costulatus* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Bali y Filipinas).

- *Eremaozetes darwinensis* Colloff, 2012

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Eremaozetes darwini* Schatz, 2001

DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.

- *Eremaozetes dividipeltatus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Eremaozetes ephippiger* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

- *Eremaozetes himalayensis* Sanyal, 1992

DISTRIBUCIÓN: India (Himalaya).

- *Eremaozetes irenae* Schatz, 2001

DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.

- *Eremaozetes kurozumii* Aoki, 1994

DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).

- *Eremaozetes lineatus* Mahunka, 1985

- DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental: India (Himalaya) y Vietnam.
- *Eremaeozetes louisae* Schatz, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Eremaeozetes machadoi* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Sudáfrica).
 - *Eremaeozetes maculosus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Eremaeozetes malleensis* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Eremaeozetes nasutus* Schatz, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Eremaeozetes octomaculatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Polinesia (Samoa), Oriental: Filipinas y Java, y Japón.
 - *Eremaeozetes reticulatus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Angola y Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
 - *Eremaeozetes rogersi* Schatz, McAloon y Hagan, 2006
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
 - *Eremaeozetes roguini* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Eremaeozetes sabinae* Schatz, 2000
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Eremaeozetes schatzi* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Eremaeozetes trifurcus* Wen, 1994
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Eremaeozetes tsavoensis* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Eremaeozetes tuberculatus* Berlese, 1913
DISTRIBUCIÓN: Java, Polinesia (Tahití) y Méjico.
 - *Eremaeozetes undulatus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Japón.
 - *Eremaeozetes ursulae* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Eremaeozetes verai* Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
 - *Eremaeozetes woelkei* Piffel, 1972
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Idiozetes Aoki, 1976 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Idiozetes erectus* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.

- *Idiozetes erectus* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental.
- *Idiozetes javensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- *Idiozetes hagenensis* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Idiozetes malgache* Fernández, Cleve y Theron, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Mahunkaia Schatz, 2002 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaeozetes bituberculatus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Mahunkaia bituberculata* (Mahunka, 1983) (*Eremaeozetes*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental y Vietnam.
- *Mahunkaia gracilis* (Mahunka, 1985) (*Eremaeozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mahunkaia schwendingeri* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Mahunkaia tricornis* Schatz, 2002
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Retrozetes Colloff, 2012 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Retrozetes koghisensis* Colloff, 2012

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Retrozetes fernandesi* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Retrozetes hanswursti* (Mahunka, 1999) (*Eremaeozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Retrozetes koghisensis* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Retrozetes mirabilis* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- *Retrozetes novaecaledoniae* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

Rogerzetes Fernández, Theron y Cleva, 2011 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rogerzetes lacouturieri* Fernández, Theron y Cleva, 2011

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

- *Rogerzetes betschi* (Fernández y Cleva, 2009) (*Eremaeozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rogerzetes lacouturieri* Fernández, Theron y Cleva, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rogerzetes samueli* Colloff, 2012
DISTRIBUCIÓN: Australia (I. Norfolk).
- *Rogerzetes spathulatus* (Balogh, 1968) (*Eremaeozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

Seteremaeozetes P. Balogh, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Eremaeozetes (Seteremaeozetes) obtectus* P. Balogh, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Seteremaeozetes obtectus* (P. Balogh, 1988) (*Eremaeozetes (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Microzetoidea Grandjean, 1936

Microzetidae Grandjean, 1936 (45 gen., 6 subg., 205 spp. y 5 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Acanthozetes Balogh, 1958 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Acanthozetes platypterus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Acanthozetes platypterus* Balogh, 1958
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Acaroceras Grandjean, 1936 (22 spp.)

ESPECIE TIPO: *Acaroceras odontotus* Grandjean, 1936

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica).

Acaroceras (Acaroceras) Grandjean, 1936 (20 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica).

- *Acaroceras (A.) aegypticus* Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid y Khalil, 1988
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Acaroceras (A.) becki* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Acaroceras (A.) brasiliensis* Ermilov y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Acaroceras (A.) cavernosus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Acaroceras (A.) dechambrieri* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Acaroceras (A.) feideri* Călugăr y Vasiliu, 1977
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Acaroceras (A.) furcatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú ¿y Argentina?).
- *Acaroceras (A.) galapagoensis* Schatz y Palacios-Vargas, 1999
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Acaroceras (A.) hamifer* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
- *Acaroceras (A.) index* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Acaroceras (A.) interiunctus* Schatz y Palacios-Vargas, 1999
DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- *Acaroceras (A.) oaxacanus* Mahunka y Palacios-Vargas, 1996

- DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Acaroceras (A.) odontotus* Grandjean, 1936
 DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Acaroceras (A.) porosus* Balogh y Mahunka, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Acaroceras (A.) pseudofurcatus* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Acaroceras (A.) pugio* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Acaroceras (A.) schalleri* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Acaroceras (A.) similis* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Acaroceras (A.) szerediae* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Acaroceras (A.) taurus* Schatz y Palacios-Vargas, 1999
 DISTRIBUCIÓN: I. Galápagos.
- Acaroceras (Malgoceras)*** Mahunka, 1993 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Acaroceras (Malgoceras) helleri* Mahunka, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Acaroceras (Malgoceras) helleri* Mahunka, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- Acaroceras (Trichacaroceras)*** Mahunka, 1991 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Acaroceras (Trichacaroceras) africanus* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Acaroceras (Trichacaroceras) africanus* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- Afrozetes*** Engelbrecht, 1972 (3 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Afrozetes magoebaensis* Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Afrozetes champagnensis* Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
Afrozetes magoebaensis Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afrozetes magoebaensis magoebaensis* Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afrozetes magoebaensis capensis* Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afrozetes natalensis* Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- Amiracarus*** Miko, 2013 (4 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Miracarus senensis* Bernini, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
 - *Amiracarus discrepans* (Mahunka, 1966) (*Miracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Amiracarus grootaerti* (Wauthy y Ducarme, 2011) (*Miracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Bélgica.
 - *Amiracarus senensis* (Bernini, 1975) (*Miracarus*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Amiracarus similis* (Subías e Iturrondobeitia, 1978) (*Miracarus*)
 (= *Miracarus abeloosi* Lions, 1979)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- Anakingia*** Hammer, 1961 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Anakingia williamsae* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).
 - *Anakingia borneensis* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Anakingia reticulata* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Anakingia williamsae* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Perú.

Arenozetes Krivolutsky, 1971 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Arenozetes christovi* Krivolutsky, 1971

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Arenozetes christovi* Krivolutsky, 1971

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).

Baloghozetes Mahunka, 2003 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Baloghozetes pluritrichosus* Mahunka, 2003

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Baloghozetes pluritrichosus* Mahunka, 2003

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Berlesezetes Mahunka, 1980 (16 spp. y 3 sspp.)ESPECIE TIPO: (*Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936) = *Microzetes ornatissimus* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Berlesezetes aegypticus* (Bayoumi, 1977) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Egipto e Irán.

- *Berlesezetes alces* (Piffel, 1961) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Berlesezetes arenarius* (Krivolutsky, 1966) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Berlesezetes brazilozetoides* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, India (Kerala) e Irán.

- *Berlesezetes brevis* (Warburton, 1912) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica: I. Seychelles, y Neotropical: Guyana [Guayana Británica].

- *Berlesezetes cuspidatus* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Berlesezetes foveolatus* Al-Assiuty, Bayoumi, Abd-el-Hamid y Khalil, 1988

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Berlesezetes glaber* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Berlesezetes grandjeani* (Mahunka, 1977) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Berlesezetes kingi* Bayoumi y Al-Khalifa, 1986

DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.

- *Berlesezetes longistriatus* (Sarkar, 1992) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Berlesezetes monoramai* (Sarkar, 1992) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Berlesezetes natalensis* (Engelbrecht, 1972) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Berlesezetes ornatissimus (Berlese, 1913) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Berlesezetes ornatissimus ornatissimus* (Berlese, 1913)(=*Microzetes africanus* Balogh, 1958)(=*Microzetes auxiliaris* Grandjean, 1936)(=*Microzetes auxiliaris pachyseta* Hammer, 1971)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (frecuente).

- *Berlesezetes ornatissimus appalachicola* (Jacot, 1938) (*Microzetes auxiliaris a.*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental e India (Bengala Occidental).

- *Berlesezetes ornatissimus mirus* (Mihelčič, 1956) (*Microzetes m.*)

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Berlesezetes ornatissimus orkneyensis* (Engelbrecht, 1972) (*Microzetes auxiliaris o.*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica: I. Orcadas del Sur (I. Orkney).

- *Berlesezetes peruensis* (Hammer, 1961) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Bengala Occidental).

- *Berlesezetes rudrasagarensis* (Sarkar, 1992) (*Microzetes*)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

Brazilozetes Balogh y Mahunka, 1969 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Brazilozetes flagellatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Brazilozetes flagellatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Brazilozetes fusiger* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil).

- *Brazilozetes phaseolus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).

Calozetes Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Calozetes monticola* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Calozetes monticola* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

Caucasiozetes Shtanchaeva, 1984 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Caucasiozetes lamellatus* Shtanchaeva, 1984

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Paleártica meridional.

- *Caucasiozetes frankeae* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Caucasiozetes lamellatus* Shtanchaeva, 1984

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Cavernozetes Mahunka, 1984 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cavernozetes excavatus* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Cavernozetes excavatus* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Cavernozetes interruptus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Cavernozetes latus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Christovizetes Krivolutsky, 1975 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Christovizetes ovatus* Krivolutsky, 1975

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Christovizetes iranensis* Akrami y Behmanesh, 2011

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Christovizetes ovatus* Krivolutsky, 1975

DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

- *Christovizetes prasadi* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Comorozetes Mahunka, 1994 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Comorozetes atavisticus* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Comorozetes atavisticus* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

- *Comorozetes concurvatus* Mahunka, 1999

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Comorozetes corrugatus* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Cosmozetes Balogh y Mahunka, 1969 (16 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmozetes striatissimus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

Cosmozetes (Cosmozetes) Balogh y Mahunka, 1969 (10 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cosmozetes (C.) cubanus* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Cosmozetes (C.) damjanovichi* Mahunka, 2005

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Cosmozetes (C.) ecuadoriensis* P. Balogh, 1989

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Cosmozetes (C.) instans* Mahunka, 2005

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Cosmozetes (C.) jaccoudi* Mahunka, 1998

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Cosmozetes (C.) negroi* Balogh y Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Cosmozetes (C.) rohri* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas).

- *Cosmozetes (C.) simplisetosus* Mahunka, 2005

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Cosmozetes (C.) striatissimus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

- *Cosmozetes (C.) vermiculatus* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Rhopalozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).

Cosmozetes (Magoebazetes) Engelbrecht, 1973 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Magoebazetes magoebaensis* Engelbrecht, 1973

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Cosmozetes (Magoebazetes) cornutus* (Mahunka, 1999) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Cosmozetes (Magoebazetes) engelbrechti* (Mahunka, 1985) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Cosmozetes (Magoebazetes) magoebaensis* (Engelbrecht, 1973) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Cosmozetes (Magoebazetes) natalensis* (Engelbrecht, 1973) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Cosmozetes (Magoebazetes) pentasetarum* (Engelbrecht, 1973) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Cosmozetes (Magoebazetes) reticulatus* (Balogh, 1962) (*Rhopalozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Cuspitigula Hammer, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cuspitigula stellifer* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Cuspitigula stellifer* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Dinozetes Balogh, 1962 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dinozetes mirabilis* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Dinozetes latissimus* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Dinozetes mirabilis* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Fusozetes Balogh, 1972 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Rhopalozetes fusiger* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Fusozetes fusiger* (Balogh, 1962) (*Rhopalozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Hauserozetes Mahunka, 1980 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Hauserozetes mausiae* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Hauserozetes mausiae* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

Hymenozetes Balogh, 1964 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Hymenozetes mirabilis* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Hymenozetes csuzdii* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenozetes mirabilis* Balogh, 1964

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenozetes quadricornutus* Mahunka, 1993

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenozetes reticulatus* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenozetes stellifer* Mahunka, 1999

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Hymenozetes verticillatus* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Kalyptrazetes Balogh, 1972 (5 spp.)

(=*Allozetes* Higgins, 1965, "nom. praeoc." por Berlese, 1913)

ESPECIE TIPO: *Allozetes harpezus* Higgins, 1965

DISTRIBUCIÓN: Neártica meridional y Norte de Neotropical.

- *Kalyptrazetes americanus* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).
- *Kalyptrazetes bifurcatus* Ermilov y Friedrich, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Kalyptrazetes desaussurei* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Kalyptrazetes harpezus* (Higgins, 1965) (*Allozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Kalyptrazetes lupitae* Mahunka y Palacios-Vargas, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Méjico e I. Galápagos).

Kaszabozetes Mahunka, 1988 (2 spp.)

(=*Sinozetes* Mahunka, 2000)

ESPECIE TIPO: *Kaszabozetes velatus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Kaszabozetes botulus* (Mahunka, 2000) (*Sinozetes*)
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Kaszabozetes velatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Licnozetes Balogh y Mahunka, 1969 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Licnozetes flabellatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Licnozetes (Licnozetes) Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Licnozetes (L.) flabellatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licnozetes (L.) multiareolatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Licnozetes (Undulozetes) Balogh y Mahunka, 1969 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Undulozetes granulatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Licnozetes (Undulozetes) granulatus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Licnozetes (Undulozetes) margaritatus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Licnozetes (Undulozetes) topali* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Rhopalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Microzetes Berlese, 1913 (36 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Tectoribates) mirandus* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y tropical (excepto Australiana).

Microzetes (Microzetes) Berlese, 1913 (23 spp.)

(=*Nellacaroides* Mahunka, 1998)

(=*Nellacarus* Grandjean, 1936)

(=*Teraja* Mahunka, 1995)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Paleotropical.

- *Microzetes (M.) adansonii* (Lions, 1966) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Microzetes (M.) asiaticus* (Krivolutsky, 1975) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (España, Ucrania, y Asia centrooccidental).
- *Microzetes (M.) asymmetricus* (Mahunka, 2001) (*Teraja*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (M.) baloghi* (Jeleva, 1962) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e Irán.
- *Microzetes (M.) castrii* (Mahunka, 1966) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Microzetes (M.) caucasicus* (Krivolutsky, 1967) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Microzetes (M.) costulatus* (Travé, 1956) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Microzetes (M.) hellenicus* (Mahunka, 1977) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.

- *Microzetes (M.) lunaris* (Aoki, 1984) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Microzetes (M.) mirandus* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes (Tectoribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Microzetes (M.) petrocoriensis* (Grandjean, 1936) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Microzetes (M.) phitosi* (Mahunka, 1979) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Grecia y España).
- *Microzetes (M.) pyrenaicus* (Travé, 1956) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Microzetes (M.) raczi* Mahunka, 1991
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Microzetes (M.) rugosus* (Mahunka, 1986) (*Megazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (M.) samarensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Microzetes (M.) septentrionalis* (Kunst, 1963) (*Nellacarus*)
(=*Nellacarus latens* Moritz, 1964)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Microzetes (M.) sestai* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Grecia.
- *Microzetes (M.) simplisetus* (Mahunka, 1998) (*Nellacaroides*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda y Marruecos.
- *Microzetes (M.) singaporensis* Subías, 2017
(=*Microzetes flagellifer* Mahunka, 1989, “nom. praeoc.” por Mahunka, 1988)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Microzetes (M.) sungai* Mahunka, 1997 (*Teraja*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (M.) tuberculatus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (M.) viedmai* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

***Microzetes (Megazetes)* Balogh, 1959 (9 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Megazetes micropterus* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Microzetes (Megazetes) eckeri* (Mahunka, 1982) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Microzetes (Megazetes) fimbriatus* Mahunka, 1988 (*Micr.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Microzetes (Megazetes) flagellifer* (Mahunka, 1988) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (Megazetes) lineatus* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2010) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Microzetes (Megazetes) micropterus* (Balogh, 1959) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Microzetes (Megazetes) pocsi* (Mahunka, 1998) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Uganda.
- *Microzetes (Megazetes) scriptus* (Mahunka, 1988) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (Megazetes) tanzicus* (Mahunka, 1983) (*Meg.*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Microzetes (Megazetes) wongi* (Mahunka, 1995) (*Teraja*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

***Microzetes (Stylozetes)* Balogh y Mahunka, 1969 (4 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Stylozetes physoseta* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Microzetes (Stylozetes) discrepans* (Balogh, 1962) (*Nellacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Microzetes (Stylozetes) physoseta* (Balogh y Mahunka, 1969) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Microzetes (Stylozetes) processus* (Balogh y Mahunka, 1977) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Microzetes (Stylozetes) spinosus* (Balogh y Mahunka, 1981) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Paraguay.

Mirabilozetes Mahunka, 1977 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Mirabilozetes dentatus* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Mirabilozetes dentatus* Mahunka, 1977

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Miracarus Kunst, 1959 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Miracarus hurkai* Kunst, 1959

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Miracarus hurkai* Kunst, 1959

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (excepto Oeste).

- *Miracarus longisetosus* Subías y Shtanchaeva, 2012

DISTRIBUCIÓN: España.

Mystacozetes Balogh, 1962 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Mystacozetes ornatus* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mystacozetes nervosus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Acaroceras*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Mystacozetes ornatus* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Mysterozetes Hammer, 1961 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Mysterozetes scapulatus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mysterozetes scapulatus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Orthozetes Balogh, 1962 (4 spp.)ESPECIE TIPO: *Orthozetes dispar* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

- *Orthozetes bidentatus* Ermilov, Sandmann y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Orthozetes depilatus* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Orthozetes dispar* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Maharashtra).

- *Orthozetes papuanus* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Oxyzetes Balogh, 1958 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Oxyzetes pectiniger* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Oxyzetes pectiniger* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Congo.

Papuazetes Balogh, 1968 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Papuazetes insignis* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Papuazetes insignis* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Phylacozetes Grandjean, 1936 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Phylacozetes membranulifer* Grandjean, 1936

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Phylacozetes ensifer* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Phylacozetes membranulifer* Grandjean, 1936

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Phylacozetes quadridentatus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Physozetes Mahunka, 2008 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Physozetes inflatus* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Physozetes inflatus* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Plumozetes Balogh, 1972 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Rhopalozetes plumifer* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Plumozetes plumifer* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Rhopalozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Protozetes Balogh, 1962 (4 spp. y 1 ssp.)ESPECIE TIPO: *Protozetes capitulum* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Protozetes capitulum* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Protozetes clavatus* Mahunka y Palacios-Vargas, 1996
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- Protozetes digitifer* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Protozetes digitifer digitifer* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
 - *Protozetes digitifer alticola* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Protozetes longicornis* P. Balogh, 1989
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Rhabdozetes Hammer, 1962 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Rhabdozetes pennatus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rhabdozetes pennatus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.

Rhopalozetes Balogh, 1964 (12 spp.)(=*Austrozetes* Balogh y Mahunka, 1969)ESPECIE TIPO: *Rhopalozetes milloti* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Rhopalozetes bisculpturatus* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rhopalozetes brazilianus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Austrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Paraguay).
- *Rhopalozetes canagaratnami* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rhopalozetes capensis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Rhopalozetes filiferus* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rhopalozetes georgensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Rhopalozetes lokobensis* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhopalozetes madecassus* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhopalozetes maximus* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1994) (*Austrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rhopalozetes milloti* Balogh, 1964
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Rhopalozetes panabokkei* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rhopalozetes witfonteinensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Rugozetes Balogh, 1960 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Microzetes grandjeani* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Rugozetes gladiator* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Rugozetes grandjeani* (Balogh, 1959) (*Microzetes*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Schalleria Balogh, 1962 (14 spp.)

ESPECIE TIPO: *Schalleria sexcornuta* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Schalleria bacillifera* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Schalleria brevisetosa* Ermilov, Sandmann y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Schalleria cruciata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Brasil).
- *Schalleria csuzdii* Mahunka, 2005
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Schalleria forceps* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Schalleria incurvata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Schalleria latilamellata* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Schalleria martii* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Schalleria mexicana* Mahunka y Palacios-Vargas, 1996
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Schalleria monoceros* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Schalleria pectinata* Ermilov, Sandmann y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Schalleria ramosa* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Schalleria sexcornuta* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Schalleria trifurcata* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Schalleriella Engelbrecht, 1972 (4 spp.)

(=*Mahunkaceras* J. y P. Balogh, 2002)

(=*Megazetes* Mahunka, 1993, "nom. praeoc." por Balogh, 1959)

ESPECIE TIPO: *Schalleriella gravouwensis* Engelbrecht, 1972

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Schalleriella gravouwensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Schalleriella nosybe* (Mahunka, 1993) (*Megazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Schalleriella phaseola* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Schalleriella vietnamica* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Schizozetes Balogh, 1962 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Schizozetes quadrilineatus* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Schizozetes quadrilineatus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (India: Tripura).
- *Schizozetes similis* Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Sturmozetes J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

(=*Gymnozetes* P. Balogh, 1984, "nom. praeoc." por Călugăr y Vasiliu, 1983)

ESPECIE TIPO: *Gymnozetes marginatus* P. Balogh, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Sturmozetes longisetus* (P. Balogh, 1989) (*Gymnozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Sturmozetes marginatus* (P. Balogh, 1984) (*Gymnozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Colombia.

Szentivanyella Balogh y Mahunka, 1969 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Szentivanyella latilamellata* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Szentivanyella africana* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Szentivanyella latilamellata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Szentivanyella szentivanyi* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.

Trichozetes Balogh y Mahunka, 1980 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Trichozetes neotrichus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Trichozetes neotrichus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Vermacarus Balogh y Mahunka, 1980 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Vermacarus longissimus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
- *Vermacarus armatus* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Vermacarus longissimus* Balogh y Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Achipterioidea Thor, 1929

Achipteriidae Thor, 1929 (7 gen., 4 subg., 90 spp. y 5 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica y Pantropical (excepto Australiana).

Achipteria Berlese, 1885 (32 spp. y 2 sspp.)
ESPECIE TIPO: (*Oribata nicoleti* Berlesle, 1883) = *Acarus coleopratus* Linnaeus, 1758
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Paleotropical).

- Achipteria (Achipteria)** Berlese, 1885 (29 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Paleotropical).
- Achipteria (A.) armata* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Achipteria (A.) armata armata* (Banks, 1895)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Achipteria (A.) armata spinosa* Jacot, 1938 “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Achipteria (A.) baleensis* Ermilov, Rybalov y Kemal, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Achipteria (A.) bentonensis* Marshall, Reeves y Norton, 1987
(= *Achipteria oregonensis borealis* Ewing, 1918, “nom. praeoc.” por Banks, 1898)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
 - *Achipteria (A.) bicarinata* Moskacheva, 1973
DISTRIBUCIÓN: Bielorrusia.
 - *Achipteria (A.) borealis* (Banks, 1898) (*Oribatella*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
 - *Achipteria (A.) catskillensis* Nevin, 1977
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
 - *Achipteria (A.) clarencei* Nevin, 1977
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
 - Achipteria (A.) coleoprata* (Linnaeus, 1758) (*Acarus*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional), India (Sikkim) e I. Santa Helena.
 - *Achipteria (A.) coleoprata coleoprata* (Linnaeus, 1758)
(= *Oribata intermedia* Michael, 1898)
(= *Oribata nicoleti* Berlese, 1883)
(= *Oribata ovalis* Nicolet, 1855, “nom. praeoc.” por Koch, 1835)
(= *Oribata redux* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y Neártica septentrional), India (Sikkim) e I. Santa Helena.
 - *Achipteria (A.) coleoprata major* Mihelčič, 1963 “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Achipteria (A.) cucullata* Moskacheva, 1973
DISTRIBUCIÓN: Bielorrusia.
 - *Achipteria (A.) curta* Aoki, 1970
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional) y Oriental (China suroriental y Vietnam).
 - *Achipteria (A.) elegans* Schweizer, 1956 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Achipteria* (A.) *gigantea* S. y A. Seniczak, 2016

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Achipteria* (A.) *hasticeps* (Hull, 1914) (*Oribata*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

- *Achipteria* (A.) *holomonensis* Cancela da Fonseca y Stamou, 1987

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Achipteria* (A.) *italica* (Oudemans, 1914) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Europea.

- *Achipteria* (A.) *languida* (Nicolet, 1855) (*Oribata*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Francia.

- *Achipteria* (A.) *longesensillus* Schweizer, 1956 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Achipteria* (A.) *longisetosa* Weigmann y Murvanidze, 2003

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Achipteria* (A.) *moderatio* Berlese, 1923 (*A. nitens* m.) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Francia.

- *Achipteria* (A.) *nitens* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)

("non" *Oribata nitens* Gervais, 1844)

(=*Achipteria acuta* Berlese, 1908)

(=*Notaspis anglicus* Oudemans, 1914)

(=*Notaspis mixtus* Sellnick, 1943)

(=*Oribata nitens* L. Koch, 1879, "nom. praec." por Gervais, 1844)

(=*Achipteria nitens* Kishida, 1930, "nom. praec." por Nicolet, 1855)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).

- *Achipteria* (A.) *oregonensis* Ewing, 1918

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).

- *Achipteria* (A.) *oudemansi* Jacot, 1929 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Achipteria* (A.) *praeoccupata* Subías, 2004

(=*Achipteria oudemansi* Hammen, 1952, "nom. praec." por Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Achipteria* (A.) *quadridentata* (Willmann, 1951) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.

- *Achipteria* (A.) *regalis* Berlese, 1908 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Achipteria* (A.) *sellnicki* Hammen, 1952

DISTRIBUCIÓN: Europea y Mongolia.

- *Achipteria* (A.) *serrata* Hirauchi y Aoki, 1997

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Achipteria* (A.) *sumatrensis* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

- *Achipteria* (A.) *verrucosa* Rjabinin, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

***Achipteria* (*Izuachipteria*)** Balogh y Mahunka, 1979 (3 spp.)

(=***Hokkachipteria*** Balogh y Mahunka, 1979)

ESPECIE TIPO: *Achipteria imperfecta* Suzuki, 1972

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y Oriental.

- *Achipteria* (*Izuachipteria*) *alpestris* (Aoki, 1973) (A.)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Achipteria* (*Izuachipteria*) *imperfecta* (Suzuki, 1972) (A.)

DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].

- *Achipteria* (*Izuachipteria*) *setulosa* Golosova, 1981 (A.)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Anachipteria Grandjean, 1932 (17 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Anachipteria deficiens* Grandjean, 1932

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

***Anachipteria* (*Anachipteria*)** Grandjean, 1932 (14 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

Anachipteria (A.) *achipteroides* (Ewing, 1913) (*Oribatella*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. y Japón).

- *Anachipteria* (A.) *achipteroides achipteroides* (Ewing, 1913)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. septentrional y Japón).

- *Anachipteria* (A.) *achipteroides australoides* Jacot, 1938 "ssp. inq."

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Anachipteria* (*A.*) *acuta* (Ewing, 1918) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.
- *Anachipteria* (*A.*) *aegyptiaca* Abd-el-Hamid, 1964
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Anachipteria* (*A.*) *deficiens* Grandjean, 1932
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Anachipteria* (*A.*) *geminus* Lindo, Clayton y Behan-Pelletier, 2008
DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.
- *Anachipteria* (*A.*) *grandis* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Este de Paleártica oriental) y Nepal.
- *Anachipteria* (*A.*) *howardi* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes*)
(=*Anachipteria achipteroides milleri* Jacot, 1936)
(=*Oribata corpuscula* Ewing, 1908)
(=*Sphaerozetes latitectus* Berlese, 1908)
(=*Oribata major* Mihelčič, 1956)
(=*Oribata perisi* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Asia centrooccidental y Neártica).
- *Anachipteria* (*A.*) *magnilamellata* (Ewing, 1909) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica centrooriental.
- *Anachipteria* (*A.*) *major* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”
 (“non” *Oribata major* Mihelčič, 1956, =*Anachipteria perisi*)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Anachipteria* (*A.*) *pratensis* Scull, Jeleva y Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Anachipteria* (*A.*) *shtanchaevae* Subías, 2009
(=*Oribata tecta alpina* Schweizer, 1922, “nom. praec.” por Halbert, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Anachipteria* (*A.*) *signata* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
(=*Oribatella achipteroides australis* Ewing, 1917)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.
- *Anachipteria* (*A.*) *svetlanae* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Anachipteria* (*A.*) *valida* (Banks, 1910) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).

***Anachipteria* (*Hoffmanacarus*)** Mahunka, 1995 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Hoffmanacarus virginianus* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Anachipteria* (*Hoffmanacarus*) *virginiana* (Mahunka, 1995) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia).

***Anachipteria* (*Weigmanniella*)** Subías, 2010 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Anachipteria dubia* Weigmann, 2001

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Anachipteria* (*Weigmanniella*) *dubia* Weigmann, 2001 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Anachipteria* (*Weigmanniella*) *sacculifera* Root, Kawahara y Norton, 2007 (*A.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

Campachipteria Aoki, 1995 (21 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Campachipteria uenoi* Aoki, 1995

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

***Campachipteria* (*Campachipteria*)** Aoki, 1995 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Campachipteria uenoi* Aoki, 1995

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical.

- *Campachipteria* (*C.*) *brevisetosa* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Campachipteria* (*C.*) *uenoi* Aoki, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).

***Campachipteria* (*Triachipteria*)** Subías, 2017 (19 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Parachipteria petiti* Travé, 1960

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Campachipteria* (*Triachipteria*) *barguzini* (Golosova y Karppinen, 1984) (*Parachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.
- *Campachipteria* (*Triachipteria*) *bella* (Sellnick, 1928) (*Notaspis*)

- DISTRIBUCIÓN: Holártica.
Campachipteria (Triachipteria) distincta (Aoki, 1959) (*Achipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Oriental.
 - *Campachipteria (Triachipteria) distincta distincta* (Aoki, 1959)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Oriental (China suroriental y Vietnam).
 - *Campachipteria (Triachipteria) distincta incurva* (Aoki, 1991) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Campachipteria (Triachipteria) ewingi* (Berlese, 1910) (*Achipteria nicoleti e.*)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
 - *Campachipteria (Triachipteria) fanzagoi* (Jacot, 1929) (*Achipteria*)
 (= *Parachipteria willmanni* Hammen, 1952)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia) y Centroamérica.
 - *Campachipteria (Triachipteria) heintoogensis* (Nevin, 1979) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Campachipteria (Triachipteria) hummelincki* Ermilov, 2016 (C.)
 DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
 - *Campachipteria (Triachipteria) neotropicalis* (Mahunka, 1983) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Campachipteria (Triachipteria) nivalis* (Hammer, 1952) (*Achipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa oriental, Paleártica oriental y Neártica septentrional).
 - *Campachipteria (Triachipteria) patavina* (Oudemans, 1914) (*Notaspis*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Rusia asiática).
 - *Campachipteria (Triachipteria) perproxima* (Sellnick, 1931) (*Notaspis*)
 (= *Parachipteria georgica* Murvanidze y Weigmann, 2003)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Campachipteria (Triachipteria) petiti* (Travé, 1960) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
 - *Campachipteria (Triachipteria) savagei* (Nevin, 1976) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Campachipteria (Triachipteria) sgardelisi* (S. y A. Seniczak, 2017) (*Achipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Grecia.
 - *Campachipteria (Triachipteria) sibirica* (Krivolutsky y Grishina, 1970) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Rusia asiática.
 - *Campachipteria (Triachipteria) snowdonensis* (Colloff y Seyd, 1987) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Campachipteria (Triachipteria) travei* (Nevin, 1977) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Campachipteria (Triachipteria) truncata* (Aoki, 1976) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Campachipteria (Triachipteria) weigmanni* (Pérez-Íñigo, 1987) (*Parachipteria*)
 DISTRIBUCIÓN: I. Azores.

Cerachipteria Grandjean, 1935 (5 spp. y 1 ssp.)

(= *Zygachipteria* Mihelčič, 1956)

ESPECIE TIPO: *Cerachipteria digita* Grandjean, 1935

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Cerachipteria digita Grandjean, 1935

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.

- *Cerachipteria digita digita* Grandjean, 1935

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.

- *Cerachipteria digita jugata* Mihelčič, 1956 (C. (*Zygachipteria*) j.)

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Cerachipteria franzi* Willmann, 1953

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Cerachipteria iturrondobeitai* A. y S. Seniczak, 2017

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Cerachipteria minuscula* (Berlese, 1902) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Cerachipteria pyrenaica* Pérez-Íñigo jr., 1991 (C. *digita* p.)

(?= *Cerachipteria fusiger* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: España.

Cubachipteria Balogh y Mahunka, 1979 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Achipteria (Cubachipteria) remota* Balogh y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.

- *Cubachipteria bispina* (Călugăr, 1990) (*Achipteria* (C.))

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Cubachipteria gaoligongensis* Tang, Yang y Liang, 2015
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cubachipteria maxsellnicki* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Cubachipteria mayariana* (Palacios-Vargas y Socarrás, 2001) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Cubachipteria pianmaensis* Tang, Yang y Liang, 2015
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Cubachipteria remota* (Balogh y Mahunka, 1979) (*Achipteria* (C.))
DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Dentachipteria Nevin, 1974 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dentachipteria ringwoodensis* Nevin, 1974

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Dentachipteria highlandensis* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Dentachipteria ringwoodensis* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).

Parachipteria Hammen, 1952 (7 spp.)

(=*Pseudachipteria* Travé, 1960)

ESPECIE TIPO: *Oribata punctata* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Parachipteria agenjoi* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Pseudachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Parachipteria floresiana* (Pérez-Íñigo, 1992) (*Pseudachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Parachipteria insularis* (Pérez-Íñigo, 1992) (*Pseudachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Parachipteria magna* (Sellnick, 1928) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Parachipteria orientalis* (Mondal y Kundu, 1999) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Parachipteria ovalis* (Koch, 1835) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
- *Parachipteria punctata* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Santa Helena.

Tegoribatidae Grandjean, 1954 (11 gen., 35 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Lemurobates Mahunka, 1997 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Lemurobates antsiranana* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Lemurobates antsiranana* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Neophysobates Luxton, 1987 (5 spp.)

(=*Paraphysobates* Luxton, 1985, “nom. praeoc.” por Mahunka, 1985)

(=*Pseudophysobates* Fujikawa, 1991)

ESPECIE TIPO: *Physobates monodactylus* Hammer, 1966

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Neotropical).

- *Neophysobates incrassatus* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neophysobates monodactylus* (Hammer, 1966) (*Physobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Neophysobates montanus* (Engelbrecht, 1986) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neophysobates nudus* (Engelbrecht, 1986) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Neophysobates zealandicus* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Paraphysobates Mahunka, 1985 (2 spp.)

(=*Monophysobates* J. y P. Balogh, 1992)

ESPECIE TIPO: *Paraphysobates abditus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Paraphysobates abditus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paraphysobates natalensis* (Engelbrecht, 1986) (*Tectoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Physobates Hammer, 1962 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Physobates spinipes* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Physobates spinipes* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Plakoribates Popp, 1960 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Plakoribates multicuspidatus* Popp, 1960

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Plakoribates africanus* (Balogh, 1959) (*Tectoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Plakoribates asiaticus* Ermilov y Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Plakoribates confluens* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Plakoribates multicuspidatus* Popp, 1960
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Plakoribates neotropicus* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Plakoribates scutatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

Protectoribates Behan-Pelletier, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Protectoribates occidentalis* Behan-Pelletier, 2017

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Protectoribates occidentalis* Behan-Pelletier, 2017
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

Pseudotectoribates Subías, 1977 (2 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: (*Pseudotectoribates bellus* Subías, 1977) = *Anachipteria subsimilis* Mihelčič, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Pseudotectoribates minidentatus* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Pseudotectoribates subsimilis* (Mihelčič, 1956) (*Anachipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.
- *Pseudotectoribates subsimilis subsimilis* (Mihelčič, 1956)
(= *Pseudotectoribates bellus* Subías, 1977)
(= *Anachipteria kittenbergeri* Balogh, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán) y Etiópica (Tanzania y Sudáfrica).
- *Pseudotectoribates subsimilis striatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008 (*P. kittenbergeri* s.)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Scutozetes Hammer, 1952 (3 spp.)

(= *Neolepidozetes* Hammer, 1977)

ESPECIE TIPO: *Scutozetes lanceolatus* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Scutozetes clavatosensillus* Ermilov, Martens y Tolstikov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Scutozetes lanceolatus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional: frecuente, Paleártica occidental: Mediterránea oriental, y Paleártica oriental: frecuente) y Surinám.
- *Scutozetes ovalis* (Hammer, 1977) (*Neolepidozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Corea.

Tectoribates Berlese, 1910 (8 spp.)

(= *Anoribatella* Kunst, 1962)

ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Tectoribates) proximus* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Tectoribates alcecampestris* Behan-Pelletier y Walter, 2013
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Tectoribates borealis* Behan-Pelletier y Walter, 2013

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Tectoribates campestris* Behan-Pelletier y Walter, 2013

DISTRIBUCIÓN: Este de Canadá y U.S.A. (Kansas).

- *Tectoribates deserticola* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Anoribatella*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Tectoribates mahunkai* (Aoki, 1974) (*Anachipteria*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y China suroriental.

- *Tectoribates mongolicus* Bayartogtokh, 1997

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Tectoribates ornatus* (Schuster, 1958) (*Anachipteria*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical (Argentina y Uruguay).

- *Tectoribates proximus* (Berlese, 1910) (*Spaerozetes* (*T.*))

(=*Tectoribates punctatus* Sellnick, 1943)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Tegoribates Ewing, 1917 (5 spp.)

(=*Lepidoribates* Sellnick, 1920)

ESPECIE TIPO: *Tegoribates subniger* Ewing, 1917

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.

- *Tegoribates americanus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional (frecuente), Este de Rusia asiática, Argentina y Vietnam.

- *Tegoribates bryophilus* Woolley, 1965

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).

- *Tegoribates latirostris* (Koch, 1844) (*Zetes*)

(=*Oribata alzanii* Coggi, 1900)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Sur).

- *Tegoribates subniger* Ewing, 1917

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Indiana).

- *Tegoribates walteri* Behan-Pelletier, 2017

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).

Williamszetes Hammer, 1961 (1 sp.)

(=*Williamsia* Hammer, 1958, "nom. praeoc." por Carus, 1890)

ESPECIE TIPO: *Williamsia elsosneadensis* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Williamszetes elsosneadensis* (Hammer, 1958) (*Williamsia*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Epactozetidae Grandjean, 1930 (2 gen. y 8 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Epactozetes Grandjean, 1930 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Epactozetes imitator* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Epactozetes imitator* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Epactozetes setosus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Truncozetes Balogh y Mahunka, 1969 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Truncozetes mucronatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Truncozetes ecuadoriensis* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Ecuador y Perú).

- *Truncozetes monodactylus* Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Truncozetes mucronatus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Truncozetes paraecuadoriensis* Ermilov, Alvarado-Rodríguez y Retana-Salazar, 2015

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Truncozetes rugosus* Mahunka, 1998

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Truncozetes sturmi* P. Balogh, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Oribatelloidea Jacot, 1925

Oribatellidae Jacot, 1925 (8 gen., 6 subg., 156 spp. y 2 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Cuspidozetes Hammer, 1962 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cuspidozetes armatus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cuspidozetes armatus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Ferolocella Grabowski, 1971 (2 spp.)

(=*Gendzella* Kulijev, 1977)

ESPECIE TIPO: (*Oribatella carolina* Banks, 1947) =*Oribatella tessellata* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Ferolocella cribraria* (Kulijev, 1977) (*Gendzella*)

(=*Oribatella sitnikovae* Djaparidze, 1989)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Ferolocella tessellata* (Berlese, 1908) (*Oribatella*)

(=*Oribatella carolina* Banks, 1947)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.

Joelia Oudemans, 1906 (5 spp.)

(=*Coggiella* Berlese, 1916)

ESPECIE TIPO: *Oribata fiorii* Coggi, 1898

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Joelia americana* (Haller, 1884) (*Oribata*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: "Neártica".

- *Joelia appalachia* Behan-Pelletier, 2013

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Virginia Occidental).

- *Joelia dubia* (Kulijev, 1967) (*Oribatella*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Méjico?

- *Joelia fiorii* (Coggi, 1898) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Méjico.

- *Joelia spina* Kulijev, 1979

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Novoribatella Engelbrecht, 1986 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tectoribates transcriptus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental.

- *Novoribatella minutisetarum* Engelbrecht, 1986

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.

- *Novoribatella pentasetarum* Engelbrecht, 1986

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Novoribatella transcripta* (Mahunka, 1985) (*Tectoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ophidiotrichus Grandjean, 1953 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Oribata connexa* Berleser, 1904) =*Oribata tecta* Michael, 1884

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Ophidiotrichus corsicanus* Bernini y Avanzati, 1983

DISTRIBUCIÓN: Francia (Córcega).

- *Ophidiotrichus exastus* Higgins, 1965

DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A..

- *Ophidiotrichus oglasae* Bernini, 1975

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Ophidiotrichus tectus* (Michael, 1884) (*Oribata*)

(=*Notaspis borussicus* Sellnick, 1908)

(=*Oribata connexa* Berlese, 1904)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).

- *Ophidiotrichus ussuricus* Krivolutsky, 1971

DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.

- *Ophidiotrichus vindobonensis* Piffel, 1961 (*O. connexus* v.)

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

Oribatella Banks, 1895 (132 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oribatella quadridentata* Banks, 1895

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Oribatella (Oribatella) Banks, 1895 (100 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Oribatella (O.) abdurachmanovi* Shtanchaeva, 2009

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Oribatella (O.) abhorrens* Weigmann, 2014

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Oribatella (O.) abmi* Behan-Pelletier y Walter, 2012

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.

- *Oribatella (O.) angulosa* Csiszár, 1962

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Oribatella (O.) anomola* Grabowski, 1970

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Dakota del Sur).

- *Oribatella (O.) arabia* Kardar, 1988 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.

- *Oribatella (O.) arctica* Thor, 1930

DISTRIBUCIÓN: Boreal.

- *Oribatella (O.) arctica arctica* Thor, 1930

DISTRIBUCIÓN: Boreal (Eurosiberiana y Neártica septentrional: frecuente).

- *Oribatella (O.) arctica litoralis* Strenzke, 1950

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Euroatlántica y Este de Paleártica oriental).

- *Oribatella (O.) asiatica* Krivolutsky, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

- *Oribatella (O.) avicula* P. Balogh, 1989

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Oribatella (O.) azizia* Kardar y Mattu, 1999 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.

- *Oribatella (O.) banksi* Behan-Pelletier y Walter, 2012

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Oribatella (O.) barbata* Choi, 1986

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Oribatella (O.) berleseii* (Michael, 1898) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental, Este de Rusia asiática y Canadá?

- *Oribatella (O.) berninii* Pérez-Íñigo, 1989

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Oribatella (O.) blocki* Starý, 1995

DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Oribatella (O.) brevicornuta* Jacot, 1934

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica oriental y Japón).

- *Oribatella (O.) brevicuspadata* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Oribatella (O.) brevilamellata* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Oribatella (O.) byzovae* Krivolutsky, 1974

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

- *Oribatella (O.) calcarata* (Koch, 1835) (*Oribata*)

(=*Oribatella decumana* Berlese, 1910)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica, Canadá y "U.S.A").

- *Oribatella (O.) canadensis* Behan-Pelletier y Eamer, 2010

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Oribatella (O.) cespitum* (Koch, 1841) (*Zetes*) "sp. inq."

(=*Zetes morticinus* Koch, 1841)

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Oribatella (O.) dechambrieri* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Oribatella (O.) ewingi* Behan-Pelletier y Walter, 2012

DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Oribatella (O.) exilicornis* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Oribatella (O.) extensa* Jacot, 1934 (*O. brevicornuta e.*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A.

- *Oribatella (O.) flagellata* Behan-Pelletier, 2011

DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.

- *Oribatella (O.) foliata* Krivolutsky, 1974

(=*Oribatella brevipila* Bernini, 1977)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Este de Rusia oriental).

- *Oribatella (O.) jerdweigmanni* Ermilov y Anichkin, 2012

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Oribatella (O.) gigantea* Berlese, 1916 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Oribatella (O.) gomerae* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) heatherae* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Oribatella (O.) ichnusae* Bernini y Avanzati, 1983
DISTRIBUCIÓN: Italia (Cerdeña).
- *Oribatella (O.) illuminata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile) y Vietnam.
- *Oribatella (O.) incisa* Dalenius, 1963
DISTRIBUCIÓN: Suecia.
- *Oribatella (O.) incurvata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Oribatella (O.) inflexa* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) jacoti* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Oribatella (¿O.?) kashmiriensis* Kardar, 1975
DISTRIBUCIÓN: Cachemira.
- *Oribatella (O.) krivolutskiyi* Karppinen y Shtanchaeva, 1987
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso e Irán.
- *Oribatella (O.) kunsti* Bernini, 1972
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatella (O.) linjiangensis* Gao y Wen, 1992
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Oribatella (O.) longispina* Berlese, 1914
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
- *Oribatella (O.) luisae* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Oribatella (O.) madagascarensis* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Oribatella (O.) mahani* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) malaya* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Oribatella (O.) manningensis* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) maryae* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) mediocris* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Oribatella (O.) microfoveolata* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
- *Oribatella (O.) minuta* Banks, 1896
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Mongolia.
- *Oribatella (O.) monospicus* Wharton, 1938
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Oribatella (O.) neonominata* Subías, 2004
(=*Oribatella longisetosa* Fernández y Alzuet, 1978, “nom. praeoc.” por Hammer, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).
- *Oribatella (O.) nigra* Kulijev, 1967
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatella (O.) nugarica* Bernini y Avanzati, 1983
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatella (O.) oregonensis* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
- *Oribatella (O.) orientalis* Choi y Aoki, 1993
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Oribatella (O.) palustris* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (América austral y Méjico) y subantártica (I. Malvinas [I. Falkland]).
- *Oribatella (O.) parallelus* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.
- *Oribatella (O.) paraumaetluisorum* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Oribatella (O.) pawnee* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.

- *Oribatella (O.) phyllophora* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Oribatella (O.) prolongata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Oribatella (O.) puertomontensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Oribatella (O.) punctata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oribatella (O.) punctulata* Balogh, 1958 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Oribatella (O.) pusilla* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
- *Oribatella (O.) quadricornuta* (Michael, 1880) (*Oribata*)
(?= *Oribata flammula* Koch, 1839 “sp. inq.”)
(?= *Oribata quadricuspis* Grube, 1859 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente.
- *Oribatella (O.) quadridentata* Banks, 1895
(= *Oribatella magniseta* Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Europa: Rumanía).
- *Oribatella (O.) quadrispinata* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oribatella (O.) reducta* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatella (O.) reticulata* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional: Europa centromeridional, Paleártica oriental meridional y U.S.A. oriental.
- *Oribatella (O.) reticulatoides* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Neártica septentrional y Noreste de Siberia.
- *Oribatella (O.) rossica* (Krivolutsky, 1974) (*Fenestrobatas*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional y Cáucaso.
- *Oribatella (O.) rugosula* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Oribatella (O.) sardoa* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatella (O.) sculpturata* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatella (O.) serrata* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Oribatella (O.) shaldybiniae* Rjabinin, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Oribatella (O.) similesuperbula* Weigmann, 2001
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Oribatella (O.) similis* Fujikawa, 1990
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribatella (O.) sintranslamella* Behan-Pelletier y Walter, 2012
DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
- *Oribatella (O.) strinatii* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Guatemala.
- *Oribatella (O.) szemesi* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Oribatella (O.) szunyoghyi* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Oribatella (O.) talpae* (Štorkán, 1923) (*Galumma*)
DISTRIBUCIÓN: Chequia.
- *Oribatella (O.) tenerifensis* Pérez-Íñigo, 1986
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatella (O.) texana* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
- *Oribatella (O.) transtriata* Behan-Pelletier, 2011
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neártica.
- *Oribatella (O.) triangulata* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatella (O.) trichoptera* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Oribatella (O.) tridactyla* Ruiz, Subías y Kahwash, 1991
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Oribatella (O.) tyrrhenica* Bernini, 1975

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

- *Oribatella (O.) umaetluisorum* Ermilov y Anichkin, 2012

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Oribatella (O.) undulata* Choi, 1986

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Oribatella (O.) unispinata* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Bolivia e India (Tripura).

- *Oribatella (O.) vicina* (Rjabinin, 1975) (*Fenestrobates*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.

- *Oribatella (O.) willmanni* Subías y Gil-Martín, 1995

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Oribatella (O.) yukonensis* Behan-Pelletier y Walter, 2012

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Canadá.

- *Oribatella (O.) zsilavii* Mahunka, 2008

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

Oribatella (Bioribatella) Subías, 2017 (4 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oribatella crassipilosa* Bernini, 1975

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Oriental.

- *Oribatella (Bioribatella) crassipilosa* Bernini, 1975 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

- *Oribatella (Bioribatella) dentaticuspis* Ewing, 1909 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.

- *Oribatella (Bioribatella) hungarica* Balogh, 1943 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Oribatella (Bioribatella) superbula (Berlese, 1904) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Norte de Oriental.

- *Oribatella (Bioribatella) superbula superbula* (Berlese, 1904)

(=*Oribatella meridionalis* Berlese, 1908)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, y Paleártica oriental meridional) y Norte de Oriental.

- *Oribatella (Bioribatella) superbula longisetosa* Hammer, 1977 (*O. meridionalis l.*)

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

Oribatella (Fberninia) Özdikmen, 2008 (1 sp.)

(=*Cavernella* Bernini, 1975, "nom. praeoc." por Morozova, 1975)

(=*Berniniella* Özdikmen, 2008, "nom. praeoc." por Balogh, 1983)

ESPECIE TIPO: *Cavernella helenae* Bernini, 1975

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Oribatella (Fberninia) helenae* (Bernini, 1975) (*Cavernella*)

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

Oribatella (Fenestrobates) Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Fenestrobates capucinus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Oribatella (Fenestrobates) capucinus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*F.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).

- *Oribatella (Fenestrobates) marauni* (Ermilov y Behan-Pelletier, 2014) (*F.*)

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Oribatella (Monoribatella) Subías, 2017 (19 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata ornata* Coggi, 1900

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Oribatella (Monoribatella) brevicuspis* Bernini, 1972 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

- *Oribatella (Monoribatella) bulanovae* Kulijev, 1962 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.

- *Oribatella (Monoribatella) colchica* Krivolutsky, 1974 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Oribatella (Monoribatella) dudichi* Willmann, 1938 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Europa centrooriental.

- *Oribatella (Monoribatella) eutricha* Berlese, 1908 (*O.*)

(=*Oribatella producta quadrimucronata* Berlese, 1910)

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Oribatella (Monoribatella) heterodentata* Karppinen y Shtanchaeva, 1987 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Oribatella (Monoribatella) jucunda* Călugăr, 1987 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Oribatella (Monoribatella) metzi* Behan-Pelletier, 2011 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.

- *Oribatella (Monoribatella) molodovi* Krivolutsky, 1971 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Oribatella (Monoribatella) nortoni* Behan-Pelletier, 2011 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.

- *Oribatella (Monoribatella) ornata* (Coggi, 1900) (*Oribata*)

(=*Oribatella producta* Berlese, 1908)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).

- *Oribatella (Monoribatella) parvula* Bernini, 1974 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Oribatella (Monoribatella) plummeri* Jacot, 1934 (*O. brevicornuta* p.)

DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

- *Oribatella (Monoribatella) pulchra* Bernini, 1974 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

- *Oribatella (Monoribatella) serrula* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Oribatella (Monoribatella) sexdentata* Berlese, 1916 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa, Este de Rusia asiática y U.S.A.: Virginia).

- *Oribatella (Monoribatella) szaboi* Balogh y Mahunka, 1979 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Oribatella (Monoribatella) tenuis* Csiszár, 1962 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Oribatella (Monoribatella) valeriae* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

Oribatella (Multoribatella) Subías, 2004 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribatella bromeliarum* Behan-Pelletier y Paoletti, 1993

DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Paleártica y Oriental.

- *Oribatella (Multoribatella) alami* Kardar, 1975 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Cachemira.

- *Oribatella (Multoribatella) bromeliarum* Behan-Pelletier y Paoletti, 1993 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Oribatella (Multoribatella) kurchevae* Krivolutsky, 1974 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Oribatella (Multoribatella) pseudonigra* Subías y Shtanchaeva, 2011

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Oribatella (Sacculoribatella) Shtanchaeva y Subías, 2012 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribatella (Sacculoribatella) caspica* Shtanchaeva y Subías, 2012

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Oribatella (Sacculoribatella) caspica* Shtanchaeva y Subías, 2012

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Oribatella (Sacculoribatella) nasuorum* Fujikawa, 2012 (*O.*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Prionoribatella Aoki, 1975 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Anachipteria dentilamellata* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Prionoribatella dentilamellata* (Aoki, 1965) (*Anachipteria*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Prionoribatella impar* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Siciliotrichus Bernini, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Siciliotrichus sculus* Bernini, 1983

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Siciliotrichus sculus* Bernini, 1983

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Ceratokalummidae Balogh, 1970 (5 gen. y 13 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Achipterina Berlese, 1916 (4 spp.)

(=*Ceratokalumma* Balogh, 1970)

ESPECIE TIPO: *Achipteria (Achipterina) oribatelloides* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Achipterina insignis* (Balogh, 1970) (*Ceratokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

- *Achipterina kaszabi* (J. y P. Balogh, 1988) (*Ceratokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Achipterina naisselini* (J. y P. Balogh, 1988) (*Ceratokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e I. Galápagos.

- *Achipterina oribatelloides* (Berlese, 1916) (*Achipteria* (*Achipterina*))

DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Arcozetes Hammer, 1958 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Arcozetes bicuspidatus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Arcozetes bicuspidatus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Arcozetes rotundatus* Mahunka, 2006

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

Cultrobates Willmann, 1930 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cultrobates heterodactylus* Willmann, 1930

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subtropical (Holártica meridional).

- *Cultrobates heterodactylus* Willmann, 1930

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Cultrobates niponicus* Aoki, 1982

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Cultrobates quadricuspidatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.

Genavensia Mahunka, 1983 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Genavensia hungarorum* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Genavensia hungarorum* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

- *Genavensia longiseta* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

Guaranozetes Balogh y Mahunka, 1981 (2 spp.)

(=**Belemacarus** Pérez-Íñigo y Baggio, 1997)

ESPECIE TIPO: *Guaranozetes nudus* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Guaranozetes amazonicus* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1997) (*Belemacarus*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Guaranozetes nudus* Balogh y Mahunka, 1981

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Ceratozetoidea Jacot, 1925

Limnozetidae Thor, 1937 (3 gen., 17 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

Antarcticola Wallwork, 1967 (1 sp.)

(=**Petrozetes** Sitnikova, 1968)

ESPECIE TIPO: *Antarcticola meyeri* Wallwork, 1967

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Antarcticola meyeri* Wallwork, 1967

(=*Petrozetes oblongus* Sitnikova, 1968)

DISTRIBUCIÓN: Antártida.

Limnozetella Willmann, 1932 (2 spp.)

(=**Austroceratobates** Mahunka, 1985)

ESPECIE TIPO: *Limnozetella lamellata* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Limnozetella endroedyi* (Mahunka, 1985) (*Austroceratobates*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Limnozetella lamellata* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Java.

Limnozetes Hull, 1916 (14 spp.)(=*Vietobates* Mahunka, 1987)ESPECIE TIPO: (*Oribata sphagni* Michael, 1880) =*Acarus ciliatus* Schrank, 1803

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica y Australiana).

- *Limnozetes amnicus* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional e Ibérica).

- *Limnozetes atmetos* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Limnozetes borealis* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Limnozetes ciliatus* (Schrank, 1803) (*Acarus*)(=*Limnozetes canadensis* Hammer, 1952)(=*Limnozetes ciliatus foveolatus* Willmann, 1939)(=*Oribata sphagni* Michael, 1880)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y ¿Centroamérica?

- *Limnozetes feuerborni* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

- *Limnozetes guyi* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Limnozetes latilamellatus* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Limnozetes lustrum* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y Europa: Polonia).

- *Limnozetes onondaga* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y España).

- *Limnozetes palmerae* Behan-Pelletier, 1989

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y Europa: Polonia) y Etiópica (Sudáfrica).

- *Limnozetes pustulatus* (Mahunka, 1987) (*Vietobates*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Limnozetes rugosus* (Sellnick, 1925) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (menos frecuente en el Sur) y Japón.

- *Limnozetes silvicola* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú y Japón.

- *Limnozetes similis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1989

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Heterozetidae Kunst, 1971 (11 gen., 1 subg., 49 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Allozetes Berlese, 1913 (8 spp.)ESPECIE TIPO: *Ceratozetes (Allozetes) pusillus* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

- *Allozetes africanus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Allozetes alas* Behan-Pelletier, 1998

DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

- *Allozetes lacandonicus* Mahunka y Palacios-Vargas, 1996

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Allozetes latus* Tseng, 1984

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Allozetes levis* Ohkubo, 1981

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Allozetes philippinensis* Corpuz-Raros y Lit, 2013

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Allozetes pusillus* (Berlese, 1913) (*Ceratozetes* (A.))

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical (Perú).

- *Allozetes translamellatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: Java e "India", Polinesia: I. Samoa, y Venezuela).

Austrachipteria Balogh y Mahunka, 1966 (14 spp.)(=*Parahypozetes* Hammer, 1967)ESPECIE TIPO: *Austrachipteria lamellata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.

- *Austrachipteria bidactyla* (J. y P. Balogh, 1983) (*Parahypozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Austrachipteria bidentata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Austrachipteria breviseta* (J. y P. Balogh, 1983) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria gigantea* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria grandis* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Bengala Occidental).
- *Austrachipteria hammerae* J. y P. Balogh, 1992
(=*Parahypozetes hammerae* Mahunka, 1997, "nom. praeoc." por J. y P. Balogh, 1992)
(=*Parahypozetes lobatus* J. y P. Balogh, 1983, "nom. praeoc." por Hammer, 1967)
(=*Austrachipteria marieae* Colloff y Halliday, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria lamellata* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Austrachipteria lobata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria macrodentata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria maxima* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria novaezealandica* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Austrachipteria phongnhae* Ermilov y Vű, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Austrachipteria pulla* Aoki y Honda, 1985
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Austrachipteria quadridentata* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Farchacarus Wallwork, 1967 (3 spp.)

(=*Africacarus* Wallwork, 1965, "nom. praeoc." por Viets, 1962)

ESPECIE TIPO: *Africacarus calcaratus* Wallwork, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.

- *Farchacarus calcaratus* (Wallwork, 1965) (*Africacarus*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Senegal) y Macaronésica (Cabo Verde).
- *Farchacarus philippinensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Hypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Farchacarus insignis* (Balogh, 1966) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Camerún.

Granizetes Hammer, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Granizetes curvatus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subantártica.

- *Granizetes curvatus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Tierra del Fuego) y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Heterozetes Willmann, 1917 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratozetes (Heterozetes) palustris* Willmann, 1917

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Heterozetes aquaticus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
(=*Heterozetes patchlorum* Habeeb, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Norte de Neotropical.
- *Heterozetes cuspidatus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Heterozetes heleios* Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Heterozetes minnesotensis* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
(=*Heterozetes cayugensis* Habeeb, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Heterozetes palustris* (Willmann, 1917) (*Ceratozetes (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

Lamellobates Hammer, 1958 (13 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: (*Lamellobates palustris* Hammer, 1958) =*Achipteria molecula* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Lamellobates (Lamellobates) Hammer, 1958 (9 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Lamellobates (L.) cuneatus* Mahunka, 2010
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Lamellobates (L.) engelbrechti* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Lamellobates (L.) furcatus* (Hammer, 1967) (*Parahypozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Lamellobates (L.) intermedius* Nübel-Reidelbach y Woas, 1992
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y España.
- Lamellobates (L.) molecula* (Berlese, 1916) (*Achipteria*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
 - *Lamellobates (L.) molecula molecula* (Berlese, 1916)
(=*Lamellobates angolensis* Balogh, 1958)
(=*Lamellobates botari* Balogh y Mahunka, 1977)
(=*Lamellobates gyoergyi* Balogh y Mahunka, 1977)
(=*Lamellobates hauseri* Mahunka 1977)
(=*Lamellobates palustris* Hammer, 1958)
(=*Lamellobates rotundatus* Scull, Jeleva y Cruz, 1984)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
 - *Lamellobates (L.) molecula aegypticus* Bayoumi, 1979 (*L. hauseri a.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Lamellobates (L.) nitidus* Călugăr, 1987
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Lamellobates (L.) ocularis* Jeleva y Vü, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Lamellobates (L.) orientalis* Csiszár, 1961
DISTRIBUCIÓN: Oriental (frecuente) y Paleártica meridional (Egipto y Japón).
- *Lamellobates (L.) reticulatus* Behan-Pelletier, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Centroamérica y Brasil).

- Lamellobates (Paralamellobates)*** Bhaduri y Raychaudhuri, 1968 (4 spp.)
ESPECIE TIPO: *Lamellobates (Paralamellobates) bengalensis* Bhaduri y Raychaudhuri, 1968
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.
- *Lamellobates (Paralamellobates) argentinensis* (Fredes, 2017) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Lamellobates (Paralamellobates) bengalensis* Bhaduri y Raychaudhuri, 1968
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Lamellobates (Paralamellobates) misella* (Berlese, 1910) (*Oribatella*)
(=*Oribatella ceylanica* Oudemans, 1915)
(=*Oribatella schoutedeni* Balogh, 1959)
(=*Paralamellobates striatus* Behan-Pelletier, 1998)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical: frecuente, y Paleártica meridional.
 - *Lamellobates (Paralamellobates) quadricornis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985 (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- Palmitalia*** Pérez-Íñigo y Peña, 1997 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Palmitalia latilamellata* Pérez-Íñigo y Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Palmitalia latilamellata* Pérez-Íñigo y Peña, 1997
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- Patagonozetes*** J. y P. Balogh, 1990 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes exornatus* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Patagonozetes exornatus* (Balogh y Csiszár, 1963) (*Sphaerozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- Punctizetes*** Hammer, 1971 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Punctizetes penicillifer* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
- *Punctizetes penicillifer* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.

- Sacculozetes*** Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Sacculozetes filus* Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.
- *Sacculozetes filus* Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

Sagittazetes J. y P. Balogh, 1983 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Sagittazetes agressor* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Sagittazetes agressor* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Ceratozetidae Jacot, 1925 (26 gen., 13 subg., 308 spp. y 12 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Adoribatella Woolley, 1967 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Adoribatella punctata* Woolley, 1967

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Adoribatella punctata* Woolley, 1967

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica occidental y Este de Rusia asiática).

Ceratozetella Shaldybina, 1966 (31 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratozetes sellnicki* Rajski, 1958

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Australiana.

Ceratozetella (*Ceratozetella*) Shaldybina, 1966 (26 spp. y 1 ssp.)

(=*Ceratozetoides* Shaldybina, 1966)

(=*Ceresella* Pavlichenko, 1993)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Australiana.

- *Ceratozetella* (*C.*) *aokii* (Bayartogtokh, 1999) (*Ceratozetoides*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Ceratozetella* (*C.*) *bregetovae* Shaldybina, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Sur de Siberia).

- *Ceratozetella* (*C.*) *brissago* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2006) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Ceratozetella* (*C.*) *cisalpina* (Berlese, 1908) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: menos frecuente en el Oeste, Paleártica oriental y Neártica oriental).

- *Ceratozetella* (*C.*) *cuspidodenticulata* (Kulijev, 1962) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Ceratozetella* (*C.*) *djaparidzae* Shaldybina, 1979

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Ceratozetella* (*C.*) *ffellbergi* (Behan-Pelletier, 1986) (*Ceratozetes*)

(=*Ceratozetella helenae* Pavlichenko, 1993)

DISTRIBUCIÓN: Holártica: Neártica septentrional y Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Norte).

- *Ceratozetella* (*C.*) *heterocuspis* (Balogh y Mahunka, 1965) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Ceratozetella (*C.*) *imperatoria* (Aoki, 1963) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Norte) y China suroriental.

- *Ceratozetella* (*C.*) *imperatoria imperatoria* (Aoki, 1963)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

- *Ceratozetella* (*C.*) *imperatoria magna* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Ceratozetella* (*C.*) *incurva* (Aoki, 1964) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Ceratozetella* (*C.*) *kirgisisca* Shaldybina, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

- *Ceratozetella* (*C.*) *maxima* (Berlese, 1908) (*Ceratozetes*)

(?=*Oribata gracilis maior* Berlese, 1904 "sp. inq.")

(=*Sphaerozetes major* Irk, 1939)

(=*Sphaerozetes maximus* Willmann, 1953, "nom. praeoc." por Berlese, 1908)

(=*Ceratozetes maximus jeanneli* Trägårdh, 1912)

(?=*Acarus spinipes* Müller, 1776 "sp. inq.")

(?=*Sphaerobates subseminulum* Oudemans, 1902 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte) y Cuba.

- *Ceratozetella* (*C.*) *minima* (Sellnick, 1928) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: menos frecuente en el Norte, y Paleártica oriental meridional).

- *Ceratozetella* (*C.*) *oresbios* (Behan-Pelletier, 1984) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Ceratozetella platyrhinoides* (Hammer, 1961) (*Ceratozetes*)

(=*Magellozetes mahnerti* Mahunka, 1984)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ceratozetella platyrhina* (Hammer, 1958) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).
- *Ceratozetella (C.) redempta* (Caroli y Maffia, 1934) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Ceratozetella (C.) reevesi* (Behan-Pelletier y Earner, 2008) (*Ceresella*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. occidental.
- *Ceratozetella (C.) rotunda* (Schweizer, 1956) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Ceratozetella (C.) sellnicki* (Rajski, 1958) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: excepto Oeste, y Paleártica oriental): frecuente.
- *Ceratozetella (C.) shaldybinae* (Seniczak, Kaczmarek y A. Seniczak, 2016) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia central).
- *Ceratozetella (C.) similis* (Schweizer, 1956) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Ceratozetella (C.) thienemanni* (Willmann, 1943) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica septentrional (frecuente Boreal) y Neotropical.
- *Ceratozetella (C.) translamellata* (Shaldybina, 1970) (*Ceratozetoides*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental (excepto Este).
- *Ceratozetella (C.) venusta* (Pavlichenko, 1993) (*Ceresella*)
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
- *Ceratozetella (C.) yezoensis* Fujita y Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Ceratozetella (Cyrtozetes) Behan-Pelletier, 1985 (5 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratozetes shiranensis* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- Ceratozetella (Cyrtozetes) denaliensis* (Behan-Pelletier, 1985) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional y Este de Paleártica oriental).
 - *Ceratozetella (Cyrtozetes) denaliensis denaliensis* (Behan-Pelletier, 1985) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Neártica septentrional y Noreste de Siberia).
 - *Ceratozetella (Cyrtozetes) denaliensis minor* (Hirauchi, 1999) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) inupiaq* (Behan-Pelletier, 1986) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) rectangularis* (Pavlichenko, 1993) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) lindoae* (Behan-Pelletier y Eamer, 2008) (*Cyr.*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetella (Cyrtozetes) shiranensis* (Aoki, 1976) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Ceratozetes Berlese, 1908 (51 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata gracilis* Michael, 1884

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Ceratozetes (Ceratozetes) Berlese, 1908 (50 spp. y 2 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Ceratozetes (C.) angustus* (Banks, 1947) (*Minunthozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Ceratozetes (C.) armatus* Mihelčič, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Ceratozetes (C.) baleensis* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ceratozetes (C.) behani* Seniczak, A. Seniczak y Kaczmarek, 2017
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ceratozetes (C.) biporosus* Behan-Pelletier y Eamer, 2009
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misisipí).
- *Ceratozetes (C.) borealis* Behan-Pelletier, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ceratozetes (C.) campestris* Mihelčič, 1956
(=*Ceratozetes obtusus* Mihelčič, 1956)
(=*Ceratozetes petrovi* Kulijev, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ceratozetes (C.) colchicus* Murvanidze y Weigmann, 2003
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ceratozetes (C.) conjunctus* Mihelčič, 1956
(=*Ceratozetes contiguus* Jeleva, 1962)

- (?= *Oribata myrmobates* Berlese, 1903 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea: frecuente, e Irán).
- *Ceratozetes (C.) cuspidatus* Jacot, 1939 (*C. gracilis* c.)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Ceratozetes (C.) cyclopeus* Behan-Pelletier y Eamer, 2009
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Ceratozetes (C.) enodis* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
 (= *Oribata figurata* Ewing, 1909)
 (= *Trachyoribates zeteki* Ewing, 1917)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Ceratozetes (C.) erupentus* Fujikawa, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratozetes (C.) gaussi* (Richters, 1908) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Ceratozetes (C.) gemmula* Pérez-Íñigo jr., 1990
 DISTRIBUCIÓN: España.
- Ceratozetes (C.) gracilis* (Michael, 1884) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Holártica, I. Santa Helena, Oriental, Nueva Zelanda, Neotropical y Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Ceratozetes (C.) gracilis gracilis* (Michael, 1884)
 (= *Ceratozetes aelleni* Mahunka, 1983)
 (= *Ceratozetes fusiger* Mihelčič, 1956)
 (= *Ceratozetes grandis* Berlese, 1908)
 (= *Ceratozetes longocuspidatus* Kulijev, 1962)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Holártica (frecuente), I. Santa Helena, Oriental, Nueva Zelanda, Neotropical (Chile y Panamá) y Antártica (I. Shetland del Sur).
- *Ceratozetes (C.) gracilis minor* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Ceratozetes (C.) guadarramicus* Pérez-Íñigo, 1991
 DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ceratozetes (C.) hamobatooides* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Nueva Caledonia).
- *Ceratozetes (C.) invitus* (Hull, 1914) (*Oribata*) “sp. inq.” (juvenil)
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Ceratozetes (C.) kananaskis* Mitchell, 1976
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetes (C.) kutchin* Behan-Pelletier, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Ceratozetes (C.) lagrecai* Bernini, 1973
 (?= *Sphaerozetes elongatissimus* Berlese, 1908 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Ceratozetes (C.) laticuspidatus* Menke, 1964
 (?= *Ceratozetes japonicus* Aoki, 1961 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente en Europa centromeridional) y Taiwán [Formosa].
- *Ceratozetes (C.) longispina* Jacot, 1936 (*C. subaquila* l.)
 DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.
- *Ceratozetes (C.) macromediocris* Shaldybina, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Europa oriental e Irán.
- *Ceratozetes (C.) mediocris* Berlese, 1908
 (= *Ceratozetes dubius* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Australiana (Nueva Zelanda).
- *Ceratozetes (C.) microsetosus* Ayyildiz y Luxton, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Ceratozetes (C.) minutissimus* Willmann, 1951
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Ceratozetes (C.) monticola* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Ceratozetes (C.) nanus* Subías, 2001
 (= *Ceratozetes minutissimus* Subías y Arillo, 2000, “nom. praec.” por Willmann, 1951)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).
- *Ceratozetes (C.) nasutus* Subías, Kahwash y Ruiz, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ceratozetes (C.) neonomintus* Subías, 2004
 (= *Ceratozetes similis* Fujikawa, 1996, “nom. praec.” por Schweizer, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ceratozetes (C.) ovidianus* Vasiliu y Călugăr, 1981

- DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Ceratozetes (C.) pacificus* Behan-Pelletier, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neártica occidental.
 - *Ceratozetes (C.) pallidus* (Lombardini, 1961) (*Cosmochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
 DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Ceratozetes (C.) parittractus* Hammer, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
 - *Ceratozetes (C.) parvulus* Sellnick, 1922 (*C. (Allozetes)*)
 DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Eurosiberiana, Cáucaso y Neártica septentrional).
 - *Ceratozetes (C.) peritus* Grandjean, 1951
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental, Este de Rusia asiática y Canadá).
 - *Ceratozetes (C.) psammophilus* Horak, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Europea.
 - *Ceratozetes (C.) pseudomediocris* Behan-Pelletier y Eamer, 2009
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Oregón).
 - *Ceratozetes (C.) simulator* Pérez-Íñigo, 1970
 (= *Ceratozetes petri* Weigmann, 1976)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Ceratozetes (C.) spiculatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.
 - *Ceratozetes (C.) spitsbergensis* Thor, 1934
 DISTRIBUCIÓN: Boreal (Eurosiberiana, Mongolia y Neártica septentrional).
 - *Ceratozetes (C.) striatus* Hammer, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Ceratozetes (C.) subaquila* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Ceratozetes (C.) subaquila subaquila* (Ewing, 1909)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Ceratozetes (C.) subaquila curtispina* Jacot, 1936
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Ohio).
 - *Ceratozetes (C.) subin conspicuus* (Berlese, 1908) (*Punctoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
 - *Ceratozetes (C.) virginicus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
 (= *Ceratozetes jeweli* Rockett y Woodring, 1966)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Ceratozetes (C.) volgini* Shaldybina, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Ceratozetes (C.) watertonensis* Behan-Pelletier, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neártica noroccidental.
 - *Ceratozetes (C.) xinjiangensis* Wen y Bu, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Ceratozetes (Mixozetes) J. y P. Balogh, 1990 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Arcozetes intermedius* Covarrubias, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Ceratozetes (Mixozetes) intermedius* (Covarrubias, 1967) (*Arcozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Chile.

Dentizetes Hammer, 1952 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Dentizetes rudentiger* Hammer, 1952
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Dentizetes ledensis* Behan-Pelletier, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Dentizetes rudentiger* Hammer, 1952
 DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Edwardzetes Berlese, 1913 (10 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oribata edwardsi* Nicolet, 1855
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Paleotropical).

Edwardzetes (Edwardzetes) Berlese, 1913 (9 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (excepto Paleotropical).
 - *Edwardzetes (E.) andicola* Hammer, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Edwardzetes (E.) armatus* (Hammer, 1958) (*Jugatata*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Edwardzetes (E.) australis* Starý y Block, 1995

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).

- *Edwardzetes (E.) dentifer* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Austral (Neotropical y Nueva Zelanda), Antártica y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Edwardzetes (E.) edwardsi* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)

(=*Notaspis edwardsi lapponicus* Trägårdh, 1902)

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina: Euroatlántica (frecuente), Cáucaso y Groenlandia.

- *Edwardzetes (E.) elongatus* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur) y Australiana (Tasmania).

- *Edwardzetes (E.) novaezealandicus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Edwardzetes (E.) trilobus* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Austria.

- *Edwardzetes (E.) ubali* Iturrondobeitia y Caballero, 2000

DISTRIBUCIÓN: España.

Edwardzetes (Gamerozetes) J. y P. Balogh, 1990 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Magellozetes brevitatorium* Covarrubias, 1967

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Edwardzetes (Gamerozetes) brevitatorium* (Covarrubias, 1967) (*Magellozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

Euzetes Berlese, 1908 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata globula* Nicolet, 1855

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Neotropical.

- *Euzetes centroamericanus* (Stoll, 1890) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Euzetes globulus* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)

(?=*Oribata aterrима* Koch, 1844 “sp. inq.”)

(=*Oribata nitens* Johnston, 1853, “nom. praeoc.” por Gervais, 1844)

(?=*Acarus seminulum* Müller, 1776 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Este de Paleártica oriental) y Neotropical (Argentina).

Furcobates Sellnick, 1959 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata hastata* Kramer, 1898

DISTRIBUCIÓN: Austral, Oriental y Boreal.

Furcobates (Furcobates) Sellnick, 1959 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Anfipolar.

- *Furcobates (F.) hastatus* (Kramer, 1898) (*Oribata*)

(?=*Oribata fisheri* Michael, 1897 “sp. inq.”)

(=*Oribata longicornuta* Berlese, 1901)

DISTRIBUCIÓN: Anfipolar (Neotropical austral, subantártica: I. Malvinas [I. Falkland] y Rusia: Islas Francisco José).

- *Furcobates (F.) lewissmithi* Starý, 1995

DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Furcobates (Parafurcobates) Hammer, 1967 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Parafurcobates cuspidatus* Hammer 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Furcobates (Parafurcobates) cuspidatus* (Hammer, 1967) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Furcobates (Pseudogeminozetes) Tseng, 1984 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pseudogeminozetes obliquus* Tseng, 1984

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Furcobates (Pseudogeminozetes) obliquus* (Tseng, 1984) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Fuscozetes Sellnick, 1928 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata fuscipes* Koch, 1844

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Fuscozetes angustus* (Banks, 1910) (*Oribatella*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).

- *Fuscozetes bidentatus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Fuscozetes cuauhtemocztini* Palacios-Vargas y Martínez-Crespo, 1987
DISTRIBUCIÓN: Méjico y ¿Costa Rica?
- *Fuscozetes floridae* Jacot, 1935 (*F. bidentatus* f.) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Fuscozetes fuscipes* (Koch, 1844) (*Oribata*)
(=*Galumna slossonae* Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur), ¿Costa Rica? y Vietnam.
- *Fuscozetes heteroporus* (Wen y Bu, 1988) (*Trichoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Fuscozetes intermedius* Caroli y Maffia, 1934
(?= *Oribata rubens* Koch, 1839 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Este).
- *Fuscozetes kamchatkicus* Seniczak, Kaczmarek y A. Seniczak, 2016
DISTRIBUCIÓN: Siberia (Kamchatka).
- *Fuscozetes montanus* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Fuscozetes novus* Shaladybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Fuscozetes pini* Dalenius, 1963
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (Suecia y Cáucaso).
- *Fuscozetes pseudosetosus* Shaladybina, 1975
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Europa centrooriental y Oeste de Paleártica oriental) y Canadá.
- *Fuscozetes rotundatus* Willmann, 1930
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Fuscozetes setosus* (Koch, 1839) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica nororiental).
- *Fuscozetes tatricus* Seniczak, 1993
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: Polonia, y Paleártica oriental: Mongolia y Noreste de China).

Geminozetes Balogh y Csiszár, 1963 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Geminozetes lineatus* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Etiópica) y Holártica.

Geminozetes (Geminozetes) Balogh y Csiszár, 1963 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Geminozetes (G.) lamellatus* Balogh, 1966
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Geminozetes (G.) lineatus* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Geminozetes (Naiazetes) Behan-Pelletier, 1996 (3 spp.)

(=*Cyranozetes* Mahunka y Mahunka-Papp, 2003)

(=*Selvazetes* Behan-Pelletier, 1998)

ESPECIE TIPO: *Naiazetes reevesi* Behan-Pelletier, 1996

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Geminozetes (Naiazetes) nasalis* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2003) (*Cyranozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Geminozetes (Naiazetes) reevesi* (Behan-Pelletier, 1996) (*N.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica y Norte de Neotropical.
- *Geminozetes (Naiazetes) silvanus* (Behan-Pelletier, 1998) (*Selvazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.

Ghilarovizetes Shaladybina, 1969 (7 spp.)

(=**Koreozetes** Aoki, 1974)

ESPECIE TIPO: *Ghilarovizetes obtusus* Shaladybina, 1969

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Ghilarovizetes altaicus* (Shaladybina, 1969) (*Melanozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Ghilarovizetes longiporusus* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Ghilarovizetes maruyamai* Hirauchi, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ghilarovizetes nitens* (Johnston, 1852) (*Carabodes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
- *Ghilarovizetes obtusus* Shaladybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Paleártica oriental).

- *Ghilarovizetes parvisetiger* (Aoki, 1974) (*Koreozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Ghilarovizetes rostralis* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental y Cáucaso.

Hispanozetes Subías y Shtanchaeva, 2012 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratozetes aragonensis* Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1988

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Hispanozetes aragonensis* (Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1988) (*Ceratozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Hispanozetes bicarinatus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hispanozetes bicorniculatus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hispanozetes foveolatus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Hispanozetes punctulatus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: Francia.
- *Hispanozetes striatus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.

Jugatala Ewing, 1913 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Jugatala tuberosa* Ewing, 1913

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Jugatala tuberosa* Ewing, 1913
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y Neártica septentrional).

Lepidozetes Berlese, 1910 (7 spp.)

(=*Onazetes* Bugrov, 1991)

ESPECIE TIPO: *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica y **Paleotropical**.

- *Lepidozetes acutirostrum* Ermilov, Martens y Tolstikov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Lepidozetes bavaricus* Weigmann, 2013
DISTRIBUCIÓN: Alemanial.
- *Lepidozetes dashidorzsi* Balogh y Mahunka, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Lepidozetes latipilosus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional, Mediterránea oriental y Paleártica oriental: excepto Este).
- *Lepidozetes singularis* Berlese, 1910
(=*Lepidozetes conjunctus* Schweizer, 1922)
(=*Lepidozetes chernovi* Rjabinin, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente, y **Sudáfrica**.
- *Lepidozetes trifolius* (Fujikawa, 1972) (*Tegoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Este de Paleártica oriental y U.S.A.: California) y Vietnam.
- *Lepidozetes umbellatus* (Bugrov, 1991) (*Onazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Lobozetes Hammer, 1958 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Lobozetes bilobatus* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Lobozetes bilobatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Macrogena Wallwork, 1966 (11 spp.)

ESPECIE TIPO: *Macrogena monodactyla* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica, Australiana austral, Oriental y Paleártica meridional.

Macrogena (Macrogena) Wallwork, 1966 (9 spp.)

(=*Lophozetes* P. Balogh, 1985)

(=*Paralobozetes* Tseng, 1984)

DISTRIBUCIÓN: Antártica, Australiana austral, Oriental y Paleártica meridional.

- *Macrogena (M.) abbreviata* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) brevisensilla* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Macrogena (M.) crassa* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) hexasetosa* Ermilov y Minor, 2016
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) longirostralis* (Tseng, 1984) (*Paralobozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Macrogena (M.) minor* (Subías, Kahwash y Ruiz, 1990) (*Mycobates*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Macrogena (M.) monodactyla* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
- *Macrogena (M.) rudentiger* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (M.) truncata* (P. Balogh, 1985) (*Lophozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Macrogena (Safrobates) Mahunka, 1989 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Safrobates miniporus* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Australiana austral.

- *Macrogena (Safrobates) gerdi* (Ermilov y Minor, 2016) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (Safrobates) insignis* (Ermilov, Minor y Behan-Pelletier, 2016) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Macrogena (Safrobates) miniporus* (Mahunka, 1989) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

Magellozetes Hammer, 1962 (3 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Magellozetes processus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Antártica, **subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]**, y Austral (Neotropical y Australiana).

Magellozetes antarcticus (Michael, 1895) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica y Neotropical austral.

- *Magellozetes antarcticus antarcticus* (Michael, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Antártica y Neotropical austral.
- *Magellozetes antarcticus traegardhi* (Subías, 2010) “ssp. inq.” (*Ceratozetes (M.)*)
(=*Oribata antarctica major* Trägårdh, 1907, “nom. praeoc.” por Pearce, 1906)
DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).
- *Magellozetes crassisetosus* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Magellozetes processus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Antártica, **subantártica: I. Malvinas [I. Falkland]**, y Neotropical austral.

Melanozetes Hull, 1916 (23 spp. y 2 sspp.)

(=*Alphypochthonius* Schweizer, 1956)

(=*Sculptozetes* Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Oribata mollicomus* Koch, 1839

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Etiópica.

- *Melanozetes aequalis* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) “sp. inq.” (**juvenil**)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes africanus* (Mahunka, 1984) (*Ghilarovizetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Melanozetes alpinus* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) “sp. inq.” (**juvenil**)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes avachai* Seniczak, Kaczmarek y A. Seniczak, 2016
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Melanozetes azoricus* Weigmann, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Melanozetes azoricus azoricus* Weigmann, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Melanozetes azoricus floresianus* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
 - *Melanozetes azoricus sanctaemariae* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Melanozetes crossleyi* Behan-Pelletier, 2000
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Melanozetes curtipilis* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) “sp. inq.” (**juvenil**)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes exobothridialis* Bayartogtokh y Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Melanozetes hermannioides* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes interruptus* Willmann, 1953
(=*Melanozetes longesensillus* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa central y Paleártica oriental meridional).
- *Melanozetes jueradae* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes lischanni* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes longisetosus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica septentrional: frecuente, y Este de Rusia asiática).
- *Melanozetes mahunkai* Subías, 2010
(=*Sculptozetes longisetosus* Mahunka, 1984, "nom. praec." por Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Melanozetes medius* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes meridianus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Melanozetes mollicomus* (Koch, 1839) (*Oribata*)
(=*Melanozetes mollisimilis* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Paleártica occidental: menos frecuente en el Sur, Paleártica oriental: excepto Este, y Neártica septentrional).
- *Melanozetes nivalis* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Melanozetes orientalis* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Norte de Rusia asiática.
- *Melanozetes sellnicki* (Hammer, 1952) (*Fuscozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (frecuente en Neártica septentrional).
- *Melanozetes stagnatilis* (Hull, 1914) (*Oribata*)
(=*Oribata alpina* Halbert, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Europa noroccidental.
- *Melanozetes tanana* Behan-Pelletier, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Melanozetes trupchumi* (Schweizer, 1956) (*Alphypochthonius*) "sp. inq." (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.

Neogymnobates Ewing, 1917 (5 spp. y 1 ssp.)

(=***Boreozetes*** Hammer, 1955)

ESPECIE TIPO: *Oribata multipilosa* Ewing, 1907

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Neogymnobates capitatus* Wang y Solhøy, 2001
DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).
- *Neogymnobates donghaksaensis* (Choi, 1986) (*Boreozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Neogymnobates luteus* (Hammer, 1955) (*Boreozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Corea y Neártica septentrional).
- *Neogymnobates luteus luteus* (Hammer, 1955)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Neogymnobates luteus asiaticus* Aoki, 1974
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Neogymnobates marilynnae* Behan-Pelletier, 2000
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Neogymnobates multipilosus* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).

Onychobates Hammer, 1967 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Onychobates nidicola* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Onychobates nidicola* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Oromurcia Thor, 1930 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oromurcia bicuspidata* Thor, 1930

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Oromurcia bicuspidata* Thor, 1930
(?= *Trichoribates lucens distinguendus* Berlese, 1923 "sp. inq.")
(=*Oromurcia sudetica* Willmann, 1939)

DISTRIBUCIÓN: Boreal: Paleártica occidental (frecuente en Norte de Europa), Noroeste de Siberia y Groenlandia.

- *Oromurcia lucens* (Koch, 1879) (*Oribata*)

(=*Notaspis setosa curta* Trägårdh, 1902)

(=*Claviceps trimaculatus* L. Koch, 1879)

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.

Pentazetes J. y P. Balogh, 1983 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pentazetes mandjeliae* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Pentazetes (Pentazetes) J. y P. Balogh, 1983 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Pentazetes (P.) mandjeliae* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

Pentazetes (Porallozetes) J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Allozetes dispar* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Pentazetes (Porallozetes) badamdorji* (Ermilov y Minor, 2016) (*Po.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Pentazetes (Porallozetes) dispar* (Hammer, 1973) (*Allozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Scotiazetes Wallwork, 1966 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Scotiazetes bidens* Wallwork, 1964

DISTRIBUCIÓN: Neártica, Neotropical y Antártica.

Scotiazetes (Scotiazetes) Wallwork, 1966 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Antártica.

- *Scotiazetes (S.) bidens* Wallwork, 1966

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).

- *Scotiazetes (S.) cuspidatus* (Covarrubias, 1967) (*Porozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Brasil).

Scotiazetes (Guatemalozetes) Mahunka, 1980 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Guatemalozetes aelleni* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.

- *Scotiazetes (Guatemalozetes) aelleni* (Mahunka, 1980) (*G.*)

DISTRIBUCIÓN: Guatemala.

- *Scotiazetes (Guatemalozetes) atypicus* (Mahunka, 2006) (*G.*)

DISTRIBUCIÓN: Venezuela.

- *Scotiazetes (Guatemalozetes) danos* (Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991) (*G.*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

Sphaerozetes Berlese, 1885 (21 spp. y 1 ssp.)

(=*Incudozetes* J. y P. Balogh, 2002)

(=*Porozetes* Hammer, 1962)

(=*Sphaerozetella* Jacot, 1929)

ESPECIE TIPO: *Oribata orbicularis* Koch, 1835

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica).

- *Sphaerozetes affinis* (Trägårdh, 1907) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Sphaerozetes arcticus* Hammer, 1952

DISTRIBUCIÓN: Boreal (Norte de Rusia europea, Siberia centrooccidental: frecuente, y Neártica septentrional: frecuente).

- *Sphaerozetes bugiamapensis* Ermilov, Anichkin y Wu, 2013

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Sphaerozetes castaneus* Hammer, 1955

DISTRIBUCIÓN: Alaska.

- *Sphaerozetes chavinensis* (Hammer, 1961) (*Jugatala*)

DISTRIBUCIÓN: Perú y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Sphaerozetes clathratus* (Hammer, 1967) (*Magellozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Sphaerozetes firthensis* Behan-Pelletier, 1986

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Sphaerozetes globularis Lombardini, 1962 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Sphaerozetes globularis globularis* Lombardini, 1962

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Sphaerozetes globularis neonomnatus* Subías, 2004 “ssp. inq.”

(=*Sphaerozetes globularis maior* Lombardini, 1962, “nom. praeoc.” por Irk, 1939)

DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Sphaerozetes neglectus* (Kulijev, 1979) (*Trichoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Sphaerozetes olympicus* A. Seniczak, S. Seniczak y Sgardelis, 2016

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Sphaerozetes orbicularis* (Koch, 1835) (*Oribata*)

(=*Sphaerozetes italiensis* Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Este de Paleártica oriental): frecuente.

- *Sphaerozetes perezinigo* Gómez-Llusá, 1988

DISTRIBUCIÓN: España.

- *Sphaerozetes piriformis* (Nicolet, 1855) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: frecuente, y Noroeste de Siberia).

- *Sphaerozetes polygonalis* (Hammer, 1962) (*Porozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica, **subantártica**, América Austral y Oriental.

- *Sphaerozetes quadrilobatus* (Wallwork, 1966) (*Porozetes polygonalis* q.)

DISTRIBUCIÓN: Antártica, **subantártica** y Neotropical Austral (Chile).

- *Sphaerozetes rostratus* (Covarrubias, 1967) (*Porozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Sphaerozetes setiger* (Trägårdh, 1910) (*Oribata piriformis* s.)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Europa.

- *Sphaerozetes shogranensis* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Sphaerozetes subintectus* Berlese, 1908 “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Grecia.

- *Sphaerozetes tricuspoidatus* Willmann, 1923

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa y Asia central rusa).

- *Sphaerozetes winchesteri* Behan-Pelletier, 2000

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

Trichoribates Berlese, 1910 (62 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Sphaerozetes (Trichoribates) berlesei* Jacot, 1929

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

Trichoribates (Trichoribates) Berlese, 1910 (48 spp. y 2 sspp.)

(?=*Claviceps* Canestrini y Fanzago, 1877 “gen. inq.”)

(?=*Murcia* Koch, 1835 “gen. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Oriental.

- *Trichoribates (T.) acaroides* (Koch, 1835) (*Murcia*) “sp. inq.” (**juvenil**)

DISTRIBUCIÓN: Alemania.

- *Trichoribates (T.) alpinus* Aoki, 1982

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (Japón e I. Kuriles).

- *Trichoribates (T.) angulatus* (Koch, 1839) (*Oribata*)

(=*Jugatala rotunda* Willmann, 1953)

DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.

- *Trichoribates (T.) angustatus* Mihelčič, 1957

(?=*Sphaerozetes prudens* Berlese, 1913 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Trichoribates (T.) aokii* Maruyama, Shimano y Bayartogtokh, 2016

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Trichoribates (T.) austroamericanus* (Berlese, 1910) (*Sphaerozetes (T.) setosus* a.)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).

- *Trichoribates (T.) berlesei* (Jacot, 1929) (*Sphaerozetes (T.)*)

(?=*Oribata boletorum* Ewing, 1913 “sp. inq.”)

(?=*Murcia trimaculata* Koch, 1835 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) y Camboya.

- *Trichoribates (T.) biarea* Gjelstrup y Solhøy, 1994

DISTRIBUCIÓN: Borealpina (Europa).

- *Trichoribates (T.) botschi* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) “sp. inq.” (**juvenil**)

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Trichoribates (T.) brevicuspis* Mihelčič, 1958

(=*Trichoribates longipilis* Mihelčič, 1956, “nom. praeoc.” por Willmann, 1951)

(=*Trichoribates pilosus* Mihelčič, 1966)

- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Trichoribates (T.) brevilamellaris* Bayartogtokh, 2010
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Trichoribates (T.) caucasicus* Shaldybina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
 - *Trichoribates (T.) copperminensis* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Paleártica oriental: excepto Este, y Neártica septentrional).
 - *Trichoribates (T.) deliensis* (Oudemans, 1922) (*Murcia*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Trichoribates (T.) dubiosus* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
 - *Trichoribates (T.) ephippiatus* (Koch, 1841) (*Murcia*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Trichoribates (T.) formosus* (Banks, 1909) (*Oribatella*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental.
 - *Trichoribates (T.) fumigatus* (Koch, 1841) (*Murcia*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Trichoribates (T.) furcatus* Schweizer, 1956
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: Suiza, y Este de Rusia asiática).
 - *Trichoribates (T.) hammerae* Subías, 2010
(=*Jugatala montana* Hammer, 1961, “nom. praeoc.” por Irk, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Trichoribates (T.) hauseri* Mahunka y Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
 - *Trichoribates (T.) hirauchiae* Maruyama, Shimano y Bayartogtokh, 2016
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Trichoribates (T.) hirtus* (Canestrini y Fanzago, 1877) (*Claviceps*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Trichoribates (T.) laeviusculus* (Canestrini y Fanzago, 1877) (*Claviceps*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - Trichoribates (T.) latincisus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Trichoribates (T.) latincisus latincisus* (Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
 - *Trichoribates (T.) latincisus giganteus* (Hall, 1911) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
 - *Trichoribates (T.) latirostratus* Bayartogtokh y Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Trichoribates (T.) monticola* (Trägårdh, 1902) (*Notaspis*)
(=*Trichoribates montanus* Irk, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica y Cáucaso.
 - Trichoribates (T.) novus* (Sellnick, 1928) (*Murcia*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.: Virginia).
 - *Trichoribates (T.) novus novus* (Sellnick, 1928)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Virginia).
 - *Trichoribates (T.) novus dentatus* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Trichoribates (T.) oblongarea* Gjelstrup y Solhøy, 1994
DISTRIBUCIÓN: Islandia.
 - *Trichoribates (T.) ocotlicus* Palacios-Vargas y Norton, 1984
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Trichoribates (T.) ogilviensis* Behan-Pelletier, 1986
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
 - *Trichoribates (T.) perfectus* (Banks, 1896) (*Oribatella*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
 - *Trichoribates (T.) persimilis* (Banks, 1906) (*Galumma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
 - *Trichoribates (T.) punctatus* Shaldybina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa suroriental y Paleártica oriental meridional).
 - *Trichoribates (T.) rausensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón y Norte de India.
 - *Trichoribates (T.) rotundicuspoidatus* Bayartogtokh y Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Trichoribates (T.) scilierensis* Bayartogtokh y Schatz, 2008
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Trichoribates (T.) serratus* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Trichoribates (T.) spatulasetosus* Reeves, 1967
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Trichoribates (T.) spinogenuala* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Trichoribates (T.) stabelchodi* (Schweizer, 1956) (*Parhypochothonius*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) striatus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional e India (Himachal Pradesh).
- *Trichoribates (T.) strigatus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2006
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Trichoribates (T.) tectopedacutus* (Thor, 1937) (*Murcia*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Trichoribates (T.) tianshanensis* Wen y Bu, 1988
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Trichoribates (T.) tjanshanicus* Shaldybina, 1971
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Trichoribates (T.) zingerlei* Bayartogtokh y Schatz, 2008
DISTRIBUCIÓN: Italia.

Trichoribates (Laminizetes) Behan-Pelletier, 1986 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Laminizetes fortispinosus* Behan-Pelletier, 1986

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Trichoribates (Laminizetes) fortispinosus* (Behan-Pelletier, 1986) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Trichoribates (Laminizetes) tabulatus* (Huang y Yang, 2013) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Trichoribates (Latilamellobates) Shaldybina, 1971 (12 spp. y 1 ssp.)

(=*Trichoribatella* Mahunka, 1983)

(=*Vicinebates* Pavlichenko, 1991)

ESPECIE TIPO: *Oribata incisella* Kramer, 1897

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Trichoribates (Latilamellobates) algarvensis* (Subías y Gil-Martín, 1990) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Trichoribates (Latilamellobates) clavatus* Mihelčič, 1956 (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Trichoribates (Latilamellobates) columbreti* (Mínguez y Subías, 1986) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: España (I. Columbretes).
- Trichoribates (Latilamellobates) incisellus* (Kramer, 1897) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica.
 - *Trichoribates (Latilamellobates) incisellus incisellus* (Kramer, 1897)
(=*Trichoribatella baloghi* Mahunka, 1983)
(=*Oribata cribelliger germanica* Schweizer, 1926)
(=*Sphaerozetes (Trichoribates) oxypterus meridionalis* Berlese, 1910)
(=*Trichoribates setosus apenninicus* Berlese, 1923)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y Canadá.
 - *Trichoribates (Latilamellobates) incisellus rotundatus* Willmann, 1939 (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Trichoribates (Latilamellobates) latilamellatus* Mihelčič, 1956 (*T.*)
(=*Trichoribates latilamellatus angustissima* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (frecuente).
- *Trichoribates (Latilamellobates) longipilis* Willmann, 1951 (*T.*)
(=*Trichoribates perlongum* Schweizer, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Trichoribates (Latilamellobates) myricus* Gjelstrup y Solhøy, 1994 (*T.*)
(?=*Sphaerozetes (Trichoribates) oxypterus* Berlese, 1910 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.
- *Trichoribates (Latilamellobates) naltschicki* (Shaldybina, 1971) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Suroeste de Paleártica oriental.
- *Trichoribates (Latilamellobates) naltschicki* (Shaldybina, 1971) (*L.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental, Irán y Suroeste de Rusia asiática.
- *Trichoribates (Latilamellobates) obesus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
(=*Jugatala lamellata* Ewing, 1918)
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Finlandia y Neártica septentrional).
- *Trichoribates (Latilamellobates) polaris* Hammer, 1953 (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Neártica noroccidental (frecuente) y Noreste de Siberia.
- *Trichoribates (Latilamellobates) sergienkoae* (Pavlichenko, 1991) (*Vicinebates*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Trichoribates (Latilamellobates) tepetlensis* Palacios-Vargas y Norton, 1984 (T.)

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

***Trichoribates (Viracochiella)* Hammer, 1961 (3 spp.)**

(=*Leebates* Balogh y Mahunka, 1996)

ESPECIE TIPO: *Viracochiella tuberculata* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana) y Paleártica meridional.

- *Trichoribates (Viracochiella) bornemisszai* (Balogh y Mahunka, 1996) (*Leebates*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Trichoribates (Viracochiella) orientalis* (Rjabinin y Zaitsev, 2008) (V.)

DISTRIBUCIÓN: I. Sajalín.

- *Trichoribates (Viracochiella) tuberculatus* (Hammer, 1961) (V.)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

***Umbellozetes* Krivolutsky, 1969 (6 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Umbellozetes fuscus* Krivolutsky, 1969

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Umbellozetes combinatus* Wang y Solhøy, 1999

DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

- *Umbellozetes fuscus* Krivolutsky, 1969

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

- *Umbellozetes parvus* Fujikawa, 2003

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Umbellozetes petrovae* (Golosova y Karppinen, 1984) (*Tutoridens* [†])

DISTRIBUCIÓN: Sur de Siberia.

- *Umbellozetes slaveki* S. y A. Seniczak, 2011

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Umbellozetes squamaceus* Wang y Shen, 1999

DISTRIBUCIÓN: China (Tíbet).

***Zetomimus* Hull, 1916 (21 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Oribata furcata* Warburton y Pearce, 1905

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

***Zetomimus (Zetomimus)* Hull, 1916 (10 spp.)**

(=*Hamobates* Hammer, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita: Holártica y tropical (excepto Etiópica).

- *Zetomimus (Z.) bicornis* (Hammer, 1967) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.

- *Zetomimus (Z.) boothianus* (Hull, 1915) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

- *Zetomimus (Z.) brevis* Ohkubo, 1987

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Zetomimus (Z.) cristatus* (Hammer, 1962) (*Hamobates*)

DISTRIBUCIÓN: Chile e India (Andhra Pradesh).

- *Zetomimus (Z.) francisi* (Habeeb, 1974) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

- *Zetomimus (Z.) furcatus* (Warburton y Pearce, 1905) (*Oribata*)

(=*Ceratozetes argentinensis* Hammer, 1958)

(?=*Oribata avenifera* Michael, 1884 "sp. inq.")

(?=*Oribata clypeata* Nicolet, 1855 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte), Este de Rusia asiática y Neotropical (Argentina y Perú).

- *Zetomimus (Z.) magnificus* (Berlese, 1910) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (Italia y Cáucaso).

- *Zetomimus (Z.) naias* Behan-Pelletier, 1998

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Zetomimus (Z.) nigrisetosus* (Hammer, 1958) (*Ceratozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Perú).

- *Zetomimus (Z.) spinosus* (Hammer, 1962) (*Hamobates*)

DISTRIBUCIÓN: Chile.

***Zetomimus (Protozetomimus)* Pérez-Íñigo, 1990 (11 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Ceratozetes acutirostris* Mihelčič, 1957

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Neotropical y Etiópica.

- *Zetomimus (Protozetomimus) acutirostris* (Mihelčič, 1957) (*Ceratozetes*)

- (=*Ceratozetes bulanovae* Kulijev, 1962)
 (= *Ceratozetes rostroundulatus* Pavlichenko, 1991)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Zetomimus (Protozetomimus) ambiguus* (Behan-Pelletier, 1998) (*Ceratozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Zetomimus (Protozetomimus) behanae* (Weigmann, 2012) (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Zetomimus (Protozetomimus) catarinensis* (C. y C. jr. Pérez-Íñigo, 1993) (*Ceratozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Zetomimus (Protozetomimus) cooki* Behan-Pelletier y Eamer, 2003 (*Z.*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental.
- *Zetomimus (Protozetomimus) genavensis* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2006) (*Ceratozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Zetomimus (Protozetomimus) longispina* (Mahunka y Topercer, 1983) (*Ceratozetella*)
 DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Zetomimus (Protozetomimus) polpaicoensis* (Hammer, 1962) (*Ceratozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Zetomimus (Protozetomimus) rostrorserratus* (Wallwork, 1965) (*Ceratozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Zetomimus (Protozetomimus) setosus* (Banks, 1895) (*Oribatella*)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zetomimus (Protozetomimus) undulatus* (Hammer, 1958) (*Ceratozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

Chamobatidae Thor, 1937 (7 gen., 1 subg., 58 spp. y 1 ssp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Ceratobates Balogh y Mahunka, 1969 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ceratobates pontiger* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: **Pantropical (excepto Australiana).**

- *Ceratobates cangioensis* Ermilov y Anichkin, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Ceratobates fornerisae* Pérez-Íñigo y Baggio, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Ceratobates monosacculatus* Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2017
 DISTRIBUCIÓN: **Sudáfrica.**
- *Ceratobates pontiger* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Ceratobates spathulatus* Balogh y Mahunka, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Chamobates Hull, 1916 (31 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata cuspidata* Michael, 1884

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.

Chamobates (Chamobates) Hull, 1916 (21 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Paleotropical.

- *Chamobates (C.) apathyi* (Tafner, 1905) (*Oribata*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Chamobates (C.) birulai* (Kulczynski, 1902) (*Notaspis*)
 (= *Chamobates cuspidatus alpinus* Schweizer, 1956)
 (= *Chamobates tricuspidatus* Willmann, 1953)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (excepto Este) y Groenlandia.
- *Chamobates (C.) caucasicus* Shaldybina, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (C.) confusus* Subías, 2000
 (?= *Chamobates angulatus* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”)
 (?= *Chamobates triangularis* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (excepto Norte): frecuente, Este de Paleártica oriental y Alaska.
- *Chamobates (C.) cuspidatiformis* (Trägårdh, 1904) (*Notaspis*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental.
- *Chamobates (C.) cuspidatus* (Michael, 1884) (*Oribata*)
 (= *Oribata dominae* Hull, 1914)
 (= *Oribata lucifer* Hull, 1914)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica) e I. Seychelles.
- *Chamobates (C.) dentatus* Mihelčič, 1956

- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (C.) dentoitorii* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
 - *Chamobates (C.) egenus* (Berlese, 1910) (*Euzetes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Chamobates (C.) geminus* Fujikawa, 1997
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Chamobates (C.) hauseri* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Marruecos.
 - *Chamobates (C.) illinoisensis* (Ewing, 1909) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
 - *Chamobates (C.) javensis* (Hammer, 1979) (*Sphaerozetes*)
(=*Unguizetes hammerae* J. y P. Balogh, 2002)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
 - *Chamobates (C.) lapidarius* (Lucas, 1849) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Argelia.
 - *Chamobates (C.) pedemontanus* (Berlese, 1910) (*Sphaerozetes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Italia.
 - *Chamobates (C.) perezinigo* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Chamobates (C.) pusillus* (Berlese, 1895) (*Oribata*)
(=*Notaspis cuspidatus borealis* Trägårdh, 1902)
(=*Chamobates incisus* Hammen, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).
 - *Chamobates (C.) roynortoni* Weigmann, 2012
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
 - *Chamobates (C.) schuetzi* (Oudemans, 1902) (*Notaspis*)
(=*Oribata omissa* Warburton y Pearce, 1905)
(=*Euzetes paolii* Berlese, 1910)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Este de Rusia asiática y U.S.A.: Virginia y Alaska).
 - *Chamobates (C.) subglobulus* (Oudemans, 1900) (*Notaspis*)
(?= *Oribata facula* Koch, 1839 “sp. inq.”)
(=*Chamobates nasutus* Mihelčič, 1957)
(=*Euzetes nigerrimus* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, Irán y Este de Rusia asiática).
 - *Chamobates (C.) vartismithi* Hull, 1916 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

Chamobates (Xiphobates) Pavlichenko, 1993 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis voigtsi* Oudemans, 1902

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Chamobates (Xiphobates) bispinosus* Mahunka, 1987 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Chamobates (Xiphobates) callipygis* Pavlichenko, 1991 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Chamobates (Xiphobates) dactyloscopicus* Bernini y Mahunka, 1982 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Chamobates (Xiphobates) depauperatus* (Berlese, 1887) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (Xiphobates) interpositus* Pschorn-Walcher, 1953
(=*Chamobates kieviensis* Shaldybina, 1980)
(=*Chamobates longipilis* Willmann, 1953)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Chamobates (Xiphobates) latissimus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Chamobates (Xiphobates) rastratus* (Hull, 1914) (*Oribata*)
(=*Chamobates spinosus* Sellnick, 1928) (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: frecuente, y Siberia centrooccidental).
- *Chamobates (Xiphobates) sergienkoe* Shaldybina, 1980 (*C.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Chamobates (Xiphobates) voigtsi* (Oudemans, 1902) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa: frecuente, y centroeste de Paleártica oriental).

Globozetes Sellnick, 1928 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Globozetes longipilus* Sellnick, 1928

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Globozetes longipilus* Sellnick, 1928
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Globozetes microtus* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Globozetes petrinjensis* (Willmann, 1940) (*Chamobates*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Hypozetes Balogh, 1959 (9 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Hypozetes imitator* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Hypozetes aviger* Hammer, 1982
DISTRIBUCIÓN: Bali.
- *Hypozetes brevisetus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Hypozetes bulgaricus* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional e India (Orissa).
- *Hypozetes imitator* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (África oriental y Emiratos Árabes) e India (Bengala Occidental).
- *Hypozetes inexpectatus* Maróy, 1972
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Hypozetes laysanensis* Aoki, 1964
DISTRIBUCIÓN: Hawái e India.
- *Hypozetes rostralis* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Hypozetes stellifer* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- Hypozetes translamellatus* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Arabia Saudita e Irán.
 - *Hypozetes translamellatus translamellatus* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo) e Irán.
 - *Hypozetes translamellatus saudicus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1984
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.

Iugoribates Sellnick, 1944 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Iugoribates gracilis* Sellnick, 1944

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Iugoribates cornutus* Mínguez, 1981
(=*Chamobates incisus* Mihelčič, 1957, “nom. praeoc.” por Hammen, 1952)
(=*Chamobates mihelcici* Pavlichenko, 1992)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Iugoribates gracilis* Sellnick, 1944
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional (frecuente).

Ocesobates Aoki, 1965 (6 spp.)

(=*Chamozetes* Sellnick, 1974)

(=*Danobates* Gjelstrup, 1978)

ESPECIE TIPO: *Ocesobates kumadai* Aoki, 1965

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Ocesobates boedvarssoni* (Sellnick, 1974) (*Chamozetes*)
(=*Danobates insignitus* Gjelstrup, 1978)
DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Ocesobates bregetovae* Shaldybina, 1974
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (España y Este de Rusia asiática).
- *Ocesobates galaicus* Subías y Shtanchaeva, 2012
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Ocesobates kumadai* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ocesobates schatzi* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Ocesobates tumidisetosus* (Monson, 2002) (*Chamobates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

Pedunculozetes Hammer, 1962 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pedunculozetes andinus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Pedunculozetes andinus* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (Nueva Zelanda y Neotropical austral).

- *Pedunculozetes minutus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Pedunculozetes ovatum* Ermilov y Minor, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Maudheimiidae J. y P. Balogh, 1984 (2 gen. y 4 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Maudheimia Dalenius, 1958 (3 spp.)
ESPECIE TIPO: *Maudheimia wilsoni* Dalenius, 1958
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Maudheimia petronia* Wallwork, 1962
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
- *Maudheimia tanngardenensis* Coetzee, 1997
DISTRIBUCIÓN: Antártida.
- *Maudheimia wilsoni* Dalenius, 1958
DISTRIBUCIÓN: Antártida.

Multimaudheimia Subías, 2004 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Maudheimia marshalli* Coetzee, 1997
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Multimaudheimia marshalli* (Coetzee, 1997) (*Maudheimia*)
DISTRIBUCIÓN: Antártida.

Humeroatidae Grandjean, 1971 (8 gen., 85 spp. y 7 ssp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Africoribates Evans, 1953 (11 spp.)
ESPECIE TIPO: *Africoribates ornatus* Evans, 1952
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Africoribates amorphus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Africoribates australis* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Africoribates depilatus* (Berlese, 1910) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía).
- *Africoribates evansi* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
- *Africoribates glabratus* (Berlese, 1908) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Africoribates macfarlanei* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Africoribates maximus* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Africoribates nasalis* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Africoribates ornatus* Evans, 1953
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Etiopía).
- *Africoribates pilosus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Africoribates subiasi* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Afroleius Mahunka, 1984 (15 spp.)
ESPECIE TIPO: *Afroleius deformis* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Afroleius amieae* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius caudatus* Coetzee, 2014
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius crassus* Coetzee, 2013
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius decurvatus* Coetzee, 2013
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius deformatoides* Coetzee, 2013
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Afroleius deformis* Mahunka, 1984

- DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius floridus* (Mahunka, 1985) (*Magyaria*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius inae* Coetzee, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius lucidus* Coetzee, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius minor* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius natalensis* Coetzee, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius polygonatus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius simplex* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Afroleius undulatus* (Balogh, 1959) (*Africoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: África oriental.
 - *Afroleius valerieae* Coetzee, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Anellozetes Hammer, 1962 (11 spp.)

(=~~*Kilimabates*~~ Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Anellozetes muscicola* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical.

- *Anellozetes auriculatus* (Mahunka, 1984) (*Kilimabates*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Sudáfrica).
- *Anellozetes bicuspidatus* (Mahunka, 1985) (*Kilimabates*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Anellozetes discifer* Hammer, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Anellozetes fusiformis* Hammer, 1970
 DISTRIBUCIÓN: **Australiana**: I. de Pascua (I. Easter) **y Nueva Zelanda**.
- *Anellozetes intermedius* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Anellozetes longicaulis* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Anellozetes luteus* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Anellozetes muscicola* Hammer, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Anellozetes neonomnatus* Subías, 2004
 (= *Kilimabates translamellatus* Mahunka, 1985, "nom. praec." por Shaldybina, 1971)
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Anellozetes processus* (Mahunka, 1984) (*Kilimabates*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Anellozetes translamellatus* (Shaldybina, 1971) (*Humerobates*)
 DISTRIBUCIÓN: **Paleártica meridional** (Asia centrooccidental y Cáucaso) **y Sudáfrica**.

Diapterobates Grandjean, 1936 (24 spp. y 4 sspp.)

ESPECIE TIPO: (*Sphaerozetes (Trichoribates) numerosus* Sellnick, 1924) = *Notaspis humeralis* Hermann, 1804

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Diapterobates altaicus* Bayartogtokh, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Diapterobates altimontanus* Hammer, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Paquistán y Nepal.
- *Diapterobates arnoldii* Krivolutsky, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Rusia asiática).
- *Diapterobates bogduulensis* Bayartogtokh y Aoki, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Diapterobates brevidentatus* Bayartogtokh, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Diapterobates crinitus* Pankov, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Islas del Este de Rusia asiática.
- *Diapterobates dubinini* Shaldybina, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental.
- *Diapterobates humeralis* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
 (= *Sphaerozetes (Trichoribates) numerosus* Sellnick, 1924)

- (=*Oribata picipes* Koch, 1839)
 (= *Claviceps ruber* Canestrini y Fanzago, 1877)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica).
 - *Diapterobates izuensis* Suzuki, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Diapterobates japonicus* Aoki, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Diapterobates montivagus* (Hull, 1914) (*Oribata*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.
 - *Diapterobates nayoensis* Fujikawa, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Diapterobates notatus* (Thorell, 1871) (*Oribata*)
 (= *Claviceps bimaculatus* L. Koch, 1879)
 (= *Sphaerozetes strandi* Berlese, 1910)
 DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (frecuente).
 - *Diapterobates oblongus* (L. Koch, 1879) (*Oppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europa (excepto Oeste) y Paleártica oriental.
 - *Diapterobates oromurcii* Shaldybina, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Asia centoccidental.
Diapterobates pusillus Aoki, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Diapterobates pusillus pusillus* Aoki, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Diapterobates pusillus cuspidatus* Choi, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Diapterobates reticulatus* (L. Koch, 1879) (*Oribata*)
 (= *Sphaerozetes (Trichoribates) principalis* Berlese, 1914)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa meridional, “Siberia”, Mongolia y Canadá).
 - *Diapterobates rostralis* Shaldybina, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Este de Paleártica oriental).
 - *Diapterobates rostrotuberculatus* Shaldybina, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Ucrania y Asia centoccidental).
 - *Diapterobates rotundocuspidatus* Shaldybina, 1970
 (= *Diapterobates siccatus* Behan-Pelletier, 1986)
 DISTRIBUCIÓN: Boreal (Noreste de Siberia y Neártica septentrional).
 - *Diapterobates sitnikovae* Shaldybina, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y “Alaska”.
 - *Diapterobates songliensis* Choi, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de Paleártica oriental.
 - *Diapterobates unimaculatus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
Diapterobates variabilis Hammer, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Boreal (excepto Europa occidental) y Nepal.
 - *Diapterobates variabilis variabilis* Hammer, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Boreal (excepto Europa occidental): frecuente.
 - *Diapterobates variabilis altissimus* Piffel, 1971
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Diapterobates variabilis honshuensis* Aoki, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Diapterobates variabilis yezoensis* Aoki, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Humerobates Sellnick, 1928 (17 spp. y 3 sspp.)

- (=*Antarctozetes* Balogh, 1961)
 (= *Baloghobates* Hammer, 1967)
 (= *Banksinus* Jacot, 1938)
 (= *Cordylobates* Luxton, 1995)
 (= *Jeannelia* Dalenius, 1958, “nom. praeoc.” por Raffray, 1913)
 (= *Trihumerozetes* Sellnick, 1959)
 ESPECIE TIPO: (*Notaspis humeralis* Hermann “sensu” Sellnick, 1928) = *Humerobates rostromellatus* Grandjean, 1936
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
 - *Humerobates africanus* (Mahunka, 1984) (*Baloghobates*)
 DISTRIBUCIÓN: África oriental.
 - *Humerobates cornutus* (Sellnick, 1959) (*Trihumerozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
 - *Humerobates crozetensis* (Richters, 1908) (*Oribata*)

- DISTRIBUCIÓN: Antártica.
- *Humerobates flechtmani* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1993
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela) y Corea.
 - *Humerobates fragilis* (Luxton, 1995) (*Cordyllobates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Ascensión.
 - *Humerobates kumaso* K. e Y.-N. Nakamura y Fujikawa, 2014
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Humerobates nudus* (Hammer, 1967) (*Baloghobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda, Corea y Taiwán [Formosa].
 - *Humerobates papuanus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Humerobates parvoglobosus* (Hammer, 1967) (*Baloghobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Humerobates perkinsi* Jacot, 1934 (*H. humeralis* p.)
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).
 - *Humerobates pomboi* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- Humerobates rostromellatus* Grandjean, 1936
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: excepto Paleártica oriental, Etiópica, Islas del Pacífico y Méjico).
- *Humerobates rostromellatus rostromellatus* Grandjean, 1936
(?= *Oribata arborea* Banks, 1895 “sp. inq.”)
(= *Sphaerobates dentatus* Mihelčič, 1957)
(?= *Acarus fungorum* Linnaeus, 1758 “sp. inq.”)
(?= *Murcia rubra* Koch, 1841 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Neártica, Etiópica, Islas de Pacífico y Méjico).
 - *Humerobates rostromellatus giganteus* Willmann, 1939 (*H. fungorum* g.)
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
 - *Humerobates rostromellatus gadarramicus* Pérez-Íñigo, 1972
(?= *Chamobates magnus* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Humerobates rostromellatus mauritius* Jacot, 1936 (*H. humeralis* m.)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Humerobates setosus* Behan-Pelletier y Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Humerobates taiwanensis* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Humerobates varius* Ohkubo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Humerobates zumpti* Sellnick, 1957
DISTRIBUCIÓN: Namibia.
- Nuhivabates*** Niemi y Behan-Pelletier, 2004 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Nuhivabates nukuhiva* Niemi y Behan-Pelletier, 2004
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Nuhivabates hivaoa* Niemi y Behan-Pelletier, 2004
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
 - *Nuhivabates nukuhiva* Niemi y Behan-Pelletier, 2004
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- Ramsayellus*** Spain y Luxton, 1970 (5 spp.)
(= *Ulugurozetes* Mahunka, 1984)
(= *Zealandobates* Hammer, 1967, “nom. praeoc.” por Hopkins, 1966)
ESPECIE TIPO: *Zealandobates grandis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Ramsayellus conspicuus* (Berlese, 1916) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
 - *Ramsayellus fallax* (Pearce, 1906) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
 - *Ramsayellus grandis* (Hammer, 1967) (*Zealandobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Ramsayellus seychellensis* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
 - *Ramsayellus turbulentus* (Mahunka, 1984) (*Ulugurozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Svalbardia Thor, 1930 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Svalbardia paludicola* Thor, 1930

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina.

- *Svalbardia paludicola* Thor, 1930

DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Norte de Europa, Sur de Siberia, Neártica septentrional: frecuente, y Cáucaso).

Punctoribatidae Thor, 1937 (12 gen., 5 subg., 99 spp. y 1 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Allomycobates Aoki, 1976 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Allomycobates lichensis* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Allomycobates lichensis* Aoki, 1976

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Cryptobothria Wallwork, 1963 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cryptobothria monodactyla* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Antártica.

- *Cryptobothria monodactyla* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).

- *Cryptobothria papuana* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Ellipsozetes Bernini, 1980 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Ellipsozetes sphaerulus* Bernini, 1980

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Ellipsozetes sphaerulus* Bernini, 1980

DISTRIBUCIÓN: Italia.

Feiderzetes Subías, 1977 (1 sp.)

(=*Allozetes* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971, "nom. praecoc." por Berlese, 1913)

ESPECIE TIPO: *Punctoribates (Minunthozetes) latus* Schweizer, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Feiderzetes latus* (Schweizer, 1956) (*Punctoribates (Minunthozetes)*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Minunthozetes Hull, 1916 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Oribata fusigera* Michael, 1884) = *Zetes semirufus* Koch, 1841

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Minunthozetes (Minunthozetes) Hull, 1916 (4 spp.)

(=*Jurabates* Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Minunthozetes (M.) pseudofusiger* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente).

- *Minunthozetes (M.) quadriareatus* Mínguez, Subías y Ruiz, 1986

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Minunthozetes (M.) semirufus* (Koch, 1841) (*Zetes*)

(=*Punctoribates bicornis* Berlese, 1908)

(=*Oribata fusigera* Michael, 1884)

(=*Minunthozetes major* Mihelčič, 1957)

DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (Paleártica occidental: frecuente, y Asia centrooccidental) y Canadá.

- *Minunthozetes (M.) tarmani* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971

(?= *Punctoribates atomus* Berlese, 1908 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Este de Rusia asiática).

Minunthozetes (Inigozetes) Subías, 2000 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Minunthozetes reticulatus* Pérez-Íñigo, 1969

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Minunthozetes (Inigozetes) reticulatus* Pérez-Íñigo, 1969 (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.

Mycobates Hull, 1916 (35 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata parmeliae* Michael, 1884

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y "Neotropical".

***Mycobates (Mycobates)* Hull, 1916 (16 spp.)**

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Mycobates (M.) acuspidatus* Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (M.) cambricus* (Hull, 1916) (*Melanozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Mycobates (M.) carli* (Schweizer, 1922) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Mycobates (M.) corticeus* Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Mycobates (M.) debilis* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Mycobates (M.) exigualis* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Boreal (Noruega y Neártica septentrional).
- *Mycobates (M.) flabelliger* (Berlese, 1908) (*Sphaerozetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
- *Mycobates (M.) hylaeus* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. oriental y Canadá).
- *Mycobates (M.) integer* Mihelčič, 1957
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Mycobates (M.) monodactylus* Shaldybina, 1970
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental y Paleártica oriental.
- *Mycobates (M.) parmelliae* (Michael, 1884) (*Oribata*)
(=*Sphaerozetes (Trichoribates) lenicomus* Berlese, 1910)
(=*Mycobates nadiji* Pavlichenko, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa: frecuente, Paleártica oriental y Canadá).
- *Mycobates (M.) perates* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mycobates (M.) rileyi* (Haller, 1884) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: “Neotropical”.
- *Mycobates (M.) tricostatus* Aoki, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Mycobates (M.) tridentatus* Weigmann, 1976
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Mycobates (M.) yukonensis* Behan-Pelletier, 1994
DISTRIBUCIÓN: Canadá.

***Mycobates (Calyptozetes)* Thor, 1930 (19 spp.)**(=*Permycobates* Strenzke, 1954)ESPECIE TIPO: *Oribata sarekensis* Trägårdh, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental y Neotropical.

- *Mycobates (Calyptozetes) alpinus* (Willmann, 1951) (C.)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Mycobates (Calyptozetes) altus* Behan-Pelletier, 1994 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mycobates (Calyptozetes) austroamericanus* Hammer, 1958 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Bolivia e Irán.
- *Mycobates (Calyptozetes) azaleos* Behan-Pelletier, 1994 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica.
- *Mycobates (Calyptozetes) beringianus* Behan-Pelletier, 1994 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) bicornis* (Strenzke, 1954) (*Permycobates*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Mycobates (Calyptozetes) brevilamellatus* Behan-Pelletier, 1994 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Mycobates (Calyptozetes) conitus* Hammer, 1952 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Boreal: Neártica septentrional (frecuente) y Noreste de Rusia asiática.
- *Mycobates (Calyptozetes) cribelliger* (Berlese, 1904) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Europa occidental.
- *Mycobates (Calyptozetes) dryas* Behan-Pelletier, 1994 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) hammerae* Behan-Pelletier, 1994 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calyptozetes) incurvatus* Hammer, 1952 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Neártica y Este de Paleártica oriental).
- *Mycobates (Calyptozetes) monocornis* Aoki, 1973 (M.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Mycobates (Calypozetes) occidentalis* Behan-Pelletier, 1994 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Mycobates (Calypozetes) patrius* Shaldybina, 1970 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea oriental y Paleártica oriental).
- *Mycobates (Calypozetes) punctatus* Hammer, 1955 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Rusia asiática y Neártica septentrional).
- *Mycobates (Calypozetes) royi* Palacios-Vargas y Vázquez, 1988 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Mycobates (Calypozetes) sarekensis* (Trägårdh, 1910) (*Oribata*)
(=*Mycobates consimilis* Hammer, 1952)
DISTRIBUCIÓN: Boreoalpina (Euroatlántica: frecuente, Asia central rusa y Neártica septentrional: frecuente).
- *Mycobates (Calypozetes) tridactylus* Willmann, 1929 (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional) y Oriental (India: Tripura).

Mycozetes Spain, 1968 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Mycozetes oleariae* Spain, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Mycozetes oleariae* Spain, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Neomycobates Wallwork, 1963 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Neomycobates tridentatus* Wallwork, 1963

DISTRIBUCIÓN: Antártica y Australiana.

- *Neomycobates tridentatus* Wallwork, 1963
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie) y Nueva Zelanda.

Pelopsis Hall, 1911 (3 spp.)

(=*Ewingozetes* Hammer, 1952)

(=*Parapelops* Jacot, 1938)

ESPECIE TIPO: (*Pelopsis nudiuscula* Hall, 1911) =*Pelops bifurcatus* Ewing, 1909

DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.

- *Pelopsis baloghi* Behan-Pelletier y Eamer, 2003
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Pelopsis bidentatus* (Hammer, 1961) (*Parapelops*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pelopsis bifurcatus* (Ewing, 1909) (*Pelops*)
(=*Pelopsis nudiuscula* Hall, 1911)
(=*Galumna partita* Banks, 1910)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (frecuente).

Punctoribates Berlese, 1908 (29 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata punctum* Koch, 1839

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Punctoribates (Punctoribates) Berlese, 1908 (19 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Australianooriental).

- *Punctoribates (P.) angulatus* Bayartogtokh, Grobler y Cobanoglu, 2000
DISTRIBUCIÓN: Turquía e Irán.
- *Punctoribates (P.) aveiroensis* Weigmann, 2009
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Punctoribates (P.) brevicuspidatus* Bayartogtokh y Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Punctoribates (P.) ezoensis* (Fujikawa, 1982) (*Mycobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Punctoribates (P.) ghilarovi* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica occidental y Mongolia.
- *Punctoribates (P.) grishinae* Shaldybina, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Cáucaso y Siberia central).
- *Punctoribates (P.) liber* Pavlichenko, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Punctoribates (P.) meridianus* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Punctoribates (P.) minimus* Shaldybina, 1969
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (excepto Este).
- *Punctoribates (P.) moldavicus* Vasiliu y Călugăr, 1976
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Punctoribates (P.) mundus* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Paleártica oriental: excepto Norte).
- *Punctoribates (P.) pannonicus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Punctoribates (P.) punctum* (Koch, 1839) (*Oribata*)
(=*Punctoribates latilobatus* Kunst, 1958)
(=*Punctoribates pragensis* Winkler, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, Este de U.S.A., Oriental y Nueva Zelanda).
- *Punctoribates (P.) selgae* (Pérez-Íñigo, 1976) (*Minunthozetes*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- Punctoribates (P.) sellnicki* Willmann, 1928
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europea y Mongolia.
 - *Punctoribates (P.) sellnicki sellnicki* Willmann, 1928
(=*Punctoribates hygrophilus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Europea (frecuente) y Mongolia.
 - *Punctoribates (P.) sellnicki crassirostris* Strenzke, 1952
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Punctoribates (P.) sibiricus* Grishina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Punctoribates (P.) sphaericus* Shaldybina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central).
- *Punctoribates (P.) torii* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Punctoribates (P.) tschernovi* Shtanchaeva y Subías, 2014
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Punctoribates (Minguezetes) Subías, Kahwash y Ruiz, 1990 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Minguezetes conjunctus* Subías, Kahwash y Ruiz, 1990

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Punctoribates (Minguezetes) conjunctus* (Subías, Kahwash y Ruiz, 1990) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Punctoribates (Minguezetes) hexagonus* Berlese, 1908 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Paleártica oriental meridional y Neártica septentrional), Vietnam y Zambia.
- *Punctoribates (Minguezetes) inecola* (Nozaki y Nakamura, 2004) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Punctoribates (Minguezetes) insignis* Berlese, 1910 (*P.*)
(=*Punctoribates manzanoensis* Hammer, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Vietnam y subtropical (excepto Etiópica).
- *Punctoribates (Minguezetes) longiporosus* Balogh, 1963 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Madagascar), Noreste de China y Oriental.
- *Punctoribates (Minguezetes) palustris* (Banks, 1895) (*Oribata*)
(=*Galumna armipes* Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (frecuente) y Paleártica occidental (Italia y Cáucaso).
- *Punctoribates (Minguezetes) weigmanni* Behan-Pelletier y Eamer, 2008 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A.: Misuri, y Canadá).

Punctoribates (Semipunctoribates) Mahunka, 1987 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Semipunctoribates hungaricus* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Punctoribates (Semipunctoribates) astrachanicus* Shaldybina, 1973 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea.
- *Punctoribates (Semipunctoribates) hungaricus* (Mahunka, 1987) (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Punctoribates (Semipunctoribates) zachvatkini* Shaldybina, 1969 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Mongolia).

Tutorozetes Hammer, 1967 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Tutorozetes termophilus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Austral (Australiana y Neotropical).

- *Tutorozetes incisirostris* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Tutorozetes termophilus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).

Zachvatkinibates Shaldybina, 1973 (18 spp.)

ESPECIE TIPO: *Zachvatkinibates nemoralis* Shaldybina, 1973

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

Zachvatkinibates (*Zachvatkinibates*) Shaldybina, 1973 (16 spp.)

(=*Eupuncatoribates* Hammer, 1977)

DISTRIBUCIÓN: Holártica.

- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *anoporosus* (Mahunka, 2006) (*Schweizerzetes*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *conjunctus* Shaldybina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *eoeryi* (Mahunka, 1972) (*Puncatoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional (Croacia y Portugal).
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *epiphytos* Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2001
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *humectus* (Hull, 1915) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *latilamellatus* Bayartogtokh y Aoki, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *lobatus* (Hammer, 1977) (*Eupuncatoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *maritimus* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Borealpina (Este de Paleártica oriental, Cáucaso y Neártica septentrional).
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *mongolicus* Bayartogtokh, 2003
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *nemoralis* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Asia central.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *nortoni* Behan-Pelletier y Eamer, 2005
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *quadrivertex* (Halbert, 1920) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental, Paleártica oriental (I. Kuriles) y Neártica septentrional.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *schatzi* Behan-Pelletier y Eamer, 2005
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *shaldybinae* Behan-Pelletier y Eamer, 2005
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *tetrasklerosis* Behan-Pelletier, 1988
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Zachvatkinibates* (*Z.*) *volgini* Shaldybina, 1973
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Zachvatkinibates (*Alpizetes*) Mahunka, 2001 (2 spp.)

(=*Schweizerzetes* Mahunka, 2001)

ESPECIE TIPO: *Alpizetes behanae* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Zachvatkinibates* (*Alpizetes*) *behanae* (Mahunka, 2001) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Zachvatkinibates* (*Alpizetes*) *perlongus* (Balogh, 1959) (*Puncatoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.

Zetomotrichoidea Grandjean, 1934

Zetomotrichidae Grandjean, 1934 (10 gen., 3 subg., 40 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Anoplozetes Lee y Pajak, 1987 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Anoplozetes jamiesoni* Lee y Pajak, 1987

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Anoplozetes jamiesoni* Lee y Pajak, 1987
DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Demisalto Coetzee, 1993 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Demisalto engelbrechti* Coetzee, 1993

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Demisalto (*Demisalto*) Coetzee, 1993 (1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Demisalto* (*D.*) *engelbrechti* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Bengala Occidental).

Demisalto (*Saltatrichus*) Coetzee, 1993 (4 spp.)ESPECIE TIPO: *Saltatrichus magnus* Coetzee, 1993

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Demisalto* (*Saltatrichus*) *magnus* (Coetzee, 1993) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Zambia).
- *Demisalto* (*Saltatrichus*) *marshalli* (Coetzee, 1995) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Demisalto* (*Saltatrichus*) *minus* (Coetzee, 1993) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Demisalto* (*Saltatrichus*) *robustus* (Coetzee, 1993) (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Floritrichus Coetzee, 2003 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Floritrichus louisbothai* Coetzee, 2003

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Floritrichus louisbothai* Coetzee, 2003
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Ghilarovus Krivolutsky, 1966 (15 spp. y 1 ssp.)(=*Desertozetes* Khanbekyan, 1990)ESPECIE TIPO: *Ghilarovus humeridens* Krivolutsky, 1966

DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica, Oriental y Neotropical).

- *Ghilarovus armenicus* Khanbekyan, 1990
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ghilarovus changlingensis* Wen, 1990
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Ghilarovus daliensis* Yamamoto y Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Ghilarovus elegans* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Ghilarovus hispanicus* Subías y Pérez-Íñigo, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Ghilarovus hispanicus hispanicus* Subías y Pérez-Íñigo, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (España, Cáucaso e Irán).
 - *Ghilarovus hispanicus gadarramicus* Subías, 1977
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Ghilarovus humeridens* Krivolutsky, 1966
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).
- *Ghilarovus khentiicus* Bayartogtokh y Smelyansky, 2007
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ghilarovus krivolutskyi* Bayartogtokh y Smelyansky, 2007
DISTRIBUCIÓN: Asia central rusa.
- *Ghilarovus kvavadzei* Murvanidze, 2014
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ghilarovus metsamoricus* (Khanbekyan, 1990) (*Desertozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Ghilarovus mongolicus* Bayartogtokh y Smelyansky, 2007
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Ghilarovus sanukiensis* Fujikawa, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ghilarovus saxicola* Aoki e Hirauchi, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Ghilarovus stipatus* Krivolutsky y Smelyanski, 1997
DISTRIBUCIÓN: Asia centooccidental.
- *Ghilarovus turcmenicus* Krivolutsky, 1974
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Mabulatrachus Coetzee, 1993 (5 spp.)(=*Hungaromotrichus* Mahunka, 1993)ESPECIE TIPO: *Mabulatrachus dentatus* Coetzee, 1993

DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional y Etiópica).

- *Mabulatrachus baloghi* (Mahunka, 1993) (*Hungaromotrichus*)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Mabulatrachus dentatus* Coetzee, 1993
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Mabulatrachus iranicus* Akarmi y Coetzee, 2007
DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Mabulatrachus kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Mabulatrachus litoralis* Aoki e Hirauchi, 2000
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Mikizetes Hammer, 1958 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mikizetes diamantensis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica meridional.

Mikizetes (Mikizetes) Hammer, 1958 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mikizetes (M.) diamantensis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
- *Mikizetes (M.) flagellifer* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile).

Mikizetes (Oglasacarus) Bernini, 1979 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oglasacarus oglasae* Bernini, 1979
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Mikizetes (Oglasacarus) oglasae* (Bernini, 1979) (*M.*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

Pallidacarus Krivolutsky, 1975 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pallidacarus tichomirovi* Krivolutsky, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Pallidacarus tichomirovi* Krivolutsky, 1975
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Sur de Rusia europea y Asia centrooccidental).

Rohria Balogh y Mahunka, 1977 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Rohria pulchella* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rohria pulchella* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Turkmenitrichus Krivolutsky y Karppinen, 2006 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Turkmenitrichus caverniculus* Krivolutsky y Karppinen, 2006
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Turkmenitrichus caverniculus* Krivolutsky y Karppinen, 2006
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Zetomotrichus Grandjean, 1934 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Zetomotrichus lacrimans* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

Zetomotrichus (Zetomotrichus) Grandjean, 1934 (6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Zetomotrichus (Z.) bidentatus* Hammer, 1977 (*Z. lacrimans b.*)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Zetomotrichus (Z.) kenyaensis* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Zetomotrichus (Z.) lacrimans* Grandjean, 1934
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) y tropical: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía), Filipinas y Cuba.
- *Zetomotrichus (Z.) lienhardi* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Zetomotrichus (Z.) linearis* Tseng, 1982
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Zetomotrichus (Z.) persicus* Akrami y Behmanesh, 2013
DISTRIBUCIÓN: Irán.

Zetomotrichus (Keralotrichus) Mahunka, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Keralotrichus plumosus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Zetomotrichus (Keralotrichus) plumosus* (Mahunka, 1985) (*K.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Oripodoidea Jacot, 1925

Drymobatidae J. y P. Balogh, 1984 (2 gen., 1 subg. y 8 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

Drymobates Grandjean, 1930 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Drimobates silvicola* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Drymobates silvicola* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Perú).

Drymobatoides Jacot, 1936 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Drymobatoides mauritius* Jacot, 1936

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Drymobatoides (*Drymobatoides*) Jacot, 1936 (4 spp.)

(=*Pelokylla* Adolph y Haq, 1982)

(=*Seychellozetes* Mahunka, 1984)

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Drymobatoides (D.) benoiti* (Mahunka, 1984) (*Seychellozetes*)

DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

- *Drymobatoides (D.) boronganensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Drymobatoides (D.) malabaricus* (Adolph y Haq, 1982) (*Pelokylla*)

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Drymobatoides (D.) mauritius* Jacot, 1936

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

Drymobatoides (*Rykella*) Balogh, 1962 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rykella insignis* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Drymobatoides (Rykella) asiatica* (Yamamoto y Aoki, 2000) (*R.*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Drymobatoides (Rykella) elamellata* (Berlese, 1916) (*Podoribates*)

DISTRIBUCIÓN: África oriental.

- *Drymobatoides (Rykella) insignis* (Balogh, 1962) (*R.*)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Mochlozetidae Grandjean, 1960 (10 gen., 2 subg., 68 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Dynatozetes Grandjean, 1960 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dynatozetes amplus* Grandjean, 1960

DISTRIBUCIÓN: Neártica y Neotropical.

- *Dynatozetes amplus* Grandjean, 1960

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Dynatozetes hexaporosus* Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Dynatozetes magnus* (Banks, 1895) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental.

- *Dynatozetes obesus* Grandjean, 1960

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Gephyrazetes Hirauchi, 1999 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Gephyrazetes fasciatus* Hirauchi, 1999

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Gephyrazetes fasciatus* Hirauchi, 1999

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Mahunkazetes J. y P. Balogh, 1992 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mochlozetes africanus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Mahunkazetes africanus* (Mahunka, 1988) (*Mochlozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Mahunkazetes longicuspis* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Podoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Congo.

Mochlobates Norton, 1984 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata affinis* Banks, 1895

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Mochlobates affinis* (Banks, 1895) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A.

Mochloribatula Mahunka, 1979 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mochloribatula multiporosa* Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Mochloribatula bahamensis* Norton, 1983

(=*Mochloribatula calycifera* Mahunka, 1985)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y U.S.A. meridional

- *Mochloribatula depilis* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).

- *Mochloribatula floridana* (Banks, 1904) (*Eremaeus*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Mochloribatula grandjeani* Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Antillas (La Española: R. Dominicana).

- *Mochloribatula metzi* Norton, 1983

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Mochloribatula multiporosa* Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Antillas e I. Galápagos, y Paleártica oriental (Irán).

- *Mochloribatula texana* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Texas).

Mochlozetes Grandjean, 1930 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mochlozetes penetrabilis* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Tropical (excepto Etiópica) y subtropical.

- *Mochlozetes asculpturatus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mochlozetes chambrieri* Mahunka, 1990

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Indonesia: Lombok).

- *Mochlozetes flatus* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Panamá.

- *Mochlozetes grandis* Wang y Lu, 1996

(=*Mochlozetes grandis* Lu y Wang, 1996, "nom. praeoc." por Wang y Lu, 1996)

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Mochlozetes maximus* (Ewing, 1908) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. central.

- *Mochlozetes officiosus* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Colombia.

- *Mochlozetes penetrabilis* Grandjean, 1930

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Japón.

- *Mochlozetes ryukyuensis* Aoki, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.

- *Mochlozetes saltaensis* Alzuet, 1989

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Nesiotizetes Jacot, 1934 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Nesiotizetes adamsoni* Jacot, 1934

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Nesiotizetes adamsoni* Jacot, 1934

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).

Podoribates Berlese, 1908 (15 spp. y 1 ssp.)

(=*Cardioribates* Jacot, 1934)

(=*Falsolobozetes* Tseng, 1984)

(=*Sphaerobates* Sellnick, 1928)

ESPECIE TIPO: *Oribata longipes* Berlese, 1887

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Podoribates artilamellatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).

- *Podoribates cuscensis* (Hammer, 1961) (*Sphaerobates*)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Podoribates cuspidatus* Sakakibara y Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.

- *Podoribates foveolatus* (Hammer, 1958) (*Sphaerobates*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Podoribates glaber* (Berlese, 1916) (*Sphaerozetes* (*Trichoribates*))
DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.
- Podoribates javensis* (Willmann, 1932) (*Sphaerobates*)
DISTRIBUCIÓN: Java y Sudáfrica.
 - *Podoribates javensis javensis* (Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Podoribates javensis africanus* Jacot, 1940
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Podoribates laneus* (Tseng, 1984) (*Falsolobozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Podoribates longipes* (Berlese, 1887) (*Oribata*)
(=*Sphaerozetes gratus* Sellnick, 1922)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Asia central rusa y Canadá).
- *Podoribates minusculus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Podoribates oriformis* (Pearce, 1910) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Podoribates platensis* Berlese, 1916 (*P. longipes* p.)
DISTRIBUCIÓN: Argentina y Mongolia.
- *Podoribates pratensis* (Banks, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
- *Podoribates rectus* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Uruguay.
- *Podoribates turgidus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Norte).

***Unguizetes* Sellnick, 1925 (21 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Oribata sphaerula* Berlese, 1905

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

***Unguizetes* (*Unguizetes*) Sellnick, 1925 (20 spp.)**

(=*Terrazetes* Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Unguizetes* (*U.*) *acutirostris* Ermilov y Kalúz, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Unguizetes* (*U.*) *asiaticus* Ermilov y Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Unguizetes* (*U.*) *atypicus* (Mahunka, 1982) (*Mochlozetes*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Unguizetes* (*U.*) *cattienensis* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Unguizetes* (*U.*) *clavatus* Aoki, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Este de Paleártica oriental.
- *Unguizetes* (*U.*) *curypterus* Wen y Zhao, 1994
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Unguizetes* (*U.*) *ermilovi* Seniczak, Kaczmarek y A. Seniczak, 2017
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Unguizetes* (*U.*) *granulatus* Sanyal, Saha y Chakraborty, 2006
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Unguizetes* (*U.*) *incertus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Uracrobates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Unguizetes* (*U.*) *inermis* Mahunka, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Indonesia: Lombok).
- *Unguizetes* (*U.*) *keralensis* (Balakrishnan, 1989) (*Terrazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Kerala) y Filipinas.
- *Unguizetes* (*U.*) *latus* Ermilov y Anichkin, 2013
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Unguizetes* (*U.*) *longiporosus* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Terrazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Unguizetes* (*U.*) *mauritius* (Jacot, 1936) (*Terrazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio) e India (Tripura).
- *Unguizetes* (*U.*) *reticulatus* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo) y Arabia Saudita.
- *Unguizetes* (*U.*) *setiger* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Uracrobates*)
(=*Podoribates brasiliensis* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Unguizetes (U.) similis* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Ecuador).
- *Unguizetes (U.) sphaerula* (Berlese, 1905) (*Oribata*)
(=*Unguizetes triplicatulus* Grandjean, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Unguizetes (U.) striatus* Fujikawa, 2004
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Unguizetes (U.) yemeniticus* Mahunka, 2000
DISTRIBUCIÓN: Yemen.

Unguizetes (Calugarella) J. y P. Balogh, 1992 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Unguizetes sabahnus* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Unguizetes (Calugarella) sabahnus* Mahunka, 1987 (*U.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Uracrobates Balogh y Mahunka, 1967 (5 spp.)
ESPECIE TIPO: *Uracrobates magniporosus* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

Uracrobates (Uracrobates) Balogh y Mahunka, 1967 (4 spp.)
(=*Urobates* Hammer, 1973)

- DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).
- *Uracrobates (U.) africanus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Uracrobates (U.) indicus* Ramani y Haq, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala y Arunachal Pradesh).
 - *Uracrobates (U.) magniporosus* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Vietnam y Taiwán [Formosa].
 - *Uracrobates (U.) pygiseta* (Hammer, 1973) (*Urobates*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.

Uracrobates (Parauracrobates) Ermilov y Martens, 2015 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Uracrobates (Parauracrobates) truncatus* Ermilov y Anichkin, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Uracrobates (Parauracrobates) newtaipeiensis* Ermilov y Liao, 2017
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Uracrobates (Parauracrobates) truncatus* Ermilov y Martens, 2015
DISTRIBUCIÓN: Nepal.

Oribatulidae Thor, 1929 (17 gen., 6 subg., 210 spp. y 6 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Capiloppia Balogh y Mahunka, 1966 (2 spp.)
ESPECIE TIPO: *Capiloppia capillata* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Capiloppia capillata* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Capiloppia hessei* (Jacot, 1940) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Gerloubia Coetzer, 1968 (6 spp.)
ESPECIE TIPO: *Eporibatula bicuspidata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional y tropical (excepto Australiana).

Gerloubia (Gerloubia) Coetzer, 1968 (2 spp.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Gerloubia (G.) chinensis* Aoki y Yamamoto, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Gerloubia (G.) saifulmalukensis* Hammer, 1977
(=*Liebstadia khugniensis* Bayartogtokh, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Ibérica y Paleártica oriental meridional).

Gerloubia (Baobabula) Mahunka, 1975 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Baobabula mussardi* Mahunka, 1975
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Gerloubia (Baobabula) mussardi* Mahunka, 1975 (*B.*)

DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Gerloubia (*Monophauloppia*) P. Balogh, 1988 (3 spp.)

(=*Fuerteventuria* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)

ESPECIE TIPO: *Paraphauloppia* (*Monophauloppia*) *planissima* P. Balogh, 1988

DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional y Neotropical.

- *Gerloubia* (*Monophauloppia*) *bicuspidata* (Hammer, 1958) (*Eporibatula*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina y U.S.A. (California).

- *Gerloubia* (*Monophauloppia*) *hispanica* Subías, 1977 (*G.*)

(=*Liebstadia ahumerata* Mahunka, 1987)

(=*Fuerteventuria mirabilis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Gerloubia* (*Monophauloppia*) *planissima* (P. Balogh, 1988) (*Paraphauloppia* (*M.*))

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Grandjeania Balogh, 1963 (1 sp.)

(=*Grandjeanella* Balogh, 1961, "nom. praeoc." por Southcott, 1961)

ESPECIE TIPO: *Grandjeanella bicaudata* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

- *Grandjeania bicaudata* (Balogh, 1961) (*Grandjeanella*)

DISTRIBUCIÓN: Angola y Pequeñas Antillas.

Jornadia Wallwork y Weems, 1984 (3 spp.)

(=*Woolleybates* J. y P. Balogh, 1984)

ESPECIE TIPO: *Jornadia larreae* Wallwork y Weems, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neártica subtropical y Neotropical.

- *Jornadia dactyloscopica* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Oribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral e Irán.

- *Jornadia larreae* Wallwork y Weems, 1984

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nuevo Méjico).

- *Jornadia longipilis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Lucoppia Berlese, 1908 (3 spp.)

(=*Romanobates* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970)

ESPECIE TIPO: (*Zetes lucorum* Koch "sensu" Berlese, 1892) =*Notaspis burrowsi* Michael, 1890

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Lucoppia burrowsi* (Michael, 1890) (*Notaspis*)

(=*Zygoribatula apletosa* Higgins y Woolley, 1975)

(=*Phauloppia banksi* Marshall, Reeves y Norton, 1987)

(=*Romanobates maiensis* Choi, 1995)

(=*Lucoppia orientalis* Djaparidze, 1985)

(=*Notaspis pectinata* Hall, 1912, "nom. praeoc." por Michael, 1885)

(=*Scutovertex pilosus* Banks, 1895)

(=*Eremaeus sanremensis* Oudemans, 1900)

(=*Zygoribatula spinosissima* Mihelčič, 1956)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Paleártica oriental: Irán y Corea, y Neártica) y tropical (China suroriental y Hawái).

- *Lucoppia feideri* Subías, 2010

(=*Romanobates reticulatus* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970, "nom. praeoc." por Willmann, 1933)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental y Chile.

- *Lucoppia nicora* Djaparidze, 1986

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Lunoribatula Mahunka, 1982 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Lunoribatula polygonata* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

- *Lunoribatula polygonata* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiopía y Chile.

Megatrichobates Grobler, 2000 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Megatrichobates striatus* Grobler, 2000

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Megatrichobates longisetosus* Grobler, 2000

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Megatrichobates smithersi* (Jacot, 1940) (*Oribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Megatrichobates striatus* Grobler, 2000
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Neolucoppia Tseng, 1984 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Neolucoppia luculenta* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Neolucoppia luculenta* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Oribatula Berlese, 1896 (137 spp. y 6 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis tibialis* Nicolet, 1855
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Oribatula (Oribatula) Berlese, 1896 (36 spp. y 3 sspp.)
(=*Ceroribatula* Lee y Birchby, 1989)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Oribatula (O.) acuminata* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad).
- *Oribatula (O.) angustolamellata* Iordansky, 1991
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
- *Oribatula (O.) arboricola* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Oribatula (O.) commutata* Iordansky, 1991
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Oribatula (O.) elegantissima* Balogh y Mahunka, 1965
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
- *Oribatula (O.) elegantula* (Schweizer, 1956) (*Trhypochthonius*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) exsudans* Travé, 1961
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Oribatula (O.) incerta* Pérez-Íñigo y Peña, 1996
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Oribatula (O.) incompleta* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Oribatula (O.) incrustata* (Lee y Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- Oribatula (O.) interrupta* (Willmann, 1939) (*Zygoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional) y Etiopía.
 - *Oribatula (O.) interrupta interrupta* (Willmann, 1939)
(=*Zygoribatula bulanovae* Kulijev, 1961)
(=*Oribatula divida* Mahunka, 1987)
(=*Zygoribatula eucalla* Wen y Zhang, 1988)
(=*Oribatula parisi* Travé, 1961)
(=*Oribatula simikovae* Iordansky, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional) y Etiopía.
 - *Oribatula (O.) interrupta major* Mihelčič, 1963
(=*Zygoribatula saxicola* Kunst, 1959, “nom. praeoc.” por Halbert, 1920)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Asia centrooccidental).
- *Oribatula (O.) kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (O.) latirostris* (Schweizer, 1956) (*Hypochthonius*) “sp. inq.” (juvenil)
(no Willmann, 1951 =*Paraphauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) longelamellata* Schweizer, 1956
DISTRIBUCIÓN: Europa centrooccidental.
- *Oribatula (O.) macrostrum* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) macrostega* Iturrondobeitia, 1985
(=*Oribatula longilamellata* Subías, 1977, “nom. praeoc.” por Schweizer, 1956)
(?=*Eporibatula nodifer* Mihelčič, 1956 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatula (O.) megaforamina* (Lee y Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (O.) mesosetosa* (Lee y Birchby, 1991) (*Fovoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (O.) nativa* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Oribatula (O.) nayloroensis* Fujita y Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (O.) neonominata* Subías, 2004 “sp. inq.”
(=*Oribatula dentata* Mihelčič, 1969, “nom. praecoc.” por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Oribatula (O.) nivalis* (Schweizer, 1956) (*Parhypochthonius*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Oribatula (O.) pannonica* Willmann, 1949
(=*Oribatula tenella* Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula tenella longipilus* Mihelčič, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica.
- *Oribatula (O.) polytuberculata* Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Orobitg, 2012
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Oribatula (O.) praeoccupata* Subías, 2004
(=*Oribatula dentata* Grobler y Skubala, 2000, “nom. praecoc.” por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Oribatula (O.) repetita* Subías, 2004
(=*Oribatula lineata* Bayartogtokh y Aoki, 1997, “nom. praecoc.” por Hammer, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oribatula (O.) robusta* Iordansky, 1991
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatula (O.) rotundata* Thor, 1937 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Noruega.
- *Oribatula (O.) runcinata* Lee, 1992
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (O.) tablasota* (Schweizer, 1956) (*Trhypochthonius*) “sp. inq.” (juvenil)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- Oribatula (O.) tibialis* (Nicolet, 1855) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, India (Sikkim) y Norte de Neotropical.
 - *Oribatula (O.) tibialis tibialis* (Nicolet, 1855)
(=*Oribatula affinis* Hull, 1914)
(=*Oribatula alpina* Schweizer, 1956)
(=*Oribatula coggii* Jacot, 1929)
(=*Oribata crassipes* L. Koch, 1879)
(=*Notaspis exilis maculata* Schweizer, 1922)
(=*Oribatula tibialis azerbeidjanica* Kulijev, 1962)
(=*Oribatula tibialis sardo* Berlese, 1916)
(=*Oribatula unica* Golosova y Karppinen, 1985)
(=*Oribatula venusta* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente), India (Sikkim) y Norte de Neotropical.
 - *Oribatula (O.) tibialis amblyptera* Berlese, 1916 (*O. a.*)
(?= *Notaspis minuta* Ewing, 1909 “sp. inq.”)
(?= *Liacarus minutus* Ewing, 1909 “sp. inq.”)
(?= *Oribatula pallida* Banks, 1906 “sp. inq.”)
(= *Oribatula saljanica* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional y Neártica).
 - *Oribatula (O.) tibialis caliptera* Berlese, 1902 (*O. c.*)
(=*Oribatula beccus* Djaparidze, 1990)
(=*Oribatula intermedia* Mihelčič, 1969)
(=*Oribatula tibialis alata* Iordansky, 1991, “nom. praecoc.” por Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula tibialis allifera* Subías, 2000)
(=*Zygoribatula vera* Bulanova-Zachvatkina, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Mediterránea, Irán y Neártica septentrional).
 - *Oribatula (O.) torrijosi* Subías, Ruiz y Kahwash, 1990
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Oribatula (O.) transitans* Berlese, 1916 (*O. (Zygoribatula)*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Oribatula (O.) translineata* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.
 - *Oribatula (O.) variaporosa* Iordansky, 1991
DISTRIBUCIÓN: Ucrania.
 - *Oribatula (O.) zhangii* Wang y Cui, 1996
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Oribatula (Zygoribatula) Berlese, 1916 (101 spp. y 3 sspp.)
(=*Fovoribatula* Lee y Birchby, 1991)
(=*Neoribatula* Ewing, 1917)

(=*Zetobelba* Hull, 1916)

ESPECIE TIPO: *Oribatula connexa* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Oribatula (Zygoribatula) aegyptica* (Abd-el-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1982) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oribatula (Zygoribatula) agaveae* (Aoki y Wang, 1986) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: China suoriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) andrianovae* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Sur de Rusia europea y Mongolia.
- *Oribatula (Zygoribatula) arcuata* (Hammer, 1977) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Oribatula (Zygoribatula) arcuatissima* Berlese, 1916
(?=*Notaspis aequalis* Michael, 1890 “sp. inq.”)
(=*Zygoribatula gozmanyi* Mahunka, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Mediterránea occidental y “U.S.A.: Illinois”).
- *Oribatula (Zygoribatula) baloghi* (Mahunka, 1986) (Z.)
(=*Zygoribatula koki* J. y P. Balogh, 2002)
(=*Zygoribatula undulata* Balogh, 1966, “nom. praeoc.” por Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Tanzania).
- *Oribatula (Zygoribatula) beloniensis* (Sanyal, Saha y Chakraborty, 2004) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Oribatula (Zygoribatula) bizygata* (Lee y Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) bonairensis* (Willmann, 1936) (Z.)
(=*Zygoribatula heterotricha* Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Centroamérica y Brasil), Malgache (I. Mauricio), U.S.A. (Tejas) e Irán.
- *Oribatula (Zygoribatula) brevisetosa* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Oribatula (Zygoribatula) capitata* (Banks, 1910) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. central.
- *Oribatula (Zygoribatula) caspica* Shtanchaeva, Grikurova y Subías, 2011
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatula (Zygoribatula) clavata* Ewing, 1917 (*O.*)
(?=*Hoploderma capitata* Hall, 1911 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Oribatula (Zygoribatula) clavotrichobothria* (Kulijev, 1962) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Oribatula (Zygoribatula) cognata* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)
(=*Zygoribatula diversa* Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula (Zygoribatula) socia* Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional.
- *Oribatula (Zygoribatula) colemani* Franklin, Norton y Crossley jr., 2008
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Georgia).
- *Oribatula (Zygoribatula) concolor* (Banks, 1895) (*Scutovertex*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) connexa* Berlese, 1904 (*O.*)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (austral y Paleártica meridional).
 - *Oribatula (Zygoribatula) connexa connexa* Berlese, 1904
(?=*Notaspis bisignata* Coggi, 1898 “sp. inq.”)
(=*Zygoribatula concinna* Iordansky, 1990)
(=*Zygoribatula magna* Ramsay, 1966)
(=*Zygoribatula striatissima* Hammer, 1962)
(=*Zygoribatula terricola* Hammen, 1952)
(=*Zygoribatula trichosa* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica meridional, Neotropical: América austral y Brasil, y Australiana: Australia y Nueva Zelanda).
 - *Oribatula (Zygoribatula) connexa substriata* (Grobler y Kok, 1993) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Oribatula (Zygoribatula) connexa ucrainica* (Iordansky, 1990) (*Z. terricola u.*)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental e Irán.
- *Oribatula (Zygoribatula) contracta* (Grobler, 1994) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (Zygoribatula) cyclospora* (Lee, 1992) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) dactylaris* (Subías, Ruiz y Kahwash, 1990) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Oribatula (Zygoribatula) dentata* (Balogh, 1958) (Z.) “sp. inq.”

- DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Oribatula (Zygoribatula) egelida* (Tseng, 1984) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Oribatula (Zygoribatula) endroedyi* (Mahunka, 1986) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Oribatula (Zygoribatula) exarata* Berlese, 1916
(=*Oribatula rugifrons* Sellnick, 1943)
(=*Oribatula rugifrons striata* Mihelčič, 1955)
(=*Oribatula rugosa* Kulijev, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (frecuente).
 - *Oribatula (Zygoribatula) excavata* Berlese, 1916
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - Oribatula (Zygoribatula) exilis* (Nicolet, 1855) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica e I. Santa Helena.
 - *Oribatula (Zygoribatula) exilis exilis* (Nicolet, 1855)
(=*Dameosoma jugorum* Hull, 1914)
(=*Oribatula (Zygoribatula) lineola* Berlese, 1916)
(=*Zygoribatula zicsii* Bayoumi, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente) e I. Santa Helena.
 - *Oribatula (Zygoribatula) exilis spherisensilla* (Djaparidze, 1985) (Z. s.)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso y Hungría.
 - *Oribatula (Zygoribatula) floridana* (Fritz, 1982) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida) y Méjico.
 - *Oribatula (Zygoribatula) frisiae* (Oudemans, 1900) (*Eremaeus*)
(=*Zygoribatula debilitranslamellata* Kulijev, 1962)
(=*Zygoribatula frisiae insularis* Travé, 1961)
(=*Notaspis pyrostigmata* Ewing, 1909)
(=*Zygoribatula tenuelamellata* Mihelčič, 1956)
(=*Oribatula variabilis* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica meridional).
 - *Oribatula (Zygoribatula) fusca* (Ewing, 1913) (*Notaspis pyrostigmata* f.)
(=*Zygoribatula rostrata* Jacot, 1938)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Oribatula (Zygoribatula) galula* (Mahunka, 2001) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Oribatula (Zygoribatula) glabra* (Michael, 1890) (*Notaspis*)
(=*Oribatula (Zygoribatula) angulata* Berlese, 1916)
(=*Zygoribatula kelbadjarica* Kulijev, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (menos frecuente en el Norte).
 - *Oribatula (Zygoribatula) globosa* (Mahunka, 2000) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
 - *Oribatula (Zygoribatula) gracilata* (Grobler y Kok, 1993) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) e India (Bengala Occidental).
 - *Oribatula (Zygoribatula) grandjeani* (Nawar y El-Borolossy, 1993) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Oribatula (Zygoribatula) granulata* (Kunst, 1958) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Oribatula (Zygoribatula) gratiosa* (Tseng, 1984) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Oribatula (Zygoribatula) guadarramica* (E. Pérez-Íñigo, 1978) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Oribatula (Zygoribatula) hailongensis* (Wen y Zhang, 1988) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
 - *Oribatula (Zygoribatula) heterochaeta* (Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Oribatula (Zygoribatula) hispanica* Subías y Arillo, 1998
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea (España y Cáucaso).
 - *Oribatula (Zygoribatula) iheyaensis* (Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Oribatula (Zygoribatula) incurva* (Mihelčič, 1969) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Oribatula (Zygoribatula) josefstaryi* Ermilov y Rybalov, 2013 (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Oribatula (Zygoribatula) keralensis* (Ramani y Haq, 1999) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Oribatula (Zygoribatula) knighti* (Luxton, 1987) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Euroatlántica.

- *Oribatula (Zygoribatula) lata* (Hammer, 1961) (Z.)
(=*Zygoribatula elongata* Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) y Corea.
- *Oribatula (Zygoribatula) lenticulata* (Mínguez y Subías, 1986) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y "Etiópica".
- *Oribatula (Zygoribatula) levigata* (Wen y Bu, 1988) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.
- *Oribatula (Zygoribatula) lineapora* (Grobler, 1993) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Oribatula (Zygoribatula) lineata* (Hammer, 1979) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).
- *Oribatula (Zygoribatula) longicuspis* (Balogh, 1966) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Oribatula (Zygoribatula) longilinea* (Wang y Li, 1997) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) longisensilla* (Djaparidze, 1985) (Z.)
(=*Zygoribatula lanceolata* Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004)
(=*Zygoribatula longa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2010)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) longiseta* (Golosova, 1970) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Oribatula (Zygoribatula) lucida* (Ewing, 1909) (*Liacarus*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Oribatula (Zygoribatula) mabar* (Mahunka, 2000) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Península Arábiga.
- *Oribatula (Zygoribatula) mariana* Aoki, 1994 (*O. acuminata m.*)
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Oribatula (Zygoribatula) mariehammerae* (Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribatula (Zygoribatula) marina* (Fujikawa, 1972) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Oribatula (Zygoribatula) meruensis* (Mahunka, 1969) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Oribatula (Zygoribatula) microporosa* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Este de Paleártica occidental y Este de Rusia asiática).
- *Oribatula (Zygoribatula) mongolica* (Bayartogtokh y Smeliansky, 2008) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Oribatula (Zygoribatula) monozygata* (Lee y Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) niliaca* (Bayoumi, 1980) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Oribatula (Zygoribatula) novazealandica* (Hammer, 1967) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Oribatula (Zygoribatula) obsessa* Subías, 2004
(=*Fovoribatula brevisetosa* Lee y Birchby, 1991, "nom. praeoc." por Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Oribatula (Zygoribatula) oceana* (Hammer, 1972) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) e I. Galápagos.
- *Oribatula (Zygoribatula) ornata* (Berlese, 1916) (*Lucoppia*)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Oribatula (Zygoribatula) hessei* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*) "sp. inq."
(=*Oribatula (Zygoribatula) oudemansi* Subías, 2010)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Oribatula (Zygoribatula) pennata* (Grobler, 1993) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Vietnam.
- *Oribatula (Zygoribatula) prima* (Ermilov y Anichkin, 2011) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Oribatula (Zygoribatula) prodorsissima* (Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Oribatula (Zygoribatula) propinqua* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*)
(=*Eremaeus brauni* Sellnick, 1908)
(=*Zygoribatula extremodontata* Kulijev, 1962)
(=*Zygoribatula laubieri* Travé, 1961)
(=*Zygoribatula laubieri canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1997)
(=*Zygoribatula laubieri meridionalis* Travé, 1961)
(=*Zygoribatula matritensis* Mihelčič, 1966)
(=*Eremaeus varius* Oudemans y Voigts, 1904)

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte).
- *Oribatula (Zygoribatula) ruchljadevi* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Oribatula (Zygoribatula) sabulosa* (Balogh, 1966) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Chad.
 - *Oribatula (Zygoribatula) salina* (Balogh, 1966) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
 - *Oribatula (Zygoribatula) sayedi* (Elbadry y Nasr, 1974) (Z.)
(=*Zygoribatula tritici* Elbadry y Nasr, 1974)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Oribatula (Zygoribatula) schauenbergi* (Mahunka, 1978) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Congo y Malgache (I. Mauricio).
 - *Oribatula (Zygoribatula) sculpturata* (Mahunka, 1989) (*Phauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Oribatula (Zygoribatula) semicirculata* (Bayartogtokh y Smeliansky, 2008) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
 - *Oribatula (Zygoribatula) setosa* Evans, 1953
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Oribatula (Zygoribatula) sharjah* (Mahunka, 2009) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Emiratos Árabes.
 - *Oribatula (Zygoribatula) similitricha* Subías, 2010
(=*Zygoribatula robusta* Grobler, 1993, "nom. praec." por Iordansky, 1991)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Oribatula (Zygoribatula) skrbjani* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental: frecuente).
 - *Oribatula (Zygoribatula) smirnovi* (Bulanova-Zachvatkina, 1978) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
 - *Oribatula (Zygoribatula) socotrensis* (Mahunka, 2000) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
 - *Oribatula (Zygoribatula) subantarctica* (Pletzen y Kok, 1971) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Marion).
 - *Oribatula (Zygoribatula) talis* (Tseng, 1984) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Oribatula (Zygoribatula) tameya* (Elbadry y Nasr, 1974) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Oribatula (Zygoribatula) tenuiseta* (Hammer, 1977) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya e Irán.
 - *Oribatula (Zygoribatula) thalassophila* Grandjean, 1935
(=*Oribatula travei* Bernini, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
 - *Oribatula (Zygoribatula) tortilis* (Hammer, 1977) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Himalaya.
 - *Oribatula (Zygoribatula) trigonella* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Asia centrooccidental y Ucrania).
 - *Oribatula (Zygoribatula) trirostrata* (Lee y Birchby, 1991) (*Ceroribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Oribatula (Zygoribatula) truncata* (Aoki, 1961) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Finlandia y Paleártica oriental) y Noreste de Oriental.
 - *Oribatula (Zygoribatula) undulata* Berlese, 1916
(=*Zygoribatula dubita* Coetzer, 1968)
(=*Zygoribatula heteroporosa* Wallwork, 1972)
(=*Zygoribatula longiporosa* Hammer, 1953)
(=*Zygoribatula tadrosi* Popp, 1960)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical.
 - *Oribatula (Zygoribatula) vanharteni* (Mahunka, 2000) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Yemen.
 - *Oribatula (Zygoribatula) vegeta* (Tseng, 1984) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Oribatula (Zygoribatula) vicina* (Aoki, 2000) (Z.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Oribatula (Zygoribatula) vulgaris* (Bulanova-Zachvatkina, 1967) (Z.)
(=*Zygoribatula hortobagyensis* Mahunka, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia central rusa).

Ovobates Mahunka, 1994 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Micreremus subnitidus* Berlese, 1913

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Ovobates subnitidus* (Berlese, 1913) (*Micreremus*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia).

Paraphauloppia Hammer, 1967 (21 spp.)

ESPECIE TIPO: *Paraphauloppia novaezealandica* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y austral.

Paraphauloppia (Paraphauloppia) Hammer, 1967 (20 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical, subtropical y austral.

- *Paraphauloppia (P.) acutinotata* Lee y Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) altimontana* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (India: Bengala Occidental).
- *Paraphauloppia (P.) altimontanooides* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) australis* (Hammer, 1962) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].
- *Paraphauloppia (P.) chilensis* (Covarrubias y Toro, 1997) (*Zygoribatula bonaiensis* c.)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Paraphauloppia (P.) cordylinosa* Higgins y Woolley, 1975
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
- *Paraphauloppia (P.) endroedyi* (Mahunka, 1985) (*Subphauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paraphauloppia (P.) fraenzlei* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) globata* Lee y Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) gracilis* (Hammer, 1958) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Vietnam.
- *Paraphauloppia (P.) lamellata* (Mahunka, 1985) (*Subphauloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Paraphauloppia (P.) latirostris* (Willmann, 1951) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Europa central.
- *Paraphauloppia (P.) magniporosa* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) morenoi* (Hammer, 1962) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Paraphauloppia (P.) novaezealandica* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).
- *Paraphauloppia (P.) obtusinotata* Lee y Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) pisacensis* (Hammer, 1961) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Paraphauloppia (P.) quadrisetosa* (Hammer, 1961) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Paraphauloppia (P.) triforata* Lee y Birchby, 1991
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Paraphauloppia (P.) variabilis* (Bayartogtokh y Aoki, 2000) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Paraphauloppia (Ermilovia) Subías, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Paraphauloppia reducta* Ermilov y Minor, 2016

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Paraphauloppia (Ermilovia) reducta* Ermilov y Minor, 2016 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Phauloppia Berlese, 1908 (22 spp.)

(=*Calvoppia* Jacot, 1934)

(=*Eporibatula* Sellnick, 1928)

(=*Imparatoppia* Jacot, 1934)

(?=*Oribata* Latreille, 1802 "gen. inq.")

(=*Paraliodes* Hall, 1911)

(=*Trichoribatula* Balogh, 1961)

ESPECIE TIPO: (*Oppia conformis* Berlese, 1895) =*Zetes lucorum* Koch, 1841

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Australiana y Neotropical).

- *Phauloppia adjecta* Aoki y Ohkubo, 1974
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Phauloppia boletorum* (Ewing, 1913) (*Lucoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Phauloppia bryani* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phauloppia caudata* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
- *Phauloppia curviseta* (Ewing, 1909) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centroseptentrional.
- *Phauloppia gracilis* Sellnick, 1952
DISTRIBUCIÓN: I. Bermudas.
- *Phauloppia hessei* (Oudemans, 1902) (*Eremaeus*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Holanda.
- *Phauloppia imparata* (Jacot, 1934) (*Imparatoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phauloppia incomperta* (Pérez-Íñigo y Peña, 1996) (*Zygoribatula*)
DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.
- *Phauloppia knoepffleri* Travé, 1961
DISTRIBUCIÓN: Francia (Córcega).
- *Phauloppia lucorum* (Koch, 1841) (*Zetes*)
(=*Lucoppia (Phauloppia) asperula* Berlese, 1916)
(=*Oppia berlesei* Leonardi, 1896)
(=*Oppia conformis* Berlese, 1895)
(=*Eremaeus conjunctus* Oudemans, 1902)
(?=*Acarus corticalis* De Geer, 1778 “sp. inq.”)
(=*Phauloppia dzaparidzei* Mahunka, 1997)
(?=*Acarus geniculatus* Linnaeus, 1758 “sp. inq.”)
(=*Paraliodes incurvata* Hall, 1911)
(=*Phauloppia longiporosa* Kulijev, 1968)
(=*Eporibatula longiporosa* Pérez-Íñigo, 1976)
(=*Phauloppia longiporosa* Mahunka, 1982, “nom. praecoc.” por Kulijev, 1968)
(=*Phauloppia longiporosa* Djaparidze, 1985, “nom. praecoc.” por Kulijev, 1968)
(=*Liacarus modestus* Banks, 1904)
(=*Eremaeus modestus* Banks, 1910)
(?=*Acarus musci* Schrank, 1781 “sp. inq.”)
(=*Phauloppia ohat* Mahunka, 1997)
(=*Phauloppia saakadzei* Djaparidze, 1985)
(=*Eremaeus schneideri* Oudemans, 1896)
(=*Lohmannia spinosa* Hall, 1911)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (frecuente en Paleártica occidental) y Nepal.
- *Phauloppia mitakensis* Suzuki, 1979
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Phauloppia nemoralis* (Berlese, 1916) (*Lucoppia (P.)*)
(=*Phauloppia coineaui* Travé, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Europea (frecuente).
- *Phauloppia perkinsi* (Jacot, 1934) (*Calvoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Phauloppia pilosa* (Michael, 1888) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica occidental (excepto Norte) y U.S.A. (Virginia).
- *Phauloppia prominens* (Bayartogtokh y Aoki, 1998) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.
- *Phauloppia rauschenensis* (Sellnick, 1908) (*Eremaeus*)
(=*Eporibatula gessneri* Willmann, 1932)
(=*Oribatula lucida* Sellnick, 1921)
(=*Phauloppia paspalevi* Csiszár, 1962)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Paleártica occidental y Asia central rusa) y Méjico.
- *Phauloppia sakamorii* (Aoki, 1970) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Phauloppia saxicola* Travé, 1961
(=*Eporibatula tuberosa* Fujikawa, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Phauloppia tavruei* (Schweizer, 1956) (*Eporibatula*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Phauloppia topali* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Phauloppia vallei* Bernini, 1973
DISTRIBUCIÓN: Italia (Sicilia).
- *Phauloppia xinjiangensis* L. Wang, Zheng, X. Wang, X. Zhang y Wen, 1990

DISTRIBUCIÓN: Noroeste de China.

Phauloppiella Subías, 1977 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Phauloppiella striata* Subías, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Etiópica y Australiana.

Phauloppiella (Phauloppiella) Subías, 1977 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.

- *Phauloppiella (P.) glabra* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Nigeria.

- *Phauloppiella (P.) striata* Subías, 1977

DISTRIBUCIÓN: España.

Phauloppiella (Ausoribula) Lee, 1992 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ausoribula quagesetosa* Lee, 1992

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Etiópica.

- *Phauloppiella (Ausoribula) bloemfonteinensis* (Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2017) (A.)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Phauloppiella (Ausoribula) quagesetosa* (Lee, 1992) (A.)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Phauloppiella (Ausoribula) termitophila* (Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2017) (A.)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Rekharibatula Bose, Mathur, Jain y Dogra, 1996 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Rekharibatula diverseta* Bose, Mathur, Jain y Dogra, 1996

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Rekharibatula diverseta* Bose, Mathur, Jain y Dogra, 1996

DISTRIBUCIÓN: "India".

Sellnickia Oudemans, 1927 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: (*Sellnickia heveae* Oudemans, 1927) = *Notaspis caudata* Michael, 1908

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Sellnickia caudata* (Michael, 1908) (*Notaspis*)

(=*Oribatula caudata* Berlese, 1910, "nom. praeoc." por Michael, 1908)

(=*Sellnickia heveae* Oudemans, 1927)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia) y Oriental.

Spinoppia Higgins y Woolley, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Spinoppia magniserrata* Higgins y Woolley, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Spinoppia magniserrata* Higgins y Woolley, 1966

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Subphauloppia Hammer, 1967 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Subphauloppia dentonyx* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

Subphauloppia (Subphauloppia) Hammer, 1967 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Subphauloppia (S.) dentonyx* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Subphauloppia (S.) glabra* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Subphauloppia (Diphauloppia) J. y P. Balogh, 1984 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Subphauloppia luminosa* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Subphauloppia (Diphauloppia) luminosa* Hammer, 1973 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana; Polinesia (I. Tonga) y Nueva Zelanda.

Nesozetidae J. y P. Balogh, 1984 (1 gen. y 2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Etiópica.

Nesozetes Hammer, 1971 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nesozetes rostropterus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Etiópica.

- *Nesozetes membranus* Ermilov, Hugo-Coetzee, Theron y Behan-Pelletier, 2017

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Nesozetes rostriferus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

Pseudoppiidae Mahunka, 1975 (4 gen. y 7 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Holártica, Etiópica y Australiana.

Behanpseudoppia Subías, 2017 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Parapirnodus hexaporosus* Behan-Pelletier, Clayton y Humble, 2002

DISTRIBUCIÓN: Neártica.

- *Behanpseudoppia coniferina* (Behan-Pelletier, Clayton y Humble, 2002) (*Parapirnodus*)

DISTRIBUCIÓN: Canadá.

- *Behanpseudoppia hexaporosa* (Behan-Pelletier, Clayton y Humble, 2002) (*Parapirnodus*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.

Pontiobates Luxton, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pontiobates denigratus* Luxton, 1989

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Pontiobates denigratus* Luxton, 1989

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Pseudoppia Pérez-Íñigo, 1966 (3 spp.)

(=*Micropirnodus* Weigmann, 2009)

(=*Symphauloppia* Balogh, 1972)

ESPECIE TIPO: *Lucoppia mediocris* Mihelčič, 1957

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Etiópica.

- *Pseudoppia interrupta* (Jeleva, 1962) (*Phauloppia*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea y Etiópica (Congo).

- *Pseudoppia longissima* (Weigmann, 2009) (*Micropirnodus*)

DISTRIBUCIÓN: Ibérica.

- *Pseudoppia mediocris* (Mihelčič, 1957) (*Lucoppia*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).

Senoribula Mahunka, 1975 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Senoribula africana* Mahunka, 1975

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Senoribula africana* Mahunka, 1975

DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Caloppiidae Balogh, 1960 (7 gen. y 35 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Brassiella Balogh, 1970 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Carabodes reticulatus* Oudemans, 1915) =*Brassiella neonominata* Subías, 2004

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.

- *Brassiella arboricola* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Nueva Caledonia.

- *Brassiella brevisetigera* Aoki, 2009

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Brassiella neonominata* Subías, 2004

(=*Carabodes reticulatus* Oudemans, 1915, "nom. praec." por Berlese, 1913)

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nueva Guinea).

- *Brassiella penicillifer* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.

- *Brassiella taiwanica* Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

Crassoribatula Hammer, 1967 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Crassoribatula maculosa* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Crassoribatula maculosa* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Luissubiasia Ermilov, 2016 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Luissubiasia microporosa* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Luissubiasia microporosa* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Neotrichozetes Travé, 1961 (1 sp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis spinulosa* Michael, 1908

DISTRIBUCIÓN: Subtropical austral (excepto Etiópica).

Neotrichozetes spinulosus (Michael, 1908) (*Notaspis*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania) y Argentina.

- *Neotrichozetes spinulosus spinulosus* (Michael, 1908)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Tasmania).

- *Neotrichozetes spinulosus germaineae* Travé, 1961

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Reticuloppia Balogh y Mahunka, 1966 (2 spp.)

(=*Decoribatula* Lee y Birchby, 1989)

ESPECIE TIPO: *Reticuloppia reticulata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Reticuloppia pustulata* (Lee y Birchby, 1989) (*Decoribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.

- *Reticuloppia reticulata* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australia.

Stelechobates Grandjean, 1965 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Stelechobates megalotrichus* Grandjean, 1965

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Stelechobates brazilianus* P. Balogh, 1995

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Stelechobates megalotrichus* Grandjean, 1965

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

Zetorchella Berlese, 1916 (23 spp.)

(=*Caloppia* Balogh, 1958)

(=*Chaunoproctellus* Mahunka, 1992)

(=*Chaunoproctus* Pearce, 1906, "nom. praec." por Bonaparte, 1850)

(=*Pabulozetes* Tseng, 1982)

ESPECIE TIPO: *Chaunoproctus cancellatus* Pearce, 1906

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Zetorchella abalai* (Bhaduri, Bhattacharya y Chakrabarti, 1975) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

- *Zetorchella amarpurensis* (Sanyal, Saha y Chakraborty, 2003) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Zetorchella asperula* (Pearce, 1906) (*Chaunoproctus*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).

- *Zetorchella basilewskyi* (Balogh, 1958) (*Caloppia*)

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Zetorchella cancellata* (Pearce, 1906) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).

- *Zetorchella deleari* (Higgins, 1966) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].

- *Zetorchella latior* (Berlese, 1913) (*Oppia*)

(=*Chaunoproctus clavisetosus* Bhaduri, Bhattacharya y Chakrabarti, 1975)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Zetorchella longipilosa* (Mahunka, 1974) (*Caloppia*)

DISTRIBUCIÓN: Zimbabue [Rodesia].

- *Zetorchella longisetosa* (Dhali y Bhaduri, 1981) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (India y Nepal).

- *Zetorchella minor* (Balogh, 1958) (*Caloppia*)

DISTRIBUCIÓN: Angola e India.

- *Zetorchella nortoni* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Zetorchella orbiculata* (Wen y Zhao, 1994) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Myanmar [Birmania]).

- *Zetorchella orientalis* (Sanyal, Saha y Chakraborty, 2003) (*Chaunoproctus*)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

- *Zetorchella pedestris* Berlese, 1916

(=*Chaunoproctus crinitus* Karppinen, 1966)

(=*Caloppia papillata* Balogh, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (frecuente).

- *Zetorchella plumosa* (Tseng, 1982) (*Pabulozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Zetorchella reticulata* (Willmann, 1933) (*Lucoppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Vietnam).
- *Zetorchella rugosa* (Mahunka, 1992) (*Chaunoproctellus*)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Zetorchella sejugata* (Ramani y Haq, 1997) (*Caloppia*)
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Zetorchella semirugosa* (Mahunka, 2011) (*Chaunoproctus*)
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Zetorchella sisiri* (Sanyal, Saha y Chakraborty, 2003) (*Chaunoproctus*)
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Zetorchella sottoetgarciai* (Corpuz-Raros, 1979) (*Caloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Zetorchella taungensis* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Zetorchella vargai* (Balogh, 1959) (*Caloppia*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Hemileiidae J. y P. Balogh, 1984 (10 gen., 9 subg., 117 spp. y 4 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Constrictobates Balogh y Mahunka, 1966 (1 sp.)
ESPECIE TIPO: *Constrictobates lineolatus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australiana.
- *Constrictobates lineolatus* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Australia.

Domitorina Grandjean, 1951 (17 spp. y 3 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Oribatula plantivaga* Berlese, 1895
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

Domitorina (Domitorina) Grandjean, 1951 (16 spp. y 3 sspp.)
(=*Cryptozetes* Hammer, 1962)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana).

- *Domitorina (D.) chilensis* (Hammer, 1962) (*Cryptozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Domitorina (D.) crystallina* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Domitorina (D.) elongata* Balogh y Csiszár, 1963
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Domitorina (D.) inflata* (Berlese, 1916) (*Oribatula (Hemileius)*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Domitorina (D.) lata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Domitorina (D.) limpida* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Domitorina (D.) marionensis* Pletzen y Kok, 1971
DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Domitorina (D.) plantivaga (Berlese, 1895) (*Oribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Australiana y Antártica).

- *Domitorina (D.) plantivaga plantivaga* (Berlese, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Neártica, Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Paleártica oriental, Etiópica: Yemen, Oriental y Neotropical: frecuente).
- *Domitorina (D.) plantivaga brasiliana* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Domitorina (D.) plantivaga insularis* Travé, 1969
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (I. Salvajes).
- *Domitorina (D.) plantivaga saxicola* Grandjean, 1951
DISTRIBUCIÓN: Europa meridional.
- *Domitorina (D.) praedatoria* Lan, Xin y Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Domitorina (D.) rostrata* Luxton, 1993
DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).
- *Domitorina (D.) sanpabloensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Domitorina (D.) sicata* Mahunka, 1983

- DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
 - *Domotorina (D.) taiwanica* Tseng, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Domotorina (D.) tropica* (Balogh, 1958) (*Hemileius*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
 - *Domotorina (D.) tuberculata* Aoki, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Domotorina (D.) usnea* (Norton y Palacios-Vargas, 1987) (*Cryptozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical e I. Galápagos.

Domotorina (Vesiculobates) Hammer, 1979 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Vesiculobates silvaticus* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Domotorina (Vesiculobates) silvatica* (Hammer, 1979) (V.)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).

Exoribatula Jacot, 1936 (6 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Exoribatula biundata* Jacot, 1936
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental) y subtropical (Holártica meridional).

Exoribatula (Exoribatula) Jacot, 1936 (4 spp.)
 (= *Nesoribatula* Aoki, 1964)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Australiana) y subtropical (Neártica meridional).
 - *Exoribatula (E.) biundata* Jacot, 1936
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Exoribatula (E.) ensifer* (Mahunka, 1983) (*Nesoribatula*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Exoribatula (E.) pacifica* (Aoki, 1964) (*Nesoribatula*)
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Exoribatula (E.) rotunda* (Mahunka, 1988) (*Nesoribatula*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Exoribatula (Multoribates) Hammer, 1961 (2 spp.)
 (= *Setulobates* Mahunka, 1984)
 ESPECIE TIPO: *Multoribates chavinensis* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Etiópica y subtropical (Paleártica meridional).
 - *Exoribatula (Multoribates) chavinensis* (Hammer, 1961) (M.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Cáucaso.
 - *Exoribatula (Multoribates) heterotricha* (Mahunka, 1984) (*Setulobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Hemileius Berlese, 1916 (71 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Protoribates (Scheloribates) initialis* Berlese, 1908
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Hemileius (Hemileius) Berlese, 1916 (27 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).
 - *Hemileius (H.) biclavulus* Lee, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hemileius (H.) brevilamellatus* (Willmann, 1932) (*Liebstadia*)
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
 - *Hemileius (H.) clavatus* Aoki, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hemileius (H.) copectus* Lee, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hemileius (H.) epereszinigoae* Subías, 2010
 (= *Hemileius elongatus* E. Pérez-Íñigo, 1978, "nom. praec." por Krivolutsky, 1969)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea y Mongolia).
 - *Hemileius (H.) glaber* (Balogh, 1970) (*Tuberemaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Hemileius (H.) gressitti* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Hemileius (H.) haydeni* (Higgins y Woolley, 1975) (*Multoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Colorado).
 - *Hemileius (H.) hierrensis* Pérez-Íñigo, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Hemileius (H.) humeralis* Pérez-Íñigo jr., 1991

- (?=*Simkinia montana* Krivolutsky y Grishina, 1970 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Mediterránea y Paleártica oriental).
 - *Hemileius (H.) initialis* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*)
 (= *Schelorbates confundatus* Sellnick, 1928)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A. (Nuevo Méjico), Oriental: Bali, y Neotropical).
 - *Hemileius (H.) lagunensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Tuberemaeus*)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Hemileius (H.) major* (Mahunka, 1985) (*Schelorbates*)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y Venezuela.
 - *Hemileius (H.) microclava* (Hammer, 1961) (*Schelorbates*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Hemileius (H.) muscicola* (Hammer, 1961) (*Schelorbates*)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Hemileius (H.) nicki* Denmark y Woodring, 1965
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Hemileius (H.) proximus* (Berlese, 1916) (*Oribatula (H.)*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Paraguay).
 - *Hemileius (H.) quadripilis* (Fitch, 1856) (*Oribata*)
 (= *Oribatula (Hemileius) comatus* Berlese, 1920)
 (= *Notaspis nuda* Hall, 1911)
 (= *Notaspis pallida* Ewing, 1909)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Hemileius (H.) rectus* Lee, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hemileius (H.) robustus* Pérez-Íñigo, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental e Irán).
 - *Hemileius (H.) simplex* (Gervais, 1849) (*Oribata*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Chile.
 - *Hemileius (H.) spirulatus* (Vasiliu y Călugăr, 1973) (*Schelorbates*)
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Hemileius (H.) suramericanus* (Hammer, 1958) (*Oribatula*)
 (= *Hemileius laticlava* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (frecuente) y U.S.A. (Kentucky).
 - *Hemileius (H.) tenuis* Aoki, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Hemileius (H.) thujae* Choy y Cho, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Hemileius (H.) translamellatus* Karppinen, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Finlandia.
 - *Hemileius (H.) trichosus* (Hammer, 1958) (*Schelorbates*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Hemileius (Monoschelobates) Balogh y Mahunka, 1969 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Monoschelobates parvus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Hemileius (Monoschelobates) foveolatus* (Balogh, 1958) (*Liebstadia*)
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Hemileius (Monoschelobates) hemileiformis* (Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013) (*M.*)
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Hemileius (Monoschelobates) masani* (Ermilov, 2016) (*M.*)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hemileius (Monoschelobates) parvus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*M.*)
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Hemileius (Monoschelobates) thienemanni* (Willmann, 1932) (*Liebstadia*)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Polinesia (I. Samoa).

Hemileius (Simkinia) Krivolutsky, 1966 (5 spp.)

(= *Tenuileius* Lee, 1989)

(= *Turcibates* Ayyildiz y Luxton, 1989)

ESPECIE TIPO: *Simkinia turanica* Krivolutsky, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Australiana.

- *Hemileius (Simkinia) minimus* Lee, 1989 (*H. (Tenuileius)*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Hemileius (Simkinia) ovalis* Kulijev, 1968 (*H.*)
 (= *Hemileius lanceolatus* Bayartogtokh y Aoki, 1997)
 (= *Turcibates parvus* Ayyildiz y Luxton, 1989)

- (=*Urubambates perlongus* Vasiliu y Călugăr, 1976)
 (?=*Dometorina rossica* Bashkirova, 1958 “sp. inq.”)
 (= *Urubambates xerophilus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2007)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Hemileius (Simkinia) paratenuis* Lee, 1989 (*H. (Tenuileius)*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Hemileius (Simkinia) tianshanicus* (Krivolutsky, 1971) (*S.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Asia centrooccidental).
 - *Hemileius (Simkinia) turanicus* (Krivolutsky, 1966) (*S.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

Hemileius (Tuberemaeus) Sellnick, 1930 (28 spp.)

(=*Anisochthodes* Newell, 1957)

ESPECIE TIPO: *Tuberemaeus singularis* Sellnick, 1930

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Hemileius (Tuberemaeus) areolatus* (Balogh y Mahunka, 1967) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Hemileius (Tuberemaeus) asiaticus* (Yamamoto y Aoki, 2000) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Hemileius (Tuberemaeus) bellissimus* (Hammer, 1971) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Hemileius (Tuberemaeus) deletus* (Hammer, 1979) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).
- *Hemileius (Tuberemaeus) dispar* (Balogh y Mahunka, 1974) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hemileius (Tuberemaeus) fissuratus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
- *Hemileius (Tuberemaeus) formosanus* (Tseng, 1984) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Filipinas.
- *Hemileius (Tuberemaeus) impolita* (Warburton, 1912) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Hemileius (Tuberemaeus) indentatus* (Hammer, 1973) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Hemileius (Tuberemaeus) inornatus* (Pérez-Íñigo, 1982) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Etiopía).
- *Hemileius (Tuberemaeus) lineatus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Filipinas y Vietnam).
- *Hemileius (Tuberemaeus) longisetosus* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Hemileius (Tuberemaeus) nagaii* (Mahunka, 1988) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Hemileius (Tuberemaeus) neonomnatus* Subías, 2004
(=*Tuberemaeus punctatus* Balogh, 1970, “nom. praec.” por Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Península Malaya.
- *Hemileius (Tuberemaeus) papillifer* (Newell, 1957) (*Anisochthodes*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái y Filipinas.
- *Hemileius (Tuberemaeus) perforatoides* (Hammer, 1979) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Hemileius (Tuberemaeus) perforatus* (Willmann, 1932) (*Liebstadia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas) y Australiana (Polinesia).
- *Hemileius (Tuberemaeus) propinquus* (Balogh y Mahunka, 1974) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
- *Hemileius (Tuberemaeus) pseudoareolatus* (Mahunka, 1977) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Hemileius (Tuberemaeus) puruczkyi* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Hemileius (Tuberemaeus) scrobinus* (Berlese, 1916) (*Oribatula (H.)*)
DISTRIBUCIÓN: Italia.
- *Hemileius (Tuberemaeus) sculpturatus* (Mahunka, 1987) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Hemileius (Tuberemaeus) similis* (Balogh, 1970) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Hemileius (Tuberemaeus) singularis* (Sellnick, 1930) (*T.*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Este de Paleártica oriental y Hawái.
- *Hemileius (Tuberemaeus) tridactylus* (Balogh, 1959) (*Liebstadia foveolata t.*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
- *Hemileius (Tuberemaeus) tuberculatus* (Balogh, 1970) (*T.*)

- DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.
 - *Hemileius (Tuberemaeus) vanharteni* (Mahunka, 2006) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Salomón).
 - *Hemileius (Tuberemaeus) vermiculatus* (Balogh, 1970) (T.)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

Hemileius (Urubambates) Hammer, 1961 (6 spp.)

ESPECIE TIPO: *Urubambates punctatus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.

- *Hemileius (Urubambates) elongatus* (Krivolutsky, 1969) (*Simkinia*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional (frecuente) y Cáucaso.
- *Hemileius (Urubambates) flagellatus* (Mahunka, 1985) (U.)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Hemileius (Urubambates) paraguayensis* (Balogh y Mahunka, 1981) (U.)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Argentina).
- *Hemileius (Urubambates) punctatus* (Hammer, 1961) (U.)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Hemileius (Urubambates) romanicus* (Vasiliiu y Călugăr, 1981) (U.)
 DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Hemileius (Urubambates) schachtachtinskoi* (Kulijev, 1961) (*Oribatula*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Cáucaso y Paleártica oriental meridional).

Heteroleius Balogh y Mahunka, 1966 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Heteroleius longissimus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.

- *Heteroleius flagellifer* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Heteroleius longissimus* Balogh y Mahunka, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Congo y Filipinas.
- *Heteroleius navicula* (Berlese, 1913) (*Oribatula*)
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Heteroleius planus* (Aoki, 1984) (*Symphauloppia*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Mucrobates Balogh y Mahunka, 1979 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Mucrobates fissuratus* Balogh y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Mucrobates fissuratus* Balogh y Mahunka, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Mucrobates microsetosus* Ermilov y Kalúz, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Nasozetes Sellnick, 1930 (5 spp.)

(=*Kinabaluella* Mahunka, 1996)

ESPECIE TIPO: *Nasozetes sumatrensis* Sellnick, 1930

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Nasozetes choerognathus* Willmann, 1932
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Filipinas).
- *Nasozetes lienhardi* Mahunka, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Nasozetes porcella* (Mahunka, 1996) (*Kinabaluella*)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Nasozetes stunkardi* Sengbusch, 1957
 DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Filipinas.
- *Nasozetes sumatrensis* Sellnick, 1930
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).

Plumobates Balogh y Mahunka, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Plumobates decoratus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Plumobates decoratus* Balogh y Mahunka, 1966
 DISTRIBUCIÓN: Australia.

Siculobata Grandjean, 1953 (9 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oppia tibialis sicula* Berlese, 1892

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Siculobata (Siculobata) Grandjean, 1953 (5 spp. y 1 ssp.)

(=***Floribates*** Norton y Kethley, 1989)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Siculobata (S.) florens* (Berlese, 1908) (*Oribatula*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Siculobata (S.) malabarica* Ramani y Haq, 1998

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Siculobata (S.) sculpturata* (Mahunka, 1988) (*Aellenobates*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).

Siculobata (S.) sicula (Berlese, 1892) (*Oppia tibialis s.*)

DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical: Paleártica meridional (Mediterránea, Polonia e Irán), Islas del Pacífico, Argentina, Sudáfrica e India (Kerala).

- *Siculobata (S.) sicula sicula* (Berlese, 1892)

DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical: Paleártica meridional (Mediterránea, Polonia e Irán), Islas del Pacífico, Argentina, Sudáfrica e India (Kerala).

- *Siculobata (S.) sicula platensis* (Berlese, 1916) (*Oribatula (Hemileius)*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Siculobata (S.) talarica* (Fredes y Martínez, 2013) (*Dometorina (S.)*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Siculobata (Metaleius) Travé, 1960 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Metaleius strenzkei* Travé, 1960

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Siculobata (Metaleius) strenzkei* (Travé, 1960) (*M.*)

(?=*Oribatula (Hemileius) sternalis* Berlese, 1916 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

Siculobata (Paraleius) Travé, 1960 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribella leontonycha* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Neotropical.

- *Siculobata (Paraleius) leahae* (Knee, 2017) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Este de Canadá.

- *Siculobata (Paraleius) leontonycha* (Berlese, 1910) (*Oribella*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Méjico.

Siculobata (Wallworkiella) Hammer, 1979 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Wallworkiella nasalis* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Siculobata (Wallworkiella) nasalis* (Hammer, 1979) (*W.*)

DISTRIBUCIÓN: Java.

Zealandozetes Ermilov, Minor y Behan-Pelletier, 2015 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Zealandozetes southensis* Ermilov, Minor y Behan-Pelletier, 2015

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Neotropical.

- *Zealandozetes southensis* Ermilov, Minor y Behan-Pelletier, 2015

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Chile.

Zeaschelorbates Luxton, 1982 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Zeaschelorbates palustris* Luxton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Zeaschelorbates palustris* Luxton, 1982

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Liebstaadiidae J. y P. Balogh, 1984 (8 gen., 1 subg., 44 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Angullozetes Hammer, 1967 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Angullozetes rostratus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Angullozetes rostratus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Areozetes Hammer, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Areozetes altimontanus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Areozetes altimontanus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Perú e I. Canarias.

Cordiozetes Mahunka, 1983 (2 spp.)

(=*Mixoribatula* Mahunka, 1987)

ESPECIE TIPO: *Cordiozetes clavisetus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).

- *Cordiozetes clavisetus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Chile).

- *Cordiozetes olahi* Mahunka, 1987 (*C. (Mixoribatula)*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Haloribatula Schuster, 1957 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Haloribatula tenareae* Schuster, 1957

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Haloribatula tenareae* Schuster, 1957

DISTRIBUCIÓN: Francia e India (Tripura).

Liebstadia Oudemans, 1906 (14 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Notaspis similis* Michael, 1888

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, "Etiópica" y Australiana).

Liebstadia (Liebstadia) Oudemans, 1906 (12 spp. y 1 ssp.)

(=*Irinobates* Krivolutsky y Christov, 1970)

(=*Rajskibates* J. y P. Balogh, 1984)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica, Oriental, "Etiópica" y Australiana).

- *Liebstadia (L.) gallardoi* (Morell, 1987) (*Protoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Liebstadia (L.) gratiosa* (Vasiliu y Călugăr, 1973) (*Protoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

- *Liebstadia (L.) humerata* Sellnick, 1928

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental: frecuente, Asia centooccidental y Neártica) y Oriental (Vietnam y Nepal).

- *Liebstadia (L.) longior* (Berlese, 1908) (*Protoribates*)

(=*Protoribates badensis* Sellnick, 1928)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Canadá).

- *Liebstadia (L.) mongolica* Bayartogtokh, 2001

(=*Liebstadia elongata* Bayartogtokh, 2001)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Liebstadia (L.) neominata* Subías, 2004

(=*Oribata monodactyla* Štorkán, 1925, "nom. praeoc." por Haller, 1884)

DISTRIBUCIÓN: "Checoslovaquia".

Liebstadia (L.) pannonica (Willmann, 1951) (*Protoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y U.S.A. (Carolina del Norte), y Oriental: Vietnam.

- *Liebstadia (L.) pannonica pannonica* (Willmann, 1951)

(=*Protoribates austriacus* Willmann, 1953)

(=*Protoribates divergens* Mihelčič, 1955)

(=*Protoribates novus* Willmann, 1953)

(=*Protoribates variabilis* Rajski, 1958)

(=*Liebstadia willmanni* Miko y Weigmann, 1996)

DISTRIBUCIÓN: Holártica: Paleártica (frecuente) y U.S.A. (Carolina del Norte), y Oriental: Vietnam.

- *Liebstadia (L.) pannonica microptera* (Mihelčič, 1957) (*Protoribates*)

(?= *Oribatula alata* Mihelčič, 1956 "sp. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.

- *Liebstadia (L.) parabadensis* (Kulijev, 1968) (*Protoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Liebstadia (L.) piligera* Balogh, 1958 "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Liebstadia (L.) pilosa* (Krivolutsky y Christov, 1970) (*Irinobates*)

DISTRIBUCIÓN: Asia centooccidental.

- *Liebstadia (L.) similis* (Michael, 1888) (*Notaspis*)

(=*Oribatula anomala* Hull, 1916)

(=*Protoribates serratmarginatus* Mahunka, 1983)

(=*Protoribates silesius* Sellnick, 1925)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y Neártica septentrional): frecuente, India (Sikkim) y Nueva Zelanda.

- *Liebstadia (L.) tenuis* (Ayyildiz y Luxton, 1989) (*Rajskibates*)

DISTRIBUCIÓN: Turquía.

Liebstadia (*Lagenobates*) Weigmann y Miko, 2002 (2 spp.)

(=*Pseudoprotoribates* Weigmann y Monson, 2004)

ESPECIE TIPO: *Oribata lagenula* Berlese, 1904

DISTRIBUCIÓN: ¿Holártica?

- *Liebstadia* (*Lagenobates*) *lagenula* (Berlese, 1904) (*Oribata*)

(?= *Protoribates pupula* Berlese, 1910 “sp. inq.”)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (menos frecuente en el Norte) ¿y Canadá?

- *Liebstadia* (*Lagenobates*) *luxtoni* (Weigmann y Monson, 2004) (*Pseudoprotoribates*)

DISTRIBUCIÓN: I. Británicas.

Maculobates Hammer, 1962 (16 spp.)

(=*Subulobates* Hammer, 1972)

ESPECIE TIPO: *Maculobates longiporosus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental, Paleártica meridional y Austral.

- *Maculobates albulus* (Hammer, 1972) (*Subulobates*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Maculobates breviporosus* Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

- *Maculobates bruneiensis* Ermilov, Chatterjee y D. J. Marshall, 2013

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo) y Paleártica oriental (Japón).

- *Maculobates concretus* (Kramer, 1898) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: América austral (Tierra del Fuego).

- *Maculobates dubius* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas del Pacífico).

- *Maculobates endroedyyoungai* Mahunka, 1989

DISTRIBUCIÓN: Tasmania.

- *Maculobates longipilosus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Maculobates longiporosus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.

- *Maculobates longus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Maculobates luteomarginatus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Maculobates luteus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Maculobates magnus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Maculobates minor* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Maculobates nordenskjoeldi* (Trägårdh, 1907) (*Oribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Shetland del Sur) y América austral (Tierra del Fuego).

- *Maculobates ventroacutus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Islas de Pacífico).

- *Maculobates vulgaris* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Poroscheloribates Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Poroscheloribates canariensis* Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Oriental.

- *Poroscheloribates canariensis* Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Poroscheloribates incertus* (Balogh, 1970) (*Areozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] y Vietnam.

Reductobates Balogh y Mahunka, 1966 (6 spp.)

(=*Ingella* Hammer, 1967)

ESPECIE TIPO: *Reductobates humeratus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Reductobates bicolor* (Hammer, 1973) (*Ingella*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

- *Reductobates brassi* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Reductobates bullager* (Hammer, 1967) (*Ingella*)

DISTRIBUCIÓN: Australiana (Nueva Zelanda y Australia).

- *Reductobates humeratus* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Reductobates latiohumeralis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Reductobates perangustus* Ermilov y Minor, 2016
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Symbioribatidae Aoki, 1966 (3 gen. y 5 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.

Piffliella Hammer, 1979 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Piffliella eduardi* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Piffliella eduardi* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Java.

Separatoribates Matsushima e Y.-N. e Y. Nakamura, 2009 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Separatoritates kujensis* Matsushima e Y.-N. e Y. Nakamura, 2009

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Separatoribates kujensis* Matsushima e Y.-N. e Y. Nakamura, 2009
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Symbioribates Aoki, 1966 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Symbioribates papuensis* Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica meridional.

- *Symbioribates aokii* Karasawa y Behan-Pelletier, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Symbioribates papuensis* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Symbioribates yukiguni* Maruyama y Shimano, 2014
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Scheloribatidae Grandjean, 1933 (19 gen., 6 subg., 356 spp. y 20 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Annobonzetes Pérez-Íñigo, 1983 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Annobonzetes sphaericus* Pérez-Íñigo, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Annobonzetes latissimus* (Berlese, 1916) (*Podoribates*)
DISTRIBUCIÓN: “África oriental”.
- *Annobonzetes latus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Annobonzetes sphaericus* Pérez-Íñigo, 1983
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].

Coronibatula Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Coronibatula lienhardi* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Coronibatula lienhardi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Cosmobates Balogh, 1959 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cosmobates tunicatus* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Cosmobates tunicatus* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Ecuadoribates Ermilov y Kalúz, 2012 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Perscheloribates (Ecuadoribates) pentasacculus* Ermilov y Kalúz, 2012

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Ecuadoribates olszjanowskii* (Ermilov y Friedrich, 2016) (*Perscheloribates (E.)*)
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Ecuadoribates pentasacculus* (Ermilov y Kalúz, 2012) (*Perscheloribates (E.)*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Euscheloribates Kunst, 1958 (13 spp.)

ESPECIE TIPO: *Euscheloribates samsinaki* Kunst, 1958

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Pantropical (excepto Neotropical).

***Euscheloribates (Euscheloribates)* Kunst, 1958 (6 spp.)**(=*Ambrobates* Mahunka, 2009)(=*Corynobates* J. y P. Balogh, 1992)(=*Tribates* Mahunka, 1978)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Pantropical (excepto Neotropical).

- *Euscheloribates (E.) clavisetus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión) e India (Kerala).

- *Euscheloribates (E.) cryptus* (Mahunka, 1978) (*Tribates*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Euscheloribates (E.) mixtus* (Mahunka, 1978) (*Tribates*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache.

- *Euscheloribates (E.) pembedoni* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates*)

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Euscheloribates (E.) samsinaki* Kunst, 1958

DISTRIBUCIÓN: Europa (“Checoslovaquia”) y Oriental (India y Vietnam).

- *Euscheloribates (E.) translamellatus* (Mahunka, 2009) (*Ambrobates*)

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

***Euscheloribates (Trischeloribates)* Hammer, 1971 (7 spp.)**(=*Berndibula* Mahunka, 2000)(=*Nanobates* J. y P. Balogh, 1984)ESPECIE TIPO: *Trischeloribates acutus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Euscheloribates (Trischeloribates) acutus* (Hammer, 1971) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

- *Euscheloribates (Trischeloribates) biculturatus* (Mahunka, 2000) (*Berndibula*)

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

- *Euscheloribates (Trischeloribates) clavatus* (Mahunka, 1988) (*Nanobates*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Euscheloribates (Trischeloribates) fenicheli* (Balogh, 1970) (*Birobates*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Euscheloribates (Trischeloribates) latus* (Hammer, 1971) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

- *Euscheloribates (Trischeloribates) payatosensillus* (Corpuz-Raros, 1979) (*Birobates*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Euscheloribates (Trischeloribates) rotundus* (Hammer, 1971) (*T.*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

***Fijibates* Hammer, 1971 (7 spp.)**ESPECIE TIPO: *Fijibates rostratus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

- *Fijibates aelleni* (Mahunka, 1988) (*Scheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).

- *Fijibates anterostratus* Corpuz-Raros, 1980

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Fijibates dlouhyi* (Mahunka, 1984) (*Scheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Centroamérica) e India (Himachal Pradesh).

- *Fijibates problematicus* Ermilov, 2016

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Fijibates rostratus* Hammer, 1971

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Islas del Pacífico).

- *Fijibates rostopilosus* (Sanyal, 1988) (*Scheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Bután.

- *Fijibates sanyali* Subías, 2017(=*Fijibates rostopilosus* Sanyal, Saha y Chakraborty, 2006, “nom. praec.” por Sanyal, 1988)

DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).

***Fissurobates* Balogh y Mahunka, 1969 (2 spp.)**ESPECIE TIPO: *Fissurobates spectabilis* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Fissurobates neotropicus* Ermilov y Kalúz, 2012

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Fissurobates spectabilis* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

***Hammerabates* Balogh, 1970 (7 spp.)**ESPECIE TIPO: *Hammerabates trisetosus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Pantropical (excepto Neotropical), Paleártica meridional y subantártica.

Hammerabates (Hammerabates) Balogh, 1970 (6 spp.)

(=*Otaheitea* Hammer, 1972)

(=*Yoronoribates* Aoki, 1987)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Pantropical (excepto Neotropical), Paleártica meridional y subantártica.

- *Hammerabates (H.) elongatus* Tseng, 1984

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Hammerabates (H.) minusculus* (Aoki, 1987) (*Yoronoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Hammerabates (H.) nasalis* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y subantártica (I. San Pablo y Amsterdam).

- *Hammerabates (H.) rotundus* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Hammerabates (H.) sulcatus* (Hammer, 1972) (*Otaheitea*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Hammerabates (H.) trisetosus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: Bengala Occidental) y Australiana (Nueva Guinea y Polinesia: I. Tokelau).

Hammerabates (Philoribates) Corpuz-Raros, 1980 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Philoribates filipinus* Corpuz-Raros, 1980

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Hammerabates (Philoribates) filipinus* (Corpuz-Raros, 1980) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Muliercula Coetzer, 1968 (10 spp.)

ESPECIE TIPO: *Muliercula muliercula* Coetzer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Etiópica, **Oriental** y Neotropical.

- *Muliercula bilineata* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Muliercula chiayiensis* Tseng, 1984

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Muliercula discrepans* (Balogh, 1959) (*Scheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Muliercula femoroserrata* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (*Scheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).

- *Muliercula inexpectata* Badejo, Woas y Beck, 2002

DISTRIBUCIÓN: Nigeria.

- *Muliercula longisacculus* (Mahunka, 1984) (*Incabates*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Muliercula muliercula* Coetzer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Muliercula ngoyensis* Coetzer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Muliercula orixaensis* (Badejo, Woas y Beck, 2002) (*Scheloribates*)

DISTRIBUCIÓN: **Neotropical**.

- *Muliercula spora* Coetzer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Cuba.

Nannerlia Coetzer, 1968 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nannerlia longinqua* Coetzer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Nannerlia bombretensis* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán.

- *Nannerlia elongatissima* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Nannerlia longinqua* Coetzer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Pachygena Hammer, 1972 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pachygena falcata* Hammer, 1972

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica meridional.

- *Pachygena falcata* Hammer, 1972

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Pachygena makarovae* Shtanchaeva y Subías, 2012

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

Planobates Hammer, 1973 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Planobates circumalatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Planobates circumalatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

Rhabdoribates Aoki, 1967 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Rhabdoribates siamensis* Aoki, 1967

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Rhabdoribates siamensis* Aoki, 1967

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Samoabates Hammer, 1973 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Samoabates acutirostrum* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Samoabates acutirostrum* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Scheloribates Berlese, 1908 (275 spp. y 20 sspp.)ESPECIE TIPO: *Zetes latipes* Koch, 1844

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Scheloribates (*Scheloribates*) Berlese, 1908 (215 spp. y 19 sspp.)(=*Andeszetes* Hammer, 1961)(=*Megascheloribates* Lee y Pajak, 1990)(=*Neoscheloribates* Hammer, 1973)(=*Paraschelobates* Jacot, 1934)(=*Protoschelobates* Jacot, 1934)(=*Semischeloribates* Hammer, 1973)(=*Storkania* Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- *Scheloribates* (*S.*) *abraensis* Corpuz-Raros, 1980

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Scheloribates* (*S.*) *acutirostris* Călugăr y Vasiliu, 1983

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Scheloribates* (*S.*) *acutirostrum* Ermilov, Rybalov y Franke, 2011

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Scheloribates* (*S.*) *aequalis* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Scheloribates* (*S.*) *aethiopicus* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Congo) e I. Canarias.

- *Scheloribates* (*S.*) *agricolus* Corpuz-Raros, 1980

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Scheloribates* (*S.*) *alexandrinae* Vasiliu e Ivan, 1995

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Scheloribates* (*S.*) *angulatus* Willmann, 1932

DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

- *Scheloribates* (*S.*) *angustus* (Hammer, 1967) (*Incabates*)(=*Incabates medius* Hammer, 1971)

DISTRIBUCIÓN: Australiana, Filipinas y Este de Paleártica oriental.

- *Scheloribates* (*S.*) *anzacensis* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Scheloribates* (*S.*) *artigasi* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).

- *Scheloribates* (*S.*) *ascendens* Weigmann y Wunderle, 1990

DISTRIBUCIÓN: Europea.

- *Scheloribates* (*S.*) *atahualpensis* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina).

- *Scheloribates* (*S.*) *azovicus* Subbotina, 1989

DISTRIBUCIÓN: Ucrania.

- *Scheloribates* (*S.*) *azumaensis* Enami, Nakamura y Katsumata, 1996

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Scheloribates* (*S.*) *badius* (Ewing, 1908) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).

- *Scheloribates* (*S.*) *barbatulus* Mihelčič, 1956(=*Scheloribates barbatulus* Mihelčič, 1957, "nom. praec." por Mihelčič, 1956)

- (=*Scheloribates penicillatus* Mihelčič, 1957)
 (= *Scheloribates subsimilis* Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Méjico.
- *Scheloribates* (*S.*) *barbatus* (Choi y Kim, 2002) (*Lauritzenia* (*Incabates*))
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Scheloribates* (*S.*) *bhadurii* Sanyal, 1992
 DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates* (*S.*) *bhutanensis* Sanyal, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Bután.
- *Scheloribates* (*S.*) *biarcualis* Hammer, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Scheloribates* (*S.*) *bicornis* Mahunka, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Cabo Verde).
- *Scheloribates* (*S.*) *bicuspidatus* Kardar, 1977
 DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).
- *Scheloribates* (*S.*) *bilineatus* Balogh, 1958 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Scheloribates* (*S.*) *brachypterus* Wallwork, 1977
 DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates* (*S.*) *brasilocompressus* Badejo, Woas y Beck, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Scheloribates* (*S.*) *brasilosphericus* Badejo, Woas y Beck, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Scheloribates* (*S.*) *brevipodus* Lee y Pajak, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates* (*S.*) *bunaensis* Fujikawa, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates* (*S.*) *callipus* (Berlese, 1908) (*Protoribates* (*S.*))
 (= *Protoschelobates seghetti* Runkel y Kates, 1947)
 DISTRIBUCIÓN: Neártica (U.S.A. nororiental) y Paleártica (Bosnia- Herzegovina).
- *Scheloribates* (*S.*) *camtschaticus* Subbotina, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Scheloribates* (*S.*) *caprai* Bernini, 1973
 (= *Scheloribates baloghi* Pérez-Íñigo, 1982, “nom. praeoc.” por Kardar, 1976)
 (= *Scheloribates subsimilis* Balogh, 1962, “nom. praeoc.” por Mihelčič, 1956)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental y tropical: Etiópica (Tanzania) y Oriental (India: Tripura).
- *Scheloribates* (*S.*) *carneus* (Hull, 1916) (*Oribatula*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Scheloribates* (*S.*) *castlei* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates* (*S.*) *chauhani* Baker, 1945
 DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Uttar Pradesh) y Taiwán [Formosa].
- *Scheloribates* (*S.*) *clavilanceolatus* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (excepto Sur).
- *Scheloribates* (*S.*) *concentricus* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates* (*S.*) *confusius* Coetzer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates* (*S.*) *corpusculum* Bayartogtokh, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Scheloribates* (*S.*) *costaricensis* Ermilov, Alvarado-Rodríguez, Tolstikov y Retana-Salazar, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Scheloribates* (*S.*) *crassipodus* Lee y Pajak, 1990
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates* (*S.*) *crassus* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates* (*S.*) *crimicus* Subbotina, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Crimea.
- *Scheloribates* (*S.*) *cruciseta* Jeleva y Vü, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates* (*S.*) *curvialatus* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India.
- *Scheloribates* (*S.*) *cuyi* Corpuz-Raros, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates* (*S.*) *danaus* Subbotina, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Scheloribates* (*S.*) *daoensis* Ermilov y Starý, 2017

- DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Scheloribates (S.) decarinatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India (Kerala).
 - *Scheloribates (S.) dentatus* Katsumata, 1988
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Scheloribates (S.) diforamenatus* Lee y Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scheloribates (S.) dimentmani* (Vasiliu e Ivan, 1995) (*Hemileius*)
DISTRIBUCIÓN: Israel.
 - *Scheloribates (S.) discifer* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Scheloribates (S.) distinctus* Mihelčič, 1964
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa meridional y Asia centrooccidental).
 - *Scheloribates (S.) diversidactylus* (Hammer, 1961) (*Andeszetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Chile) e India (Tripura).
 - *Scheloribates (S.) elegans* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Tropical: Oriental, Hawái y Neotropical.
 - *Scheloribates (S.) elongatus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
 - *Scheloribates (S.) elsi* Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Scheloribates (S.) eusetosus* Lee y Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scheloribates (S.) exiguus* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
 - *Scheloribates (S.) feideri* Călugăr y Vasiliu, 1983
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Scheloribates (S.) femoratus* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Scheloribates (S.) fijiensis* Hammer, 1971 (*S. praeincisus f.*)
DISTRIBUCIÓN: Islas de Pacífico y Filipinas.
 - *Scheloribates (S.) fimbriatoides* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e India (Tripura).
 - *Scheloribates (S.) fimbriatus* Thor, 1930
DISTRIBUCIÓN: **Pantropical y subtropical.**
 - *Scheloribates (S.) fimbriatus fimbriatus* Thor, 1930
(?=Protoribates (*Scheloribates*) *artifex* Berlese, 1916 “sp. inq.”)
DISTRIBUCIÓN: **Pantropical y subtropical.**
 - *Scheloribates (S.) fimbriatus africanus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Chad, Arabia Saudita e Irán.
 - *Scheloribates (S.) fimbriatus calcaratus* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Scheloribates (S.) fimbriatus javensis* Willmann, 1932
DISTRIBUCIÓN: Oriental e Islas del Pacífico.
 - *Scheloribates (S.) fimbriatus whitteni* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
 - *Scheloribates (S.) flagellatus* Wallwork, 1966
DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
 - *Scheloribates (S.) flagellisetosus* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Scheloribates (S.) fuscousensillus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Scheloribates (S.) giganteus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú e India (Maharashtra).
 - *Scheloribates (S.) gilvulus* (Koch, 1841) (*Zetes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Scheloribates (S.) grandiporosus* (Hammer, 1973) (*Neoscheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
 - *Scheloribates (S.) guhitanus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas) y Australiana (Nuevas Hébridias [Vanuatu]).
 - *Scheloribates (S.) gunini* Bayartogtokh, 2000
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Scheloribates (S.) helenensis* Wallwork, 1977
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
 - *Scheloribates (S.) heterosetosus* Lee y Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scheloribates (S.) heterotrichus* Mahunka, 1984

- DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) huancayensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India.
- *Scheloribates (S.) humeratus* (Hull, 1916) (*Oribatula*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Scheloribates (S.) hygrophilus* Ivan y A. Călugăr, 2005
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Scheloribates (S.) ibericus* Weigmann, 2010
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Scheloribates (S.) imperfectus* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- Scheloribates (S.) indicus* (Oudemans, 1915) (*Murcia*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] e India (Rajastán), e Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) indicus indicus* (Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] e India, y Hawái.
- *Scheloribates (S.) indicus marquesalis* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) iteratus* Subías, 2004
(=*Scheloribates microclava* Balogh, 1962, “nom. praec.” por Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) jucundior* (Berlese, 1923) (*Protoribates (S.) parvulus j.*)
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) kraepelini* (Berlese, 1908) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
- Scheloribates (S.) labyrinthicus* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: **Paleártica meridional** (Mediterránea e Irán).
- *Scheloribates (S.) labyrinthicus labyrinthicus* Jeleva, 1962
DISTRIBUCIÓN: **Paleártica meridional** (Mediterránea e Irán).
- *Scheloribates (S.) labyrinthicus oscensis* Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.
- Scheloribates (S.) laevigatus* (Koch, 1835) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica y Paleotropical).
- *Scheloribates (S.) laevigatus laevigatus* (Koch, 1835)
(=*Oribata lucasi* Nicolet, 1855)
(=*Oribata michaeli* Hull, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Paleotropical y Neotropical: Argentina y Bolivia).
- *Scheloribates (S.) laevigatus angustirostris* Mihelčič, 1957 (*S. a.*)
(=*Scheloribates robustus* Mihelčič, 1969, “nom. praec.” por Pletzen, 1963)
(=*Scheloribates sine* Kulijev, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Scheloribates (S.) laevigatus quintus* Wunderle, Beck y Woas, 1990 (*S. q.*)
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Scheloribates (S.) laminatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Scheloribates lanceoliger* (Berlese, 1908) (*Protoribates (S.)*) “sp. inq.”
(=*Oribata helvina* Ewing, 1909)
(=*Galumna sylvicola* Banks, 1909)
DISTRIBUCIÓN: **Neártica**.
- *Scheloribates (S.) latoincisus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga), Oriental (China suroriental e India) e I. Galápagos.
- *Scheloribates (S.) leleupi* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Tanzania).
- *Scheloribates (S.) litoralis* Weigmann, 2010
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Scheloribates (S.) longior* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia y Vietnam.
- *Scheloribates (S.) longisensilus* Ivan y A. Călugăr, 2005
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Scheloribates (S.) longisetosus* Feider, Vasiliu y Călugăr, 1973
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
- *Scheloribates (S.) longus* Kulijev, 1968
(=*Scheloribates lencoranicus* Subbotina, 1981)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica: Mediterránea oriental y Paleártica oriental (excepto Oeste).
- Scheloribates (S.) louwi* Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) louwi louwi* Pletzen, 1965

- DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Scheloribates (S.) louwi nimirumi* Coetzer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) lucasiformis* (Trägårdh, 1905) (*Oribata*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Sudán.
- *Scheloribates (S.) luchili* Wharton, 1938
 DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Scheloribates (S.) luciensis* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Brasil.
- *Scheloribates (S.) luteomarginatus* Hammer, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina e I. Galápagos).
- *Scheloribates (S.) maculatus* Wallwork, 1977
 DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (S.) magnus* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Scheloribates (S.) mahnerti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Madagascar).
- *Scheloribates (S.) manoai* Jacot, 1934
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) maoriensis* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) marginedentatus* (Trägårdh, 1931) (*Chamobates*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).
- *Scheloribates (S.) matulius* Corpuz-Raros, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (S.) maximus* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) megalonyx* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
- *Scheloribates (S.) milleri* Jacot, 1936
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental y Pequeñas Antillas.
- *Scheloribates (S.) minifimbriatus* Mínguez, Subías y Ruiz, 1986
 (?=*Protoribates (S.) exilior* Berlese, 1916 “sp. inq.”)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical y subtropical: Holártica meridional (Mediterránea y U.S.A.: Carolina del Norte), Guinea Ecuatorial y Panamá.
- *Scheloribates (S.) mochlosimilaris* Badejo, Woas y Beck, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) moestus* (Banks, 1895) (*Oribata*) “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
- *Scheloribates (S.) muii* Jacot, 1934
 DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) muiricius* Jacot, 1937 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
- *Scheloribates (S.) multiiteratus* Subías, 2004
 (= *Oribata simplex* Štorkán, 1925, “nom. praec.” por Gervais, 1849)
 DISTRIBUCIÓN: “Checoslovaquia”.
- *Scheloribates (S.) multirepetitus* Subías, 2004
 (= *Incabates striatus* Corpuz-Raros, 1980, “nom. praec.” por Hammer, 1958)
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- Scheloribates (S.) mumfordi* Jacot, 1934 (*S. (Paraschelobates)*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
 - *Scheloribates (S.) mumfordi mumfordi* Jacot, 1934
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
 - *Scheloribates (S.) mumfordi uapoui* Jacot, 1934 (*S. (Paraschelobates)*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
- *Scheloribates (S.) nanus* Lee y Pajak, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) natmaensis* Ermilov, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Myanmar [Birmania].
- *Scheloribates (S.) neonominatus* Subías, 2004
 (= *Scheloribates baloghi* Călugăr y Vasiliu, 1983, “nom. praec.” por Kardar, 1976)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (S.) nigeriocompressus* Badejo, Woas y Beck, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) nigeriosphericus* Badejo, Woas y Beck, 2002
 DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) nudus* Woodring, 1965

- DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
- *Scheloribates (S.) oahuensis* Jacot, 1934
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Scheloribates (S.) obesus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Scheloribates (S.) obsessus* Subías, 2004
(=*Scheloribates indicus* Sanyal, 1992, “nom. praeoc.” por Oudemans, 1915)
DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
 - *Scheloribates (S.) obtusus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Scheloribates (S.) ornatus* Balogh, 1959
DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Scheloribates (S.) oryzae* Lan, Xin y Aoki, 1986
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Scheloribates (S.) pacificus* (Sellnick, 1959) (*Styloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai].
 - *Scheloribates (S.) pahabaeus* (Corpuz-Raros, 1980) (*Incabates*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Scheloribates (S.) pajaki* (J. y P. Balogh, 2002) (*Megascheloribates*)
(=*Megascheloribates microsetosus* Lee y Pajak, 1990, “nom. praeoc.” por Wallwork, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scheloribates (S.) palawanus* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- Scheloribates (S.) pallidulus* (Koch, 1841) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Scheloribates (S.) pallidulus pallidulus* (Koch, 1841)
(=*Oribata agilis* Nicolet, 1855)
(=*Protoribates (Scheloribates) frigidus* Berlese, 1908)
(=*Zetes fuscomaculatus* Koch, 1841)
(=*Scheloribates ponticus* Subbotina, 1989)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica; frecuente en Holártica).
 - *Scheloribates (S.) pallidulus latipes* (Koch, 1844) (*Zetes l.*)
(=*Scheloribates campestris* Mihelčič, 1966)
(=*Oribata clavipectinata* Ewing, 1907)
(=*Oribata femoralis* Nicolet, 1855)
(=*Scheloribates grandis* Subbotina, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Paleártica), Oriental y Etiopía.
- *Scheloribates (S.) papillaris* Tseng, 1984
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Taiwán [Formosa] y Vietnam).
 - *Scheloribates (S.) parabilis* Woodring, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
 - *Scheloribates (S.) parabrevipodus* Lee y Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scheloribates (S.) parananus* Lee y Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Scheloribates (S.) parvialatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Scheloribates (S.) parvulus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- Scheloribates (S.) parvus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica e India.
- *Scheloribates (S.) parvus parvus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Etiopía) y Oriental.
 - *Scheloribates (S.) parvus conglobatus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Scheloribates (S.) pauliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
 - *Scheloribates (S.) peracutus* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Scheloribates (S.) perforatus* Wallwork, 1964
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
 - *Scheloribates (S.) perisi* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Congo).
 - *Scheloribates (S.) philippinensis* Corpuz-Raros, 1980
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Scheloribates (S.) pilosus* Sellnick, 1943 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Italia.

- *Scheloribates (S.) pinnatus* (Gervais, 1849) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Scheloribates (S.) polygonatus* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).
- *Scheloribates (S.) ponticuliger* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Scheloribates (S.) potchefstroomensis* Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov y Theron, 2017
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- Scheloribates (S.) praeincisus* (Berlese, 1910) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
 - *Scheloribates (S.) praeincisus praeincisus* (Berlese, 1910)
(=*Murcia insularis* Oudemans, 1915)
(=*Scheloribates zaherii* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty y Trrad, 1983)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: frecuente, Islas del Pacífico: frecuente, Etiópica (Etiopía y Camerún) y Neotropical) y Holártica meridional (Egipto, Irán y U.S.A.: Tejas).
 - *Scheloribates (S.) praeincisus acuticlava* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Scheloribates (S.) praeincisus atlanticus* Pérez-Íñigo, 1982
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
 - *Scheloribates (S.) praeincisus cubanus* Scull, Jeleva y Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Scheloribates (S.) praeincisus interruptus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental: frecuente, Islas del Pacífico: frecuente, y "Neotropical").
 - *Scheloribates (S.) praeincisus sandvicensis* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates insularis s.*)
(=*Scheloribates praeincisus rotundiclava* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986)
(=*Scheloribates translamellaris* Kardar, 1977)
DISTRIBUCIÓN: Hawái, Norte de India, Neotropical (Brasil y Argentina) y U.S.A. (Tejas).
 - *Scheloribates (S.) praeincisus tenuiseta* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) e India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) praelineatus* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán e India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) praeoccupatissimus* Subías, 2004
(=*Scheloribates minutus* Mahunka, 1984, "nom. praeoc." por Pletzen, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Megascheloribates calcaratus* Lee y Pajak, 1990, "nom. praeoc." por Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- Scheloribates (S.) praestantissimus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: África oriental.
 - *Scheloribates (S.) praestantissimus praestantissimus* (Berlese, 1916)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
 - *Scheloribates (S.) praestantissimus major* (Berlese, 1916) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
- *Scheloribates (S.) primoricus* (Subbotina, 1987) (*Semischeloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Rusia asiática.
- *Scheloribates (S.) processus* Nakamura, Y.- N. Nakamura y Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) pseudomochlosimilaris* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) pseudoprincipalis* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) pubescens* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) rakhali* Sanyal, 1992
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Scheloribates (S.) rectus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical: Bolivia y Brasil, Sudáfrica y Noreste de India).
- *Scheloribates (S.) repetitivus* Subías, 2004
(=*Scheloribates pacificus* Hammer, 1967, "nom. praeoc." por Sellnick, 1959)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Scheloribates (S.) repetitus* Subías, 2004
(=*Scheloribates crassus* Kulijev, 1979, "nom. praeoc." por Hammer, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Scheloribates (S.) reticulatus* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2008) (*Semischeloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Scheloribates (S.) rigidisetosus* Willmann, 1951
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa central y Paleártica oriental meridional).

- *Scheloribates (S.) riyadhiensis* Kardar, 1988 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Scheloribates (S.) robustus* Pletzen, 1963
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) rostrudentatus* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Scheloribates (S.) rotundatus* Hammer, 1955
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Scheloribates (S.) rugiceps* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (S.) rugosus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Venezuela).
- *Scheloribates (S.) sacculipunctatus* Mahunka, 2009
DISTRIBUCIÓN: Emiratos Árabes.
- *Scheloribates (S.) sacsahuamanensis* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú y **Noreste de India**.
- *Scheloribates (S.) salebrosus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Albania.
- *Scheloribates (S.) samirani* Sanyal, Saha y Chakraborty, 2006
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) saswatii* Dhali y Bhaduri, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Scheloribates (S.) saudicus* Bayoumi y Al-Khalifa, 1985
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Scheloribates (S.) saudiensis* Kardar, 1988 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
- *Scheloribates (S.) saxicola* (Halbert, 1920) (*Oribatula*)
DISTRIBUCIÓN: Islas Británicas.
- *Scheloribates (S.) schauenbergi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Scheloribates (S.) semidesertus* Bulanova-Zachvatkina y Mahmudova, 1991
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Scheloribates (S.) sergienkoe* Subbotina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Scheloribates (S.) shigeruus* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) sikkimensis* Dhali y Bhaduri, 1981
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.
- *Scheloribates (S.) sphaeroides* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) e I. Galápagos.
- *Scheloribates (S.) striatus* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia e I. Galápagos) e India (Tripura).
- *Scheloribates (S.) striolatus* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Scheloribates (S.) sudaficanus* Subías, 2018
(=*Urubambates calcaratus* Mahunka, 1984, "nom. praeoc." por Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) teldanicus* Vasilii e Ivan, 1995
DISTRIBUCIÓN: Israel.
- *Scheloribates (S.) thermophilus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Tropical (Perú, India, e Islas del Pacífico).
 - *Scheloribates (S.) thermophilus thermophilus* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú e India.
 - *Scheloribates (S.) thermophilus corolevuensis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
- *Scheloribates (S.) transplicatus* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty y Ttrad, 1983
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Scheloribates (S.) tricarinus* Coetzer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) tuberculatus* Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1987
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Scheloribates (S.) tubuaiensis* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Paleártica occidental (Cáucaso).
- *Scheloribates (S.) turcmensis* Subbotina, 1987
DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.
- *Scheloribates (S.) uluguruensis* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Scheloribates (S.) unisetosus* Lee y Pajak, 1990
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Scheloribates (S.) urenicus* Subbotina, 1978
DISTRIBUCIÓN: Rusia europea central.
- *Scheloribates (S.) vanzwaluwenburgi* (Jacot, 1934) (*Protoschelobates*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Scheloribates (S.) variabilis* Pletzen, 1965
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (S.) viguerasis* Scull, Jeleva y Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Scheloribates (S.) volcanensis* Hammer, 1962
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y ¿Centroamérica?).
- *Scheloribates (S.) vulgaris* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental (Vietnam).
- *Scheloribates (S.) willmanni* Hammer, 1961
(=*Scheloribates angulatus* Hammer, 1958, “nom. praeoc.” por Willmann, 1932)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (S.) xylobatoides* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Sureste de Europa.
- *Scheloribates (S.) yamaeensis* Y.- N. Nakamura, Hashimoto, Nishi, Nakamura y Fujikawa, 2015
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) yezoensis* Fujita y Fujikawa, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Scheloribates (S.) yorubaensis* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Scheloribates (S.) zealandicus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Andhra Pradesh).

Scheloribates (Bischeloribates) Mahunka, 1988 (9 spp.)

ESPECIE TIPO: (*Bischeloribates heterodactylus* Mahunka, 1988, “nom. praeoc.” por Pletzen, 1963)

=*Scheloribates (Bischeloribates) mahunkai* Subías, 2010

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Scheloribates (Bischeloribates) bidactylus* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Bischeloribates) biunguis* (Berlese, 1920) (*Protoribates (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Scheloribates (Bischeloribates) conirostris* Corpuz-Raros, 1980 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Bischeloribates) dalawaeus* Corpuz-Raros, 1980 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Bischeloribates) elegantulus* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Bischeloribates) lizelhugae* Ermilov y Rybalov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scheloribates (Bischeloribates) mahunkai* Subías, 2010
(=*Bischeloribates heterodactylus* Mahunka, 1988, “nom. praeoc.” por Pletzen, 1963)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Scheloribates (Bischeloribates) munesaensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scheloribates (Bischeloribates) wachteli* Ermilov y Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.

Scheloribates (Grandjeanobates) Hammer, 1967 (3 spp.)

(=*Aellenobates* Mahunka, 1978)

ESPECIE TIPO: *Grandjeanobates novazealandicus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Scheloribates (Grandjeanobates) cryptacus* (Mahunka, 1978) (*Aellenobates*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) laticlava* Hammer, 1961 (*S.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Bután.
- *Scheloribates (Grandjeanobates) novazealandicus* (Hammer, 1967) (*G.*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Scheloribates (Makischeloribates) Corpuz-Raros, 1980 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Makischeloribates tripartitus* Corpuz-Raros, 1980

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Scheloribates (Makischeloribates) tripartitus* (Corpuz-Raros, 1980) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Scheloribates (Oxyscheloribates) J. y P. Balogh, 1990 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Scheloribates aculeatus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Scheloribates (Oxyscheloribates) aculeatus* Hammer, 1961 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

Scheloribates (Perscheloribates) Hammer, 1973 (47 spp. y 1 ssp.)

(=*Ischeloribates* Corpuz-Raros, 1980)

(=*Scheloribatella* Mahunka, 1984)

ESPECIE TIPO: *Perscheloribates clavatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Scheloribates (Perscheloribates) abbreviatus* Wallwork, 1977 (S.)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Scheloribates (Perscheloribates) agusanensis* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Scheloribates (Perscheloribates) albialatus* Hammer, 1961 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Perú e India.

- *Scheloribates (Perscheloribates) algarvensis* Weigmann, 2009 (S. (*Euscheloribates*))

DISTRIBUCIÓN: Portugal.

- *Scheloribates (Perscheloribates) baluktotus* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Scheloribates (Perscheloribates) benguetensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*Ischeloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas e India (Andhra Pradesh).

- *Scheloribates (Perscheloribates) brevialetus* Hammer, 1961 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Scheloribates (Perscheloribates) brevipterus* Hammer, 1962 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Scheloribates (Perscheloribates) cavernicolus* (Corpuz-Raros, 1980) (*Ischeloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Scheloribates (Perscheloribates) clavatus (Hammer, 1973) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental: Filipinas y Taiwán [Formosa], Australiana: Polinesia, y Paleártica meridional: Japón.

- *Scheloribates (Perscheloribates) clavatus clavatus* (Hammer, 1973)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Filipinas.

- *Scheloribates (Perscheloribates) clavatus torquatus* (Aoki, 1984) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].

- *Scheloribates (Perscheloribates) conjuges* Hammer, 1967 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda e India (Assam).

- *Scheloribates (Perscheloribates) crassisetosus* (Ermilov, Rybalov y Franke, 2011) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Scheloribates (Perscheloribates) crassus* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Scheloribates (Perscheloribates) curiosus* (Ermilov, 2016) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Cuba.

- *Scheloribates (Perscheloribates) curvirhynchus* Wallwork, 1977 (S.)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Scheloribates (Perscheloribates) ethiopicus* (Mahunka, 1986) (*Ischeloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Scheloribates (Perscheloribates) evanescens* Wallwork, 1977 (S.)

DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.

- *Scheloribates (Perscheloribates) fissuratus* Hammer, 1961 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).

- *Scheloribates (Perscheloribates) interlamellaris* (Ermilov, Chatterjee y D. J. Marshall, 2013) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Scheloribates (Perscheloribates) keriensis* Hammer, 1967 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Scheloribates (Perscheloribates) lanceolatus* (Aoki, 1984) (*Ischeloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.

- *Scheloribates (Perscheloribates) latus* Hammer, 1958 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Bolivia.

- *Scheloribates (Perscheloribates) luminosus* Hammer, 1961 (S.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical: Neotropical (Perú y Brasil), Oriental (Vietnam e India) y Etiópica (Congo y

Etiopía).

- *Scheloribates (Perscheloribates) lumotus* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Scheloribates (Perscheloribates) luteus* Hammer, 1962 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Venezuela) y Vietnam.
- *Scheloribates (Perscheloribates) luzonensis* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) minimus* (Mahunka, 1992) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Scheloribates (Perscheloribates) minusculus* Hammer, 1961 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Scheloribates (Perscheloribates) minutus* Pletzen, 1965 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental (Filipinas e India: Arunachal Pradesh).
- *Scheloribates (Perscheloribates) monodactylus* Morell, 1987 (S.)
(=*Scheloribates elongatus* Mihelčič, 1963, “nom. praec.” por Warburton, 1912)
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Scheloribates (Perscheloribates) monttensis* Hammer, 1962 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Scheloribates (Perscheloribates) nepalensis* (Ermilov y Martens, 2014) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Scheloribates (Perscheloribates) nodosus* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)
DISTRIBUCIÓN: **Oriental: Filipinas y Taiwán [Formosa].**
- *Scheloribates (Perscheloribates) paraluminosus* (Ermilov, Alvarado-Rodríguez, Tolstikov y Retana-Salazar, 2015) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Scheloribates (Perscheloribates) paratranslamellatus* (Ermilov y Rybalov, 2014) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Scheloribates (Perscheloribates) paratzitzikamaensis* (Ermilov, Sandmann, Marian y Maraun, 2013) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Scheloribates (Perscheloribates) quezonensis* (Corpuz-Raros, 1980) (*Ischeloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas y Méjico.
- *Scheloribates (Perscheloribates) reiteratus* (Subías, 2004) (P.)
(=*Scheloribates calcaratus* Wallwork, 1977, “nom. praec.” por Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Scheloribates (Perscheloribates) rostratus* Hammer, 1958 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Perscheloribates) rustenburgensis* Pletzen, 1963 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Scheloribates (Perscheloribates) setiger* (P. Balogh, 1988) (*Ischeloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Scheloribates (Perscheloribates) shiraensis* (Evans, 1953) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Scheloribates (Perscheloribates) subtropicus* Hammer, 1961 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Scheloribates (Perscheloribates) surigaoensis* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) tenuis* (Corpuz-Raros, 1980) (P.)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Scheloribates (Perscheloribates) translamellatus* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1991) (*Monoschelobates*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Scheloribates (Perscheloribates) tzitzikamaensis* Pletzen, 1963 (S.)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Scheloribatoides Mahunka, 1988 (1sp.)

ESPECIE TIPO: *Scheloribatoides lamellatus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Scheloribatoides lamellatus* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Similobates Mahunka, 1982 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Similobates demetorum* Mahunka, 1982

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Similobates deficiens* (Wallwork, 1977) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Similobates demetorum* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

Striatobates Hammer, 1973 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Striatobates tuberculatus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Striatobates tuberculatus* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).

Topobates Grandjean, 1958 (25 spp.)

(=*Berndia* Mahunka, 1988)

(=*Flagellobates* Mahunka, 1978)

(=*Setobates* Balogh, 1961)

ESPECIE TIPO: *Topobates granifer* Grandjean, 1958

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica, Neotropical y Antártica).

- *Topobates alisanicus* (Tseng, 1984) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Topobates berndhauseri* (Mahunka, 1978) (*Flagellobates*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Topobates carpathicus* (Weigmann y Miko, 1998) (*Scheloribates* (T.))
DISTRIBUCIÓN: Eslovaquia.
- *Topobates circumcarinatus* (Weigmann y Miko, 1998) (*Scheloribates* (T.))
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Topobates comatus* (Pérez-Íñigo jr., Herrero y Pérez-Íñigo, 1987) (*Setobates*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.
- *Topobates coronopubes* (Lee y Pajak, 1988) (*Setobates*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Topobates granifer* Grandjean, 1958
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa e "India".
- *Topobates helveticus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Topobates heterodactylus* (Pletzen, 1963) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Topobates holsaticus* Weigmann, 1969
(=*Scheloribates alvaradoi* Pérez-Íñigo, 1969)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica occidental (excepto Norte).
- *Topobates humeralis* Subbotina, 1976
DISTRIBUCIÓN: Europa oriental.
- *Topobates lanceolatus* (Wallwork, 1977) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Topobates magnus* (Balogh, 1962) (*Setobates*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Egipto.
- *Topobates medius* (Hammer, 1967) (*Setobates*)
(=*Setobates discors* Hammer, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topobates microsetosus* (Wallwork, 1977) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Topobates multiplisetus* (Mahunka, 1977) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Topobates multisetosus* (Balogh, 1970) (*Tuberemaeus*)
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Topobates quindecim* (Ermilov y Minor, 2016) (*Scheloribates* (T.))
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topobates scheloribatoides* (Ramsay, 1966) (*Multoribates*)
(=*Setobates minor* Hammer, 1967)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Topobates setosus* (Mahunka, 1988) (*Berndia*)
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Reunión).
- *Topobates sphaeroides* Subbotina, 1985
DISTRIBUCIÓN: Rusia europea central.
- *Topobates tanzanicus* Mahunka, 1993
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Topobates ultraforaminosus* (Lee y Pajak, 1988) (*Setobates*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Topobates umbraili* (Schweizer, 1956) (*Hemileius*)
DISTRIBUCIÓN: Suiza.
- *Topobates vasiliui* (Ivan y A. Călugăr, 2005) (*Scheloribates* (T.))
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.

Oripodidae Jacot, 1925 (17 gen., 1 subg., 105 spp. y 3 sspp.)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Anoripoda Sellnick, 1959 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Anoripoda nasalis* Sellnick, 1959

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Anoripoda nasalis* Sellnick, 1959

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Sociedad).

Benoibates Balogh, 1958 (17 spp.)

(=*Exoripoda* Woolley, 1961)

(=*Haploripoda* Balogh y Mahunka, 1967)

(=*Reductoripoda* Mahunka y Palacios-Vargas, 1996)

ESPECIE TIPO: *Benoibates flagellifer* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Benoibates absolutus* (Mahunka y Palacios-Vargas, 1996) (*Reductoripoda*)

DISTRIBUCIÓN: Méjico.

- *Benoibates amazonicus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Benoibates antiguaensis* Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- *Benoibates bolivianus* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Benoibates borhidii* Balogh y Mahunka, 1980

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Benoibates chacoensis* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Benoibates crinitus* (Berlese, 1910) (*Protoribates* (*Scheloribates*))

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Benoibates excavatus* (Woolley, 1961) (*Exoripoda*)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical (frecuente).

- *Benoibates flagellifer* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Benoibates juglans* (Jacot, 1938) (*Exoribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.

- *Benoibates marginatus* (Hammer, 1973) (*Exoribatula*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia.

- *Benoibates minimus* Mahunka, 1985

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Ecuador).

- *Benoibates muscicola* Baranek, 1981

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Benoibates plurisetus* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Paraguay.

- *Benoibates reductus* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Haploripoda*)

DISTRIBUCIÓN: Congo y Méjico.

- *Benoibates rugosus* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

- *Benoibates suramericanus* (Mahunka, 1983) (*Exoripoda*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

Birobates Balogh, 1970 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Birobates reductus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.

- *Birobates hepaticolus* Colloff y Cairns, 2011

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Birobates makinisus* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Birobates nasutus* Aoki, 2006

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Birobates reductus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea e India (Tripura).

Brachyoripoda Balogh, 1970 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Brachyoripoda foveolata* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.

- *Brachyoripoda foveolata* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] y Vietnam).

- *Brachyoripoda minima* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Brachyoripoda punctata* Ohkubo, 1980

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- Campbellobates*** Wallwork, 1964 (5 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Campbellobates acanthus* Wallwork, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Oriental, Australiana y Antártica.
Campbellobates acanthus Wallwork, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell) y Hawái.
 - *Campbellobates acanthus acanthus* Wallwork, 1964
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Campbell).
 - *Campbellobates acanthus hawaiiensis* P. Balogh, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Campbellobates aureus* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Campbellobates latohumeralis* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Campbellobates occultus* Hammer, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Campbellobates philippinensis* Corpuz-Raros, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- Cosmopirnodus*** Balogh, 1970 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Cosmopirnodus pulcherrimus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
 - *Cosmopirnodus angulatus* Ichisawa y Aoki, 1998
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Cosmopirnodus pulcherrimus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Japón.
 - *Cosmopirnodus tridactylus* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- Gymnobates*** Banks, 1902 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Gymnobates glaber* Banks, 1902
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Gymnobates glaber* Banks, 1902
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Washington D.C.).
- Gymnobatoides*** Woolley, 1966 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Gymnobates longus* Ewing, 1909
 DISTRIBUCIÓN: Neártica.
 - *Gymnobatoides longus* (Ewing, 1909) (*Gymnobates*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- Monstroripoda*** Mahunka, 2006 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Monstroripoda tubulifera* Mahunka, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
 - *Monstroripoda tubulifera* Mahunka, 2006
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Filipinas.
- Oripoda*** Banks, 1904 (37 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Oripoda elongata* Banks y Pergande, 1904
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
 - *Oripoda alata* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Gymnobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Oripoda angolensis* (Balogh, 1963) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Angola.
 - *Oripoda anguina* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Oripoda anomala* Baranek, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Oripoda araucariae* C. y C., jr. Pérez-Íñigo, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Oripoda attenuata* Mahunka, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Oripoda auriculata* Mahunka, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Oripoda australis* Berlese, 1916
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Ecuador).
 - *Oripoda benegasi* Fernández, 1999

- DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Oripoda brasiliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Oripoda canagaratnami* (Balogh, 1970) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Oripoda clavata* Woolley, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oripoda cordobensis* J. y P. Balogh, 1990
 (= *Truncopes australis* Balogh y Mahunka, 1968, “nom. praeoc.” por Berlese, 1916)
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Oripoda corticola* Baranek, 1981
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Oripoda cubana* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
 - *Oripoda divergens* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Méjico).
 - *Oripoda elongata* Banks y Pergande, 1904
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. y Méjico.
 - *Oripoda excavata* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Oripoda humerata* (Balogh, 1959) (*Benoibates*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
 - *Oripoda josephineae* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Oripoda lenkoi* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Oripoda lobata* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oripoda longiseta* Woolley, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oripoda luminosa* (Hammer, 1979) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Oripoda magna* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Oripoda maxensis* Mahunka, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Oripoda moderata* Berlese, 1916 “sp. inq.”
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
 - *Oripoda montana* (Hammer, 1962) (*Gymnobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y ¿Centroamérica?).
 - *Oripoda obliqua* Aoki y Yamamoto, 2007
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Oripoda philippinensis* Corpuz-Raros, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Oripoda pinicola* Aoki y Ohkubo, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Vietnam.
 - *Oripoda prominens* P. Balogh, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Oripoda punctata* Baranek, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Oripoda sacculifera* Mahunka, 2001
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Oripoda scissurata* (Balogh y Mahunka, 1980) (*Truncopes*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Oripoda sumonyii* Mahunka, 1985
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Oripoda trilabiata* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y ¿Centroamérica?) y Corea.

Parapirnodus Balogh y Mahunka, 1968 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Parapirnodus longus* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Neártica.

- *Parapirnodus longus* Balogh y Mahunka, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Parapirnodus prosopis* Martínez, Fernández y Monetti, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.

Protoripoda Balogh, 1970 (11 spp.)ESPECIE TIPO: *Protoripoda woolleyi* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

Protoripoda (Protoripoda) Balogh, 1970 (7 spp.)(?=*Frischia* Oudemans, 1915 "gen. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y Paleártica meridional.

- *Protoripoda (P.) elongata* (Oudemans, 1915) (*Frischia*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Protoripoda (P.) flagellata* Choi, 1994

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Protoripoda (P.) incurva* (Berlese, 1916) (*Oripoda*)

DISTRIBUCIÓN: Somalia.

- *Protoripoda (P.) insularis* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Protoripoda (P.) lineata* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Protoripoda (P.) nasuta* Mahunka, 2009

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Protoripoda (P.) woolleyi* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Protoripoda (Baloghates) Özdikmen, 2008 (4 spp.)(=*Calobates* Balogh, 1961, "nom. praeoc." por Kaup, 1829)ESPECIE TIPO: *Oripoda ornatissima* Balogh, 1959

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).

- *Protoripoda (Baloghates) antichthon* (Higgins, 1966) (*Calobates*)

DISTRIBUCIÓN: Guyana [Guayana Británica].

- *Protoripoda (Baloghates) ornata* Mahunka, 1986 (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

- *Protoripoda (Baloghates) ornatissima* (Balogh, 1959) (*Oripoda*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Protoripoda (Baloghates) tuberculata* Mahunka, 1988 (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

Pseudopirnodus Baranek, 1985 (4 spp.)ESPECIE TIPO: *Pseudopirnodus persetosus* Baranek, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Pseudopirnodus domrowi* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Pirnodus*)

DISTRIBUCIÓN: Australia.

- *Pseudopirnodus imitans* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Pirnodus*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina e I. Galápagos).

- *Pseudopirnodus madegassus* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Pseudopirnodus persetosus* Baranek, 1985

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Méjico).

Pteroripoda Balogh y Mahunka, 1974 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Pteroripoda minutissima* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Oriental y Neotropical).

- *Pteroripoda minutissima* Balogh y Mahunka, 1974

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

- *Pteroripoda perennis* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Scriptoripoda P. Balogh, 1985 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Scriptoripoda excellens* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Scriptoripoda excellens* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

- *Scriptoripoda tenorioae* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: Hawái.

Subpirnodus Mahunka, 1988 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Subpirnodus mirabilis* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Subpirnodus mirabilis* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Truncopes Grandjean, 1956 (11 spp. y 2 sspp.)

(=**Huarpescopes** Fernández, Monetti y Martínez, 1995)

ESPECIE TIPO: *Truncopes optatus* Grandjean, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional, Oriental y Neotropical.

- *Truncopes cryophilus* (Fernández, 1989) (*Pirnodus*)

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Truncopes fujikawae* Aoki y Ohkubo, 1974

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Truncopes gozeensis* Y.-N. Nakamura, 2009

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Truncopes makilingensis* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Truncopes moderatus Aoki y Ohkubo, 1974

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Vietnam e India: Arunachal Pradesh).

- *Truncopes moderatus moderatus* Aoki y Ohkubo, 1974

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Truncopes moderatus variabilis* Aoki y Yamamoto, 2007

DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental (Vietnam e India: Arunachal Pradesh).

- *Truncopes montanus* Wen y Chen, 1992

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Truncopes optatus Grandjean, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea occidental y Este de Paleártica oriental) y Oriental (India: Bengala Occidental).

- *Truncopes optatus optatus* Grandjean, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea occidental y Este de Rusia asiática (I. Kuriles) y Oriental (India: Bengala Occidental).

- *Truncopes optatus asiaticus* Aoki y Ohkubo, 1974

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Truncopes orientalis* Mahunka, 1987

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Truncopes pyriformis* Hammer, 1981

DISTRIBUCIÓN: Java.

- *Truncopes sinaraja* Mahunka, 2001

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Truncopes yoshidai* Aoki y Ohkubo, 1974

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

Pirnodidae Grandjean, 1956 (2 gen. y 5 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Australiana y Neotropical) y subtropical.

Cryptoribatula Jacot, 1934 (2 spp.)

(=**Euaella** Hammer, 1973)

ESPECIE TIPO: *Cryptoribatula taishanensis* Jacot, 1934

DISTRIBUCIÓN: Australiana y Paleártica meridional.

- *Cryptoribatula euaensis* Hammer, 1973

(=**Euaella gitteae** Hammer, 1973)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).

- *Cryptoribatula taishanensis* Jacot, 1934

DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.

Pirnodus Grandjean, 1956 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pirnodus detectidens* Grandjean, 1956

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Neotropical.

- *Pirnodus andinus* Baranek, 1985

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Pirnodus detectidens* Grandjean, 1956

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

- *Pirnodus soyeri* Travé, 1969

DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (I. Salvajes).

Protoribatidae J. y P. Balogh, 1984 (11 gen., 5 subg., 146 spp. y 3 sspp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Cribozetes Balogh, 1970 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Cribozetes multiareolatus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Cribozetes multiareolatus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka] y Filipinas.

Perxylobates Hammer, 1972 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Xylobates vermiseta* Balogh y Mahunka, 1968

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Perxylobates barbatus* Hammer, 1972

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Java.

- *Perxylobates brevisetus* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).

- *Perxylobates coreanus* Choi y Aoki, 1993

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Perxylobates crassisetosus* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Perxylobates guehoi* Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Malgache y Vietnam.

- *Perxylobates longissimus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

- *Perxylobates mahunkai* Bayoumi, 1980

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Perxylobates obesus* Bayoumi, 1977

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Perxylobates paravermiseta* Mahunka, 1976

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

- *Perxylobates sinensis* Wen, Aoki y X. Wang, 1984

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Perxylobates sinlimes* (Hammer, 1971) (*Xylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji) y Pequeñas Antillas.

- *Perxylobates taidinchani* Mahunka, 1976

DISTRIBUCIÓN: China (Hong-Kong).

- *Perxylobates thanhoensis* Ermilov, Vü, Trinh y Dao, 2011

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Perxylobates vermiseta* (Balogh y Mahunka, 1968) (*Xylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Malgache, Oriental, Islas del Pacífico y Pequeñas Antillas).

- *Perxylobates vietnamensis* (Jeleva y Vü, 1987) (*Xylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Polillozetes Corpuz-Raros, 2009 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Polillozetes aggenitalis* Corpuz-Raros, 2009

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Polillozetes aggenitalis* Corpuz-Raros, 2009

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Protoribates Berlese, 1908 (84 spp. y 3 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata dentata* Berlese, 1883

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Protoribates (Protoribates) Berlese, 1908 (48 spp. y 3 sspp.)

(=*Alloribates* Banks, 1947)

(=*Octodurozetes* Mahunka, 1993)

(=*Styloribates* Jacot, 1934)

(=*Xylobates* Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Protoribates (P.) angulatus* Choi, 1986

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Protoribates (P.) antillensis* (Mahunka, 1985) (*Xylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e Irán.

- *Protoribates (P.) baloghi* (Kardar, 1977) (*Scheloribates*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: India (Uttar Pradesh).

- *Protoribates (P.) bayanicus* Bayartogtokh, 2000

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Protoribates (P.) berndhauseri* (Mahunka, 1993) (*Octodurozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Suiza.

- *Protoribates (P.) brevisetosus* (Fujita, 1989) (*Xylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Protoribates (P.) capucinus Berlese, 1908

- DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
- *Protoribates (P.) capucinus capucinus* Berlese, 1908
(=*Xylobates capucinus angustior* Jacot, 1937)
(?= *Oribata monodactyla* Haller, 1884 "sp. inq.")
(=*Oribata parvilamellata* Ewing, 1909)
(=*Alloribates singularis* Banks, 1947)
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica): frecuente en tropical y subtropical.
 - *Protoribates (P.) capucinus bonairensis* Willmann, 1936 "ssp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Protoribates (P.) capucinus tentaculus* Mihelčič, 1958 "ssp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Protoribates (P.) cattienensis* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - Protoribates (P.) crassisetiger* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Protoribates (P.) crassisetiger crassisetiger* Choi, 1986
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Protoribates (P.) crassisetiger nipponicus* Fujita, 1989
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) curvicarinatus* Ermilov y Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Protoribates (P.) dentatus* (Berlese, 1883) (*Oribata*)
(=*Peloribates vastus* Mihelčič, 1956)
DISTRIBUCIÓN: Holártica, Oriental (Filipinas y Vietnam) y Melanesia (I. Fiji).
 - *Protoribates (P.) diani* (Mahunka, 1986) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Protoribates (P.) ecuadoriensis* Ermilov, Bayartogtokh, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Protoribates (P.) epimeralis* (Corpuz-Raros, 2009) (*Octodurozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Protoribates (P.) geonjiensis* Choi, 1994
DISTRIBUCIÓN: Corea.
 - *Protoribates (P.) gracilis* (Aoki, 1982) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
 - *Protoribates (P.) hakonensis* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Japón y Portugal.
 - *Protoribates (P.) halleri* (Michael, 1898) (*Oribata*) "sp. inq."
(=*Oribata simplex* Haller, 1884, "nom. praeoc." por Gervais, 1849)
DISTRIBUCIÓN: "Neotropical".
 - *Protoribates (P.) hirokous* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) imperfectus* (Banks, 1906) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. oriental.
 - *Protoribates (P.) iracemae* Pérez-Íñigo y Baggio, 1994
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).
 - *Protoribates (P.) kargilensis* (Kardar y Mattu, 1999) (*Scheloribates*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.
 - *Protoribates (P.) kumayaensis* Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) longiuscula* (Koch, 1841) (*Zetes*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Alemania.
 - *Protoribates (P.) lophothrichus* (Berlese, 1904) (*Oribata*)
(=*Styloribates pectinatus* Jacot, 1934)
(=*Xylobates prionotus* Woolley, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente, Etiópica: Senegal e I. Santa Helena, Oriental: Vietnam y China suoriental, y Hawái).
 - *Protoribates (P.) mollicoma* (Hammer, 1973) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico e India (Bengala Occidental).
 - *Protoribates (P.) myrmecophilus* Aoki e Ito, 1997
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Protoribates (P.) naganoensis* (Fujita, 1989) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) natalensis* (Pletzen, 1963) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India.
 - *Protoribates (P.) oblongus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
(=*Oribata longa* Ewing, 1909)
(=*Xylobates longisetae* Jacot, 1937)

- DISTRIBUCIÓN: Neártica (excepto Oeste) **y Pequeñas Antillas.**
- *Protoribates (P.) osunensis* Badejo, Woas y Beck, 2003
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
 - *Protoribates (P.) paracapucinus* (Mahunka, 1988) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental, Paleártica oriental (Irán), Etiópica (Congo **y Camerún**), Neotropical y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
 - *Protoribates (P.) paraecuadoriensis* Ermilov y Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Protoribates (P.) pembertoni* (Jacot, 1934) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
 - *Protoribates (P.) rioensis* Badejo, Woas y Beck, 2003
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Protoribates (P.) robustior* (Jacot, 1937) (*Xylobates oblongus r.*)
(=*Xylobates capucinus robustior* Jacot, 1937, “nom. praeoc.” por Jacot, 1937)
DISTRIBUCIÓN: Este de U.S.A. y Canadá.
 - *Protoribates (P.) rodriguezii* (Mahunka, 1988) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
 - *Protoribates (P.) rotundus* (Aoki, 2002) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) rufafulvus* (Kardar, 1977) (*Scheloribates*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Norte de India.
 - *Protoribates (P.) shirakamiensis* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) shvanderovi* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: **Vietnam.**
 - *Protoribates (P.) souchnaiensis* Abd-el-Hamid, 1965
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Protoribates (P.) taira* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Protoribates (P.) tenuis* (Wen, Aoki y X. Wang, 1984) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Protoribates (P.) tetrasetosus* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Protoribates (P.) tohokuensis* Fujikawa, 2003
DISTRIBUCIÓN: Japón y Portugal.
 - *Protoribates (P.) triangularis* (Hammer, 1971) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico e India (Bengala Occidental).
 - *Protoribates (P.) varisetiger* (Wen, Aoki y X. Wang, 1984) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Protoribates (P.) yezoensis* (Fujikawa, 1983) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

***Protoribates (Biunguis)* Subías, 2018 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Protoribates heterodactylus* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Protoribates (Biunguis) heterodactylus* Ermilov y Anichkin, 2011 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Protoribates (Biunguis) luteus* (Hammer, 1979) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas).

***Protoribates (Triaunguis)* Kulijev, 1978 (34 spp.)**

(=*Brasilobates* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)

(=*Glaberoribates* Tseng, 1984)

ESPECIE TIPO: (*Scheloribates fallax* Kulijev, 1968) =*Peloribates obtusus* Mihelčič, 1956

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Protoribates (Triaunguis) acutus* (Hammer, 1979) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Java).
- *Protoribates (Triaunguis) aethiopicus* Ermilov y Rybalov, 2013 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Protoribates (Triaunguis) bipilis* (Hammer, 1972) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) bisculpturatus* (Mahunka, 1988) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
- *Protoribates (Triaunguis) chistyakovi* Ermilov y Starý, 2017 (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: **Vietnam.**
- *Protoribates (Triaunguis) cuyi* Corpuz-Raros, 2014
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Protoribates (Triaunguis) duoseta* (Hammer, 1979) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental y Australiana (Nuevas Hébridas [Vanuatu]).
- *Protoribates (Triaunguis) durbanensis* (Pletzen, 1963) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Protoribates (Triaunguis) genitalis* Corpuz-Raros, 2013
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) gruezoi* Corpuz-Raros, 2014
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) haughlandae* Walter y Latonas, 2013 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Protoribates (Triaunguis) lemensis* Ermilov y Tolstikov, 2015 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Protoribates (Triaunguis) longilamellatus* Berlese, 1916 (P. (*Scheloribates*))
DISTRIBUCIÓN: “África oriental” y Java.
- *Protoribates (Triaunguis) magniporosus* Corpuz-Raros, 2013
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) magnus* (Aoki, 1982) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India.
- *Protoribates (Triaunguis) maigsius* (Corpuz-Raros, 1979) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) maximus* (Mahunka, 1988) (*Brasilobates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental e Irán.
- *Protoribates (Triaunguis) obtusus* (Mihelčič, 1956) (*Peloribates*)
(=*Scheloribates fallax* Kulijev, 1968)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán).
- *Protoribates (Triaunguis) paramadagascarensis* Ermilov, 2016 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Pequeñas Antillas).
- *Protoribates (Triaunguis) paramaigsius* Corpuz-Raros, 2014
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) praeoccupatus* Subías, 2004
(=*Brasilobates bipilis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980, “nom. praeoc.” por Hammer, 1972)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Paleártica oriental (Irán).
- *Protoribates (Triaunguis) punctatus* (Grobler, 1991) (*Brasilobates*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica y Noreste de India.
- *Protoribates (Triaunguis) putinglupaensis* Corpuz-Raros, 2013
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) rhomboides* (Hammer, 1972) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Protoribates (Triaunguis) rigidus* Corpuz-Raros y Lit, 2013
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) sangumburiensis* (Choi, 1996) (*Brasilobates*)
DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Protoribates (Triaunguis) seminudus* (Hammer, 1971) (*Xylobates*)
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Islas del Pacífico, y Oriental: Noreste de India (frecuente) y Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) shaldybinae* Ermilov y Starý, 2017 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Protoribates (Triaunguis) spinosus* (Fujita, 1989) (*Brasilobates*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Protoribates (Triaunguis) urbanus* (Tseng, 1984) (*Glaberoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Protoribates (Triaunguis) varisculptus* Corpuz-Raros, 2014
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Protoribates (Triaunguis) vulgaris* Corpuz-Raros, 2013
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Setoxylobates Balogh y Mahunka, 1967 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Setoxylobates foveolatus* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Setoxylobates (Setoxylobates) Balogh y Mahunka, 1967 (2 spp.)

(=*Lignobates* Mahunka, 2006)

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Setoxylobates (S.) berndhauseri* (Mahunka, 2006) (*Lignobates*)

DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).

- *Setoxylobates (S.) foveolatus* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Norte de India).

Setoxylobates (Plenoxylobates) Hammer, 1979 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Plenoxylobates ramosus* Hammer, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Setoxylobates (Plenoxylobates) curtiseta* (Hammer, 1979) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental: Java e India (Tripura).

- *Setoxylobates (Plenoxylobates) mayuloeus* (Corpuz-Raros, 1979) (*Perxylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Setoxylobates (Plenoxylobates) ramosus* (Hammer, 1979) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Java.

Setoxylobates (Polyxylobates) Hammer, 1973 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Polyxylobates diversiporosus* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Setoxylobates (Polyxylobates) diversiporosus* (Hammer, 1973) (P.)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga), Norte de Neotropical y Vietnam.

- *Setoxylobates (Polyxylobates) principalis* (Berlese, 1916) (*Protoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Sicaxylobates Luxton, 1985 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Xylobates sicafer* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Sicaxylobates pseudovermiseta* (Corpuz-Raros, 1979) (*Pilobatella*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Sicaxylobates sicafer* (Hammer, 1968) (*Xylobates*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

Totobates Hammer, 1961 (16 spp.)ESPECIE TIPO: *Totobates discifer* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Austral y subtropical austral (excepto Etiópica).

- *Totobates acutissimus* (Hammer, 1967) (*Maculobates*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates anarensis* (Dalenius, 1958) (*Liebstadia*)

DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Macquarie).

- *Totobates antarcticus* Wallwork, 1964 (*T. elegans a.*)

DISTRIBUCIÓN: Austral (Antártica y Nueva Zelanda).

- *Totobates capita* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates communis* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates discifer* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Totobates elegans* (Hammer, 1958) (*Protoribates*)

DISTRIBUCIÓN: Austral (Argentina y Antártica).

- *Totobates latus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates macroonyx* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates marionensis* Pletzen y Kok, 1971

DISTRIBUCIÓN: Antártica.

- *Totobates microseta* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates minimus* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates mollicoma* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Totobates ovalis* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Totobates pterygoides* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Argentina.

- *Totobates viviparus* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Chile.

Tranoribates Pérez-Íñigo, 1992 (5 spp.)(=*Edaphoribates* Nakamura y Nakai, 2009)ESPECIE TIPO: *Protoribates latus* Mihelčič, 1965DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y **Pantropical (excepto Neotropical)**.- *Tranoribates agricola* (Nakamura y Aoki, 1989) (*Protoribates*)

- DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Vietnam y Sudáfrica.
 - *Transoribates boraboraensis* (Sellnick, 1959) (*Protoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Sociedad).
 - *Transoribates clavatus* (Willmann, 1932) (*Protoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
 - *Transoribates latus* (Mihelčič, 1965) (*Protoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
 - *Transoribates parvulus* (Willmann, 1932) (*Protoribates*)
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

Trixylobates Balogh y Mahunka, 1978 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Trixylobates bidactylus* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Trixylobates bidactylus* Balogh y Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Tuxenia Hammer, 1958 (3 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Tuxenia complicata* Hammer, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica.
 - *Tuxenia brevis* Covarrubias, 1967
 (= *Tuxenia brevisetosa* Mahunka, 1980)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral.
 - *Tuxenia complicata* Hammer, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Tuxenia manantialis* Hammer, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical austral y subantártica: I. Malvinas [I. Falkland].

Vilhenabates Balogh, 1963 (10 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Peloribates minutus* Balogh, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Vilhenabates (Vilhenabates) Balogh, 1963 (8 spp.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
 - *Vilhenabates (V.) ambohitra* Mahunka, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Vilhenabates (V.) dissecatus* Mahunka, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Vilhenabates (V.) giganteus* Ermilov y Rybalov, 2012
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Vilhenabates (V.) hyalinus* Tseng, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Vilhenabates (V.) minutus* (Balogh, 1958) (*Peloribates*)
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Vilhenabates (V.) reductus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Vilhenabates (V.) schawalleri* Ermilov y Martens, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Vilhenabates (V.) simplex* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

Vilhenabates (Phalacrozetes) Aoki, 1965 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Phalacrozetes sinatus* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Vilhenabates (Phalacrozetes) similis* (Mahunka, 1988) (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
 - *Vilhenabates (Phalacrozetes) sinatus* (Aoki, 1965) (*P.*)
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Haplozetidae Grandjean, 1936 (20 gen., 11 subg., 236 spp. y 5 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Acutozetes Balogh, 1970 (6 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Acutozetes rostratus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.
 - *Acutozetes bornemisszai* J. y P. Balogh, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
 - *Acutozetes chibai* Aoki, 1976

- DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Acutozetes izumiensis* Fujikawa, 2011
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Acutozetes javensis* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Acutozetes nadchatrami* Balogh y Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Acutozetes rostratus* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Vietnam.

Baloghia Mahunka, 1994 (2 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Baloghia juditae* Mahunka, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Baloghia juditae* Mahunka, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).
 - *Baloghia spinifera* Mahunka, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Baloghiella Bulanova-Zachvatkina, 1972 (3 spp.)

- ESPECIE TIPO: *Baloghiella prima* Bulanova-Zachvatkina, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Baloghiella foveolata* Akrami y Ebrahimi, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Baloghiella granulata* Bayartogtokh y Akrami, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Baloghiella prima* Bulanova-Zachvatkina, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Asia centrooccidental.

Berlesiella Hammer, 1979 (2 spp.)

- (=*Comororibula* Mahunka, 1994)
 ESPECIE TIPO: *Berlesiella scutata* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.
 - *Berlesiella scutata* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Berlesiella truncata* (Mahunka, 1994) (*Comororibula*)
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Borneozetes Mahunka, 1997 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Borneozetes lanceolatus* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Borneozetes lanceolatus* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Cantharozetes Hammer, 1961 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Cantharozetes lucens* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Cantharozetes lucens* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Perú.

Conozetes Balogh y Mahunka, 1969 (1 sp.)

- ESPECIE TIPO: *Conozetes arcualis* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Conozetes arcualis* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Indoribates Jacot, 1929 (35 spp. y 1 ssp.)

- ESPECIE TIPO: *Protoribates punctulatus* Sellnick, 1925
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Indoribates (Indoribates) Jacot, 1929 (11 spp.)

- (=*Nixozetes* Mahunka, 1977)
 (= *Sundazetes* Hammer, 1979)
 DISTRIBUCIÓN: Australianooriental y Paleártica meridional.
 - *Indoribates (I.) bicarinatus* Ermilov y Anichkin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Indoribates (I.) brevisetus* (Balogh, 1970) (*Cosmobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Indoribates (I.) crassisetiger* (Fukuyama y Aoki, 2000) (*Nixozetes*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Indoribates (I.) gregoryi* (Balogh, 1970) (*Cosmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Indoribates (I.) japonicus* (Aoki, 1988) (*Sundazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Indoribates (I.) javanus* (Mahunka, 1977) (*Nixozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Filipinas).
- *Indoribates (I.) microsetosus* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Indoribates (I.) multisetus* (Wen y Zhao, 1994) (*Sundazetes*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Indoribates (I.) nobilis* (Golosoova, 1984) (*Cosmobates*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Indoribates (I.) punctulatus* (Sellnick, 1925) (*Protoribates*)
(=*Nixozetes apoensis* Corpuz-Raros, 1979)
(=*Sundazetes crispus* Hammer, 1979)
(=*Cosmobates panabokkei* Balogh, 1970)
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Indoribates (I.) samarensis* (Corpuz-Raros y Gruèzo, 2005) (*Nixozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Indoribates (Bolkiah) Mahunka, 1997 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bolkiah hauseri* Mahunka, 1997

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Indoribates (Bolkiah) hauseri* (Mahunka, 1997) (*B.*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Indoribates (Haplozetes) Willmann, 1935 (18 spp. y 1 ssp.)

(=*Mixobates* Subías y Gil-Martín, 1993)

(=*Propeschelobates* Jacot, 1936)

(=*Triungulozetes* Subías, 2001)

ESPECIE TIPO: *Peloribates vindobonensis* Willmann, 1935

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Indoribates (Haplozetes) albidus* (Ewing, 1908) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
- *Indoribates (Haplozetes) biheterodactylus* (Ermilov y Tolstikov, 2015) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Indoribates (Haplozetes) carneus* (Tseng, 1984) (*Lauritzenia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Indoribates (Haplozetes) clavatus* (Bayartogtokh, 2000) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
- *Indoribates (Haplozetes) cuticulatus* (Tseng, 1984) (*Muliercula*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Indoribates (Haplozetes) differens* (Weigmann, 2010) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
- *Indoribates (Haplozetes) fusifer* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*)
(=*Haplozetes (Mixobates) insularis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea e Irán) e India (Tripura).
- *Indoribates (Haplozetes) glaber* (Beck, 1965) (*Rostrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indoribates (Haplozetes) iranicus* Mortazavi, Akrami y Hajizadeh, 2011 (*I. (Mancoribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Indoribates (Haplozetes) longisacculus* Murvanidze y Weigmann, 2012
DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.
- *Indoribates (Haplozetes) madagascarensis* (Balogh, 1961) (*Scheloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Madagascar y Kenia).
- *Indoribates (Haplozetes) minutus* (Tseng, 1984) (*Lauritzenia*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa] y Neotropical.
- *Indoribates (Haplozetes) nudus* (Hammer, 1958) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Indoribates (Haplozetes) paraminimicoma* (Ermilov, Bayartogtokh, Sandmann, Marian y Maraun, 2013) (*H.*)
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Indoribates (Haplozetes) quadripilus* (Berlese, 1916) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Filipinas) y Australiana (Islas del Pacífico).
- *Indoribates (Haplozetes) triangulatus* (Beck, 1964) (*H.*)

DISTRIBUCIÓN: El Salvador.

- *Indoribates (Haplozetes) ulykpani* (Bayartogtokh y Aoki, 1998) (*H.*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

Indoribates (Haplozetes) vindobonensis (Willmann, 1935) (*Peloribates*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Península Arábiga y Méjico y Vietnam.

- *Indoribates (Haplozetes) vindobonensis vindobonensis* (Willmann, 1935)

(=*Scheloribates longiporosus* Kulijev, 1968)

(=*Ceratozetes problematicus* Mahunka, 1982)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica, Etiópica (Península Arábiga y Etiopía), Méjico y Vietnam.

- *Indoribates (Haplozetes) vindobonensis curtipilis* (Kunst, 1977) (*Haplozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

Indoribates (Mancoribates) Hammer, 1961 (4 spp.)

(=*Minasbates* Pérez-Íñigo y Baggio, 1996)

ESPECIE TIPO: *Mancoribates rostrilosus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Tropical (Neotropical y Australiana).

- *Indoribates (Mancoribates) acutirostrum* (Hammer, 1968) (*Lauritzenia*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Indoribates (Mancoribates) rostrilosus* (Hammer, 1961) (*M.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Indoribates (Mancoribates) rotundirostrum* (Hammer, 1968) (*Lauritzenia*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Indoribates (Mancoribates) sphaeroclava* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1996) (*Minasbates*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Indoribates (Philippizetes) Corpuz-Raros, 1979 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nixozetes (Philippizetes) philippinensis* Corpuz-Raros, 1979

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Indoribates (Philippizetes) corpuzrarosae* (Mahunka, 1987) (*Nixozetes (P.)*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).

- *Indoribates (Philippizetes) philippinensis* (Corpuz-Raros, 1979) (*Nixozetes (P.)*)

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Lauritzenia Hammer, 1958 (27 spp.)

ESPECIE TIPO: *Lauritzenia longipluma* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Lauritzenis (Lauritzenia) Hammer, 1958 (6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Lauritzenia (L.) furtadoi* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Haplozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y Filipinas).

- *Lauritzenia (L.) glabra* Pérez-Íñigo y Baggio, 1996

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Lauritzenia (L.) insignis* (Balogh y Mahunka, 1966) (*Haplozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Lauritzenia (L.) longipluma* Hammer, 1958

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Bengala Occidental).

- *Lauritzenia (L.) loongchiensis* (Tseng, 1984) (*Haplozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].

- *Lauritzenia (L.) minimicoma* (Beck, 1964) (*Haplozetes*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical e India (Tripura).

Lauritzenia (Incabates) Hammer, 1961 (19 spp.)

(=*Canaribates* Pérez-Íñigo y Peña, 1994)

ESPECIE TIPO: *Incabates nudus* Hammer, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Lauritzenia (Incabates) aokii* (Choi, 1985) (*Incabates*)

DISTRIBUCIÓN: Corea.

- *Lauritzenia (Incabates) atlantica* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) brevisetosa* (Bayartogtokh, 2000) (*H.*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia.

- *Lauritzenia (Incabates) canariensis* Pérez-Íñigo y Peña, 1997

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) depilis* Pérez-Íñigo y Peña, 1996

DISTRIBUCIÓN: I. Canarias.

- *Lauritzenia (Incabates) elegans* (Kunst, 1977) (*Haplozetes*)

- DISTRIBUCIÓN: Holártica meridional (Europa centromeridional y U.S.A. suroriental).
 - *Lauritzenia (Incabates) elongata* (Lee y Shepherd, 1990) (*Magnobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lauritzenia (Incabates) globula* (Lee y Shepherd, 1990) (*Magnobates*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lauritzenia (Incabates) hispanica* Morell, 1991 (*L.*)
 DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Lauritzenia (Incabates) macronuda* (Lee, 1993) (*I.*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lauritzenia (Incabates) major* (Aoki, 1970) (*I.*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental: Taiwán [Formosa] y Vietnam.
 - *Lauritzenia (Incabates) makii* (Y.-N. Nakamura, Fukumori y Fujikawa, 2010) (*Haplozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Lauritzenia (Incabates) nuda* (Hammer, 1961) (*I.*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y ¿Centroamérica?) y Oriental (Filipinas e India: Bengala Occidental).
 - *Lauritzenia (Incabates) pallida* (Mihelčič, 1956) (*Peloribates*)
 (= *Protoribates meridionalis* Mihelčič, 1965)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Lauritzenia (Incabates) punctata* (Lee, 1993) (*I.*)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Lauritzenia (Incabates) similis* Subías y Gil-Martín, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Lauritzenia (Incabates) sinuata* (Pérez-Íñigo jr., 1990) (*Haplozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Ibérica.
 - *Lauritzenia (Incabates) tenuifusus* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*)
 (= *Canaribates chamobatooides* Pérez-Íñigo y Peña, 1994)
 DISTRIBUCIÓN: **Paleártica meridional** (Mediterránea e Irán).
 - *Lauritzenia (Incabates) valbehanae* (Ermilov, 2016) (*Haplozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

***Lauritzenia (Magnobates)* Hammer, 1967 (2 spp.)**

(= *Gymnozetes* Călugăr y Vasiliu, 1983)

ESPECIE TIPO: *Magnobates flagellifer* Hammer, 1967

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Etiópica).

- *Lauritzenia (Magnobates) flagellifer* (Hammer, 1967) (*M.*)
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
 - *Lauritzenia (Magnobates) orghidani* (Călugăr y Vasiliu, 1983) (*Gymnozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.

***Magyaria* Balogh, 1963 (17 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Scheloribates reticulatus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical).

- *Magyaria agusana* Corpuz-Raros, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Magyaria annobonica* Pérez-Íñigo, 1982
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón], y Congo).
 - *Magyaria atlantica* Pérez-Íñigo, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
 - *Magyaria breviseta* Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Magyaria cancellata* (Beck, 1964) (*Haplozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Sudán e India (Bengala Occidental).
 - *Magyaria fenestrata* Balogh y Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Magyaria filipina* Corpuz-Raros, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Magyaria incisa* Balogh y Mahunka, 1974
 DISTRIBUCIÓN: Península Malaya.
 - *Magyaria javensis* Hammer, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Magyaria krisztinae* Mahunka, 2008
 DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Magyaria luzonica* Corpuz-Raros, 1991
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Magyaria mindanensis* Corpuz-Raros, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Magyaria ornata* Balogh, 1963

- DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Magyaria pulcherrima* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
 - *Magyaria reticulata* (Balogh, 1958) (*Scheloribates*)
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
 - *Magyaria strinovichi* Balogh, 1970
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
 - *Magyaria triangulata* Mahunka, 1988
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Mahnertozetes Mahunka y Mahunka-Papp, 2009 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Mahnertozetes perreti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Mahnertozetes perreti* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Nasobates Woolley, 1966 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Nasobates spinosus* Woolley, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Nasobates mirabilis* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Nasobates spinosus* Woolley, 1966
 (= *Nasobates paraguayensis* Mahunka, 1984)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Honduras y Paraguay.

Paraxylobates Balogh y Mahunka, 1969 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Paraxylobates imitans* Balogh y Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana).

- *Paraxylobates burii* Ermilov, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Paraxylobates imitans* Balogh y Mahunka, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico) e India (Rajastán).
 - *Paraxylobates lowmanae* (Ermilov, Winchester y Wassie, 2012) (*Pilobatella*)
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
 - *Paraxylobates maurensis* (Scull, 1985) (*Pilobatella*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.

Peloribates Berlese, 1908 (91 spp. y 2 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata peloptoides* Berlese, 1888

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

***Peloribates* (*Peloribates*)** Berlese, 1908 (87 spp. y 2 sspp.)

(= *Capillozetes* Balogh, 1943)

(= *Euryparazetes* Radford, 1950)

(= *Indobates* Pandit y Bhattacharya, 1999)

(= *Parazetes* Willmann, 1930, "nom. praeoc." por Sclater, 1879)

(= *Setincabates* Lee, 1993)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Peloribates* (*P.*) *ababaeus* Corpuz-Raros, 1979
 DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
Peloribates (*P.*) *acutus* Aoki, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental (Tailandia y China suroriental).
 - *Peloribates* (*P.*) *acutus acutus* Aoki, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
 - *Peloribates* (*P.*) *acutus curvisacculatus* Aoki, 1967
 DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Peloribates* (*P.*) *alaskensis* Hammer, 1955
 DISTRIBUCIÓN: Alaska.
 - *Peloribates* (*P.*) *americanus* Jacot, 1939 (*P. europaeus a.*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva Hampshire).
 - *Peloribates* (*P.*) *angulatus* Bayartogtokh, 2000
 DISTRIBUCIÓN: Mongolia.
 - *Peloribates* (*P.*) *asejugalis* (Pandit y Bhattacharya, 1999) (*Indobates*)
 DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
 - *Peloribates* (*P.*) *barbatus* Aoki, 1977
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Peloribates* (*P.*) *buntotanus* Corpuz-Raros, 1981

- DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) canadensis* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional (frecuente).
 - *Peloribates (P.) clavatus* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Illinois).
 - *Peloribates (P.) consectionus* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Etiopía).
 - *Peloribates (P.) curtipilus* Jacot, 1937
DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Paleártica oriental meridional).
 - *Peloribates (P.) decumanus* (Berlese, 1908) (*Protoribates (Scheloribates)*)
(=*Peloribates anomalus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Peloribates (P.) dispersus* Beck, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Peloribates (P.) europaeus* Willmann, 1935
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.: Nuevo Méjico) y Méjico.
 - *Peloribates (P.) floridensis* Nevin, 1975
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Peloribates (P.) formosus* Nakatamari, 1985
DISTRIBUCIÓN: Japón e Irán.
 - *Peloribates (P.) fragilis* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Peloribates (P.) fumotoensis* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Peloribates (P.) fuscetosus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Peloribates (P.) genavensium* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Peloribates (P.) glaber* Mihelčič, 1956
(=*Peloribates alatus* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
 - *Peloribates (P.) grandis* (Willmann, 1930) (*Parazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica y Japón.
 - *Peloribates (P.) gressitti* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
 - *Peloribates (P.) guttatoides* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia y Vietnam).
 - *Peloribates (P.) guttatus* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Vietnam).
 - *Peloribates (P.) haramachiensis* Aoki, 1999
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Peloribates (P.) hirsutus* (Banks, 1895) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Nueva York).
 - *Peloribates (P.) hubbardi* (Banks, 1904) (*Galumna*)
(=*Peloribates histricinus* Berlese, 1910)
(=*Peloribates tillandsius* Nevin, 1975)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Peloribates (P.) hungaricus* (Balogh, 1943) (*Capillozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania y Nepal.
 - *Peloribates (P.) hypersetosus* (Lee, 1993) (*Setincabates*)
DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Peloribates (P.) hystrix* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).
 - *Peloribates (P.) intermedius* Mondal, 1984
DISTRIBUCIÓN: India.
 - *Peloribates (P.) iowaensis* Ewing, 1917
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Iowa).
 - *Peloribates (P.) juniperi* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
 - *Peloribates (P.) kalboprodorsalis* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Peloribates (P.) kaszabi* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Peloribates (P.) latus* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Peloribates (P.) levipunctatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Peloribates (P.) lineatus* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) longicoma* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Argentina y Brasil).
- *Peloribates (P.) longipilosus* Csiszár, 1962
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
- *Peloribates (P.) longisetosus* (Willmann, 1930) (*Parazetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical, Este de Paleártica oriental e India.
- *Peloribates (P.) magkakaibaesus* Corpuz-Raros, 1979
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) magnisetosus* Hammer, 1967
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Peloribates (P.) moderatus* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) muscicola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú y Japón.
- *Peloribates (P.) neominatus* Subías, 2004
(=*Peloribates hirsutus* Mahunka, 1983, "nom. praeoc." por Banks, 1895)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Peloribates (P.) nigeriensis* Badejo, Woas y Beck, 2002
DISTRIBUCIÓN: Nigeria.
- *Peloribates (P.) nishinoi* Aoki, 1977
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) ominei* Nakatamari, 1985
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) pakistanensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional (Paquistán) y Oriental.
- *Peloribates (P.) palawanus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) paraguayensis* Balogh y Mahunka, 1981
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay) y Oriental (India: Bengala Occidental, y Vietnam).
- *Peloribates (P.) peloptoides* (Berlese, 1888) (*Oribata*)
(=*Oribata banksi* Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Paraguay y Brasil), China suroriental y U.S.A. (Illinois).
- *Peloribates (P.) perezinigo* Shtanchaeva, Grikurova y Subías, 2011
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Peloribates (P.) perreti* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Peloribates (P.) pilipinus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) pilosus* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur).
- *Peloribates (P.) pinguisetus* Mahunka, 1985
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas y U.S.A. (Tejas).
- *Peloribates (P.) plumosus* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Peloribates (P.) pocsi* Mahunka y Mahunka-Papp, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Peloribates (P.) porosus* Beck, 1964
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Peloribates (P.) prominens* Fujikawa, 2006
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) pseudoporosus* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Peloribates (P.) rangiroaensis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental, Oriental y Polinesia.
 - *Peloribates (P.) rangiroaensis rangiroaensis* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia y Oriental (Vietnam e India: Kerala).
 - *Peloribates (P.) rangiroaensis asiaticus* Aoki y Nakatamari, 1974
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y China suroriental.
- *Peloribates (P.) ratubakensis* Hammer, 1979
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Java y Nepal).
- *Peloribates (P.) repetitus* Subías, 2004
(=*Peloribates minutus* Aoki, 1967, "nom. praeoc." por Balogh, 1958)
DISTRIBUCIÓN: Tailandia y ¿Este de Rusia asiática?
- *Peloribates (P.) reticulatus* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Peloribates (P.) rigidicoma* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
- *Peloribates (P.) robustus* Grishina, 1981
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental y Méjico.
- *Peloribates (P.) ryukyuensis* Aoki y Nakatamari, 1974
DISTRIBUCIÓN: Japón e India (Kerala).
- *Peloribates (P.) serratoseta* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. central.
- *Peloribates (P.) sierramadrensis* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) spiniformis* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Peloribates (P.) stellatus* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Peloribates (P.) szirakii* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Peloribates (P.) tatyanae* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Peloribates (P.) tredecemsetosus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) tripuraensis* Sanyal y Saha, 1996
DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Peloribates (P.) tsengi* Wang, Wen y Chen, 2003
(=*Peloribates longisetosus* Tseng, 1984, “nom. praeoc.” por Willmann, 1930)
(=*Peloribates praeoccupatus* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Peloribates (P.) tunisiensis* Mahunka, 1980
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.
- *Peloribates (P.) turgidus* Wen y Zhao, 1994
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Peloribates (P.) uracasensis* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Micronesia (I. Marianas).
- *Peloribates (P.) varisculptus* Corpuz-Raros, 1981
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Peloribates (P.) yatsushiroensis* Fujikawa, 2016
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) yezoensis* Fujikawa, 1986
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Peloribates (P.) yunnanensis* Wen, 1985
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Peloribates (Aokibates) Mahunka, 1988 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Aokibates yoshii* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental y Neotropical.

- *Peloribates (Aokibates) yoshii* (Mahunka, 1988) (A.)
DISTRIBUCIÓN: Borneo y Méjico.

Peloribates (Peloribatodes) Mahunka, 2011 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Peloribates (Peloribatodes) incompatibilis* Mahunka, 2011

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Peloribates (Peloribatodes) incompatibilis* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Peloribates (Tentaculozetes) Balogh, 1970 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tentaculozetes loksai* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Australiana.

- *Peloribates (Tentaculozetes) loksai* (Balogh, 1970) (T.)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Pilobatella Balogh y Mahunka, 1967 (7 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pilobatella punctulata* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

Pilobatella (Pilobatella) Balogh y Mahunka, 1967 (6 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Pilobatella (P.) berleseii* Bhattacharya y Banerjee, 1980
DISTRIBUCIÓN: Noreste de India.

- *Pilobatella (P.) brevipila* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pilobatella (P.) monstrosa* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Pilobatella (P.) punctulata* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Camerún) e India: Bengala Occidental.
- *Pilobatella (P.) schauenbergi* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pilobatella (P.) xena* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Pilobatella (Tripilobatella) Subías, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pilobatella baloghi* Mahunka, 2003

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pilobatella (Tripilobatella) baloghi* Mahunka, 2003 (P.)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Pilobates Balogh, 1960 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Protoribates pilosellus* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

Pilobates (Pilobates) Balogh, 1960 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Paleártica meridional.

- *Pilobates (P.) carpetanus* Pérez-Íñigo, 1969
(?=*Protoribates elongatus* Mihelčič, 1956 “sp. inq.”)
- (?=*Protoribates longior* Mihelčič, 1957 “sp. inq.”)
- DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Pilobates (P.) pilosellus* (Balogh, 1958) (*Protoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola y Cáucaso.

Pilobates (Italobates) Mahunka, 1994 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Protoribates (Scheloribates) incisura* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pilobates (Italobates) incisura* (Berlese, 1916) (*Protoribates (Scheloribates)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Rostrozetella Mahunka, 2006 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Rostrozetes (Rostrozetella) decorus* Mahunka, 2006

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Rostrozetella decorus* (Mahunka, 2006) (*Rostrozetes (Rostrozetella)*)
DISTRIBUCIÓN: Venezuela.
- *Rostrozetella schalleri* (Beck, 1965) (*Rostrozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Rostrozetes Sellnick, 1925 (28 spp. y 2 sspp.)

(=*Carabozetes* Mihelčič, 1957)

(=*Zaherizetes* Yousef y Nasr, 1976)

ESPECIE TIPO: (*Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925) =*Trachyoribates ovulum* Berlese, 1908

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Rostrozetes aegypticus* (Yousef y Nasr, 1976) (*Zaherizetes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Rostrozetes africanus* (Yousef y Nasr, 1976) (*Zaherizetes*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Rostrozetes angulifer* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Rostrozetes bothulifer* Balogh y Mahunka, 1979
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Brasil).
- *Rostrozetes carinatus* Beck, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rostrozetes cristatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Rostrozetes cubanus* Balogh y Mahunka, 1974
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Rostrozetes dimorphochaites* Higgins, 1996
DISTRIBUCIÓN: Neotropical: Guyana [Guayana Británica] y Venezuela.
- *Rostrozetes dispar* (Balogh, 1958) (*Peloribates*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Rostrozetes florens* Balogh, 1970
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Rostrozetes geminsetosus* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes heterotrichus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).
- *Rostrozetes inornatus* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes irregularis* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Bolivia y Vietnam.
- *Rostrozetes komodensis* Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Australiana: Indonesia (Komodo) y Oriental: India (Tripura).
- *Rostrozetes mammillatus* (Warburton, 1912) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.
- *Rostrozetes monstruosus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Venezuela).
- *Rostrozetes nagaii* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- Rostrozetes ovulum* (Berlese, 1908) (*Trachyoribates*)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
 - *Rostrozetes ovulum ovulum* (Berlese, 1908)
(=*Peloribates areolatus* Balogh, 1958)
(=*Trachyoribates dorsalis* Balogh, 1958)
(=*Rostrozetes flavus* Woodring, 1965)
(=*Rostrozetes foveolatus* Sellnick, 1925)
(=*Rostrozetes geneuxi* Mahunka, 1985)
(=*Trachyoribates nodosus* Hammer, 1958)
(=*Rostrozetes pulcherrimus* Balogh, 1961)
(=*Peloribates punctulatus* Balogh, 1958)
(=*Rostrozetes punctulifer* Balogh y Mahunka, 1979)
(=*Rostrozetes trimorphus* Balogh y Mahunka, 1979)
DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
 - *Rostrozetes ovulum appalachicola* Jacot, 1938 (*R. foveolatus a.*) "ssp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).
 - *Rostrozetes ovulum poensis* (Mihelčič, 1957) (*Carabozetes p.*)
(=*Rostrozetes foveolatus nebulosus* Beck, 1965)
DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Bioco [Fernando Poo] y Neotropical.
- *Rostrozetes perezinigo* P. Balogh, 1995
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes persiangulfi* (Akrami, Majidi y Behmanesh, 2011) (*Trachyoribates (R.)*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Rostrozetes pinguis* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes polygonatus* Balogh y Mahunka, 1969
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes pseudofurcatus* Balogh y Mahunka, 1968
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Rostrozetes punctatus* Karppinen, 1966
DISTRIBUCIÓN: Guinea e India (Bengala Occidental).
- *Rostrozetes rimachensis* Beck, 1965
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Brasil).
- *Rostrozetes sexclavatus* Sellnick, 1925 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Rostrozetes shibai* Aoki, 1976
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Península Malaya y China suroriental).

Trachyoribates Berlese, 1908 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata ampulla* Berlese, 1905

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Trachyoribates ampulla* (Berlese, 1905) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Indonesia) y Nueva Guinea.
- *Trachyoribates chinensis* Fukuyama y Aoki, 2000
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

Tubulozetidae P. Balogh, 1989 (1 gen. y 1 sp.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

Tubulozetes P. Balogh, 1989 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Tubulozetes rostratus* P. Balogh, 1989

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Tubulozetes rostratus* P. Balogh, 1989

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Parakalummidae Grandjean, 1936 (2 gen., 3 subg., 66 spp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Neoribates Berlese, 1914 (62 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata roubali* Berlese, 1910

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Neoribates (*Neoribates*) Berlese, 1914 (51 spp.)

(=*Protokalumma* Jacot, 1929)

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Etiópica y Antártica).

- *Neoribates* (*N.*) *aurantiacus* (Oudemans, 1914) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Holártica (menos frecuente en el Sur) y Oriental.

- *Neoribates* (*N.*) *barbatus* Hammer, 1968

DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.

- *Neoribates* (*N.*) *borealis* Vladimirova, 2009

DISTRIBUCIÓN: Eurosiberiana.

- *Neoribates* (*N.*) *bulanovae* Grishina, 2009

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Neoribates* (*N.*) *cheni* Liang y Yang, 2013

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Neoribates* (*N.*) *cupulatus* Liang, Yang y Tang, 2014

DISTRIBUCIÓN: China suroriental.

- *Neoribates* (*N.*) *depressus* (Banks, 1895) (*Oribata*)

DISTRIBUCIÓN: Neártica oriental (frecuente) y U.S.A. (Florida).

- *Neoribates* (*N.*) *elongatus* Aoki, 2009

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Neoribates* (*N.*) *erectus* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Protokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Neoribates* (*N.*) *flagellum* (Balogh, 1970) (*Protokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Neoribates* (*N.*) *formaminiferus* Sellnick, 1923

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Neoribates* (*N.*) *fulvus* Sellnick, 1923 (*N. foraminiferus* f.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Centroamérica).

- *Neoribates* (*N.*) *gracilis* Travé, 1970

DISTRIBUCIÓN: Europa meridional y Nepal.

- *Neoribates* (*N.*) *granulatus* Akrami y Behmanesh, 2012

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Neoribates* (*N.*) *incisus* Hagino, Shimano y Aoki, 2016

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Neoribates* (*N.*) *insignificans* (Mahunka, 1995) (*Parakalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Neoribates* (*N.*) *isabelaensis* Bayartogtokh, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Neoribates* (*N.*) *jacoti* (Balogh y Mahunka, 1967) (*Protokalumma*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal).

- *Neoribates* (*N.*) *krivolutskyi* Grishina, 2009

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.

- *Neoribates* (*N.*) *macrosacculatus* Aoki, 1966

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.

- *Neoribates* (*N.*) *monodactylus* Ermilov y Anichkin, 2014

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Neoribates* (*N.*) *neglectus* Willmann, 1953

DISTRIBUCIÓN: Europa central.

- *Neoribates* (*N.*) *neonomnatus* Subías, 2004 (*N. (Protokalumma)*)

(=*Protokalumma jacoti* Norton y Kethley, 1989, "nom. praeoc." por Balogh y Mahunka, 1967)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Misuri).

- *Neoribates* (*N.*) *oceanicus* (Oudemans, 1915) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Neoribates* (*N.*) *ornamentus* Ermilov y Kalúz, 2013

DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Neoribates (N.) pallidus* Aoki, 1988
(=*Neoribates alius* Fujikawa, 2007)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Nepal.
- *Neoribates (N.) parabarbatu*s Ermilov y Kalúz, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Neoribates (N.) parabulanovae* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Neoribates (N.) paramacrosacculatus* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Neoribates (N.) pararotundus* Ermilov y Martens, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Neoribates (N.) paratuberculatus* Ermilov, Shtanchaeva y Subías, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) particula* Liang y Yang, 2013
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Neoribates (N.) parvisetigerum* (Aoki, 1965) (*Protokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental (frecuente).
- *Neoribates (N.) peruensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Ecuador).
- *Neoribates (N.) pterotus* (Banks, 1910) (*Galumna*)
(=*Oribata (Neoribates) fissuratus* Berlese, 1914)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental.
- *Neoribates (N.) protrusus* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) pseudojacoti* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) punctulatus* (Balogh, 1970) (*Protokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoribates (N.) pyramidalis* (Tseng, 1984) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Neoribates (N.) quadrisetosus* (Ewing, 1917) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental (frecuente).
- *Neoribates (N.) rimosus* Suzuki, 1978
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (N.) rotundus* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón y Taiwán [Formosa].
- *Neoribates (N.) roubali* (Berlese, 1910) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Noreste de Oriental.
- *Neoribates (N.) salicis* (Ewing, 1913) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
- *Neoribates (N.) setiger* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Neoribates (N.) sibiricus* Vladimirova, 2009
DISTRIBUCIÓN: Siberia.
- *Neoribates (N.) similis* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Neoribates (N.) spindleformis* Ermilov y Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) striatissimus* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neoribates (N.) szabadosi* (Balogh, 1970) (*Protokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Neoribates (N.) tuberculatus* Willmann, 1956
DISTRIBUCIÓN: “Checoslovaquia”.

***Neoribates (Pseudoneoribates)* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015 (2 spp.)**

ESPECIE TIPO: *Neoribates (Pseudoneoribates) negrosensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Neoribates (Pseudoneoribates) kotschani* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Neoribates (Pseudoneoribates) negrosensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

***Neoribates (Parakalumma)* Jacot, 1929 (5 spp. y 1 ssp.)**

ESPECIE TIPO: *Neoribates lydia* Jacot, 1923

DISTRIBUCIÓN: Holártica y Australiana.

- *Neoribates (Parakalumma) corticis* (Ewing, 1913) (*Oribata*)

- DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Míchigan).
 - *Neoribates (Parakalumma) headlandi* (Starý, 1997) (P.)
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
 - *Neoribates (Parakalumma) koshiensis* Y.-N. Nakamura, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Neoribates (Parakalumma) lydia* Jacot, 1923 (N.)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.
Neoribates (Parakalumma) robustus (Banks, 1895) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental y Japón).
 - *Neoribates (Parakalumma) robustus robustus* (Banks, 1895)
 (= *Oribata centropterus* Berlese, 1908)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (U.S.A. oriental: frecuente, y Japón).
 - *Neoribates (Parakalumma) robustus floridanus* (Jacot, 1935) (P.)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- Neoribates (Perezinigokalumma)* Subías, 2004 (4 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Protokalumma afrum* Pérez-Íñigo, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Etiópica y Neotropical).
 - *Neoribates (Perezinigokalumma) afrum* (Pérez-Íñigo, 1969) (*Protokalumma*)
 DISTRIBUCIÓN: Guinea Ecuatorial: I. Pagalu [Annobón].
 - *Neoribates (Perezinigokalumma) foveolata* (Balogh y Mahunka, 1969) (*Parakalumma*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Surinám).
 - *Neoribates (Perezinigokalumma) munizi* (Balogh y Mahunka, 1974) (*Parakalumma*)
 DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Neoribates (Perezinigokalumma) piton* (Mahunka, 1998) (*Parakalumma*)
 DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.

- Sandenia* Oudemans, 1917 (4 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Galumna georgiae* Oudemans, 1914
 DISTRIBUCIÓN: Antártica, Oriental y Paleártica.

- Sandenia (Sandenia)* Oudemans, 1917 (1 sp.)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica.
 - *Sandenia (S.) georgiae* (Oudemans, 1914) (*Galumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica (I. Georgia del Sur).

- Sandenia (Porokalumma)* Wallwork, 1966 (3 spp.)
 (= *Neokalumma* Tseng, 1984)
 ESPECIE TIPO: *Sandenia rotunda* Wallwork, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Antártica, Oriental y Paleártica.
 - *Sandenia (Porokalumma) elongata* Liu y Wu, 2013
 DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Sandenia (Porokalumma) laiae* (Tseng, 1984) (*Neokalumma*)
 DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Sandenia (Porokalumma) rotunda* Wallwork, 1963 (S.)
 DISTRIBUCIÓN: Antártica.

Galumnoidea Jacot, 1925

- Galumnidae** Jacot, 1925 (29 gen., 14 subg., 551 spp. y 33 sspp.)
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

- Acrogalumna* Grandjean, 1956 (10 spp. y 1 ssp.)
 ESPECIE TIPO: *Oribata elimata longipluma* Berlese, 1904
 DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).
 - *Acrogalumna abrupta* Hammer, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
 - *Acrogalumna bipartita* Aoki y Hu, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Acrogalumna hungarica* (Willmann, 1938) (*Allogalumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Acrogalumna lanceolata* Bayartogtokh y Akrami, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Irán.
Acrogalumna longipluma (Berlese, 1904) (*Oribata elimata l.*)
 DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica, Etiópica, Oriental (India: Kerala y China suroriental) y Nueva Zelanda.
 - *Acrogalumna longipluma longipluma* (Berlese, 1904)

(=*Galumna decipiens* Mihelčič, 1956)

(=*Galumna filata* Oudemans, 1914)

(=*Galumna latipluma* Mihelčič, 1952)

(=*Galumna longiporus* Mihelčič, 1952)

(=*Oribata setiformis* Hall, 1911)

DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Holártica (frecuente en Europa), Etiópica, Oriental (India: Kerala y China suroriental) y Nueva Zelanda.

- *Acrogalumna longipluma adjarica* Murvanidze y Weigmann, 2003

DISTRIBUCIÓN: Cáucaso.

- *Acrogalumna machadoi* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Oriental: India (Tripura) y Nepal.

- *Acrogalumna monttensis* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Chile.

- *Acrogalumna pacifica* (Trägårdh, 1931) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Chile (I. Juan Fernández).

- *Acrogalumna pectinata* (Jacot, 1937) (*Zetes*) "sp. inq."

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Carolina del Norte).

- *Acrogalumna shogranensis* Hammer, 1977

DISTRIBUCIÓN: Paquistán y China suroriental.

Africogalumna Starý, 2005 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Africogalumna krivolutskyi* Starý, 2005

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Africogalumna krivolutskyi* Starý, 2005

DISTRIBUCIÓN: Congo.

Allogalumna Grandjean, 1936 (41 spp.)

(=*Ctenogalumna* Balogh, 1961)

(=*Xenogalumna* Balogh, 1961)

ESPECIE TIPO: *Galumna alamellae* Jacot, 1935

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Neártica y Antártica).

- *Allogalumna alpha* Pérez-Íñigo y Baggio, 1994

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Argentina).

- *Allogalumna ampla* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Allogalumna antillensis* (Mahunka, 1998) (*Pilogalumna*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Perú).

- *Allogalumna asetosa* Ermilov y Kalúz, 2014

DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Allogalumna borhidii* Balogh y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Allogalumna brevisetosa* (Bayartogtokh y Weigmann, 2005) (*Acrogalumna*)

DISTRIBUCIÓN: Mongolia y China suroriental.

- *Allogalumna confluens* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Allogalumna costata* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.

- *Allogalumna cubana* Balogh y Mahunka, 1979

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Ecuador).

- *Allogalumna dilatata* J. y P. Balogh, 1983

DISTRIBUCIÓN: Australia y Filipinas.

- *Allogalumna exigua* Popp, 1960

DISTRIBUCIÓN: Egipto.

- *Allogalumna filiger* Hammer, 1962

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Chile y Panamá).

- *Allogalumna gedaii* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Tailandia.

- *Allogalumna incompleta* Mahunka, 1988

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

- *Allogalumna indonesiensis* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015

DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

- *Allogalumna insolita* Mahunka, 1996

DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

- *Allogalumna iranica* Akrami, 2015

DISTRIBUCIÓN: Irán.

- *Allogalumna integer* (Berlese, 1904) (*Oribata alata* i.)

(=*Allogalumna alata transversa* Mihelčič, 1957)

- (=*Galumna* (*Pergalumna*) *diversiata* Mihelčič, 1956)
 (= *Allogalumna neerlandica* Hammer, 1952)
 DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Allogalumna leleupi* Balogh, 1962
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Allogalumna longula* (Balogh, 1961) (*Xenogalumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna madagascarensis* (Balogh, 1961) (*Ctenogalumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna margaritifera* Balogh, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Allogalumna microporosa* Mahunka, 1980
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical.
- *Allogalumna monodactyla* Ermilov y Anichkin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Allogalumna multesima* Grandjean, 1957
 DISTRIBUCIÓN: Norte de Neotropical y Vietnam.
- *Allogalumna novazealandica* Hammer, 1968
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Allogalumna paramachadoi* Ermilov y Anichkin, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Allogalumna paranovazealandica* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Allogalumna parva* (Berlese, 1916) (*Oribata*)
 (= *Galumna alamellae* Jacot, 1935)
 (= *Galumna alamellae italicum* Jacot, 1935)
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Allogalumna pellucida* Wallwork, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Allogalumna plowmanae* J. y P. Balogh, 1983
 DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Allogalumna pocsi* Mahunka, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna quadrimaculata* (Mahunka, 1988) (*Pergalumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Allogalumna rotundiceps* Aoki, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Vietnam.
- *Allogalumna rugata* Liang y Yang, 2015
 DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Allogalumna sinornata* Mahunka, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Allogalumna superporosa* Mahunka, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Allogalumna triangulata* Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- *Allogalumna turkeyensis* Grobler, Bayram y Cobanoglu, 2004
 DISTRIBUCIÓN: Turquía.
- *Allogalumna upoluensis* Hammer, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa) y Vietnam.
- *Allogalumna vojnitsi* Mahunka, 1993
 DISTRIBUCIÓN: África oriental.

Carinogalumna Engelbrecht, 1973 (6 spp.)

(= *Paracarinogalumna* Mahunka, 1998)

(= *Pseudogalumna* Pérez-Íñigo y Baggio, 1994)

ESPECIE TIPO: *Carinogalumna montana* Engelbrecht, 1973

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Carinogalumna alineata* Ermilov y Martens, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Carinogalumna clericata* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Carinogalumna genavensium* (Mahunka, 1998) (*Paracarinogalumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Pequeñas Antillas y Brasil).
- *Carinogalumna heros* (Canestrini, 1897) (*Oribata*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Carinogalumna montana* Engelbrecht, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Carinogalumna philippinensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Centroribates Berlese, 1915 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata mucronata* G. y R. Canestrini, 1882

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Centroribates mucronatus* (G. y R. Canestrini, 1882) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

Cryptogalumna Grandjean, 1957 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Cryptogalumna cryptodonta* Grandjean, 1957

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional y Oriental.

- *Cryptogalumna cryptodonta* Grandjean, 1957

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Cryptogalumna grandjeani* Balakrishnan y Haq, 1985

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Dicatozetes Grandjean, 1956 (2 spp.)

ESPECIE TIPO: *Centroribates uropygium* Grandjean, 1928

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Dicatozetes numidicus* Bernini, 1984

DISTRIBUCIÓN: Argelia.

- *Dicatozetes uropygium* (Grandjean, 1928) (*Centroribates*)

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Dimidiogalumna Engelbrecht, 1972 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Dimidiogalumna villiersensis* Engelbrecht, 1972

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical y Paleártica meridional.

- *Dimidiogalumna azumai* Aoki, 1996

DISTRIBUCIÓN: Japón y **Oriental** (Vietnam y **China suroriental**).

- *Dimidiogalumna comoroensis* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

- *Dimidiogalumna grandjeani* Ermilov y Anichkin, 2014

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Dimidiogalumna mauritii* (Mahunka, 1978) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Dimidiogalumna villiersensis* Engelbrecht, 1972

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Flagellozetes Balogh, 1970 (14 spp. y 1 ssp.)

ESPECIE TIPO: *Flagellozetes porosus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental, Neotropical y Paleártica meridional.

Flagellozetes (Flagellozetes) Balogh, 1970 (1 sp. y 1 ssp.)

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

Flagellozetes (F.) porosus Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Oriental: Ceilán [Sri Lanka]e India (Kerala).

- *Flagellozetes (F.) porosus porosus* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].

- *Flagellozetes (F.) porosus indicus* Balakrishnan y Haq, 1985

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Flagellozetes (Cosmogalumna) Aoki, 1988 (13 spp.)

(=***Variogalumna*** Mahunka, 1995)

ESPECIE TIPO: *Cosmogalumna ornata* Aoki, 1988

DISTRIBUCIÓN: Oriental, Neotropical y Paleártica meridional.

- *Flagellozetes (Cosmogalumna) areticulata* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015)

(***Galumna (C.)***)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).

- *Flagellozetes (Cosmogalumna) centroclathrata* (Hagino y Shimano, 2017) (***Galumna (C.)***)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Flagellozetes (Cosmogalumna) dongnaiensis* (Ermilov y Anichkin, 2013) (***Galumna (C.)***)

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Flagellozetes (Cosmogalumna) ekaterinae* (Ermilov y Friedrich, 2016) (***Galumna (C.)***)

DISTRIBUCIÓN: Perú.

- *Flagellozetes (Cosmogalumna) hiroyoshii* (Nakamura y Fujikawa, 2004) (***C.***)

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Flagellozetes (Cosmogalumna) imperfecta* (Aoki y Hu, 1993) (C.)
(=*Galumna (Cosmogalumna) praeoccupata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) kirishimaensis* (Hagino y Shimano, 2017) (*Galumna* (C.))
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) ornata* (Aoki, 1988) (C.)
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) singularis* (Mahunka, 1995) (*Variogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Península Malaya).
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) sumatrensis* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015)
(*Galumna* (C.))
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) tenensis* (Ermilov, Vu y Nguyen, 2011) (*Galumna* (C.))
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) vladopesici* (Ermilov y Corpuz-Raros, 2015) (*Galumna* (C.))
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Flagellozetes (Cosmogalumna) yonaguniensis* (Aoki, 2009) (*Galumna* (C.))
DISTRIBUCIÓN: Japón.

Galumna Heyden, 1826 (187 spp. y 10 sspp.)
ESPECIE TIPO: *Notaspis alatus* Hermann, 1804
DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.

Galumna (Galumna) Heyden, 1826 (176 spp. y 10 sspp.)
(=*Holokalumna* Jacot, 1929)
(=*Holozetes* Jacot, 1929)
(=*Kinezogalumna* Aoki y Hu, 1993)
(=*Zetes* Koch, 1836)

- DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita.
- *Galumna (G.) aba* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Galumna (G.) acutifrons* Banks, 1915 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Galumna (G.) acutirostrum* Ermilov y Anichkin, 2010
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Galumna (G.) aegyptica* Abd-el-Hamid, Al-Assiuty y Ttrad, 1982
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
 - *Galumna (G.) agueroi* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
 - Galumna (G.) alata* (Hermann, 1804) (*Notaspis*)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica occidental, Mongolia, U.S.A., I. Seychelles, Hawái, Argentina, India: Kerala, y Antártica: I. Georgia del Sur).
 - *Galumna (G.) alata alata* (Hermann, 1804)
(=*Galumna coleoptratum occidentale* Jacot, 1929)
(=*Oribata octopunctata* Ewing, 1909)
(=*Zetes satellitius* Koch, 1841)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica occidental: menos frecuente en el Norte, Mongolia, U.S.A.: frecuente, I. Seychelles, Hawái, Argentina, India: Kerala, y Antártica: I. Georgia del Sur).
 - *Galumna (G.) alata maxima* Willmann, 1939 (*G. m.*)
(=*Galumna alata multiiterata* Subías, 2004)
DISTRIBUCIÓN: Macaronésica (Madeira).
 - *Galumna (G.) angularis* Jeleva, Scull y Cruz, 1984
(=*Galumna hamifer* Mahunka, 1985)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Galumna (G.) ankaratra* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Galumna (G.) antalata* Banks, 1916 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Tasmania.
 - *Galumna (G.) antiguaensis* Ermilov, 2016
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Galumna (G.) antonioberlesei* Subías, 2010 "sp. inq."
(=*Oribata ovata* Berlese, 1916 "nom. praeoc." por Koch, 1839)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
 - *Galumna (G.) appressala* (Ewing, 1910) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Galumna (G.) arabica* Bayoumi y Al-Khalifa, 1984
DISTRIBUCIÓN: Arabia Saudita.

- *Galumna (G.) armatifera* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) arrugata* Jeleva, Scull y Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Galumna (G.) atomaria* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- Galumna (G.) australis* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Australiana: Hawái.
 - *Galumna (G.) australis australis* (Berlese, 1914)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Galumna (G.) australis pembertonii* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Galumna (G.) azoreana* Pérez-Íñigo, 1992
DISTRIBUCIÓN: I. Azores.
- *Galumna (G.) baloghi* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Chad y Congo).
- *Galumna (G.) banksi* Jacot, 1929
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Galumna (G.) barnardi* (Jacot, 1940) (*Holozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Congo).
- *Galumna (G.) basilewskyi* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Galumna (G.) berlesei* Oudemans, 1919
DISTRIBUCIÓN: Europa centromeridional.
- *Galumna (G.) betzaida* Mahunka, 1992
DISTRIBUCIÓN: Israel.
- *Galumna (G.) bidentatirostris* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Galumna (G.) bimorpha* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Galumna (G.) bradleyi* (Jacot, 1935) (*Zetes*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) breviseta* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Galumna (G.) calcicola* (Aoki y Hu, 1993) (*Kinezogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Galumna (G.) californica* (Hall, 1911) (*Oribata alata c.*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Galumna (G.) calva* Starý, 1997
DISTRIBUCIÓN: Australia y Sumatra.
- Galumna (G.) capensis* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Sudáfrica y Congo).
 - *Galumna (G.) capensis capensis* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Galumna (G.) capensis dissimilis* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) castanea* (Canestrini, 1898) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Galumna (G.) cavernalis* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Galumna (G.) changchunensis* Wen, 1987
DISTRIBUCIÓN: Norte de China.
- *Galumna (G.) chujoi* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental e India (Kerala).
- *Galumna (G.) circularis* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia, ¿Centroamérica? e I. Galápagos).
- *Galumna (G.) cirripilis* (Canestrini, 1898) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.
- *Galumna (G.) colombiana* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Galumna (G.) coloradensis* (Jacot, 1929) (*Holokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centromeridional.
- *Galumna (G.) colossus* Oudemans, 1915
DISTRIBUCIÓN: Ceilán [Sri Lanka].
- *Galumna (G.) comparabilis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) coreana* Choi, 1997

- (=*Galumna longiporosa* Choi, 1986, "nom. praeoc." por Fujikawa, 1972)
 (= *Galumna reiterata* Subías, 2004)
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Galumna (G.) coronata* Mahunka, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Senegal.
- *Galumna (G.) costata* Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
- Galumna (G.) crenata* Deb y Raychaudhuri, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: frecuente, y Filipinas).
 - *Galumna (G.) crenata crenata* Deb y Raychaudhuri, 1975
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (India: frecuente, y Filipinas).
 - *Galumna (G.) crenata indica* Sh. Sarkar, Sanyal y Chakrabarti, 2013
 DISTRIBUCIÓN: India (Maharashtra).
 - *Galumna (G.) crenata uttarkashii* Sh. Sarkar, Sanyal y Chakrabarti, 2007
 DISTRIBUCIÓN: India (Uttarakhand).
- *Galumna (G.) cubana* Jeleva, Scull y Cruz, 1984
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Cuba y Pequeñas Antillas).
- *Galumna (G.) cuneata* Aoki, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Galumna (G.) curvifamulus* Ermilov, Hugo-Coetzee, Khaustov y Theron, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) delectum* Pérez-Íñigo y Baggio, 1996
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) difficilis* (Berlese, 1916) (*Oribata*) "sp. inq."
 DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Galumna (G.) dimidiata* Engelbrecht, 1969
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e Irán.
- *Galumna (G.) dimorpha* Krivolutskaja, 1952
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (excepto Este).
- *Galumna (G.) discifera* Balogh, 1960
 (= *Galumna engelbrechti* J. y P. Balogh, 2002, "nom. praeoc." por Mahunka, 1997)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Congo y Sudáfrica), Oriental (Vietnam e India: Kerala) e Irán.
- *Galumna (G.) dispar* Willmann, 1932
 DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Galumna (G.) divergens* Mahunka, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Borneo e Irán.
- *Galumna (G.) dkrivolutskyi* Ermilov y Starý, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) duplex* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Galumna (G.) egregia* Sellnick, 1923
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Panamá).
- *Galumna (G.) elegantula* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
 DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) elimata* (Koch, 1841) (*Oribata*)
 DISTRIBUCIÓN: Europea.
- *Galumna (G.) engelbrechti* Mahunka, 1997
 DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Galumna (G.) euaensis* Hammer, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Galumna (G.) europaea* (Berlese, 1914) (*Oribata emarginatus e.*)
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Europa centromeridional y Asia centrooccidental).
- *Galumna (G.) exigua* Sellnick, 1925
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (Sumatra y Filipinas).
- *Galumna (G.) fijiensis* Hammer, 1973
 DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- Galumna (G.) flabellifera* Hammer, 1958
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.
 - *Galumna (G.) flabellifera flabellifera* Hammer, 1958
 (= *Pergalumna pyri* Elbadry y Nasr, 1975)
 DISTRIBUCIÓN: Pantropical (frecuente) y subtropical.
 - *Galumna (G.) flabellifera orientalis* Aoki, 1965
 DISTRIBUCIÓN: Oriental y Japón.
- *Galumna (G.) flagellata* Willmann, 1925
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica centromeridional (excepto Este).
- *Galumna (G.) fordi* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Islas del Pacífico, Etiópica y "Neotropical").

- *Galumna (G.) fuscata* Kishida, 1921 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
- *Galumna (G.) gharbiensis* Bayoumi, Al-Assiuty, Abd-el-Hamid y El-Shereef, 1983
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Galumna (G.) gibbula* Grandjean, 1956 (*G. tarsipennata* g.)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Galumna (G.) glabra* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) globuloides* (Tafner, 1905) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Galumna (G.) granalata* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Norte de Oriental.
- *Galumna (G.) grandjeani* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: África centrooriental.
- *Galumna (G.) granulimorpha* Bayartogtokh y Akrami, 2014
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Galumna (G.) hammerae* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) homodactyla* (Karpelles, 1893) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
- *Galumna (G.) hudsoni* Hammer, 1952
DISTRIBUCIÓN: Canadá.
- *Galumna (G.) humida* (Hall, 1911) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Galumna (G.) incerta* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) incisa* Mahunka, 1982
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumna (G.) indonesia* Ermilov, Sandmann, Klarnar, Widyastuti y Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Galumna (G.) innexa* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) inquirenda* (Berlese, 1916) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Etiópica ("África oriental" y Sudáfrica).
 - *Galumna (G.) inquirenda inquirenda* (Berlese, 1916) "ssp. inq."
(=*Oribata maxima* Berlese, 1916, "nom. praeoc." por Ewing, 1908)
DISTRIBUCIÓN: "África oriental".
 - *Galumna (G.) inquirenda lawrencei* Jacot, 1940 (*G. maxima l.*) "ssp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Galumna (G.) inquirenda natalensis* Jacot, 1940 (*G. maxima n.*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Galumna (G.) iranensis* Mahunka y Akrami, 2001
DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Galumna (G.) irazu* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Galumna (G.) iterata* Subías, 2004 "sp. inq."
(=*Zetes banksi* Jacot, 1929, "nom. praeoc." por Jacot, 1929)
(=*Galumna jacoti* Marshall, Reeves y Norton, 1987, "nom. praeoc." por Wharton, 1938)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
- *Galumna (G.) ithacensis* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental (frecuente).
- *Galumna (G.) jacoti* Wharton, 1938 "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Galumna (G.) karajica* Mahunka y Akrami, 2001
DISTRIBUCIÓN: Irán y Cáucaso.
- *Galumna (G.) kazakhstani* Krivolutskaia, 1952 (*G. lanceata k.*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Rusia asiática meridional).
- *Galumna (G.) kebangica* Ermilov y Vū, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) khoii* Mahunka, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).
- *Galumna (G.) lanceata* (Oudemans, 1900) (*Notaspis*)
(=?*Zetes dorsalis* Koch, 1835 "sp. inq.")
(=*Galumna dubia* Mihelčič, 1953)
(=*Galumna exiguareata* Mihelčič, 1953)
(=*Galumna maxima* Mihelčič, 1956, "nom. praeoc." por Willmann, 1939)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (frecuente) y Vietnam.

- *Galumna (G.) lanceosensilla* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Galumna (G.) laselyae* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) lejeunei* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Galumna (G.) levisensilla* Ermilov y Anichkin, 2010
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Noreste de India).
- *Galumna (G.) longiclava* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) longiporosa* Fujikawa, 1972
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Galumna (G.) lunaris* Jeleva, Scull y Cruz, 1984
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
- *Galumna (G.) lyrica* (Jacot, 1935) (*Holokalumna*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) macroptera* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. meridional.
 - *Galumna (G.) macroptera macroptera* (Ewing, 1909)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
 - *Galumna (G.) macroptera matecumbei* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) major* (Pearce, 1906) (*Oribata alata m.*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: India (Sikkim).
- *Galumna (G.) makilingensis* Ermilov, Corpuz-Raros y Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Galumna (G.) mariae* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Congo) y Macaronésica (Cabo Verde).
- *Galumna (G.) media* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Galumna (G.) microfissum* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Vietnam.
- *Galumna (G.) mikoi* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Galumna (G.) miniporosa* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Galumna (G.) minuta* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental (frecuente).
- *Galumna (G.) mollis* Kunst, 1958
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea oriental.
- *Galumna (G.) monteithi* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) monticola* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán.
- *Galumna (G.) mystax* C. y C. jr., Pérez-Íñigo, 1993
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) naturalisi* Ermilov, 2017
DISTRIBUCIÓN: Colombia.
- *Galumna (G.) nigra* (Ewing, 1909) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica nororiental (frecuente).
- *Galumna (G.) nilgiria* (Ewing, 1910) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Galumna (G.) niliaca* Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985
DISTRIBUCIÓN: Egipto.
- *Galumna (G.) nodula* Nevin, 1974
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Galumna (G.) nonoensis* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Galumna (G.) nortoni* Subías, 2017 "sp. inq."
(=*Oribata alata* Packard, 1888, "nom. praeoc." por Hermann, 1804)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A.: Kentucky.
- *Galumna (G.) nuda* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Perú.
- *Galumna (G.) pallida* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) paracalcicola* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Galumna (G.) paragibbula* Weigmann, 2011
DISTRIBUCIÓN: Portugal.
- *Galumna (G.) parakazakhstani* Ermilov y Anichkin, 2014
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) paramastigophora* Ermilov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) paraoctopunctata* Ermilov, Alvarado-Rodríguez y Retana-Salazar, 2015
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- *Galumna (G.) parascaber* Deb y Raychaudhuri, 1975
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Galumna (G.) paraweni* Ermilov y Kalúz, 2014
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Galumna (G.) parazeucta* Ermilov y Friedrich, 2016
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Galumna (G.) parva* Woodring, 1965
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Luisiana).
- *Galumna (G.) parviporosa* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) perezii* Pérez-Íñigo y Baggio, 1994
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) planiclava* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Japón.
 - *Galumna (G.) planiclava planiclava* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga).
 - *Galumna (G.) planiclava ishigakiensis* Aoki, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Galumna (G.) polyporus* Mihelčič, 1952 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
- *Galumna (G.) pseudokhoii* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Camboya).
- *Galumna (G.) pseudotriquetra* Ermilov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Galumna (G.) pusilla* Sellnick, 1923
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Galumna (G.) reticulata* Hammer, 1958
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Galumna (G.) rossica* Sellnick, 1926
DISTRIBUCIÓN: Paleártica (excepto Oeste): frecuente.
- *Galumna (G.) rostrata* Sellnick, 1922 “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: I. Célebes [Sulawesi].
- *Galumna (G.) rugosa* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Galumna (G.) sabahna* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Sumatra).
- *Galumna (G.) samoensis* Jacot, 1924
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Galumna (G.) scaber* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
- *Galumna (G.) scripta* Balogh y Mahunka, 1966
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Galumna (G.) sequoiae* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
- *Galumna (G.) setigera* Mihelčič, 1956
(=*Galumna (Pergalumna) crassicostata* Mihelčič, 1956)
(=*Galumna distincta* Mihelčič, 1956)
(=*Galumna (Pergalumna) fusigera* Mihelčič, 1956)
(=*Galumna sicca* Mihelčič, 1957)
DISTRIBUCIÓN: Mediterránea.
- *Galumna (G.) similis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Uruguay) y U.S.A. (Tejas).
- *Galumna (G.) sinuofrons* Jacot, 1922
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Galumna (G.) strinovichi* J. y P. Balogh, 1983
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) swezeyi* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Hawái.
- *Galumna (G.) szentivanyorum* J. y P. Balogh, 1983

- DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Galumna (G.) tarsipennata* Oudemans, 1914
(=*Galumna (Pergalumna) lata* Mihelčič, 1956)
(=*Galumna nova* Mihelčič, 1957)
(=*Galumna parvula* Mihelčič, 1956)
- DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: frecuente en el Sur, y Asia centrooccidental) y Brasil.
- *Galumna (G.) tessellata* (Ewing, 1910) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
 - *Galumna (G.) tetraporosa* Ermilov, Martens y Tolstikov, 2014
DISTRIBUCIÓN: Nepal.
 - *Galumna (G.) teuri* Ermilov y Klimov, 2017
(=*Galumna imperfecta* Hammer, 1972, “nom. praeoc.” por Banks, 1906)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
 - *Galumna (G.) texana* Banks, 1906
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Tejas).
 - *Galumna (G.) tokyoensis* Aoki, 1966
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
 - *Galumna (G.) triangulata* Bayartogtokh y Akrami, 2014
DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Galumna (G.) tricuspadata* Engelbrecht, 1969
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
 - *Galumna (G.) triops* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo).
 - *Galumna (G.) triquetra* Aoki, 1965
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam) y Australia.
 - *Galumna (G.) tsengi* Ermilov y Liao, 2017
DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Galumna (G.) tuberculata* Mahunka, 1997
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - *Galumna (G.) unica* Sellnick, 1923
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Galumna (G.) valida* Aoki, 1994
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico.
 - *Galumna (G.) varia* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Galumna (G.) virginiensis* Jacot, 1929
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental (frecuente) y China suroriental.
 - *Galumna (G.) weni* Aoki y Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
 - *Galumna (G.) wojciechniedbalai* Ermilov, 2012
DISTRIBUCIÓN: Zambia.
 - *Galumna (G.) zachvatkini* Grishina, 1982
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Mediterránea oriental y Paleártica oriental meridional).

***Galumna (Angulogalumna)* Grishina, 1981 (2 spp.)**

(=*Cuspidogalumna* Starý, 2005)

ESPECIE TIPO: *Angulogalumna asiatica* Grishina, 1981

DISTRIBUCIÓN: Paleártica y Etiópica.

- *Galumna (Angulogalumna) asiatica* (Grishina, 1981) (A.)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental.

- *Galumna (Angulogalumna) staryi* Subías, 2010

(=*Cuspidogalumna areolata* Starý, 2005, “nom. praeoc.” por Willmann, 1923)

DISTRIBUCIÓN: Congo.

***Galumna (Atypicogalumna)* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Atypicogalumna corpuzrarosae* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Atypicogalumna corpuzrarosae* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015

DISTRIBUCIÓN: Sumatra.

***Galumna (Erogalumna)* Grandjean, 1966 (1 sp.)**

ESPECIE TIPO: *Erogalumna zeucta* Grandjean, 1966

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Galumna (Erogalumna) zeucta* (Grandjean, 1966) (E.)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Venezuela y Panamá).

Galumna (Indogalumna) Balakrishnan, 1985 (6 spp.)ESPECIE TIPO: *Indogalumna microsulcata* Balakrishnan, 1985

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical (Paleártica meridional).

- *Galumna (Indogalumna) balakrishnani* Subías, 2010(=*Indogalumna monticola* Balakrishnan, 1985, "nom. praeoc." por Hammer, 1977)

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Galumna (Indogalumna) microsulcata* (Balakrishnan, 1985) (*I.*)

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Galumna (Indogalumna) neonominata* Subías, 2004(=*Galumna clavata* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991, "nom. praeoc." por Sellnick, 1931 [+])

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

- *Galumna (Indogalumna) pterolineata* Hammer, 1972 (*G.*)

DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).

- *Galumna (Indogalumna) rasilis* Pérez-Íñigo, 1987 (*G.*)(=*Galumna rugosa* Wallwork, 1977, "nom. praeoc." por Hammer, 1968)(=*Galumna sanctaehelenae* J. y P. Balogh, 2002)

DISTRIBUCIÓN: I. Azores e I. Santa Helena.

- *Galumna (Indogalumna) undulata* (Balakrishnan, 1985) (*I.*)

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Galumna (Kabylogalumna) Bernini, 1984 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Kabylogalumna rhinoceros* Bernini, 1984

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Galumna (Kabylogalumna) rhinoceros* (Bernini, 1984) (*K.*)

DISTRIBUCIÓN: Argelia.

Galumna (Rostrogalumna) Engelbrecht, 1973 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Galumna rostrata* Engelbrecht, 1969

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Galumna (Rostrogalumna) chrisengelbrechti* Ermilov y Klimov, 2017 (*G.*)(=*Galumna rostrata* Engelbrecht, 1969, "nom. praeoc." por Sellnick, 1922)

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Globogalumna J. y P. Balogh, 1990 (2 spp.)ESPECIE TIPO: *Allogalumna globulifera* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Neotropical y Oriental.

- *Globogalumna biporosa* Ermilov y Anichkin, 2012

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).

- *Globogalumna globulifera* (Balogh y Mahunka, 1978) (*Allogalumna*)

DISTRIBUCIÓN: Brasil.

Heterogalumna Balogh, 1960 (4 spp.)ESPECIE TIPO: *Heterogalumna lineolata* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Heterogalumna lineolata* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Heterogalumna minima* Ermilov y Kalúz, 2014

DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Heterogalumna monticola* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Heterogalumna pygmaea* (Balogh, 1958) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Angola.

Kunstogalumna Starý, 2005 (1 sp.)ESPECIE TIPO: *Kunstogalumna unica* Starý, 2005

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Kunstogalumna unica* Starý, 2005

DISTRIBUCIÓN: Congo.

Leptogalumna Balogh, 1960 (4 spp.)ESPECIE TIPO: *Leptogalumna ciliata* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Leptogalumna (Leptogalumna) Balogh, 1960 (3 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Leptogalumna (L.) ciliata* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Etiópica, Polinesia (Tahití), Cuba y Vietnam.

- *Leptogalumna (L.) dengi* H. y Z. Wang, 1994
DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Leptogalumna (L.) reducta* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.

Leptogalumna (Aegyptogalumna) Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Aegyptogalumna mastigophora* Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.

- *Leptogalumna (Aegyptogalumna) mastigophora* (Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif y El-Deeb, 1985) (A.) (= *Pilogalumna saboorii* Mahunka y Akrami, 2001)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional: Mediterránea (Egipto y España) e Irán.

Neoctenogalumna Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Ctenogalumna moresonensis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Neoctenogalumna (Neoctenogalumna) Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013 (2 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Neoctenogalumna (N.) congoensis* (Starý, 2005) (*Ctenogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Neoctenogalumna (N.) moresonensis* (Engelbrecht, 1972) (*Ctenogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

Neoctenogalumna (Paractenogalumna) Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Neoctenogalumna (Paractenogalumna) longiciliata* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Neoctenogalumna (Paractenogalumna) longiciliata* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

Neogalumna Hammer, 1973 (10 spp.)

ESPECIE TIPO: *Neogalumna antenniger* Hammer, 1973

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y Paleártica meridional.

- *Neogalumna aethiopica* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Neogalumna antenniger* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Samoa).
- *Neogalumna araujoi* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1994) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Bolivia).
- *Neogalumna curviporosa* Balakrishnan, 1986
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Neogalumna harrysmiti* (Ermilov, 2016) (*Galumna (N.)*)
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
- *Neogalumna longilineata* (Ermilov y Anichkin, 2014) (*Galumna (N.)*)
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neogalumna longiporosa* Liang, Yang y Tang, 2014
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
- *Neogalumna seniczaki* Ermilov y Anichkin, 2010
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Neogalumna specifica* (Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015) (*Galumna (N.)*)
DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Neogalumna tolstikovi* (Ermilov y Anichkin, 2014) (*Galumna (N.)*)
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Filipinas).

Notogalumna Sellnick, 1959 (8 spp.)

ESPECIE TIPO: *Notogalumna praetiosa* Sellnick, 1959

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

- *Notogalumna africana* Mahunka, 1988
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Notogalumna floridiae* (Jacot, 1929) (*Holokalumma*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Notogalumna foveolata* Balakrishnan, 1989
DISTRIBUCIÓN: Oriental: India (Kerala) y Vietnam.
- *Notogalumna hexagona* (Balogh, 1960) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Angola.
- *Notogalumna lagunaensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Vietnam).

- *Notogalumna nortoni* Ramani y Haq, 1990
DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).
- *Notogalumna praetiosa* Sellnick, 1959
DISTRIBUCIÓN: Polinesia: I. Australes [I. Tubuai] y Borneo.
- *Notogalumna truncata* (Warburton, 1912) (*Oribata*) "sp. inq."
DISTRIBUCIÓN: I. Seychelles.

Orthogalumna Balogh, 1961 (4 spp.)

(=*Mirogalumna* Mahunka, 1993)

ESPECIE TIPO: *Orthogalumna saeva* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Australiana) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Orthogalumna leytenis* (Ermilov y Corpuz-Raros, 2015) (*Mirogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Orthogalumna saeva* Balogh, 1961
DISTRIBUCIÓN: Etiópica, India (Tripura), Japón y Pequeñas Antillas.
- *Orthogalumna terebrantis* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Uruguay, U.S.A. (Florida) y Etiópica (Zambia y Sudáfrica).
- *Orthogalumna xena* (Mahunka, 1993) (*Mirogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Ruanda.

Pergalumna Grandjean, 1936 (158 spp. y 14 sspp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata nervosa* Berlese, 1914

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

Pergalumna (Pergalumna) Grandjean, 1936 (157 spp. y 14 sspp.)

(?= *Neorizetes* Jacot, 1933 "gen. inq.")

DISTRIBUCIÓN: Cosmopolita (excepto Antártica).

- *Pergalumna (P.) aegra* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil) y Oriental (Sur de India).
- *Pergalumna (P.) aequalis* (Sellnick, 1923) (*Stictozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) aequiporosa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Pergalumna (P.) akitaensis* Aoki, 1961
DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental.
- *Pergalumna (P.) altera* (Oudemans, 1915) (*Galumna*)
(=*Galumna (Pergalumna) diversa* Mihelčič, 1956)
(=*Pergalumna harumaensis* Aoki, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Holártica: frecuente en Europa, Sudáfrica, Oriental y Micronesia: I. Marianas).
- *Pergalumna (P.) amamiensis* Aoki, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) amorpha* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Pergalumna (P.) andasibe* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) andhraense* Raju, Appalanaidu y Rao, 1981
DISTRIBUCIÓN: India (Andhra Pradesh).
- *Pergalumna (P.) andicola* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Argentina) e India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) anellata* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) annulata* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pergalumna (P.) aokii* Nakatamari, 1982
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) arborea* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Connecticut).
- *Pergalumna (P.) asetosa* Ermilov, Shtanchaeva, Kalúz y Subías, 2013
DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Pergalumna (P.) australis* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (*P.*)
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
- *Pergalumna (P.) bellesii* Pérez-Íñigo y Baggio, 1997
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) bhaskari* Sh. Sarkar, Sanyal y Chakrabarti, 2012
DISTRIBUCIÓN: India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) bicristata* Mahunka, 2011

- DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) bifissurata* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití) y Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) bimaculata* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Tonga) y Filipinas.
 - *Pergalumna (P.) boliviana* Ermilov, 2013
DISTRIBUCIÓN: Bolivia.
 - *Pergalumna (P.) brasiliensis* (Sellnick, 1923) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - Pergalumna (P.) bryani* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) bryani bryani* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) bryani marquesi* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
 - *Pergalumna (P.) bryani uapoui* (Jacot, 1934) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (I. Marquesas).
 - *Pergalumna (P.) californiae* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (California).
 - *Pergalumna (P.) capualensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
 - *Pergalumna (P.) cardosensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Perú).
 - *Pergalumna (P.) cattienica* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Pergalumna (P.) chiyukiae* Fujikawa, 2011
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Pergalumna (P.) circula* (Jacot, 1935) (*Galumna flagellifera c.*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
 - *Pergalumna (P.) comparandus* (Berlese, 1920) (*Oribata emarginatus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Argentina.
 - *Pergalumna (P.) complicata* Balogh y Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Pergalumna (P.) confluentina* (Willmann, 1953) (*Allogalumna longipluma c.*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Austria.
 - *Pergalumna (P.) conspicua* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Congo).
 - *Pergalumna (P.) corniculata* (Berlese, 1905) (*Oribata elimatus c.*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
 - *Pergalumna (P.) corolevuensis* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico e India (Tripura).
 - Pergalumna (P.) corrugis* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Pergalumna (P.) corrugis corrugis* (Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Masachuset).
 - *Pergalumna (P.) corrugis milleri* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
 - *Pergalumna (P.) crassipora* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).
 - *Pergalumna (P.) cribriger* (Berlese, 1916) (*Oribata*)
(=*Galumna flagelliferum* Jacot, 1929)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. y norte de Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) cubaensis* Ermilov y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Cuba.
 - *Pergalumna (P.) cucheae* Mahunka, 1998
DISTRIBUCIÓN: Pequeñas Antillas.
 - *Pergalumna (P.) dactylaris* Palacios-Vargas y Villagómez, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - *Pergalumna (P.) decorata* Balogh y Mahunka, 1977
DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Bolivia y Centroamérica).
 - *Pergalumna (P.) decoratissima* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) dentirostrata* (Bayartogtokh y Akrami, 2014) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Pergalumna (P.) distincta* Liu y Wu, 2013
DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Pergalumna (P.) dodsoni* Nevin, 1979

- DISTRIBUCIÓN: Neártica septentrional.
- *Pergalumna (P.) dubitanda* Hammer, 1972
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
- *Pergalumna (P.) ecuadorensis* Ermilov y Kalúz, 2012
DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
- *Pergalumna (P.) elongata* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Pergalumna (P.) elongatiporosa* Ermilov, Alvarado-Rodríguez y Retana-Salazar, 2014
DISTRIBUCIÓN: Costa Rica.
- Pergalumna (P.) emarginata* (Banks, 1895) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Neártica, norte de Neotropical y centro de Paleártica.
- *Pergalumna (P.) emarginata emarginata* (Banks, 1895)
(=*Zetes emarginatus bidens* Jacot, 1935)
(=*Oribata emarginatus columbianus* Berlese, 1916)
(=*Pergalumna omniphagous* Rockett y Woodring, 1966)
DISTRIBUCIÓN: Neártica: frecuente, norte de Neotropical y centro de Paleártica.
- *Pergalumna (P.) emarginata coscobensis* (Jacot, 1935) (*Zetes*) “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Conécticut).
- *Pergalumna (P.) emarginata laevis* (Jacot, 1935) (*Zetes*) “ssp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).
- *Pergalumna (P.) fastigata* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Pergalumna (P.) filifera* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio) y Australia.
- *Pergalumna (P.) filiformis* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Pergalumna (P.) formicaria* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica occidental y Neártica septentrional).
- *Pergalumna (P.) foveolata* Hammer, 1973
DISTRIBUCIÓN: Australianooriental: Polinesia (I. Tonga) e India, y Neotropical: Brasil.
- *Pergalumna (P.) frater* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Congo y Japón.
- *Pergalumna (P.) fusca* (Berlese, 1916) (*Oribata (Stictozetes)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
- *Pergalumna (P.) graminetum* (Jacot, 1935) (*Zetes*)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. nororiental.
- *Pergalumna (P.) granulata* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Oriental: Vietnam e India (Uttarakhand), y Japón.
- *Pergalumna (P.) hastata* Aoki, 1987
DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental: Filipinas e India (Bengala Occidental).
- *Pergalumna (P.) hauseri* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- Pergalumna (P.) hawaiiensis* (Jacot, 1934) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Oriental (Sumatra y Vietnam).
- *Pergalumna (P.) hawaiiensis hawaiiensis* (Jacot, 1934)
DISTRIBUCIÓN: Islas del Pacífico y Oriental (Sumatra y Vietnam).
- *Pergalumna (P.) hawaiiensis marquesana* (Jacot, 1934) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia.
- *Pergalumna (P.) heroica* (Willmann, 1932) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: Java.
- *Pergalumna (P.) horvathorum* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.
- *Pergalumna (P.) hydrophila* (Hammer, 1962) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Chile.
- *Pergalumna (P.) hypergranulosa* Palacios-Vargas y Villagómez, 2017
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Pergalumna (P.) imadatei* Aoki y Hu, 1993
DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Nepal).
- *Pergalumna (P.) incompta* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Sudáfrica, y Oriental: India (Uttarakhand).
- *Pergalumna (P.) indistincta* Ermilov y Anichkin, 2011
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) indivisa* Mahunka, 1995
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Pergalumna (P.) infinita* Mahunka, 2011
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- Pergalumna (P.) intermedia* Aoki, 1963

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia y Paleártica oriental meridional) y Norte de Oriental.
 - *Pergalumna (P.) intermedia intermedia* Aoki, 1963
 DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Grecia y Paleártica oriental meridional) y Noreste de Oriental.
 - *Pergalumna (P.) intermedia retroversa* Aoki y Hu, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Norte de India).
- *Pergalumna (P.) irregularis* Wallwork, 1977
 DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Pergalumna (P.) jongkyui* Choi, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Corea.
- *Pergalumna (P.) kotschyi* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) krisperi* Ermilov y Friedrich, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) kunsti* Ermilov y Starý, 2017
 DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Pergalumna (P.) lenticulata* Ermilov y Friedrich, 2016
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Pergalumna (P.) longiporosa* Fujita y Fujikawa, 1987
 DISTRIBUCIÓN: Japón y Oriental: India (I. Andamán).
- *Pergalumna (P.) longisetosa* Balogh, 1960
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica: África central, Neotropical: Méjico, y Oriental: Vietnam e India (Maharashtra).
- *Pergalumna (P.) louisianae* (Jacot, 1929) (*Zetes*)
 (= *Galumna confusa* Woodring, 1965)
 DISTRIBUCIÓN: Sureste de U.S.A.
- Pergalumna (P.) magnipora* (Hammer, 1961) (*Galumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Tropical (Perú, Sudáfrica y Oriental) y subtropical (Sureste de Paleártica oriental).
 - *Pergalumna (P.) magnipora magnipora* (Hammer, 1961)
 DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Pergalumna (P.) magnipora capensis* Engelbrecht, 1972
 DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica e India (Tripura).
 - *Pergalumna (P.) magnipora capillaris* Aoki, 1961 (*P. c.*)
 DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.
 - *Pergalumna (P.) magnipora xishuangbanna* Aoki y Hu, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pergalumna (P.) mahunkai* Ermilov, Shtanchaeva, Kalúz y Subías, 2013
 DISTRIBUCIÓN: India (Tripura).
- *Pergalumna (P.) makarovae* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
 DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Pergalumna (P.) margaritata* Mahunka, 1989
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
- *Pergalumna (P.) mauritii* Mahunka, 1978
 DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio), Micronesia (I. Marianas) y Vietnam.
- *Pergalumna (P.) medialis* (Sellnick, 1925) (*Stictozetes*)
 DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
- *Pergalumna (P.) melloi* Pérez-Íñigo y Baggio, 1994
 DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Pergalumna (P.) menglunensis* Aoki y Hu, 1993
 DISTRIBUCIÓN: China suroriental.
- *Pergalumna (P.) microtuberculata* Bayartogtokh y Akrami, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Irán.
- *Pergalumna (P.) minipora* Ermilov, Chatterjee, Kumar Das y Bordoloi, 2014
 DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
- *Pergalumna (P.) minutuberculata* Ermilov y Martens, 2014
 DISTRIBUCIÓN: Nepal.
- *Pergalumna (P.) minor* (Willmann, 1928) (*Galumna*)
 DISTRIBUCIÓN: Holártica (Europa centromeridional y U.S.A.: Nueva York).
- *Pergalumna (P.) minoricana* Pérez-Íñigo jr., 1991
 DISTRIBUCIÓN: España.
- *Pergalumna (P.) montana* Hammer, 1961
 DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Perú y Venezuela).
- *Pergalumna (P.) myrmophila* (Berlese, 1914) (*Oribata longiplumum m.*)
 (= *Pergalumna iunctiporosa* Bayartogtokh y Akrami, 2014)
 (= *Galumna linata* Oudemans, 1914)
 (= *Galumna longior* Willmann, 1928)
 (= *Galumna sexareata* Mihelčič, 1956)
 (= *Allogalumna subaequalis* Mihelčič, 1956)
 (= *Allogalumna subaequalis fusca* Mihelčič, 1956)

- DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (Paleártica occidental: frecuente en Mediterránea, y Paquistán) y Etiópica (Guinea Ecuatorial: Bioco [Fernando Poo] y Tanzania: Zanzíbar).
- *Pergalumna (P.) nasica* Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
 - DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil ¿y Argentina?).
 - *Pergalumna (P.) nasifera* Mahunka, 2011
 - DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
 - Pergalumna (P.) nervosa* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
 - DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica y U.S.A.) y Sudáfrica.
 - *Pergalumna (P.) nervosa nervosa* (Berlese, 1914)
 - DISTRIBUCIÓN: Holártica (Paleártica: frecuente, y U.S.A.) y Sudáfrica.
 - *Pergalumna (P.) nervosa retalata* (Oudemans, 1915) (*Galumna r.*)
 - (=*Galumna (Pergalumna) nervosa punctata* Mihelčič, 1957)
 - DISTRIBUCIÓN: Oeste de Europa.
 - *Pergalumna (P.) nuda* Balogh, 1960
 - DISTRIBUCIÓN: Angola y Vietnam.
 - *Pergalumna (P.) numerosa* (Sellnick, 1923) (*Galumna*)
 - DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Pergalumna (P.) obsessa* Subías, 2004
 - (=*Galumna pallida* Tseng, 1984, “nom. praeoc.” por Hammer, 1958)
 - DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Pergalumna (P.) obsidiana* Palacios-Vargas y Villagómez, 2017
 - DISTRIBUCIÓN: Méjico.
 - Pergalumna (P.) obvia* (Berlese, 1914) (*Oribata*)
 - DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Etiópica: Sudáfrica e I. Santa Helena, Vietnam, Hawái y Neotropical).
 - *Pergalumna (P.) obvia obvia* (Berlese, 1914)
 - (=*Oribata obvia norvegicus* Berlese, 1914)
 - (=*Dimidiogalumna wallworki* J. y P. Balogh, 2002)
 - DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita (Paleártica: frecuente, U.S.A.: California, Etiópica: Sudáfrica e I. Santa Helena, Vietnam, Hawái y Neotropical).
 - *Pergalumna (P.) obvia sinensis* (Jacot, 1922) (*Galumna*)
 - DISTRIBUCIÓN: Noreste de China.
 - *Pergalumna (P.) operata* Tseng, 1984
 - DISTRIBUCIÓN: Taiwán [Formosa].
 - *Pergalumna (P.) ornamenta* Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
 - DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Pergalumna (P.) panayensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
 - DISTRIBUCIÓN: Oriental (Filipinas y Sumatra).
 - *Pergalumna (P.) paraboliviana* Ermilov y Gwiazdowicz, 2015
 - DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Pergalumna (P.) paracattienica* Ermilov, Chatterjee, Kumar Das y Bordoloi, 2014
 - DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Pergalumna (P.) paraclerica* Ermilov, Chatterjee, Kumar Das y Bordoloi, 2014
 - DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Pergalumna (P.) paradecoratissima* Ermilov y Kalúz, 2012
 - DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Pergalumna (P.) paraelongata* Ermilov y Anichkin, 2012
 - DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Pergalumna (P.) paraindistincta* Ermilov, Sandmann, Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015
 - DISTRIBUCIÓN: Sumatra.
 - *Pergalumna (P.) paralongisetosa* Ermilov y Kalúz, 2012
 - DISTRIBUCIÓN: Ecuador.
 - *Pergalumna (P.) parapassimpunctata* Ermilov y Friedrich, 2016
 - DISTRIBUCIÓN: Perú.
 - *Pergalumna (P.) paratsurusakii* Ermilov, Shtanchaeva, Kalúz y Subías, 2013
 - DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).
 - *Pergalumna (P.) parva* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
 - DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Ecuador).
 - *Pergalumna (P.) passimpunctata* Balogh y Mahunka, 1969
 - DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Pergalumna (P.) paucisetosa* (Jacot, 1929) (*Galumna*) “sp. inq.”
 - DISTRIBUCIÓN: ¿“China”?.
 - *Pergalumna (P.) pauliensis* Pérez-Íñigo y Baggio, 1991
 - DISTRIBUCIÓN: Brasil.
 - *Pergalumna (P.) persica* Akrami y Ebrahimi, 2013
 - DISTRIBUCIÓN: Irán.
 - *Pergalumna (P.) pertrichosa* Mahunka, 1995

- DISTRIBUCIÓN: Oriental: Borneo e **India (Bengala Occidental)**.
- *Pergalumna (P.) plumata* Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) pocsi* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Tanzania y Zambia).
 - *Pergalumna (P.) pseudomargaritata* Mahunka, 1994
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
 - *Pergalumna (P.) pseudosejugalis* Ermilov y Anichkin, 2012
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Pergalumna (P.) pterinervis* (Canestrini, 1898) (*Oribata*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Oriental (Indonesia).
 - *Pergalumna (P.) punctulata* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
 - *Pergalumna (P.) remota* (Hammer, 1968) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda y Noreste de India.
 - *Pergalumna (P.) reniformis* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Pergalumna (P.) rima* Fujikawa, 2007
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Pergalumna (P.) rotunda* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Pergalumna (P.) rugosala* (Ewing, 1909) (*Oribata*) “sp. inq.”
DISTRIBUCIÓN: Noreste de U.S.A.
 - *Pergalumna (P.) sabitai* Sh. Sarkar, Sanyal y Chakrabarti, 2012
DISTRIBUCIÓN: **India (Bengala Occidental)**.
 - *Pergalumna (P.) seminervosa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2008
DISTRIBUCIÓN: Rumanía.
 - *Pergalumna (P.) semistriata* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Pergalumna (P.) semistriata semistriata* Pérez-Íñigo jr., 1990
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Pergalumna (P.) semistriata matritensis* Arillo y Subías, 1993
DISTRIBUCIÓN: España.
 - *Pergalumna (P.) silvatica* Hammer, 1961
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) silvestris* Hammer, 1968
DISTRIBUCIÓN: Nueva Zelanda.
 - *Pergalumna (P.) somalica* (Berlese, 1916) (*Oribata ovata s.*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.
 - *Pergalumna (P.) storkani* Ermilov y Starý, 2017
DISTRIBUCIÓN: **Vietnam**.
 - *Pergalumna (P.) striata* (Pérez-Íñigo y Baggio, 1980) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: **Neotropical (Brasil y Pequeñas Antillas)**.
 - *Pergalumna (P.) striatipodorsum* Ermilov, Alvarado-Rodríguez y Retana-Salazar, 2014
DISTRIBUCIÓN: **Neotropical (Costa Rica y Pequeñas Antillas)**.
 - *Pergalumna (P.) strigulata* Mahunka, 1978
DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).
 - *Pergalumna (P.) sulcatomarginata* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
 - *Pergalumna (P.) sura* P. Balogh, 1997
DISTRIBUCIÓN: Neotropical.
 - *Pergalumna (P.) tahitiensis* J. y P. Balogh, 2002
(=*Pergalumna montana* Hammer, 1972, “nom. praeoc.” por Hammer, 1961)
DISTRIBUCIÓN: Polinesia (Tahití).
 - *Pergalumna (P.) tanzanica* Mahunka, 1984
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
 - *Pergalumna (P.) taprobanica* P. Balogh, 1988
DISTRIBUCIÓN: Oriental (Ceilán [Sri Lanka] e India (Bengala Occidental)).
 - *Pergalumna (P.) tsavoensis* Mahunka, 1986
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Kenia y Zambia).
 - *Pergalumna (P.) tsurusakii* Starý, 2005
DISTRIBUCIÓN: Japón.
 - *Pergalumna (P.) variosculpturata* Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
DISTRIBUCIÓN: Hungría.
 - *Pergalumna (P.) ventralis* (Willmann, 1932) (*Galumna*)
(=*Galumna duplicata* Hammer, 1958)

DISTRIBUCIÓN: Tropical (**Oriental**, Polinesia y Neotropical) y Holártica (“U.S.A.” y **Paleártica: Mediterránea oriental** y Este de Paleártica oriental).

- *Pergalumna (P.) virga* Fujikawa, 2007

DISTRIBUCIÓN: Japón.

Pergalumna (P.) weberi (Jacot, 1935) (*Zetes*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Pergalumna (P.) weberi weberi* (Jacot, 1935)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Pergalumna (P.) weberi plumalae* (Jacot, 1935) (*Zetes*)

DISTRIBUCIÓN: U.S.A. (Florida).

- *Pergalumna (P.) willmanni* (Zachvatkin, 1953) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Paleártica (Europa centromeridional y Suroeste de Siberia).

- *Pergalumna (P.) yurtaevi* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam) y Australiana (Nuevas Hébridias [Vanuatu]).

Pergalumna (Bigalumna) Mahunka y Mahunka-Papp, 2009 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Galumna (Bigalumna) rimosa* Mahunka y Mahunka-Papp, 2009

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pergalumna (Bigalumna) rimosa* (Mahunka y Mahunka-Papp, 2009) (*Galumna (B.)*)

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

Pilizetes Sellnick, 1937 (17 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pilizetes africanus* Sellnick, 1937

DISTRIBUCIÓN: Etiópica y Neotropical.

Pilizetes (Pilizetes) Sellnick, 1937 (14 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Pilizetes (P.) africanus* Sellnick, 1937

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) anufrievi* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Pilizetes (P.) australis* Balogh y Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Pilizetes (P.) basilewskyi* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) brevisetus* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) csoengeyi* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) curtipilus* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Pilizetes (P.) denticulatus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Kenia.

- *Pilizetes (P.) dudichi* Balogh, 1966

DISTRIBUCIÓN: Chad.

- *Pilizetes (P.) saskai* Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) sellnicki* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Angola.

- *Pilizetes (P.) subglaber* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) subsimilis* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Pilizetes (P.) tuberculatus* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Comores).

Pilizetes (Neopilizetes) J. y P. Balogh, 1990 (2 spp.)

(?= *Kratzensteinia* Oudemans, 1919 “gen. inq.”)

ESPECIE TIPO: *Pilizetes neotropicus* Balogh y Mahunka, 1978

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Pilizetes (Neopilizetes) neotropicus* Balogh y Mahunka, 1978 (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical (Brasil y Méjico).

- *Pilizetes (Neopilizetes) rugifrons* (Stoll, 1891) (*Oribata*) “sp. inq.”

DISTRIBUCIÓN: Centroamérica.

Pilizetes (Pseudopilizetes) Ermilov, 2017 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pilizetes (Pseudopilizetes) camerunensis* Ermilov, 2017

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.- *Pilizetes (Pseudopilizetes) camerunensis* Ermilov, 2017**DISTRIBUCIÓN:** Camerún.***Pilogalumna*** Grandjean, 1956 (14 spp. y 6 sspp.)**(=Disparagalumna** Hammer, 1973)ESPECIE TIPO: *Pilogalumna ornatula* Grandjean, 1956**DISTRIBUCIÓN:** Cosmopolita (excepto y Antártica).- *Pilogalumna arabica* Bayoumi y Al-Khalifa, 1986**DISTRIBUCIÓN:** Península Arábiga.- *Pilogalumna binadalaes* (Jacot, 1929) (*Galumna areolata* b.)**DISTRIBUCIÓN:** Neártica septentrional.- *Pilogalumna bloemfonteinensis* Engelbrecht, 1972**DISTRIBUCIÓN:** Sudáfrica y U.S.A. (Nuevo Méjico)?- *Pilogalumna cozadensis* Nevin, 1976**DISTRIBUCIÓN:** U.S.A. (Nebraska).*Pilogalumna crassiclava* (Berlese, 1914) (*Allogalumna*)**DISTRIBUCIÓN:** Paleártica centromeridional.- *Pilogalumna crassiclava crassiclava* (Berlese, 1914)(=*Galumna allifera* Oudemans, 1915)**DISTRIBUCIÓN:** Paleártica centromeridional (frecuente).- *Pilogalumna crassiclava longiareata* Pérez-Íñigo, 1976 (*P. allifera* l.)**DISTRIBUCIÓN:** Mediterránea occidental.- *Pilogalumna crassiclava montana* Grishina y Sergienko, 1978 (*P. allifera* m.)**DISTRIBUCIÓN:** Sureste de Europa.- *Pilogalumna kimberleyensis* Engelbrecht, 1972**DISTRIBUCIÓN:** Sudáfrica.- *Pilogalumna minima* Liu y Wu, 2013**DISTRIBUCIÓN:** Noreste de China.*Pilogalumna ornatula* Grandjean, 1956**DISTRIBUCIÓN:** Mediterránea y Méjico.- *Pilogalumna ornatula ornatula* Grandjean, 1956(=*Galumna adareata* Mihelčič, 1957)(=*Allogalumna molensis* Mihelčič, 1957)(=*Allogalumna pterata* Mihelčič, 1957)**DISTRIBUCIÓN:** Mediterránea y Méjico.- *Pilogalumna ornatula fayoumensis* Abd-el-Hamid, 1965**DISTRIBUCIÓN:** Egipto.- *Pilogalumna rosauraruizae* Villagómez y Palacios-Vargas, 2015**DISTRIBUCIÓN:** Méjico.- *Pilogalumna rostrata* (Fujikawa, 2008) (*Disparagalumna*)**DISTRIBUCIÓN:** Japón.- *Pilogalumna steinmanni* Aoki, 1975**DISTRIBUCIÓN:** Corea.*Pilogalumna tenuiclava* (Berlese, 1908) (*Oribata*)**DISTRIBUCIÓN:** Holártica.- *Pilogalumna tenuiclava tenuiclava* (Berlese, 1908)(=?*Acarus alatus* Schrank, 1803 "sp. inq.")(=?*Acarus aquaticus marginatus* De Geer, 1778 "sp. inq.")(=*Galumna areolata* Willmann, 1923)(=*Allogalumna atra* Mihelčič, 1957)(=*Allogalumna boevi* Krivolutskaja, 1952)(=*Galumna radiata* Sellnick, 1928)**DISTRIBUCIÓN:** Holártica (frecuente en Europa).- *Pilogalumna tenuiclava halli* (Jacot, 1929) (*Galumna areolata* h.)**DISTRIBUCIÓN:** U.S.A. (California).- *Pilogalumna tenuiclava hispida* (Jacot, 1935) (*Galumna alata* h.)**DISTRIBUCIÓN:** U.S.A. (Florida).- *Pilogalumna tenuiclava recta* (Mihelčič, 1957) (*Allogalumna*)**DISTRIBUCIÓN:** España.- *Pilogalumna tongaensis* (Hammer, 1973) (*Disparagalumna*)**DISTRIBUCIÓN:** Polinesia (I. Tonga).- *Pilogalumna variabilis* Engelbrecht, 1972**DISTRIBUCIÓN:** Sudáfrica e India (Tripura).***Psammogalumna*** Balogh, 1943 (3 spp.)ESPECIE TIPO: *Stictozetes hungaricus* Sellnick, 1925

DISTRIBUCIÓN: Paleártica.

- *Psammogalumna hungarica* (Sellnick, 1925) (*Stictozetes*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional (excepto extremos Este y Oeste).
- *Psammogalumna iranica* Akrami, Irani-Nejad y Mirzaie, 2011
DISTRIBUCIÓN: Irán y Cáucaso.
- *Psammogalumna thysanura* (Krivolutskaja, 1952) (*Allogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Paleártica oriental meridional.

Sacculogalumna Engelbrecht, 1973 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Sacculogalumna saccularis* Engelbrecht, 1973

DISTRIBUCIÓN: **Tropical (excepto Australiana)** y Paleártica meridional.

- *Sacculogalumna hexasacculata* Ermilov y Friedrich, 2017
DISTRIBUCIÓN: Perú.
- *Sacculogalumna saccularis* Engelbrecht, 1973
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Sacculogalumna samarensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Sacculogalumna suiyangensis* Liang, Yang y Huang, 2012
DISTRIBUCIÓN: China suroriental y Cáucaso.

Setogalumna P. Balogh, 1985 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Setogalumna excellens* P. Balogh, 1985

DISTRIBUCIÓN: **Pantropical (excepto Neotropical)** y Paleártica meridional.

- *Setogalumna ambigua* (Wallwork, 1977) (*Galumna*)
DISTRIBUCIÓN: I. Santa Helena.
- *Setogalumna diminuta* Arillo y Subías, 1993
DISTRIBUCIÓN: España.
- *Setogalumna excellens* P. Balogh, 1985
DISTRIBUCIÓN: Australia.
- *Setogalumna luzonica* Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Setogalumna minisetosa* Ermilov y Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

Sphaerogalumna Balogh, 1961 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Pergalumna index* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Sphaerogalumna index* (Balogh, 1960) (*Pergalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.

Stictozetes Berlese, 1916 (5 spp.)

(=*Strabogalumna* Mahunka, 1995)

(=*Trachygalumna* Balogh, 1960)

ESPECIE TIPO: *Oribata (Stictozetes) scaber* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Paleotropical.

- *Stictozetes bisulcatus* (Balogh, 1960) (*Trachygalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Congo.
- *Stictozetes margaritae* (Mahunka, 1993) (*Trachygalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Stictozetes microporosa* (Mahunka, 1986) (*Trachygalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Kenia.
- *Stictozetes psadilliferus* (Mahunka, 1995) (*Strabogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Borneo.
- *Stictozetes scaber* (Berlese, 1916) (*Oribata (S.)*)
DISTRIBUCIÓN: Somalia.

Taeniogalumna Balogh, 1962 (3 spp.)

ESPECIE TIPO: *Taeniogalumna sphaerula* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Taeniogalumna behanae* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010
DISTRIBUCIÓN: Etiopía.
- *Taeniogalumna sphaerula* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.
- *Taeniogalumna tanzanica* Mahunka, 1983
DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Trichogalumna Balogh, 1960 (31 spp.)

ESPECIE TIPO: *Pilogalumna lunai* Balogh, 1958

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Trichogalumna (Trichogalumna) Balogh, 1960 (29 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

- *Trichogalumna (T.) africana* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Etiopía y Zambia).
- *Trichogalumna (T.) albomaculata* Ermilov y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Trichogalumna (T.) arborea* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) atypica* Ermilov y Tolstikov, 2015
DISTRIBUCIÓN: Brasil.
- *Trichogalumna (T.) boninensis* Hagino, Bayartogtokh y Shimano, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) chimaera* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) chitralensis* Hammer, 1977
DISTRIBUCIÓN: Paquistán e India: Bengala Occidental.
- *Trichogalumna (T.) curva* (Ewing, 1907) (*Oribata*)
(=*Oribata tantillus* Berlese, 1908)
DISTRIBUCIÓN: U.S.A. centrooriental: frecuente.
- *Trichogalumna (T.) duoporosa* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Trichogalumna (T.) granuliala* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) hygrophila* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) imperfecta* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) interlamellaris* Ermilov y Corpuz-Raros, 2016
DISTRIBUCIÓN: Filipinas.
- *Trichogalumna (T.) lineata* Ohkubo, 1984
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) lunai* (Balogh, 1958) (*Pilogalumna*)
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Chad) y Japón.
- *Trichogalumna (T.) madagassica* Mahunka, 1996
DISTRIBUCIÓN: Madagascar.
- *Trichogalumna (T.) mexicana* Villagómez y Palacios-Vargas, 2013
DISTRIBUCIÓN: Méjico.
- *Trichogalumna (T.) microseta* Wallwork, 1965
DISTRIBUCIÓN: Chad.
- *Trichogalumna (T.) montana* Balogh, 1962
DISTRIBUCIÓN: África central.
- *Trichogalumna (T.) nabhitabhatai* Mahunka, 2008
DISTRIBUCIÓN: Tailandia.
- *Trichogalumna (T.) nipponica* (Aoki, 1966) (*Pergalumna duplicata* n.)
DISTRIBUCIÓN: Semicosmopolita: Paleártica meridional (Cáucaso y Sureste de Paleártica oriental: frecuente), Oriental, Etiópica (Zambia y Sudáfrica) y Neotropical (Ecuador).
- *Trichogalumna (T.) ohkuboi* Hagino, Bayartogtokh y Shimano, 2017
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) pumularis* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Trichogalumna (T.) punctata* Engelbrecht, 1972
DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.
- *Trichogalumna (T.) seminuda* Balogh, 1960
DISTRIBUCIÓN: Etiópica (Angola y Congo) e India (Tripura).
- *Trichogalumna (T.) subnuda* Balogh y Mahunka, 1967
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.
- *Trichogalumna (T.) taeniata* Hammer, 1971
DISTRIBUCIÓN: Melanesia (I. Fiji).
- *Trichogalumna (T.) trowella* Nakamura, Y.- N. Nakamura y Fujikawa, 2013
DISTRIBUCIÓN: Japón.
- *Trichogalumna (T.) vietnamica* Mahunka, 1987
DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

Trichogalumna (Sarawakiella) Mahunka, 1966 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Sarawakiella longipilosa* Mahunka, 1966

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Trichogalumna (Sarawakiella) longipilosa* (Mahunka, 1966) (S.)

DISTRIBUCIÓN: Borneo.

Trichogalumna (Tanzanycha) Koçak y Kemal, 2008 (1 sp.)

(=*Didymonycha* Mahunka, 1984, "nom. praec." por Aurivillius, 1922)

ESPECIE TIPO: *Didymonycha hesperis* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Trichogalumna (Tanzanycha) hesperis* (Mahunka, 1984) (*Didymonycha*)

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Vaghia Oudemans, 1919 (5 spp.)

ESPECIE TIPO: *Oribata (Stictozetes) stupendus* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Subtropical (Paleártica, Oriental y Neotropical).

- *Vaghia blascoi* Travé, 1981

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Vaghia carinata* (Travé, 1956) (*Galumna*)

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa y Méjico.

- *Vaghia simplex* Travé, 1957

DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

- *Vaghia stupenda* (Berlese, 1916) (*Oribata (Stictozetes)*)

DISTRIBUCIÓN: Suroeste de Europa.

- *Vaghia uniporosa* Arillo y Subías, 1993

DISTRIBUCIÓN: España.

Galumnellidae Balogh, 1960 (5 gen., 3 subg. y 45 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical y subtropical.

Galumnella Berlese, 1916 (25 spp.)

ESPECIE TIPO: *Galumnella paradoxa* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

Gallumnella (Galumnella) Berlese, 1916 (24 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Neotropical) y subtropical (Paleártica meridional).

- *Galumnella (G.) apiculata* Mahunka, 1992

DISTRIBUCIÓN: Senegal.

- *Galumnella (G.) areolata* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Etiópica: Angola y Zimbabue [Rodesia].

- *Galumnella (G.) baleensis* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2010

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Galumnella (G.) cellularis* Balogh y Mahunka, 1967

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Galumnella (G.) geographica* Mahunka, 1995

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Vietnam).

- *Galumnella (G.) indica* Balakrishnan, 1989

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

- *Galumnella (G.) junichiaokii* Ermilov, Corpuz-Raros y Shimano, 2014

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Galumnella (G.) microporosa* Ermilov y Anichkin, 2011

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Vietnam y Nepal).

- *Galumnella (G.) nipponica* Suzuki y Aoki, 1970

(=*Galumnella angustifrons* Aoki, 1970)

DISTRIBUCIÓN: Este de Paleártica oriental y Oriental.

- *Galumnella (G.) okinawana* Aoki, 2009

DISTRIBUCIÓN: Japón.

- *Galumnella (G.) paradoxa* Berlese, 1916

DISTRIBUCIÓN: Somalia.

- *Galumnella (G.) parageographica* Ermilov y Kalúz, 2013

DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Galumnella (G.) pauliani* Balogh, 1961

DISTRIBUCIÓN: Madagascar y Vietnam.

- *Galumnella (G.) pilosa* Engelbrecht, 1972

DISTRIBUCIÓN: Sudáfrica.

- *Galumnella (G.) processa* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Galumnella (G.) pulchella* (Aoki y Hu, 1993) (*Porogalumnella*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (China suroriental y Vietnam).

- *Galumnella (G.) punctipennis* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Galumnella (G.) quezonensis* Ermilov y Corpuz-Raros, 2017

DISTRIBUCIÓN: Filipinas.

- *Galumnella (G.) rugosa* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Congo e Irán.

- *Galumnella (G.) rugosula* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Congo.

- *Galumnella (G.) subareolata* Mahunka, 1969

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

- *Galumnella (G.) tanzanica* Mahunka, 1984

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Galumnella (G.) tiunovi* Ermilov y Anichkin, 2013

DISTRIBUCIÓN: Vietnam.

- *Galumnella (G.) woschitzi* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

Galumnella (Bigalumnella) Mahunka, 1994 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Bigalumnella csavatorum* Mahunka, 1994

DISTRIBUCIÓN: Oriental.

- *Galumnella (Bigalumnella) csavatorum* (Mahunka, 1994) (*B.*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Tailandia y Vietnam).

Galumnopsis Grandjean, 1931 (15 spp.)

ESPECIE TIPO: *Galumnopsis holoscripta* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Pantropical.

Galumnopsis (Galumnopsis) Grandjean, 1931 (11 spp.)

DISTRIBUCIÓN: Pantropical (excepto Oriental).

- *Galumnopsis (G.) africana* (Mahunka, 1978) (*Porogalumnella.*)

DISTRIBUCIÓN: Malgache (I. Mauricio).

- *Galumnopsis (G.) clavata* Mahunka, 1983

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Galumnopsis (G.) giganteus* Ermilov, Sidorchuk y Rybalov, 2011

DISTRIBUCIÓN: Etiopía.

- *Galumnopsis (G.) holoscripta* Grandjean, 1931

DISTRIBUCIÓN: Panamá.

- *Galumnopsis (G.) lanceosensilla* Ermilov y Kalúz, 2012

DISTRIBUCIÓN: Ecuador.

- *Galumnopsis (G.) longisetus* Mahunka, 1986

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Galumnopsis (G.) rostrata* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

- *Galumnopsis (G.) ruginervis* Balogh, 1962

DISTRIBUCIÓN: África oriental.

- *Galumnopsis (G.) sagitta* Balogh, 1970

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea.

- *Galumnopsis (G.) secunda* (Sellnick, 1923) (*Galumnella*)

DISTRIBUCIÓN: Neotropical.

- *Galumnopsis (G.) sellnicki* Balogh, 1960

DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Galumnopsis (Porogalumnella) Balogh, 1968 (4 spp.)

ESPECIE TIPO: *Porogalumnella quadriporosa* Balogh, 1968

DISTRIBUCIÓN: Australianooriental.

- *Galumnopsis (Porogalumnella) microsetosa* (Ermilov y Kalúz, 2013) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: India (Arunachal Pradesh).

- *Galumnopsis (Porogalumnella) quadriporosa* (Balogh, 1968) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Nueva Guinea y Filipinas.

- *Galumnopsis (Porogalumnella) reducta* (Mahunka, 1995) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: Oriental (Borneo y Filipinas).

- *Galumnopsis (Porogalumnella) setosa* (Balakrishnan y Haq, 1982) (*P.*)

DISTRIBUCIÓN: India (Kerala).

Iberogalumnella Arillo y Subías, 1993 (1 sp.)

ESPECIE TIPO: *Iberogalumnella alandalusica* Arillo y Subías, 1993

DISTRIBUCIÓN: Paleártica meridional.
 - *Iberogalumnella alandalusica* Arillo y Subías, 1993
 DISTRIBUCIÓN: Mediterránea occidental.

Monogalumnella Mahunka, 1986 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Monogalumnella neutricha* Mahunka, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.

Monogalumnella (Monogalumnella) Mahunka, 1986 (1 sp.)
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Monogalumnella (M.) neutricha* Mahunka, 1986
 DISTRIBUCIÓN: Tanzania.

Monogalumnella (Trichogalumnella) Mahunka, 1992 (1 sp.)
 ESPECIE TIPO: *Trichogalumnella hauseri* Mahunka, 1992
 DISTRIBUCIÓN: Etiópica.
 - *Monogalumnella (Trichogalumnella) hauseri* (Mahunka, 1992) (*T.*)
 DISTRIBUCIÓN: Senegal.

Trypogalumnella Mahunka, 1995 (2 spp.)
 ESPECIE TIPO: *Trypogalumnella poronota* Mahunka, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Oriental.
 - *Trypogalumnella densoporosa* Mahunka, 1995
 DISTRIBUCIÓN: **Oriental** (Borneo y Filipinas).
 - *Trypogalumnella poronota* Mahunka, 1995
 DISTRIBUCIÓN: Borneo.

INDICE ALFABÉTICO DE GÉNEROS (Y SUBGÉNEROS) DE ORIBÁTIDOS

(Cuando se trata de un subgénero, entre paréntesis figura el género al que pertenece)

- Abchasiella Gordeeva y Tarba, 1990
 Acanthobelba Enami y Aoki, 1993
 Acanthozetes Balogh, 1958
 Acaroceras Grandjean, 1936
 Acaronychus Grandjean, 1932
 Achiperia Berlese, 1885
 Achipterina Berlese, 1916
 Aciculoppia (**Oxyoppia**) Subías y Rodríguez, 1986
 Acrogalumna Grandjean, 1956
 Acronothrus Berlese, 1916 (= **Crotonia**)
 Acropopia Balogh, 1983
 Acrotocephus (**Otocephus**) Aoki, 1965
 Acrotritia Jacot, 1923
 Acupedicellus Hunt y Lee, 1995 (= **Pedrocortesella**)
 Acutoppia Balogh, 1983
 Acutozetes Balogh, 1970
 Adamaeus (**Damaeus**) Norton, 1977
 Adelphacarus Grandjean, 1932
 Adhaesozetes Hammer, 1966
 Adoribatella Woolley, 1967
 Adoristes Hull, 1916
 Adrodamaeus Paschoal, 1984
 Aedoplophora Grandjean, 1932 (= **Prototritia**)
 Aegyptogalumna (**Leptogalumna**) Al-Assiuty, Abd-el-Hamid, Seif, El-Deeb, 1985
 Aellenobates Mahunka, 1978 (= **Grandjeanobates**)
 Aeroppia Hammer, 1961
 Aethioppia Balogh, 1983
 Afreremella Mahunka, 1974 (= **Triteremella**)
 Afrhypochthonius Balogh, 1958 (= **Eohypochthonius**)
 Africacarus Wallwork, 1965 (= **Farchacarus**)
 Africogalumna Starý, 2005
 Africoribates Evans, 1953
 Afroleius Mahunka, 1984
 Afroliochthonius (**Liochthonius**) Mahunka, 1995
 Afronothrus Wallwork, 1961
 Afropia Koçak y Kemal, 2008
 Afrotocephus Mahunka, 1985
 Afrotritia (**Indotritia**) Mahunka, 1988
 Afrozetes Engelbrecht, 1972
 Afticarabodes Fernández, Theron y Rollard, 2013
 Akansilvanus Fujikawa, 1993
 Akrodamaeus Norton, 1979 (= **Parabelbella**)
 Alaskozetes Hammer, 1955
 Albonothrus Tseng, 1982 (= **Trhypochthonius**)
 Alcioppia Balogh, 1983 (= **Ramusella**)
 Aleurodamaeus Grandjean, 1954
 Alismobates Luxton, 1992
 Allobelba Kunst, 1961 (= **Metabelbella**)
 Allodamaeus Banks, 1947
 Allogalumna Grandjean, 1936
 Allomycobates Aoki, 1976
 Allonothrus Hammen, 1953
 Allopelops Hammer, 1952 (= **Eupelops**)
 Alloribates Banks, 1947 (= **Protoribates**)
 Allosuctobelba Moritz, 1970
 Allozetes Berlese, 1913
 Allozetes Higgins, 1965 (= **Kalyptrazetes**)
 Allozetes Feider, Vasiliu y Călugăr, 1971 (= **Feiderzetes**)
 Alphyochthonius Schweizer, 1956 (= **Melanozetes**)
 Alpizetes (**Zachvatkinibates**) Mahunka, 2001
 Altrhypochthonius Weigmann, 1997 (= **Mainothrus**)
 Amazoppia Balogh y Mahunka, 1969
 Ambrobates Mahunka, 2009 (= **Euscheloribates**)
 Amerigloboppia (**Neoamerioppia**) Subías, 1989
 Amerioppia Hammer, 1961
 Amerobelba Berlese, 1908
 Ameronothrus Berlese, 1896
 Amerus Berlese, 1896
 Ametroproctus Higgins y Woolley, 1968
 Amiracarus Miko, 2013
 Amnemochthonius Grandjean, 1949
 Amolops Hull, 1916 (= **Ramusella**)
 Ampullobates Grandjean, 1962
 Amuracarus Lange, 1975 (= **Stomacarus**)
 Anachipteria Grandjean, 1932
 Anakingia Hammer, 1961
 Anarea Dalenius, 1958 (= **Halozetes**)
 Ancestropopia (**Neotrichoppia**) Subías y Rodríguez, 1986
 Andacarus Grandjean, 1958 (= **Stomacarus**)
 Anderemaeus Hammer, 1958
 Andesamerus Hammer, 1962
 Andesperuviella Paschoal, 1989 (= **Pheroliodes**)
 Andeszetes Hammer, 1961 (= **Scheloribates**)
 Anellozetes Hammer, 1962
 Angelia Berlese, 1885 (= **Nothrus**)
 Angullozetes Hammer, 1967
 Angulogalumna (**Galumna**) Grishina, 1981
 Anisochthodes Newell, 1957 (= **Tuberemaeus**)
 Annectacarus Grandjean, 1950
 Annobonzetes Pérez-Íñigo, 1983
 Anomaloppia Subías, 1978
 Anoplozetes Lee y Pajak, 1987
 Anoribatella Kunst, 1962 (= **Tectoribates**)
 Anoripoda Sellnick, 1959
 Antarcticola Wallwork, 1967
 Antarctoplophora Mahunka, 1980 (= **Neophthiracarus**)
 Antarctozetes Balogh, 1961 (= **Humerobates**)
 Antennoppia (**Lasiobelba**) Mahunka, 1983
 Antillobodes Mahunka, 1985 (= **Phyllocarabodes**)
 Antilloppia Mahunka, 1985 (= **Neoppia**)
 Antongilibodes Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014
 Aokibates (**Peloribates**) Mahunka, 1988
 Aokibelba (**Ctenobelba**) Subías y Shtanchaeva, 2013
 Aokiella Balogh y Mahunka, 1967
 Aphelacarus Grandjean, 1932
 Apograptoppia (**Graptoppia**) Subías y Rodríguez, 1985
 Apolohmannia (**Perlohmannia**) Aoki, 1960
 Apoplophora Aoki, 1980
 Apotomocephus Aoki, 1965
 Apotritia Norton y Lions, 1992
 Aquanothrus Engelbrecht, 1975
 Arborichthonius Norton, 1982
 Arceremaeus Hammer, 1961
 Archegocephus Aoki, 1965
 Archegotocephus (**Megalotocephus**) Mahunka, 1988
 Archegozetes Grandjean, 1931
 Archeonothrus Trägårdh, 1906
 Archeremella Balogh y Mahunka, 1974
 Archiphthiracarella Mahunka, 1996
 (= **Archiphthiracarus**)
 Archiphthiracarus (**Phthiracarus**) Balogh y Mahunka, 1979
 Archoplophora Hammen, 1959
 Arcoppia Hammer, 1977

- Arcozetes Hammer, 1958
 Arenozetes Krivolutsky, 1971
 Areozetes Hammer, 1961
 Argentinobates Fernández, 1984 (=Hydrozetes)
 Argentinovertex Fernández y Cleva, 2002
 (=Arthrovertex)
 Aribates Aoki, Takaku e Ito, 1994
 Arotrobates Luxton, 1992
 Arphthricarus Niedbala, 1994 (=Notophthiracarus)
 Arthrophlophora Berlese, 1910
 Arthrochthonius Ewing, 1917 (=Hypochthoniella)
 Arthrodamaeus Grandjean, 1954
 Arthrothrus Trägårdh, 1910 (=Eulohmannia)
 Arthrovertex Balogh, 1970
 Asiacarus Krivolutsky, 1971 (=Thamnacarus)
 Aspermaeus Behan-Pelletier, 1982
 Astegistes Hull, 1916
 Atalotegaeus Luxton, 1988
 Atopochthonius Grandjean, 1949
 Atropacarus Ewing, 1917
 Atypicogalumna (**Galumna**) Ermilov, Sandmann,
 Klarner, Widyastuti y Scheu, 2015
 Ausoribula (**Phauloppiella**) Lee, 1992
 Austracarus J. y P. Balogh, 1983 (=Ozacarus)
 Austracarus Mahunka, 1984 (=Ululohmannia)
 Austrachipteria Balogh y Mahunka, 1966
 Austrocarabodes Hammer, 1966
 Austroceratobates Mahunka, 1985 (=Limnozsetella)
 Austroceratoppia Hammer, 1979
 Austrodamaeus Balogh y Mahunka, 1981
 Austroeremulus Mahunka, 1985
 Austrogneta Balogh y Csiszár, 1963
 Austronothrus Hammer, 1966
 Austrophthiracarus Balogh y Mahunka, 1978
 (=Protophthiracarus)
 Austropopia Balogh, 1983
 Austrotrititia Sellnick, 1959
 Austrozetes Balogh y Mahunka, 1969 (=Rhopalozetes)
 Autogneta Hull, 1916
 Autoppia Golosova y Karppinen, 1983 (=Tripiloppia)
 Baioppia (**Lanceoppia**) Luxton, 1985
 Bakobodes Mahunka, 1996 (=Pseudocarabodes)
 Balazsella Mahunka, 1983 (=Phylloribatula)
 Baloghacarus Mahunka, 1983
 Baloghates (**Protoripoda**) Özdikmen, 2008
 Balogheremaeus Arillo y Subías, 2006
 Baloghia Mahunka, 1994
 Baloghiella Bulanova-Zachvatkina, 1972
 Baloghobates Hammer, 1967 (=Humerobates)
 Baloghodes (**Austrocarabodes**) Mahunka, 1986
 Baloghozetes Mahunka, 2003
 Baloghoppia Mahunka, 1983
 Balzania Jacot, 1929 (=Conoppia)
 Banksia Oudemans y Voigts, 1905 (=Xenillus)
 Banksinoma Oudemans, 1930
 Banksinus Jacot, 1938 (=Humerobates)
 Baobabula (**Gerlobia**) Mahunka, 1975
 Basiceramerus Corpuz-Raros, 1979
 Basidoppia Mahunka, 1983
 Basilobelba Balogh, 1958
 Basiloppia Balogh, 1983
 Bathocephus Aoki, 1978
 Beckiella Grandjean, 1964
 Bedoslohmannia Fernández, Theron, Rollard y Castillo,
 2014
 Behanpseudoppia Subías, 2017
 Beklemishevia Zachvatkin, 1945
 Belba Heyden, 1826
 Belbodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1967
 Belemacarus Pérez-Íñigo y Baggio, 1997
 (=Guaranozetes)
 Belloppia Hammer, 1968
 Belorchestes Grandjean, 1951
 Benoibates Balogh, 1958
 Berlesezetes Mahunka, 1980
 Berlesiella Hammer, 1979
 Berndamerus (**Ctenobelba**) Mahunka, 1977
 Berndbella Mahunka, 1985 (=Caveremulus)
 Berndia Mahunka, 1988 (=Topobates)
 Berndibula Mahunka, 2000 (=Trischelorbates)
 Berndobodes (**Yoshiobodes**) Mahunka, 1986
 Berndotritia Mahunka, 1987 (=Oribotritia)
 Berniniella Balogh, 1983
 Berniniella Özdikmen, 2008 (=Fberninia)
 Besuchetacarus (**Notophthiracarus**) Mahunka, 1985
 Bicrostoppia (**Lanceoppia**) Subías, 1989
 Bicyrthermannia Hammer, 1979
 Bifurcobelba (**Ctenobelba**) Subías y Shtanchaeva, 2010
 Bigalumna (**Pergalumna**) Mahunka y Mahunka-Papp,
 2009
 Bigalumnella (**Galumnella**) Mahunka, 1994
 Bioppia Mahunka y Paoletti, 1984 (=Ramusella)
 Bioribatella (**Oribatella**) Subías, 2017
 Bipassalozetes Mihelčič, 1957
 Bipectinoppia Subías y Shtanchaeva, 2011
 (=Paramedioppia)
 Birobates Balogh, 1970
 Birotegaeus Luxton, 1988
 Birsteinus Krivolutsky, 1965
 Bischelorbates (**Schelorbates**) Mahunka, 1988
Biunguis (Protoribates) Subías, 2018
 Bolkia (**Indoribates**) Mahunka, 1997
 Boreozetes Hammer, 1955 (=Neogymnobates)
 Borhidia Balogh y Mahunka, 1974
 Bornebuschia Hammer, 1966
 Bornemiszaella (**Hammerella**) P. Balogh, 1994
 Borneozetes Mahunka, 1997
 Borneremaeus Mahunka, 1991
 Bovicarabodes Fernández, Theron y Rollard, 2013
 Brachioppia Hammer, 1961
 Brachioppiella Hammer, 1962
 Brachychochthonius Jacot, 1938 (=Brachychthonius)
 Brachychthonius Berlese, 1910
 Brachyriopoda Balogh, 1970
 Brasilotrititia (**Euphthiracarus**) Märkel, 1964
 Brasilobates Pérez-Íñigo y Baggio, 1980 (=Triunguis)
 Brazilobates Koçak y Kemal, 2008 (=Salvus)
 Brasiloppia (**Leoppia**) Pérez-Íñigo y Baggio, 1986
 Brassiella Balogh, 1970
 Brassoppia Balogh, 1983
 Brazilozetes Balogh y Mahunka, 1969
 Bruneiella Mahunka, 1997 (=Sacculobates)
 Bukitrititia Mahunka, 1990
 Bulbocephus Mahunka, 1988
 Bulleremaeus Hammer, 1966
 Bullibates Subías y Shtanchaeva, 2012
 Bunabodes Fujikawa, 2004
 Bursoplophora Subías y Pérez-Íñigo, 1978
 Caenobelba (**Belba**) Norton, 1980
 Caenosamerus Higgins y Woolley, 1969
 Caleremaeus Berlese, 1910
 Calhoplophora Berlese, 1923 (=Tropacarus)
 Calipteremaeus Paschoal, 1987

- Calobates Balogh, 1961 (=Baloghates)
 Caloppia Balogh, 1958 (=Zetorchella)
 Calozetes Balogh y Mahunka, 1969
 Calugarella (**Unguizetes**) J. y P. Balogh, 1992
 Calvoppia Jacot, 1934 (=Phauloppia)
 Calyptophthiracarus (**Notophthiracarus**) Aoki, 1980
 Calyptozetes (**Mycobates**) Thor, 1930
 Camisia Heyden, 1826
 Campachipteria Aoki, 1995
 Campbellobates Wallwork, 1964
 Campbelloppia (**Solenoppia**) Luxton, 1985
 Canaloppia (**Berniniella**) Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
 Canaribates Pérez-Íñigo y Peña, 1994 (=Incabates)
 Cantharozetes Hammer, 1961
 Capillibates Hammer, 1966
 Capillonthrus (**Heminothrus**) Kunst, 1971
 Capilloppia Balogh y Mahunka, 1966
 Capillozetes Balogh, 1943 (=Peloribates)
 Carabocephus Berlese, 1910
 Carabodella Mahunka, 1986 (=Hardybodes)
 Carabodes Koch, 1835
 Carabodoides Jacot, 1937 (=Epioremulus)
 Carabozetes Mihelčič, 1957 (=Rostrozetes)
 Cardioribates Jacot, 1934 (=Podoribates)
 Carinabella Hammer, 1977
 Carinogalumna Engelbrecht, 1973
 Carinozetes Pflingstl y Schuster, 2012
 Carolohmannia (**Lohmannia**) Norton, Metz y Sharma, 1978
 Cassioppia Poltavskaya, 1994 (=Lalmoppia)
 Caucaseremaeus Subías y Shtanchaeva, 2006
 Caucasiobelba (**Ctenobelba**) Subías y Shtanchaeva, 2010
 Caucasiozetes Shtanchaeva, 1984
 Caudamaeolus P. Balogh, 1988
 Cavaecarabodes Fernández, Theron, Rollard y Castillo, 2014
 Caveremulus Mahunka, 1983
 Cavernella Bernini, 1975 (=Fberninia)
 Cavernocarabodes Mahunka, 1974
 Cavernocephus Balogh y Mahunka, 1969
 Cavernozetes Mahunka, 1984
 Celaeno Koch, 1835 (=Eupelops)
 Centroribates Berlese, 1914
 Cepheus Koch, 1835
 Cerachipteria Grandjean, 1935
 Ceratobates Balogh y Mahunka, 1969
 Ceratokalumna Balogh, 1970 (=Achipterina)
 Ceratoppia Berlese, 1908
 Ceratoppiella Hammer, 1977
 Ceratorchestes Balogh y Mahunka, 1969
 Ceratotenuala Aoki y Maruyama, 1983
 Ceratozetella Shaldybina, 1966
 Ceratozetes Berlese, 1908
 Ceratozetoides Shaldybina, 1966 (=Ceratozetella)
 Ceresella Pavlichenko, 1993 (=Ceratozetella)
 Cerocephus Trägårdh, 1931
 Ceroribatula Lee y Birchby, 1989 (=Oribatula)
 Cerostocephus Mahunka, 1973
 Ceylobodes J. y P. Balogh, 1992
 Chamobates Hull, 1916
 Chamozetes Sellnick, 1974 (=Ocesobates)
 Charassobates Grandjean, 1929
 Chaunoproctellus Mahunka, 1992 (=Zetorchella)
 Chaunoproctus Pearce, 1906 (=Zetorchella)
 Chavinia Hammer, 1961
 Cheloppia Hammer, 1971
 Chistyakovella Ermilov, Aoki y Anichkin, 2013
 Choixenillus Subías, 2016
 Christovizetes Krivolutsky, 1975
 Chudalupia Wallwork, 1981
 Chuoppia Tseng, 1982 (=Arcoppia)
 Cilioppia Balogh, 1983 (=Lasiobelba)
 Circellobates Luxton, 1992
 Clavazetes Hammer, 1966 (=Papillocephus)
 Claviceps Canestrini y Fanzago, 1877 (?=Trichoribates)
 Coartobelba Mahunka, 2001
 Coetzeella Ermilov, Hugo-Coetzee y Khaustov, 2107
 Coggiella Berlese, 1916 (=Joelia)
 Collohmanna Sellnick, 1922
 Comeremaeus Hammer, 1962
 Comororibula Mahunka, 1994 (=Berlesiella)
 Comorozetes Mahunka, 1994
 Compactozetes Hammer, 1966
 Conchogneta (**Autogneta**) Grandjean, 1963
 Condylobelba Mahunka, 2001
 Condyloppia Balogh, 1983
 Confinoppia (**Neotrichoppia**) Subías y Rodríguez, 1986
 Congocephus Balogh, 1958
 Congoppia Balogh, 1983
 Conoppia Berlese, 1908
 Conozetes Balogh y Mahunka, 1969
 Constrictobates Balogh y Mahunka, 1966
 Constrictocephus Grobler, 1998 (=Pseudotocephus)
 Convergooppia (**Lanceoppia**) Balogh, 1983
 Cordiozetes Mahunka, 1983
 Cordylobates Luxton, 1995 (=Humerobates)
 Coronibatula Mahunka, 1988
 Coronoquadroppia (**Quadroppia**) Ohkubo, 1995
 Coropoculia (**Ametroproctus**) Aoki y Fujikawa, 1972
 Corynobates J. y P. Balogh, 1992 (=Euscheloribates)
 Corynoppia Balogh, 1983
 Cosmobates Balogh, 1959
 Cosmochthonius Berlese, 1910
 Cosmogalumna (**Flagellozetes**) Aoki, 1988
 Cosmogneta Grandjean, 1960
 Cosmohermannia Aoki y Yoshida, 1970
 Cosmopirnodus Balogh, 1970
 Cosmoppia Balogh, 1983 (=Dissorhina)
 Cosmozetes Balogh y Mahunka, 1969
 Costeremus Aoki, 1970
 Crassoribatula Hammer, 1967
 Cretoppia Mahunka, 1986 (=Teratoppia)
 Cribrozetes Balogh, 1970
 Cristamerus Hammer, 1977 (=Gymnodampia)
 Criteremaeus Balogh y Csiszár, 1963
 Cristonothrus (**Tyrphonothrus**) Subías, 2004
 Crotonia Thorell, 1876
 Cryptacarus Grandjean, 1950
 Cryptobothria Wallwork, 1963
 Cryptogalumna Grandjean, 1957
 Cryptoplophora Grandjean, 1932
 Cryptoppia Csiszár, 1961
 Cryptoribatula Jacot, 1934
 Cryptozetes Hammer, 1962 (=Dometorina)
 Csibiplophora Mahunka, 1984 (=Bursoplophora)
 Ctenacarus Grandjean, 1939
 Ctenamerus J. y P. Balogh, 1992
 Ctenobelba Balogh, 1943
 Ctenogalumna Balogh, 1961 (=Allogalumna)
 Ctenoppia Balogh, 1983
 Ctenoppiella Gordeeva y Karppinen, 1988 (=Lauroppia)
 Cubabodes Balogh y Mahunka, 1974
 Cubacephus Balogh y Mahunka, 1979

- (=**Reticulocephus**)
 Cubachipteria Balogh y Mahunka, 1979
 Cubaoppia Balogh, 1983
 Cultrobates Willmann, 1930
 Cultroribella Mahunka, 1985
 Cultroribula Berlese, 1908
 Cultrozetes Sellnick, 1922 (=Astegistes)
 Cuneoppia Balogh y Mahunka, 1969
 Cuspidogalumna Starý, 2005 (=Angulogalumna)
 Cuspidozetes Hammer, 1962
 Cuspitegula Hammer, 1966
 Cycloppia Balogh, 1983
 Cyliroppia (**Discoppia**) Subías y Rodríguez, 1986
 Cymbaeremaeus Berlese, 1896
 Cyranozetes Mahunka y Mahunka-Papp, 2003
 (=Naiazetes)
 Cyrthermannia Balogh, 1958
 Cyrtozetes (**Ceratozetella**) Behan-Pelletier, 1985
 Daedaloppia Hauser y Mahunka, 1983 (=Antennoppia)
 Damaeolus Paoli, 1908
 Damaeoppia Ohkubo, 1995 (=Quinquoppia)
 Damaeus Koch, 1835
 Dameobelba Sellnick, 1928
 Dameosoma Berlese, 1892 (=Oppia)
 Dampfiella Sellnick, 1931
 Danobates Gjelstrup, 1978 (=Ocesobates)
 Darthvaderum Hunt, 1996 (=Novazelandiella)
 Dasybelba Woolley e Higgins, 1979 (=Nododamaeus)
 Decoribatula Lee y Birchby, 1989 (=Reticuloppia)
 Decoroppia Mahunka, 2009
 Defectamerus Aoki, 1984 (=Gymnodampia)
 Demisalto Coetzee, 1993
 Dendracarus Balogh, 1961
 Dendroeremaeus Behan-Pelletier, Eamer y Clayton, 2005
 Dendrohermannia P. Balogh, 1985
 Dendrozetes Aoki, 1970
 Dentachipteria Nevin, 1974
 Dentizetes Hammer, 1952
 Dentoppia Gordeeva, 2001 (=Moritzoppiella)
 Desertozetes Khanbekyan, 1990
 Diapterobates Grandjean, 1936
 Dicastrribates J. y P. Balogh, 1988 (=Sacculobates)
 Dicatozetes Grandjean, 1956
 Dicondyla Aoki, 1965 (=Dolicheremaeus)
 Dicrotegaeus Luxton, 1988
 Didierotocephus (**Afrotocephus**) Mahunka, 1994
 Didymonycha Mahunka, 1984 (=Tanzanycha)
 Dimidiogalumna Engelbrecht, 1972
 Dinoxenillus Pérez-Íñigo y Baggio, 1980 (=Xenillus)
 Dinozetes Balogh, 1962
 Diodontocephus Mihelčič, 1958 (=Eupterotegaeus)
 Diorchestes Grandjean, 1951 (=Microzetorchestes)
 Diphauloppia (**Subphauloppia**) J. y P. Balogh, 1984
 Diplobodes Aoki, 1958
 Discoppia Balogh, 1983
 Discosuctobelba Hammer, 1979 (=Ussuribata)
 Disparagalumna Hammer, 1973 (=Galumna)
 Dissorhina Hull, 1916
 Dividoppia (**Subiasella**) Mahunka, 1987
 Dolicheremaeus Jacot, 1938
 Dometorina Grandjean, 1951
 Donjohnstonella Walter, 2009 (=Gymnodamaeus)
 Dorycranosus (**Liaccarus**) Woolley, 1969
 Drepanoppia Balogh, 1983
 Drukoppia Gordeeva, 2001 (=Moritzoppiella)
 Drymobates Grandjean, 1930
 Drymobatoides Jacot, 1936
 Dudichella Balogh, 1970
 Dudichoplophora Mahunka, 1982
 Dynatozetes Grandjean, 1960
 Dyobelba (**Subbelba**) Norton, 1979
 Dysarcoppia (**Mimoppia**) Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
 Dzarogneta (**Oxyoppia**) Kulijev, 1978
 Ecuadoribates Ermilov y Kalúz, 2012
 Edaphoribates Nakamura y Nakai, 2009 (=Transoribates)
 Edwardzetes Berlese, 1913
 Elapheremaeus Grandjean, 1943 (=Ctenobelba)
 Elaphoppia Balogh, 1983
 Ellipsozetes Bernini, 1980
 Elliptochthonius Norton, 1975
 Embolacarus Sellnick, 1919 [†] (?=Collohmanna)
 Enantioppia Balogh y Mahunka, 1969
 Eniochthonius Grandjean, 1933 (=Hypochthoniella)
 Enisella Ayyildiz y Luxton, 1989
 Ensicamisia (**Camisia**) Kunst, 1971
 Entomotritia Märkel, 1964 (=Mesotritia)
 Eobrachychthonius Jacot, 1936
 Eohypochthonius Jacot, 1938
 Epactozetes Grandjean, 1930
 Epidamaeus (**Damaeus**) Bulanova-Zachvatkina, 1957
 Epieremulus Berlese, 1916
 Epilohmannia Berlese, 1910
 Epilohmannoides Jacot, 1936
 Epimerella Kulijev, 1967
 Eporibatula Sellnick, 1928 (=Phauloppia)
 Eremaezetes Berlese, 1913
 Eremaeus Koch, 1835
 Eremella Berlese, 1913
 Eremobelba Berlese, 1908
 Eremobodes Jacot, 1937
 Eremulus Berlese, 1908
 Erioppia Balogh, 1983
 Ermilovia (**Paraphauloppia**) Subías, 2017
 Erogalumna (**Galumna**) Grandjean, 1966
 Ethiovertex Mahunka, 1982
 Euaella Hammer, 1973 (=Cryptoribatula)
 Eudamaeus (**Damaeus**) Pérez-Íñigo, 1987
 Eueremaeus Mihelčič, 1963
 Eulohmannia Berlese, 1910
 Eupelops Ewing, 1917
 Euphthiracarus Ewing, 1917
 Eupterotegaeus Berlese, 1916
 Eupuncatoribates Hammer, 1977 (=Zachvatkinibates)
 Eurhynchoribates Miko, 2016
 Eurostocephus Aoki, 1965
 Euryacarus (**Javacarus**) Woolley, 1966
 Euryparazetes Radford, 1948 (=Peloribates)
 Euscheloribates Kunst, 1958
 Eutegaeus Berlese, 1916
 Euzetes Berlese, 1908
 Ewingozetes Hammer, 1952 (=Pelopsis)
 Exanthoppia J. y P. Balogh, 1983
 Exochocephus Woolley e Higgins, 1968
 Exoribatula Jacot, 1936
 Exoripoda Woolley, 1961 (=Benoibates)
 Falsolobozetes Tseng, 1984 (=Podoribates)
 Farchacarus Wallwork, 1967
 Fberninia Özdikmen, 2008
 Feiderzetes Subías, 1977
 Fenestrella Mahunka, 1987 (=Mahunkana)
 Fenestrobates (**Oribatella**) Balogh y Mahunka, 1969
 Fenestrobella Balogh, 1970
 Fenichelia Balogh, 1970

Fernandezbodes (Congocephus) Subías, 2018

- Fernandocephus Mahunka, 1982
 Ferolocella Grabowski, 1971
 Fijibates Hammer, 1971
 Fijirella Hammer, 1971 (=Gressittolus)
 Fineoppia Khanbekyan y Gordeeva, 1991 (=Dzarogneta)
 Fissicepheus Balogh y Mahunka, 1967
 Fissurobates Balogh y Mahunka, 1969
 Flabellobelba Pérez-Íñigo, 1995
 Flagellobates Mahunka, 1978 (=Topobates)
 Flagellocephus P. Balogh, 1984
 Flagellozetes Balogh, 1970
 Flagrosuctobelba (Suctobelbella) Hammer, 1979
 Flammaeremaeus Balogh, 1968
 Flexa (Carabodes) Kulijev, 1977
 Floribates Norton y Kethley, 1989 (=Siculobata)
 Floritrichus Coetzee, 2003
 Foraminoppia Subías y Arillo, 1998
 Fortuynia Hammer, 1960
 Fosseeremus Grandjean, 1954
 Fossonothrus (Tyrphonostrus) Hammer, 1962
 Fossoppia Mahunka, 1994
 Foveolatoppia Mahunka, 1988
 Fovoribatula Lee y Birchby, 1989 (=Zygoribatula)
 Frischia Oudemans, 1915 (?=Protoripoda)
 Frondoppia Mahunka, 1983 (=Graptoppia)
 Fuegoplophora Mahunka, 1980 (=Protophthiracarus)
 Fuerteventura Pérez-Íñigo y Peña, 1996
 (=Monophauloppia)
 Furcobates Sellnick, 1959
 Furcodamaeus Pérez-Íñigo y Baggio, 1980
 Furcoppia Balogh y Mahunka, 1966
 Furcoribula Balogh, 1943
 Furculoppia (Multioppia) Balogh, 1983
 Fuscozetes Sellnick, 1928
 Fusozetes Balogh, 1972
 Fusuloppia Balogh, 1983
 Galapagacarus P. Balogh, 1985
 Galumna Heyden, 1826
 Galumnella Berlese, 1916
 Galumnopsis Grandjean, 1931
 Gamarozetes (Edwardzetes) J. y P. Balogh, 1990
 Gehypochthonius Jacot, 1936
 Geminoppia J. y P. Balogh, 1983
 Geminozetes Balogh y Csiszár, 1963
 Gemmazetes Fujikawa, 1979 (=Oribelopsis)
 Genavensia Mahunka, 1983
 Gendzella Kulijev, 1977 (=Ferolocella)
 Geocephus Sitnikova, 1979 (=Reticulocephus)
 Gephyrazetes Hirauchi, 1999
 Gerloubia Coetzer, 1968
 Ghilarovizetes Shaldybina, 1969
 Ghilarovus Krivolutsky, 1966
 Gibbibodes (Gibbicepheus) Mahunka, 1986
 Gibbicepheus Balogh, 1958
 Gigantoppia Mahunka, 2008
 Gilarovella Lange, 1974
 Ginglymacarus Ewing, 1917 (=Phthiracarus)
 Gittella Hammer, 1961
 Glaberoribates Tseng, 1984 (=Triaunguis)
 Glabropia (Karenella) Subías y Rodríguez, 1986
 Glanderemaeus Balogh y Csiszár, 1963
 Globogalumna J. y P. Balogh, 1990
 Globonothrus Tseng, 1982 (=Eupelops)
 Globoppia Hammer, 1962
 Globozetes Sellnick, 1928
 Gobiella Balogh y Mahunka, 1965 (=Kaszabobates)
 Gordeeviella (Adoristes) Shtanchaeva, Subías y Arillo, 2010
 Goyoppia Balogh, 1983
 Gozmanyina Balogh y Mahunka, 1983
 Gradjeanacarus Zachvatkin, 1958 (=Ctenacarus)
 Gradjeanella Balogh, 1961 (=Grandjeania)
 Grandjeania Balogh, 1963
 Grandjeanobates (Scheloribates) Hammer, 1967
 Grandjeanoplophora Balogh y Mahunka, 1979
 Granizetes Hammer, 1961
 Granuloppia Balogh, 1958
 Granuloteratoppia P. Balogh, 1988
 Graptoppia Balogh, 1983
 Gredosella Gil-Martín, Arillo y Subías, 2000
 Gressittolus Balogh, 1970
 Gressittoppia (Brachioppiella) Balogh, 1983
 Grypoceramerus Suzuki y Aoki, 1970
 Guaranozetes Balogh y Mahunka, 1981
 Guatemalozetes (Scotiazetes) Mahunka, 1980
 Guineobodes (Pasocephus) Mahunka, 1987
 Gustavia Kramer, 1879
 Gymnobates Banks, 1902
 Gymnobotoides Woolley, 1966
 Gymnobodes Balogh, 1965
 Gymnodamaeus Kulczynski, 1902
 Gymnodampia Jacot, 1937
 Gymnonothrus Ewing, 1917 (=Nothrus)
 Gymnozetes Călugăr y Vasiliu, 1983 (=Magnobates)
 Gymnozetes P. Balogh, 1984 (=Sturmozetes)
 Hafenferrefia Jacot, 1939
 Hafenrefferia Oudemans, 1906
 Hafenrefferiella Sellnick, 1952 (=Hafenferrefia)
 Haloribatula Schuster, 1957
 Halozetes Berlese, 1916
 Hamacarus Hammer, 1977 (=Mixacarus)
 Hammation Grandjean, 1959 (=Basilobelba)
 Hammerabates Balogh, 1970
 Hammerella Balogh, 1983
 Hammeria Sellnick, 1944 (=Propelops)
 Hammeriella Paschoal, 1989 (=Pheroliodes)
 Hammeroppia (Multioppia) Vasiliu e Ivan, 2009
 Hamobates Hammer, 1962 (=Zetomimus)
 Hamoppia (Lanceoppia) Hammer, 1968
 Hamotegeus Balogh y Mahunka, 1969 (=Sadocephus)
 Haplacarus Wallwork, 1962
 Haplamerus J. y P. Balogh, 1992
 Haplobelba Balogh y Mahunka, 1969
 Haplochthonius Willmann, 1930
 Haploripoda Balogh y Mahunka, 1967 (=Benoibates)
 Haplozetes (Indoribates) Willmann, 1935
 Hardybodes Balogh, 1970
 Hauseroceratoppia Mahunka, 1980 (=Pseudoceratoppia)
 Hauserophthiracarus Mahunka, 1982
 (=Calyptophthiracarus)
 Hauseroplophora Mahunka, 1977
 Hauserozetes Mahunka, 1980
 Helioppia Balogh, 1983
 Hellenamerus Mahunka, 1974
 Heloribates Grandjean, 1966 (=Hydrozetes)
 Helvetacarus Mahunka, 1993 (=Atropacarus)
 Helvetobelba (Allosuctobelba) Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
 Hemileius Berlese, 1916
 Heminothrus Berlese, 1913
 Heptacarus Piffel, 1963
 Hermannia Nicolet, 1855
 Hermannella Berlese, 1908

- Hermannobates Hammer, 1961
 Heterobelba Berlese, 1913
 Heterochthonius Berlese, 1910
 Heterodamaeus Ewing, 1917 (=Gymnodamaeus)
 Heterodamaeus Woolley, 1957 (=Adrodamaeus)
 Heterodamaeus Mihelčič, 1964 (=Parabelbella)
 Heterogalumna Balogh, 1960
 Heterohermannia (**Hermannia**) Woas, 1992
 Heteroleius Balogh y Mahunka, 1966
 Heteroppia Balogh, 1970
 Heterozetes Willmann, 1917
 Hexachaetoniella Paschoal, 1987
 Hexatocepheus (**Otocepheus**) Wen, 1993
 Hexoppia Balogh, 1958
 Himalacarus Sheals, 1965 (=Zachvatkinella)
 Hispanozetes Subías y Shtanchaeva, 2011
 Hoffmanacarus (**Anachipteria**) Mahunka, 1995
 Hokkachiapteria Balogh y Mahunka, 1979
 (=Izuachiapteria)
 Holokalumna Jacot, 1929 (=Galumna)
 Hololohmannia Kubota y Aoki, 1998
 Holonothrus Wallwork, 1963
 Holozetes Jacot, 1929 (=Galumna)
 Hoploderma Michael, 1898 (=Phthiracarus)
 Hoplophora Koch, 1836 (=Phthiracarus)
 Hoplophorella Berlese, 1923
 Hoplophthiracarus Jacot, 1933
 Huarpescoptes Fernández, Monetti y Martínez, 1995
 (=Truncopes)
 Huilicheremaeus Fernández, Marcangeli y Eguaras, 1997
 Humerobates Sellnick, 1928
 Hummelia Oudemans, 1916 (?=Euphthiracarus)
 Hungarobelba Balogh, 1943
 Hungaromotrichus Mahunka, 1993 (=Mabulatrachus)
 Hydroecocepheus Corpuz-Raros, 1979
 Hydronothrus Aoki, 1964 (=Thrypochthoniellus)
 Hydrozetes Berlese, 1902
 Hygroribates Jacot, 1934 (=Ameronothrus)
 Hymenobelba Balogh, 1962
 Hymenozetes Balogh, 1964
 Hypocephalus Krivolusky, 1971
 Hypochthoniella Berlese, 1910
 Hypochthonius Koch, 1835
 Hypodamaeus Bulanova-Zachvatkina, 1957 (=Damaeus)
 Hypogeoppia Subías, 1981
 Hypovertex Krivolusky, 1969
 Hypozetes Balogh, 1959
 Iberogalumna Arillo y Subías, 1993
 Iberoppia Pérez-Íñigo, 1986
 Idiodamaeus Paschoal, 1984 (=Austrodamaeus)
 Idiozetes Aoki, 1976
 Ikarotocepheus Mahunka, 1988
 Imaparattoppia Jacot, 1934 (=Phauloppia)
 Incabates (**Lauritzenia**) Hammer, 1961
 Incudozetes J. y P. Balogh, 2002 (=Sphaerozetes)
 Indobates Pandit y Bhattacharya, 1999 (=Peloribates)
 Indogalumna (**Galumna**) Balakrishnan, 1985
 Indoribates Jacot, 1929
 Indotocepheus (**Odontocepheus**) Mondal y Kundu, 1999
 Indotritia Jacot, 1929
 Infernobates Karppinen y Poltavskaja, 1990 (=Oribella)
 Ingella Hammer, 1967 (=Reductobates)
 Inigozetes (**Minunthozetes**) Subías, 2000
 Insculptoppia (**Ramusella**) Subías, 1980
 Insculptoppiella (**Ramusella**) Subías y Rodríguez, 1986
 Interbelba Mahunka y Mahunka-Papp, 2012
 Intermedioppia Subías y Rodríguez, 1987
 Interoppia (**Hammerella**) Mahunka, 1987
 Irinobates Krivolusky y Christov, 1970 (=Liebstadia)
 Ischeloribates Corpuz-Raros, 1980 (=Perscheloribates)
 Issaniella Grandjean, 1962
 Italobates (**Pilobates**) Mahunka, 1994
 Iugoribates Sellnick, 1944
 Ivarsia Karppinen y Krivolusky, 1987 (=Ensicamisia)
 Izuachiapteria (**Achiapteria**) Balogh y Mahunka, 1979
 Jacotella Banks, 1947
 Javacarus Balogh, 1961
 Javalohmannia Hammer, 1979 (=Meristacarus)
 Javieroppia Mínguez y Subías, 1986
 Jeannelia Dalenius, 1958 (=Humerobates)
 Jermymia Mahunka, 2002 (=Gressittoppia)
 Joboppia Ruiz, Mínguez y Subías, 1988
 Joelia Oudemans, 1906
 Johnstonella Paschoal, 1983 (=Gymnodamaeus)
 Jornadia Wallwork y Weems, 1984
 Joshuella Wallwork, 1972
 Jugatala Ewing, 1913
 Jurabates Jacot, 1929 (=Minunthozetes)
 Kabylogalumna (**Galumna**) Bernini, 1984
 Kaibacepheus (**Samarocephus**) Corpuz-Raros, 2004
 Kakophthiracarus (**Hoplophorella**) Mahunka, 1992
 Kalayaan Corpuz-Raros, 1998
 Kallioia (**Diplobodes**) Mahunka, 1985
 Kalyptrazetes Balogh, 1972
 Karenella Hammer, 1962
 Kartoeremaeus Higgins, 1979 (=Eueremaeus)
 Kaszabobates Balogh, 1972
 Kaszabozetes Mahunka, 1988
 Kathetosuctobelba Chinone, 2003 (=Sucteremaeus)
 Keralotrichus (**Zetomotrichus**) Mahunka, 1985
 Kilimabates Mahunka, 1984 (=Anellozetes)
 Kinabaluella Mahunka, 1996 (=Nasozetes)
 Kinezogalumna Aoki y Hu, 1993 (=Galumna)
 Klapperiches (**Carabodes**) Mahunka, 1979
 Kochia Oudemans, 1900 (=Xenillus)
 Kodiakella Hammer, 1967
 Kokoppia Balogh, 1983
 Koreoribates Choi, 1994 (=Scutoribates)
 Koreozetes Aoki, 1974 (=Ghilarovizetes)
 Kratzensteinia Oudemans, 1919 (?=Neopilizetes)
 Krivolutskiella Gordeeva, 1980
 Kuklosuctobelba Chinone, 2003
 Kulievia Vasiliu e Ivan, 1999
 Kunoppia Mahunka, 1987 (=Rhinoppia)
 Kunstella Krivolusky, 1974 (=Scutoribates)
 Kunstidamaeus (**Damaeus**) Miko, 2006
 Kunstogalumna Starý, 2005
 Labiogenia Hunt, 1996 (=Novazelandiella)
 Lagenobates (**Liebstadia**) Weigmann y Miko, 2002
 Lalmoppia (**Subiasella**) Subías y Rodríguez, 1986
 Lamellarea Kok, 1968
 Lamellobates Hammer, 1958
 Lamellocephalus Balogh, 1961
 Lamellovertex Bernini, 1976
 Lamellozetes Covarrubias, 1967
 Laminizetes (**Trichoribates**) Behan-Pelletier, 1986
 Laminoppia Hammer, 1968
 Lancelalmoppia (**Lanceoppia**) Subías, 1989
 Lanceoppia Hammer, 1962
 Lanibelba (**Belbodamaeus**) Norton, 1980
 Laroppia Subías, 1989
 Lasiobelba Aoki, 1959
 Latilamellobates (**Trichoribates**) Shaldybina, 1971
 Latovvertex Mahunka, 1987 (=Exochocephus)

- Lauritzenia Hammer, 1958
 Lauropopia Subías y Mínguez, 1986
 Lawrencoppia Jacot, 1936 (=Phyllhermannia)
 Leebates Balogh y Mahunka, 1996 **Viracochiella**
 Leiosoma Nicolet, 1855 (=Liacarus)
 Lemurobates Mahunka, 1997
 Lemuroppia Mahunka, 1994
 Leobodes Aoki, 1965
 Leoppia Pérez-Íñigo, 1983
 Lepidacarus Csiszár, 1961
 Lepidoribates Sellnick, 1920 (=Tegoribates)
 Lepidozetes Berlese, 1910
 Leptogalumna Balogh, 1960
 Leptoppia Mahunka, 1997
 Leptorchistis Canestrini y Berlese, 1885 (=Zetorchestes)
 Leptosuctobelba (**Novosuctobelba**) Chinone, 2003
 Leptotocepheus Balogh, 1961
 Lesseria Oudemans, 1917 (=Epilohmannia)
 Leuroxenillus Woolley e Higgins, 1966 (=Liacarus)
 Liacaroppia Subías y Rodríguez, 1986
 Liacarus Michael, 1898
 Licneremaeus Paoli, 1908
 Licnobelba Grandjean, 1931
 Licnocepheus Woolley, 1969
 Licnodamaeolus Covarrubias, 1998
 Licnodamaeus Grandjean, 1931
 Licnoliodes Grandjean, 1931
 Licnozetes Balogh y Mahunka, 1969
 Liebstadia Oudemans, 1906
 Lignobates Mahunka, 2006 (=Setoxylobates)
 Limnozotella Willmann, 1932
 Limnozetes Hull, 1916
 Lineoppia J. y P. Balogh, 1983
 Linothrus Tseng, 1982 (=Cyrthermannia)
 Liochthonius Hammen, 1959
 Liodes Heyden, 1826 (=Neoliodes)
 Litholestes Grandjean, 1951
Litoribates Pflingstl y Schatz, 2017
 Loboppia Balogh, 1983
 Lobozetes Hammer, 1958
 Loftacarus Lee, 1981
 Lohmannia Michael, 1898
 Longocephalus Balogh y Mahunka, 1966
 Lopheremaeus Paschoal, 1988
 Lopholiodes Passchoal, 1987
 Lophotocephus J. y P. Balogh, 1983
 Lophozetes P. Balogh, 1985 (=Macrogena)
 Lucioppia (**Subiasella**) Mahunka, 1985
 Lucoppia Berlese, 1908
 Luissubiasia Ermilov, 2016
 Lunoribatula Mahunka, 1982
 Luxtoneremaeus J. y P. Balogh, 1992
 Luxtonia Mahunka, 2001
 Lyrifissiella Paschoal, 1989
 Lyroppia Balogh, 1961
 Mabulatrachus Coetzee, 1993
 Macarotritia Pérez-Íñigo, 1986 (=Austrotritia)
 Machadobelba Balogh, 1958
 Machadocephalus Balogh, 1958
 Machuella Hammer, 1961
 Macquariella Wallwork, 1963 (=Macquarioppia)
 Macquarioppia Wallwork, 1964
 Macrogena Wallwork, 1966
 Macrosoma Hammer, 1979 (=Senectoppia)
 Maculobates Hammer, 1962
 Madabelba Mahunka, 2009 (=Leptosuctobelba)
 Maerkelotritia Hammer, 1967
 Magellozetes Hammer, 1962
 Magnobates (**Lauritzenia**) Hammer, 1967
 Magoebazetes (**Cosmozetes**) Engelbrecht, 1972
 Magyaria Balogh, 1963
 Mahnertella Mahunka, 1997 (=Rugoppia)
 Mahnertozetes Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 Mahunkaceras J. y P. Balogh, 2002 (=Schalleriella)
 Mahunkaia Schatz, 2002
 Mahunkana Koçak y Kemal, 2008
 Mahunkazetes J. y P. Balogh, 1992
 Mahunkella Balogh, 1983
 Mahunkobates Călugăr, 1989
 Mainothrus Choi, 1996
 Makischelorbates (**Schelorbates**) Corpuz-Raros, 1980
 Malacoangelia Berlese, 1913
 Malaconothrus Berlese, 1904
 Malgachebates Fernández, Cleva y Theron, 2011
 Malgacheliodes Fernández y Cleva, 2010
 Malgasodes Mahunka, 2000
 Malgoceras (**Acaroceras**) Mahunka, 1993
 Mancoribates (**Indoribates**) Hammer, 1961
 Mangabebodes (**Tuberocephus**) Fernández, Theron, Leiva, Rollard y Tiedt, 2014
 Mantigueracarus (**Rhacaplacarus**) Balogh y Mahunka, 1992
 Maorizetes Hammer, 1966
 Marshallia Gordeeva, 1980 (=Gozmanyina)
 Masthermannia Berlese, 1913
 Maudheimia Dalenius, 1958
 Mauribodes J. y P. Balogh, 1992 (=Kalloia)
 Medioppia Subías y Mínguez, 1985 (=Rhinoppia)
 Medioxyoppia Subías, 1989
 Megalotocepheus Aoki, 1965
 Megaschelorbates Lee y Pajak, 1990 (=Schelorbates)
 Megatrachobates Grobler, 2000
 Megazetes (**Microzetes**) Balogh, 1959
 Megazetes Mahunka, 1993 (=Schalleriella)
 Megeremaeus Higgins y Woolley, 1965
 Melanozetes Hull, 1916
 Membranoppia Hammer, 1968
 Meriocephalus Aoki, 1973
 Meristacarus Grandjean, 1934
 Meristolohmannia Balogh y Mahunka, 1966
 Mesoplophora Berlese, 1904
 Mesotritia Forsslund, 1963
 Metabelba Grandjean, 1936
 Metabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967
 Metaleius (**Siculobata**) Travé, 1960
 Metaphthiracarus (**Phthiracarus**) Aoki, 1980
 Metapyroppia Woolley, 1969
 Metrioppia Grandjean, 1931
 Mexiceremus J. y P. Balogh, 1998
 Mexicoppia (**Furcoppia**) Mahunka, 1983
 Michaelia Haller, 1884 (=Lohmannia)
 Micreremus Berlese, 1908
 Microchthonius Kahwash, Subías y Ruiz, 1989
 (=Nanochthonius)
 Microlamellarea Coetzee, 1987
 Microphthiracarus Mahunka, 1982 (=Phthiracarus)
 Micropirnodus Weigmann, 2009 (=Pseudoppia)
 Microppia Balogh, 1983
 Microtegeus Berlese, 1916
 Microtritia Märkel, 1964
 Microzetes Berlese, 1913
 Microzetorchestes Balogh, 1943
 Mikizetes Hammer, 1958
 Millotacarus (**Paulianacarus**) Balogh, 1961

- Mimoppia Balogh, 1983
 Minasbates Pérez-Íñigo y Baggio, 1996 (=Mancoribates)
 Minguezetes (**Punctoribates**) Subías, Kahwash y Ruiz, 1990
 Minoricoppia Pérez-Íñigo Jr., 1991 (=Pseudoamerioppia)
 Minunthozetes Hull, 1916
 Mirabilozetes Mahunka, 1977
 Miracarus Kunst, 1959
 Miobelba Pérez-Íñigo y Peña, 1994 (=Parabelbella)
 Mirogalumna Mahunka, 1993 (=Orthogalumna)
 Miropia Hammer, 1968
 Mirus Kulijev, 1967 (=Spinozetes)
 Mixacarus Balogh, 1958
 Mixobates Gil-Martín y Subías, 1993 (=Haplozetes)
 Mixochthonius Niedbala, 1972
 Mixoribatula Mahunka, 1987 (=Cordiozetes)
 Mixozetes (**Ceratozetes**) J. y P. Balogh, 1990
 Mochlobates Norton, 1984
 Mochloribatula Mahunka, 1979
 Mochlozetes Grandjean, 1930
 Mongaillardia Grandjean, 1961
 Monofurcoppia Pérez-Íñigo y Sarasola, 1995
 Monogalumna Mahunka, 1986
 Monophauloppia (**Gerloubia**) P. Balogh, 1988
 Monophysobates J. y P. Balogh, 1992 (=Paraphysobates)
 Monoribatella (**Oribatella**) Subías, 2017
 Monoschelobates (**Hemileius**) Balogh y Mahunka, 1969
 Monstroripoda Mahunka, 2006
 Montizetes (**Pantelozetes**) Kunst, 1971
 Moritzichthonius Pereda e Iturrondobeitia, 1990
 (=Neolichthonius)
 Moritziella Balogh, 1983 (=Moritzoppia)
 Moritzoppia Subías y Rodríguez, 1988
 Moritzoppiella (**Oppiella**) Gordeeva, 2000
 Mucrobates Balogh y Mahunka, 1979
 Mucronothrus Trägårdh, 1931
 Muliercula Coetzer, 1968
 Multifossoppia (**Fossoppia**) Subías, 2017
 Multilanceoppia (**Multioppia**) Subías, 1989
 Multimaudheimia Subías, 2004
 Multimedioppia Subías, 1991
 Multioppia Hammer, 1961
 Multipulchroppia Subías, 1989
 Multoribatella (**Oribatella**) Subías, 2004
 Multoribates (**Exoribatula**) Hammer, 1961
 Multoribula Balogh y Mahunka, 1966
 Murcia Koch, 1835 (?=Trichoribates)
 Mycobates Hull, 1916
 Mycozetes Spain, 1968
 Mystacozetes Balogh, 1962
 Mysterozetes Hammer, 1961
 Mystroppia Balogh, 1959
 Nacunansella (**Licnodamaeolus**) Fernández y Cleva, 1998
 Naiazetes Behan-Pelletier, 1996
 Nanhermannia Berlese, 1913
 Nannerlia Coetzer, 1968
 Nanobates J. y P. Balogh, 1984 (=Trischeloribates)
 Nanochthonius (**Cosmochthonius**) Subías y Gil-Martín, 1995
 Nanohystrix Norton y Fuangarworn, 2015
 Nasobates Woolley, 1966
 Nasobelba Mahunka, 2005 (=Leptosuctobelba)
 Nasozetes Sellnick, 1930
 Neamerus (**Amerus**) Willmann, 1939
 Negroppia Vasiliu y Călugăr, 1977
 Nehypochthonius Norton y Metz, 1980
 Nellacaroides Mahunka, 1998 (=Microzetes)
 Nellacarus Grandjean, 1936 (=Microzetes)
 Nemacepheus Aoki, 1968
 Neoamerioppia Subías, 1989
 Neoatrichosus (**Eohypochthonius**) Fernández, 1984
 Neobelba (**Metabelba**) Bulanova-Zachvatkina, 1967
 Neobrachychthonius Moritz, 1976
 Neocarabodes (**Diplobodes**) Balogh y Mahunka, 1969
 Neocepheus Willmann, 1936 (=Carabodes)
 Neochthonius Karppinen, 1984 (=Neovochthonius)
 Neoctenacarus Moritz, 1974
 Neoctenogalumna Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
 Neopilohmannia (**Epilohmannia**) McDaniel y Bolen, 1989
 Neoeutegaeus Aoki, 1964
 Neogalumna Hammer, 1973
 Neogymnobates Ewing, 1917
 Neohermannia Bayoumi y Mahunka, 1979
 Neokakophthiracarus J. y P. Balogh, 2002
 (=Besuchetacarus)
 Neokalumma Tseng, 1984 (=Porokalumma)
 Neolepidozetes Hammer, 1977 (=Scutozetes)
 Neolichthonius Lee, 1982
 Neoliodes Berlese, 1888
 Neolohmannia Bulanova-Zachvatkina, 1960
 (=Apolohmannia)
 Neolucoppia Tseng, 1984
 Neomycobates Wallwork, 1963
 Neonooliodes Hunt, 1996 (=Pheroliodes)
 Neonothrus Forsslund, 1955 (=Platynothrus)
 Neophthiracarus (**Phthiracarus**) Balogh y Csiszár, 1963
 Neophysobates Luxton, 1987
 Neopilizetes (**Pilizetes**) J. y P. Balogh, 1990
 Neoppia Bhattacharya y Banerjee, 1981
 Neoprotophthiracarus Mahunka, 1980
 (=Neophthiracarus)
 Neoprototritia Shereef, 1978 (=Arthrophlophora)
 Neoribates Berlese, 1914
 Neoribatula Ewing, 1917 (=Zygoribatula)
 Neorizetes Jacot, 1933 (?=Pergalumna)
 Neoscheloribates Hammer, 1973 (=Scheloribates)
 Neoscutovortex Mihelčič, 1957 (=Scutovortex)
 Neosteganacarus Balogh y Mahunka, 1992 (=Rafacarus)
 Neostrinatina Mahunka, 1980
 Neosuctobelba Balogh y Mahunka, 1969
 Neotocepheus (**Plenotocepheus**) Hammer, 1966
 Neotrichacarus Hammer, 1973 (=Heptacarus)
 Neotrichocephus Hammer, 1973
 Neotrichoppia Subías e Iturrondobeitia, 1980
 Neotrichozetes Travé, 1961
 Neovochthonius Judson, 2009
 Neoxenillus Fujikawa, 2004
 Neozetes Berlese, 1885 (=Gustavia)
 Neseutegaeus Woolley, 1965
 Nesiacarus Csiszár, 1961
 Nesiotizetes Jacot, 1934
 Nesopelops Hammer, 1973
 Nesoppia Luxton, 1985 (=Membranoppia)
 Nesoribatula Aoki, 1964 (=Exoribatula)
 Nesotocepheus Hammer, 1972 (=Pseudotocepheus)
 Nesozetes Hammer, 1971
 Ngorongobodes J. y P. Balogh, 1992 (=Uluguroides)
 Niedbalacarus J. y P. Balogh, 2002 (=Steganacarus)
 Niedbalaia Mahunka, 1999 (=Euphthiracarus)
 Niloppia Balogh, 1983
 Niosuctobelba (**Kuklosuctobelba**) Chinone, 2003
 Niphocephus Balogh, 1943

- Nippobodes Aoki, 1959
 Nippohermannia (**Nanhermannia**) P. Balogh, 1985
 Nipponiella Gordeeva, 1980
 Nixozetes Mahunka, 1977 (=Indoribates)
 Nodocopeus Hammer, 1958
 Nododamaeus (**Parabelbella**) Hammer, 1977
 Nooliodes Paschoal, 1989
 Nortonacarus Balogh y Mahunka, 1992 (=Rafacarus)
 Nortonbelba Bernini, 1980
 Nortonchthonius (**Cosmochthonius**) Jorrín, 2014
 Nortonella Paschoal, 1982 (=Joshuella)
 Nosybea Mahunka, 1993 (=Lamellocephus)
 Nosybelba Mahunka, 1994
 Notaspis Hermann, 1804 (?=Ceratoppia)
 Nothrolohmanna Balogh, 1968
 Nothrus Koch, 1836
 Notogalumna Sellnick, 1959
 Notohermannia P. Balogh, 1985
 Notophthiracarus Ramsay, 1966
 Notophthiracarus Balogh y Mahunka, 1967
 (=Protophthiracarus)
 Notoppia Balogh y Mahunka, 1966
 Novazelandiella Paschoal, 1989
 Novonothrus Hammer, 1966
 Novoribatella Engelbrecht, 1986
 Novosuctobelba Hammer, 1977
 Nuhivabates Niemi y Behan-Pelletier, 2004
 Ocellotocephus Mahunka, 1989
 Ocesobates Aoki, 1965
 Octodurozetes Mahunka, 1993 (=Protoribates)
 Octoliodes Paschoal, 1987 (=Lopholiodes)
 Octoppia Balogh y Mahunka, 1969
 Odontocephus Berlese, 1913
 Odontodamaeus Paschoal, 1982 (=Gymnodamaeus)
 Oglasacarus (**Mikizetes**) Bernini, 1979
 Ojaithrus Habeeb, 1982 (=Hydrozetes)
 Oligoppia Balogh, 1983
 Ommatocephus Berlese, 1913
 Onazetes Bugrov, 1991 (=Lepidozetes)
 Onychobates Hammer, 1967
 Operculoppia Hammer, 1968
 Ophidiotrichus Grandjean, 1953
 Opisthocephus Aoki, 1976 (=Pasocephus)
 Oppia Koch, 1836
 Oppiella Jacot, 1937
 Opsioristes Woolley, 1967
 Orbiculobates Grandjean, 1961
 Oribata Latreille, 1802 (?=Phauloppia)
 Oribatella Banks, 1895
 Oribatodes Banks, 1895
 Oribatula Berlese, 1896
 Oribella Berlese, 1908
 Oribellopsis (**Pantelozetes**) Kunst, 1971
 Oribotritia Jacot, 1924
 Orinchoribates (**Eurhynchoribates**) Miko, Ermilov y Corpuz-Raros, 2017
 Oripoda Banks, 1904
 Oromurcia Thor, 1930
 Orthogalumna Balogh, 1961
 Orthozetes Balogh, 1962
 Otaheitea Hammer, 1972 (=Hammerabates)
 Otocephus Berlese, 1905
 Otopotacephus Corpuz-Raros, 2007
 Otoppia Balogh, 1983
 Ovobates Mahunka, 1994
 Ovochthonius Rjabinin, 1977
 Ovonothrus Kunst, 1971 (=Capillonothrus)
 Oxymerus Aoki, 1965
 Oxybrachioppia Subías, 1989
 Oxymystrophia Subías y Shtanchaeva, 2011
 Oxyoppia Balogh y Mahunka, 1969
 Oxyoppiella (**Oxyoppia**) Subías y Rodríguez, 1986
 Oxyoppioides Subías y Mínguez, 1985
 Oxyscheloribates (**Scheloribates**) J. y P. Balogh, 1990
 Oxyzetes Balogh, 1958
 Ozacarus Colloff y Halliday, 1998
 Pabulozetes Tseng, 1982 (=Zetorchella)
 Pachygena Hammer, 1972
 Paenoppia Woolley e Higgins, 1965
 Palaeacaroides Lange, 1972
 Palaeacarus Trägårdh, 1932
 Pallidacarus Krivolutsky, 1975
 Palmitalia Pérez-Íñigo y Peña, 1997
 Pantelozetes Grandjean, 1953
 Papillacarus Kunst, 1959
 Papillocephus Balogh y Mahunka, 1966
 Papillochthonius Gil-Martín, Subías y Arillo, 1992
 Papillonotus Wallwork, 1961
 Papuacephus Balogh, 1968
 Papuazetes Balogh, 1968
 Parabelbella Bulanova-Zachvatkina, 1967
 Paracamisia Olszanowski y Norton, 2002
 (=Capillonothrus)
 Paracarinogalumna Mahunka, 1998 (=Carinogalumna)
 Paraceratoppia Rjabinin, 1982
 Paraceratorchestes (**Ceratorchestes**) Ermilov y Kalúz, 2012
 Parachipteria Hammen, 1952
 Paractenogalumna (**Neoctenogalumna**) Ermilov, Starý, Sandmann, Marian y Maraun, 2013
 Paradamaeus (**Damaeus**) Bulanova-Zachvatkina, 1957
 Paradolicheremaeus Tseng, 1982
 Paraeroppia Sanyal, 2009 (=Aeroppia)
 Parafurcobates (**Furcobates**) Hammer, 1967
 Paragloboppia (**Taiwanoppia**) Subías, 1989
 Parahypozetes Hammer, 1967 (=Austrachipteria)
 Parakalumna (**Neoribates**) Jacot, 1929
 Paralalmoppia (**Subiasella**) Subías y Shtanchaeva, 2012
 Paralamellobates (**Lamellobates**) Bhaduri y Raychaudhuri, 1968
 Paraleius (**Siculobata**) Travé, 1960
 Paraliochthonius Moritz, 1976 (=Neoliochthonius)
 Paraliodes Hall, 1911 (=Phauloppia)
 Parallonothrus Badejo, Woas y Beck, 2002
 (=Allonothrus)
 Paralobozetes Tseng, 1984 (=Macrogena)
 Paralopheremaeus Paschoal, 1987
 Paralycus Womersley, 1944
 Paramedioppia (**Rhinoppia**) Mahunka y Mahunka-Papp, 2000
 Parapelops Jacot, 1938 (=Pelopsis)
 Paraphauloppia Hammer, 1967
 Paraphthiracarus Aoki, 1980 (=Archiphthiracarus)
 Paraphysobates Mahunka, 1985
 Paraphysobates Luxton, 1985 (=Neophysobates)
 Parapirnodus Balogh y Mahunka, 1968
 Parapocisia Niedbała, 2014 (=Euphthiracarus)
 Parapyrophia Pérez-Íñigo y Subías, 1979
 Pararamusella Mahunka y Palacios-Vargas, 1998
 Pararectoppia Mahunka, 1987 (=Lalmoppia)
 Paraschelobates Jacot, 1934 (=Scheloribates)
 Parasuctobelba Hammer, 1977
 Parasynoppia Aoki, 1983 (=Elaphoppia)
 Paratritia Moritz, 1966

- Parauracrobates (**Uracrobates**) Ermilov y Martens, 2015
 Parautogneta Golosova, 1974
 Parawoasella (**Hammerella**) Ermilov, Shtanchaeva, Subías y Anichkin, 2012
 Paraxylobates Balogh y Mahunka, 1969
 Parazetes Willmann, 1930 (= **Peloribates**)
 Pareutegaeus Woolley, 1965
 Parhynchoribates (**Rhynchoribates**) Miko, 2016
 Parhypochthonius Berlese, 1904
 Parisuctobelba Higgins y Woolley, 1976
 Paroppia Hammer, 1968
 Parplophora (**Mesoplophora**) Niedbała, 1985
 Paschoalia Subías, 2004 (= **Pheroliodes**)
 Paschoalia Özdikmen, 2008 (= **Joshuella**)
 Pasocephus Aoki, 1976
 Passalobates (**Bipassalozetes**) Pérez-Íñigo y Peña, 1996
 Passalomonia Mahunka, 1987
 Passalozetes Grandjean, 1932
 Patagonozetes J. y P. Balogh, 1990
 Pateribelba Mourek, Miko y Bernini, 2011 (= **Neobelba**)
 Paternoppia Gil-Martín, Subías y Arillo, 2000
 Paulianacarus Balogh, 1961
 Paulonothrus Kunst, 1971 (= **Heminothrus**)
 Pectinoppia Subías y Rodríguez, 1986 (= **Dzarogneta**)
 Pediculochelus Lavoipierre, 1946 (= **Paralycus**)
 Pedrocortesella Hammer, 1961
 Pedrocortesia Hammer, 1958 (= **Pheroliodes**)
 Pedunculozetes Hammer, 1962
 Pelokylla Adolph y Haq, 1982 (= **Drymobatoidea**)
 Pelonia Grube, 1859 (= **Cepheus**)
 Peloppia Sellnick, 1931 (= **Metrioppia**)
 Pelops Koch, 1835 (= **Eupelops**)
 Pelops Hall, 1911
 Peloptorbula Mahunka, 1984
 Peloptulus Berlese, 1908
 Peloribates Berlese, 1908
 Peloribatodes (**Peloribates**) Mahunka, 2011
 Peltenuiala Norton, 1983
 Pentabodes P. Balogh, 1984 (= **Phyllocarabodes**)
 Pentacephus Corpuz-Raros, 2004
 Pentazetes J. y P. Balogh, 1983
 Perezinigokalumma (**Neoribates**) Subías, 2004
 Pergalumna Grandjean, 1936
 Peridromotritia Jacot, 1923 (= **Phthiracarus**)
 Perlohmannia Berlese, 1916
 Permycobates Strenzke, 1954 (= **Calyptozetes**)
 Perschelorbates (**Schelorbates**) Hammer, 1973
 Perspicuoppia (**Oppiella**) Pérez-Íñigo, 1971
 Persuctobelba Mahunka, 2000
 Pertorgunia Dalenius, 1958 (= **Halozetes**)
 Perutritia (**Mesotritia**) Märkel, 1964
 Perxylobates Hammer, 1972
 Petrozetes Sitnikova, 1968 (= **Antarcticola**)
 Phalacrozetes (**Vilhenabates**) Aoki, 1965
 Phauloppia Berlese, 1908
 Phauloppiella Subías, 1977
 Phenopelops Petrunkevitch, 1955 (= **Eupelops**)
 Pheroliodes Grandjean, 1931
 Philippizetes (**Indoribates**) Corpuz-Raros, 1979
 Philippobodes J. y P. Balogh, 1992 (= **Bathocephus**)
 Philippotocephus J. y P. Balogh, 1992
 Philoribates (**Hammerabates**) Corpuz-Raros, 1980
 Philotritia Mahunka, 1988 (= **Oribotritia**)
 Phrathicarus Niedbała, 1994 (= **Calyptophthiracarus**)
 Phthiracaroides Štorkán, 1923 (= **Collohmanna**)
 Phthiracarulus Berlese, 1920 (= **Mesoplophora**)
 Phthiracarus Perty, 1841
 Phthirarica (**Notophthiracarus**) Mahunka, 1982
 Phylacozetes Grandjean, 1936
 Phylleremus Behan-Pelletier y Walter, 2007
 Phyllhermannia Berlese, 1916
 Phyllocarabodes Balogh y Mahunka, 1969
 Phyllochthonius Travé, 1967
 Phyllolohmannia (**Mixacarus**) J. y P. Balogh, 1987
 Phyllonothrus Sellnick, 1959 (= **Masthermannia**)
 Phyllorchestes Mahunka, 1983 (= **Zetorchestes**)
 Phylloribatula Balogh y Mahunka, 1978
 Phyllotegeus Berlese, 1913 (= **Conoppia**)
 Phyllozetes Gordeeva, 1978
 Physobates Hammer, 1962
 Physozetes Mahunka, 2008
 Piffliella Hammer, 1979
 Pilizetes Sellnick, 1937
 Pilobatella Balogh y Mahunka, 1967
 Pilobates Balogh, 1960
 Pilocephus Pérez-Íñigo, 1992
 Pilogalumna Grandjean, 1956
 Pirnodus Grandjean, 1956
 Plaesioppia (**Brassoppia**) Balogh, 1983
 Plakoribates Popp, 1960
 Planobates Hammer, 1973
 Planoristes Iturrondobeitia y Subías, 1978
 Plasmobates Grandjean, 1929
 Plateremaeus Berlese, 1908
 Platyamerus J. y P. Balogh, 1983
 Platyliodes Berlese, 1916
 Platynothrus (**Heminothrus**) Berlese, 1913
 Plenotocephus Hammer, 1966
 Plenoxylobates (**Setoxylobates**) Hammer, 1979
 Pleodamaeus Paschoal, 1983 (= **Gymnodamaeus**)
 Plesiodamaeus Grandjean, 1954
 Plesiotritia Walker, 1965 (= **Oribotritia**)
 Pletzenoppia Balogh, 1983
 Plonaphacarus Niedbała, 1986 (= **Rhacaplacarus**)
 Plumobates Balogh y Mahunka, 1966
 Plumozetes Balogh, 1972
 Pluritrithoppia Subías y Arillo, 1989
 Pocsia (**Euphthiracarus**) Mahunka, 1983
 Pocsoppia Mahunka, 1984 (= **Granuloppia**)
 Podacarus Grandjean, 1955
 Podopterotegaeus Aoki, 1969
 Podoribates Berlese, 1908
 Poecilochthonius Balogh, 1943
 Polillozetes Corpuz-Raros, 2009
 Polyoppia Hammer, 1968
 Polypterozetes Berlese, 1916
 Polyxylobates (**Setoxylobates**) Hammer, 1973
 Pontobates Luxton, 1989
 Porallozetes (**Pentazetes**) J. y P. Balogh, 1992
 Porobelba Grandjean, 1936
 Porofenichelia Mahunka, 1985 (= **Fenichelia**)
 Porogalumnella (**Galumnopsis**) Balogh, 1968
 Porokalumma (**Sandenia**) Wallwork, 1966
 Poroliodes Grandjean, 1934
 Poroschelorbates Arillo, Gil-Martín y Subías, 1994
 Porozetes Hammer, 1962 (= **Sphaerozetes**)
 Porhoppia Balogh, 1970
 Porhotegeus Balogh y Mahunka, 1966
 Posthermannia Grandjean, 1954 (= **Masthermannia**)
 Pravoppia (**Membranoppia**) Luxton, 1985
 Prionoribatella Aoki, 1975
 Processoppia Balogh, 1983
 Procorynetes (**Liacarus**) Woolley, 1967
 Propelops Jacot, 1937

- Propeschelobates Jacot, 1936 (=Haplozetes)
Proctoribates Behan-Pelletier, 2017
 Proteremaues Piffel, 1965
 Proteremella Balogh, 1959 (=Eremella)
 Protobelba (**Belbodamaeus**) Norton, 1979
 Protocephus Jacot, 1928
 Protokalumna Jacot, 1929 (=Neoribates)
 Protophthiracarus (**Notophthiracarus**) Balogh, 1972
 Protophthora Berlese, 1910
 Protoribates Berlese, 1908
 Protoribotritia Jacot, 1938
 Protoripoda Balogh, 1970
 Protoschelobates Jacot, 1934 (=Scheloribates)
 Prototritia Berlese, 1910
 Protozetes Balogh, 1962
 Protozetomimus (**Zetomimus**) Pérez-Íñigo, 1990
 Provertex Mihelčič, 1959
 Psammocephus (**Fissicephus**) Aoki, 1970
 Psammochthonius Fuangarworn y Norton, 2013
 Psammogalumna Balogh, 1943
 Pseudnobates Luxton, 1992
 Pseudachipteria Travé, 1960 (=Parachipteria)
 Pseudantarctica Balogh, 1970
 Pseudereulus Balogh y Mahunka, 1968
 Pseudoamerioppia Subías, 1989
 Pseudobrachioppiella Tseng, 1982
 Pseudocarabodes Mahunka, 1991
 Pseudocephus Jacot, 1928 (=Xenillus)
 Pseudoceratoppia Hammer, 1962
 Pseudocryptacarus McDaniel, Norton y Bolen, 1979
 (=Heptacarus)
 Pseudogalumna Pérez-Íñigo y Baggio, 1994
 (=Carinogalumna)
 Pseudogeminozetes (**Furcobates**) Tseng, 1984
Pseudomultioppia Subías, 2018
 Pseudoneoribates (**Neoribates**) Ermilov y Corpuz-Raros, 2015
 Pseudonothrus (**Allonothrus**) Balogh, 1958
 Pseudophysobates Fujikawa, 1991 (=Neophysobates)
Pseudopilizetes (Pilizetes) Ermilov, 2017
 Pseudopirnodus Baranek, 1985
 Pseudoppia Pérez-Íñigo, 1966
 Pseudoprotoribates Weigmann y Monson, 2004
 (=Lagenobates)
 Pseudopyroppia Rjabinin, 1987
 Pseudotectoribates Subías, 1977
 Pseudotocephus Balogh, 1961
 Pseudotritia Willmann, 1919 (=Euphthiracarus)
 Pteramerus Balogh, 1964
 Pterobates Balogh y Mahunka, 1977 (=Salvus)
 Pterochthonius Berlese, 1913
 Pteroripoda Balogh y Mahunka, 1974
 Pterozetes Hammer, 1966
 Ptiloppia Balogh, 1983
 Pulchroppia Hammer, 1979
 Pulchroppiella Balogh, 1983
 Punctizetes Hammer, 1971
 Punctoribates Berlese, 1908
 Pustuloppia Mahunka, 1994
 Pyroppia Hammer, 1955
 Quadroppia Jacot, 1939
 Quadroribula J. y P. Balogh, 1992
 Quatrobela (**Subbelba**) Norton, 1980
 Quattoppiella Hugo-Coetzee, 2014
 Quinquoppia Tseng, 1982
 Radamoppia Mahunka, 1994 (=Lancelalmoppia)
 Rafacarus (**Steganacarus**) Niedbała, 1981
 Rajskibates J. y P. Balogh, 1984 (=Liebstadia)
 Ramogneta Karppinen, 1966
 Ramonoppia Morell, 1990
 Ramsayellus Spain y Luxton, 1970
 Ramuloppia Balogh, 1961
 Ramusella Hammer, 1962
 Ramuseloppia Subías y Rodríguez, 1986
 Rastellobata Grandjean, 1961
 Rectoppia (**Ramusella**) Subías, 1980
 Reductobates Balogh y Mahunka, 1966
 Reductoppia (**Similoppia**) P. Balogh, 1984
 Reductoripoda Mahunka y Palacios-Vargas, 1996
 (=Benoibates)
Rekharibatula Bose, Mathur, Jain y Dogra, 1996
 Reptacarus Pérez-Íñigo y Peña, 1995
 Reteremuloides Mahunka, 1989
 Reteremulus Balogh y Mahunka, 1966
 Reticobella Hammer, 1962 (=Suctobelbilla)
 Reticulocephus Vasiliu y Călugăr, 1977
 Reticuloppia Balogh y Mahunka, 1966
 Retrozetes Colloff, 2012
 Rhabdoribates Aoki, 1967
 Rhabdozetes Hammer, 1962
 Rhacaplacarus Niedbała, 1986
 Rhaphidosus (**Liacarus**) Woolley, 1969
 Rhaphigneta (**Autogneta**) Grandjean, 1960
 Rhaphoppia Balogh, 1983 (=Processoppia)
 Rhinoppia Balogh, 1983
 Rhinosuctobelba Woolley e Higgins, 1969
 (=Rhynchobelba)
 Rhizophobates Karasawa y Aoki, 2005 (=Thalassozetes)
 Rhopalozetes Balogh, 1964
 Rhynchobelba Willmann, 1953
 Rhynchobella Hammer, 1961 (=Suctobelbilla)
 Rhynchoppia Balogh, 1968
 Rhynchoribates Grandjean, 1929
 Rhynchoribatodes (**Rhynchoribates**) Miko, 2016
 Rhysotritia Märkel y Meyer, 1959 (=Acrotritia)
 Rimandocephus (**Kalayaan**) Corpuz-Raros, 1998
 Rioppia Balogh y Mahunka, 1977
 Rogerzetes Fernández, Theron y Cleva, 2011
 Rohria Balogh y Mahunka, 1977
 Romanobates Feider, Vasiliu y Călugăr, 1970
 (=Lucoppia)
 Rostrogalumna (**Galumna**) Engelbrecht, 1973
 Rostrozetella Mahunka, 2006
 Rostrozetes Sellnick, 1925
 Roynortonella Walter, 2009 (=Joshuella)
 Roynortonia Ermilov, 2011
 Rugocephus Mahunka, 2009
 Rugoppia Mahunka, 1986
 Rugozetes Balogh, 1960
 Rykella (**Drymobatoides**) Balogh, 1962
 Sabacarus Ramsay y Sheals, 1969
 Sabahoppia (**Ramusella**) Mahunka, 1987
 Sabahtritia Mahunka, 1987
 Sacculobates Grandjean, 1962
 Sacculogalumna Engelbrecht, 1973
 Sacculoppia Balogh y Mahunka, 1968
 Sacculoptulus (**Peloptulus**) Subías, 2017
 Sacculoribatella (**Oribatella**) Shtanchaeva y Subías, 2012
 Sacculozetes Behan-Pelletier y Rjabinin, 1991
 Sadocephus Aoki, 1965
 Safrobates (**Macrogena**) Mahunka, 1989
 Sagittabodes (**Machadocephus**) J. y P. Balogh, 1992
 Sagittazetes J. y P. Balogh, 1983
 Salpasozetes Mahunka, 1977 (=Bipassalozetes)

- Saltatrichus (**Demisalto**) Coetzee, 1993
 Salvus Özdikmen, 2008
 Samarocephus Corpuz-Raros, 1990
 Samoabates Hammer, 1973
 Sandenia Oudemans, 1917
 Sarawakiella (**Trichogalumna**) Mahunka, 1996
 Saxicolestes Grandjean, 1951
 Scapheremaeus Berlese, 1910
 Scapuleremaeus Behan-Pelletier, 1989
 Scarabacarus Shtanchaeva y Subías, 2010
 Sceletoppia Mahunka y Mahunka-Papp, 2009
 Schalleria Balogh, 1962
 Schalleriella Engelbrecht, 1972
 Scheloribatella Mahunka, 1984 (= **Perscheloribates**)
 Scheloribates Berlese, 1908
 Scheloribatoides Mahunka, 1988
 Schizozetes Balogh, 1962
 Schusteria Grandjean, 1968
 Schweizerzetes Mahunka, 2001 (= **Alpizetes**)
 Scotiazetes Wallwork, 1966
 Scriptoripoda P. Balogh, 1985
 Sculptozetes Mahunka, 1984 (= **Melanozetes**)
 Scutoribates Sellnick, 1918
 Scutovertex Michael, 1879
 Scutoverticosus Kok, 1968
 Scutozetes Hammer, 1952
 Seboetocephus Mahunka, 1985
 Selenoribates Strenzke, 1961
 Sellnickia Oudemans, 1927
 Sellnickochthonius Krivolutsky, 1964
 Selvazetes Behan-Pelletier, 1998
 Semipunctatoribates (**Punctoribates**) Mahunka, 1987
 Semischeloribates Hammer, 1973 (= **Scheloribates**)
 Senectoppia Aoki, 1976
 Senilochthonius (**Haplochthonius**) Mahunka, 1992
 Senoribula Mahunka, 1975
 Separatoppia Mahunka, 1983
 Separatoribates Matsushima e Y.-N. e Y. Nakamura, 2009
 Serrarius Michael, 1883 (= **Gustavia**)
 Serratobelba Mahunka, 1984
 Serratoppia Subías y Mínguez, 1985
 Seteremaeozetes P. Balogh, 1988
 Seteremaeus Hammer, 1971
 Setincabates Lee, 1993 (= **Peloribates**)
 Setobates Balogh, 1961 (= **Topobates**)
 Setogalumna P. Balogh, 1985
 Setoppia Balogh, 1983
 Setoxylobates Balogh y Mahunka, 1967
 Setulobates Mahunka, 1984 (= **Multoribates**)
 Setuloppia Balogh, 1983
 Seychellozetes Mahunka, 1984 (= **Drymobatoides**)
 Sibiremaeus Rjabinin y Krivolutsky, 1975
 (= **Proteremaeus**)
 Sicaxylobates Luxton, 1985
 Siciliophora (**Prototritia**) Bernini, 1983
 Siciliotrichus Bernini, 1973
 Siculobata Grandjean, 1953
 Sigmonothrus Chakrabarti y Kundu, 1978
 (= **Platynothrus**)
 Similobates Mahunka, 1982
 Similochthonius Mahunka, 1985
 Similoppia Mahunka, 1983
 Simkinia (**Hemileius**) Krivolutsky, 1966
 Singabodes Mahunka, 1998
 Sinolohmannia Balogh y Mahunka, 1979
 (= **Epilohmannia**)
 Sinozetes Mahunka, 2000 (= **Kaszabozetes**)
 Solenoppia Hammer, 1968
 Solenozetes Grandjean, 1931
 Spathulocephus Balogh y Mahunka, 1969
 Spatiodamaeus (**Damaeus**) Bulanova-Zachvatkina, 1957
 Sphaerobates Sellnick, 1928 (= **Podoribates**)
 Sphaerochochthonius Mahunka, 1985 (= **Similochthonius**)
 Sphaerochthoniella Mahunka, 1985 (= **Sphaerochthonius**)
 Sphaerochthonius Berlese, 1910
 Sphaerogalumna Balogh, 1961
 Sphaerozetella Jacot, 1929 (= **Sphaerozetes**)
 Sphaerozetes Berlese, 1885
 Sphagnoppia J. y P. Balogh, 1986
 Sphidrocephus Woolley e Higgins, 1963
 Spinneremaeus Colloff, 2011
 Spinoppia Higgins y Woolley, 1966
 Spinotocephus Hammer, 1981
 Spinozetes Piffel, 1966
 Stachyoppia Balogh, 1961
 Stakarenoppia (**Karenella**) Subías y Rodríguez, 1986
 Staurobates Grandjean, 1966
 Stauroma Grandjean, 1966
 Steganacarellus (**Notophthiracarus**) Mahunka, 1986
 Steganacarus Ewing, 1917
 Stelechobates Grandjean, 1965
 Stenoppia (**Graptoppia**) Balogh, 1983
 Stenoxenillus Woolley e Higgins, 1966 (= **Li acarus**)
 Sternoppia Balogh y Mahunka, 1968
 Stictozetes Berlese, 1916
 Stomacarus Grandjean, 1952
 Stonyxenillus (**Xenillus**) Woolley e Higgins, 1966
 Storkania Jacot, 1929 (= **Scheloribates**)
 Strabogalumna Mahunka, 1995 (= **Stictozetes**)
 Strenzkea Travé, 1967
 Striatobates Hammer, 1973
 Striatoppia Balogh, 1958
 Strinatocarus Mahunka, 1974
 Sturmcarus P. Balogh, 1984 (= **Neophthiracarus**)
 Sturmozetes J. y P. Balogh, 1992
 Styloribates Jacot, 1934 (= **Protoribates**)
 Stylozetes (**Microzetes**) Balogh y Mahunka, 1969
 Subbelba Bulanova-Zachvatkina, 1967
 Subiasella Balogh, 1983
 Subphauloppia Hammer, 1967
 Subpirmodus Mahunka, 1988
 Subulobates Hammer, 1972 (= **Maculobates**)
 Sucteremaeus Golosova y Krivolutsky, 1975
 Suctobelba Paoli, 1908
 Suctobelbata Gordeeva, 1991
 Suctobelbella Jacot, 1937
 Suctobelbilla Jacot, 1937
 Suctobelbiloides Mahunka, 1988
 Suctobelboides (**Novosuctobelba**) Pankov, 1997
 Suctoppia Balogh, 1958 (= **Suctobelbilla**)
 Suctoribates Balogh, 1963
 Suctotegeus Mahunka, 1987
 Sulcoribula Hammer, 1971
 Sumatrotritia Mahunka, 1989
 Sundazetes Hammer, 1979 (= **Indoribates**)
 Svalbardia Thor, 1930
 Symbioribates Aoki, 1966
 Symphauloppia Balogh, 1972 (= **Pseudoppia**)
 Synchthonius Hammen, 1952
 Synichotritia Walker, 1965
 Synoppia Balogh y Mahunka, 1969 (= **Sternoppia**)
 Szentivanyella Balogh y Mahunka, 1969
 Taeniogalumna Balogh, 1962
 Tainsculptoppia Subías y Shtanchaeva, 2011

- Taiwanoppia Tseng, 1982
Tamdamaeus Miko y Ermilov, 2017
Tansocephus Mahunka, 1983
Tanzanycha (**Trichogalumna**) Koçak y Kemal, 2008
Tanzoppia (**Heteroppia**) Mahunka, 1988
Tauropliphora (**Grandjeanoplophora**) Gordeeva, Niemi y Petrova-Nikitina, 1998
Tecteremaeus Hammer, 1961
Tectocarabodes Mahunka, 1988
Tectocephus Berlese, 1896
Tectodamaeus (**Parabelbella**) Aoki, 1984
Tectopelops Jacot, 1929 (= **Eupelops**)
Tectoppia Wallwork, 1961
Tectoppiella Mahunka, 1984 (= **Setoppia**)
Tectorhynchoribates (**Rhynchoribates**) Miko, 2016
Tectoribates Berlese, 1910
Tegeocranellus Berlese, 1913
Tegeocranus Nicolet, 1855 (= **Carabodes**)
Tegezotes Berlese, 1913
Tegoribates Ewing, 1917
Teleolioides Grandjean, 1934
Temburongia Mahunka, 1990
Tentaculozetes (**Peloribates**) Balogh, 1970
Tenuelamellarea Subías e Iturrondobeitia, 1978
Tenuiala Ewing, 1913
Tenuialoides Woolley e Higgins, 1966
Tenuileius Lee, 1989 (= **Turcibates**)
Teraja Mahunka, 1995 (= **Microzetes**)
Teratoppia Balogh, 1959
Teratoppiella (**Teratoppia**) Balogh, 1983
Tereticephus S. y F. Bernini, 1990
Terratritia Ramsay y Sheals, 1969
Terrazetes Jacot, 1929 (= **Unguizetes**)
Tessacarus Grandjean, 1962 (= **Lamellocephus**)
Tetracondyla Newell, 1956 (= **Dolicheremaeus**)
Tetrochthonius Hammer, 1958 (= **Haplochthonius**)
Tetropia Gordeeva, 1999 (= **Moritzoppia**)
Thalassozetes Schuster, 1963
Thamnacarus Grandjean, 1950
Thasecazetes Pflingstl, Baumann, Lienhard y Schatz, 2017
Thyrisoma Grandjean, 1953 (= **Banksinoma**)
Tikizetes Hammer, 1967
Tokunocephus Aoki, 1966
Tongacarus Hammer, 1973 (= **Javacarus**)
Topalia Balogh y Csiszár, 1963
Topobates Grandjean, 1958
Torpacarus Grandjean, 1950
Totobates Hammer, 1961
Trachygalumna Balogh, 1960 (= **Stictozetes**)
Trachyhoplophora Berlese, 1923 (= **Steganacarus**)
Trachyoribates Berlese, 1908
Traegardhacarus Zachvatkin, 1945 (= **Palaeacarus**)
Transoribates Pérez-Íñigo, 1992
Trapezoppia Balogh y Mahunka, 1969
Trematoppia Balogh, 1964
Trhypochthoniellus Willmann, 1928
Trhypochthonius Berlese, 1904
Triachipteria (**Campachipteria**) Subías, 2017
Triaunguis (**Protoribates**) Kulijev, 1978
Triautogneta Fujikawa, 2009
Tribates Mahunka, 1978 (= **Euscheloribates**)
Trichacaroceras (**Acaroceras**) Mahunka, 1991
Tricheremaeus Berlese, 1908
Trichocarabodes Balogh, 1961
Trichocephus Balogh y Mahunka, 1966
Trichocondyla J. y P. Balogh, 1986
Trichodamaeus Mahunka, 1984 (= **Aleurodamaeus**)
Trichogalumna Balogh, 1960
Trichogalumnella Mahunka, 1992
Trichonothrus Mahunka, 1986
Trichoppia Balogh, 1961
Trichoribatella Mahunka, 1983 (= **Latilamellobates**)
Trichoribates Berlese, 1910
Trichoribatula Balogh, 1961 (= **Phauloppia**)
Trichotocephus Aoki, 1965
Trichozetes Balogh y Mahunka, 1980
Trichthonius Hammer, 1961
Trihumerozetes Sellnick, 1959 (= **Humerobates**)
Trilohmannia Willmann, 1923 (= **Trhypochthonius**)
Trimalaconothrus (**Malaconothrus**) Berlese, 1916
Tripilobatella (**Pilobatella**) Subías, 2017
Tripiloppia Hammer, 1968
Tripliphora Mahunka, 1977 (= **Arthrophlophora**)
Trischeloribates (**Euscheloribates**) Hammer, 1971
Tritegeus Berlese, 1913
Triteremella Kunst, 1971
Tritia Berlese, 1883 (= **Oribotritia**)
Triungulozetes Subías, 2001 (= **Haplozetes**)
Trixylobates Balogh y Mahunka, 1978
Trizetes Berlese, 1904
Tropacarus (**Steganacarus**) Ewing, 1917
Truncopes Grandjean, 1956
Truncozetes Balogh y Mahunka, 1969
Trypogalumnella Mahunka, 1995
Tuberemaeus (**Hemileius**) Sellnick, 1930
Tuberocephus Balogh y Mahunka, 1969
Tuberoppia Golosova, 1974
Tubulozetes P. Balogh, 1989
Tumerozetes Hammer, 1966
Tumidalvus Ewing, 1908 (= **Trhypochthonius**)
Tuparezetes Spain, 1969
Turcibates Ayyildiz y Luxton, 1989 (= **Simkinia**)
Turkmenitrichus Krivolutsky y Karppinen, 2006
Tutorozetes Hammer, 1967
Tuxenia Hammer, 1958
Tyrphonothrus Knülle, 1957
Udetalioides Jacot, 1929 (= **Neolioides**)
Ugandoppia Mahunka, 1988 (= **Brachioppiella**)
Uluguroides (**Austrocarabodes**) Mahunka, 1983
Ulugurozetes Mahunka, 1984 (= **Ramsayellus**)
Ululohmannia Mahunka, 1987
Umbellozetes Krivolutsky, 1969
Unduloribates Balogh, 1943
Undulozetes (**Licnozetes**) Balogh y Mahunka, 1969
Unguizetes Sellnick, 1925
Unicobelba Mahunka y Mahunka-Papp, 1999
(= **Suctobelbata**)
Uracrobates Balogh y Mahunka, 1967
Urobates Hammer, 1973 (= **Uracrobates**)
Uronothrus Berlese, 1913 (= **Camisia**)
Uroppia Balogh, 1983
Urubambates (**Hemileius**) Hammer, 1961
Ussuribata (**Suctobelbella**) Rjabinin, 1975
Vaghia Oudemans, 1919
Valbehanella Ermilov y Hugo-Coetzee, 2012
Variogalumna Mahunka, 1995 (= **Cosmogalumna**)
Varioppia (**Hammerella**) Mahunka, 1985
Veloppia Hammer, 1955
Vepracarus (Papillacarus) Aoki, 1965
Verachthonius Moritz, 1976
Vermacarus Balogh y Mahunka, 1980
Vesiculobates (**Siculobata**) Hammer, 1979
Vicinebates Pavlichenko, 1991 (= **Latilamellobates**)
Vietobates Mahunka, 1987 (= **Limnozetes**)

Vietoppia Mahunka, 1988 (=Taiwanoppia)
 Vigilomicrozetes Tseng, 1982 (=Nothrus)
 Vilhenabates Balogh, 1963
 Viracochiella (**Trichoribates**) Hammer, 1961
 Wallworkella Balogh, 1983 (=Wallworkoppia)
 Wallworkiella (**Siculobata**) Hammer, 1979
 Wallworkoppia Subías, 1989
 Weigmannia Miko y Norton, 2010
 Weigmanniella (**Anachipteria**) Subías, 2010
 Westwoodia Cambridge, 1875 (=Crotonia)
 Williamsia Hammer, 1958 (=Williamszetes)
 Williamszetes Hammer, 1961
 Woasella J. y P. Balogh, 2002 (=Varioppia)
 Woolleybates J. y P. Balogh, 1984 (=Jornadia)
 Xenilloides Pérez-Íñigo y Baggio, 1989
 Xenillus Robineau-Desvoidy, 1839
 Xenogalumna Balogh, 1961 (=Allogalumna)
 Xenolohmannia Balogh y Mahunka, 1969
 Xenoppia Mahunka, 1982 (=Afroppia)
 Xiphobates (**Chamobates**) Pavlichenko, 1994
 Xiphobelba Csiszár, 1961
 Xylobates Jacot, 1929 (=Protoribates)
 Yambaramerus Aoki, 1996
 Yemenobodes Mahunka, 2000 (=Pseudocarabodes)
 Yoronoribates Aoki, 1987 (=Hammerabates)
 Yoshiobodes Mahunka, 1986
 Yungaseremaeus Balogh y Mahunka, 1969
 Zachvatkinella Lange, 1954
 Zachvatkinibates Shaldybina, 1973
 Zaherizetes Yousef y Nasr, 1976 (=Rostrozetes)
 Zealandobates Hammer, 1967 (=Ramsayellus)
 Zealandozetes Ermilov, Minor y Behan-Pelletier, 2015
 Zeanothrus Hammer, 1966 (=Trimalaconothrus)
 Zeaotritia (**Indotritia**) Mahunka, 1988
 Zeaschelorbates Luxton, 1982
 Zeasuctobelba Hammer, 1966
 Zetes Koch, 1836 (=Galumna)
 Zetobelba Hull, 1916 (=Zygoribatula)
 Zetomimus Hull, 1916
 Zetomotrichus Grandjean, 1934
 Zetorchella Berlese, 1916
 Zetorchestes Berlese, 1888
 Zimbabweae Fernández, Theron y Leiva, 2016
 (=Sagittabodes)
 Zygachipteria Mihelčič, 1956 (=Cerachipteria)
 Zygoribatula (**Oribatula**) Berlese, 1916

ÍNDICE ALFABÉTICO Y BIOGEOGRÁFICO DE ESPECIES (Y SUBESPECIES) DE ORIBÁTIDOS
(Paleártica. Neártica. Etiópica. Oriental. Australiana. Antártica. Neotropical. Sinonimia)

- aba (*Galumna*)
ababa [*H. (Phyllhermannia)*]
abacus [*N. (Besuchetacarus)*]
ababaeus (*Peloribates*)
abalai (*Zetorchella*)
abarkouhiensis [*R. (Insculptoppia)*] (=elliptica)
abbreviata (*Macrogena*)
abbreviata (*Meristolohmannia*)
abbreviatus [*S. (Perschelorbates)*]
abchastica [*L. (Antennoppia)*]
abchastica (*Ceratoppia*)
abchastica [*Q. (Coronoquattroppia)*]
abchasticus [*H. (Platynothrus)*] (=peltifer)
abchasticus [*P. (Vepracarus)*]
abdita (*Aeroppia*)
abditus (*Paraphysobates*)
abdominalis [*L. (Dorycranosus)*]
abdosensilla (*Camisia*)
abdurachmanovi (*Oribatella*)
abeloosi (*Amiracarus*) (=similis)
aberrans (*Belba*) (=sculpta)
aberrans (*Protoribotritia*)
aberrata (*Rhinoppia*) (=subpectinata)
abhorrens (*Oribatella*)
abmi (*Oribatella*)
abnobensis (*Tricheremaeus*)
aborigensis [*D. (Epidamaeus)*]
aborigensis (*Niphocephus*)
abraensis (*Schelorbates*)
abresi (*Stomacarus*)
abrupta (*Acrogalumna*)
absalom (*Eupelops*) *sp. inq.*
abscondita (*Cryptoplophora*)
abscondita (*Cryptoplophora*)
abscondita (*Cryptoplophora*)
abscondita (*Cryptoplophora*)
abscondita [*M. (Parplophora)*]
absidatus [*S. (Rafacarus)*]
absimilis (*Atropacarus*)
absolon (*Dolicheremaeus*)
absolutus (*Benoibates*)
abstemius (*Notophthiracarus*)
abstemius (*Phthiracarus*)
abulensis [*P. (Montizetes)*]
acalepha [*H. (Phyllhermannia)*]
acanthophora (*Indotritia*) (=krakatauensis)
acanthus (*Campbellobates*)
acarinus (*Aphelacarus*)
acarinus (*Aphelacarus*)
acarinus (*Aphelacarus*)
acarinus (*Aphelacarus*)
acaroides (*Trichoribates*) *sp. inq.*
achalensis (*Pheroliodes*)
achipteroides (*Anachipteria*)
achipteroides (*Anachipteria*)
achmedovi (*Atropacarus*)
aciculatus (*Papillacarus*)
aciculatus (*Papillacarus*)
aciculatus (*Reteremulus*)
acostulatus (*Eueremaeus*)
acromios (*Eupelops*)
acromios (*Eupelops*)
acromios (*Eupelops*)
acruciata (*Eremaeus*) (=hepaticus)
actirostrata (*Medioxyoppia*)
aculeata (*Metabelbella*)
aculeata (*Crotonia*)
aculeatsetae (*Neoliodes*) hawaiiensis
aculeatus [*N. (Calyptophthiracarus)*] (=bruneiensis)
aculeatus (*Notophthiracarus*)
aculeatus [*N. (Protophthiracarus)*]
aculeatus [*S. (Oxyschelorbates)*]
acuminata (*Ceratoppia*) Koch, 1841 (=bipilis)
acuminata (*Ceratoppia*) Gol., 1981
acuminata (*Ceratoppia*) Gol., 1981
acuminata (*Lauroppia*) *maritima*
acuminata (*Lauroppia*) *maritima*
acuminata (*Oribatula*)
acuminatus [*P. (Archiphthiracarus)*]
acuminatus [*L. (Rhaphidosus)*]
acuminatus [*L. (Rhaphidosus)*]
acuspidatus (*Mycobates*)
acuspidatus (*Planoristes*)
acuta (*Achipteria*) (=nitens)
acuta (*Anachipteria*)
acuta (*Beckiella*)
acuta (*Graptoppia*) *sundensis*
acuta (*Gymnodampia*)
acuta (*Hafenrefferia*)
acuta (*Hafenrefferia*)
acuta (*Karenella*)
acuta (*Medioxyoppia*)
acuta (*Moritzoppia*)
acuta (*Suctobelbella*)
acuticlava (*Schelorbates*) *praeincisus*
acutidens [*L. (Dorycranosus)*]
acutidens [*L. (Dorycranosus)*]
acutidens [*L. (Dorycranosus)*]
acutidens (*Suctobelbella*)
acutidens (*Suctobelbella*)
acutidens (*Suctobelbella*)
acutifrons (*Galumna*)
acutinotata (*Paraphauloppia*)
acutipes (*Separatoppia*)
acutirostris [*Z. (Protozetomimus)*]
acutirostris (*Rhinoppia*) (=ordunensis)
acutirostris (*Schelorbates*)
acutirostris (*Unguizetes*)
acutirostrum (*Galumna*)
acutirostrum (*Lepidozetes*)
acutirostrum [*L. (Mancoribates)*]
acutirostrum (*Orbiculobates*)
acutirostrum (*Samoabates*)
acutirostrum (*Schelorbates*)
acutisetosa (*Nanhermannia*)
acutissima [*S. (Flagrosuctobelba)*] *sp. inq.*
acutissimus (*Totobates*)
acutodentata [*S. (Ussuribata)*]
acutus (*Cavernocephus*)
acutus [*L. (Dorycranosus)*]
acutus (*Eremaeozetes*)
acutus (*Eurhynchoribates*)
acutus (*Grypoceramerus*)
acutus (*Peloribates*)
acutus (*Peloribates*)
acutus (*Tectocephus*)

acutus [P. (Trianguis)]
acutus [E. (Trischelorbates)]
 adami (Eremulus)
adamsoni (Nesiotizetes)
 adanata [N. (Confinoppia)]
 adansonii (Microzetes)
adareata (Pilogalumna) (=ornatula)
adauriculata (Oppiella) (=nova)
 adelaie (Xenillus)
 adelaidae (Oribella)
 adelaidae [S. (Tropacarus)]
 adilatatus [T. (Cristonothrus)]
 adjacens (Aeroppia)
adjacens (Aeroppia)
 adjacentis (Arthrophophora)
 adjarica (Acrogalumna) longipluma
 adjecta (Phauloppia)
adjuncta (Lanceoppia)
 adminensis (Licnoliodes)
admirabilis [N. (Protophthiracarus)]
admirabilis [N. (Steganacarellus)] (=obsessus)
 adpressus (Gymnodamaeus)
 adpressus (Gymnodamaeus)
aduncatus [R. (Mantigueracarus)]
aduncus (Hoplophthiracarus)
 aegra (Pergalumna)
 aegra (Pergalumna)
 aegrota (Belba)
 aegyptiaca (Anachipteria)
aegyptiaca (Oppiella) (=nova)
 aegyptiacus (Eobranchycthonius)
 aegyptica (Epilohmannia) minuta
 aegyptica (Galumna)
 aegyptica [O. (Zygoribatula)]
 aegypticus (Acaroceras)
 aegypticus [P. (Archiphthiracarus)]
 aegypticus (Berlesezetes)
 aegypticus (Lamellobates) molecula
 aegypticus (Rostrozetes) *sp. inq.*
aelleni (Ceratozetes) (=gracilis)
 aelleni (Fijibates)
aelleni [S. (Guatemalozetes)]
aelleni (Neoamerioppia)
 aelleni (Strinatocarus)
 aenigmaticus (Xenilloides)
aenus [P. (Neophthiracarus)]
 aeoliana (Berniniella)
 aeoliana (Mongaillardia)
 aepyornis [R. (Insculptoppiella)]
 aequalis (Euphthiracarus)
 aequalis (Euphthiracarus)
 aequalis (Melanozetes) *sp. inq.*
 aequalis (Papillacarus)
aequalis (Pergalumna)
aequalis (Schelorbates)
aequalis [O. (Zygoribatula)] (?=arcuatissima)
 aequidentatus [L. (Dorycranosus)]
 aequiporosa (Pergalumna)
aequipunctatus (Euphthiracarus) (=monodactylus)
 aequiseta (Ramonoppia)
 aequivoca (Arcoppia)
 aethes [P. (Archiphthiracarus)]
 aethes (Hoplophorella)
 aethes [N. (Steganacarellus)]
 aethiopica (Basilobelba)
 aethiopica (Gustavia)
 aethiopica (Neogalumna)

aethiopicus (Dolicheremaeus)
 aethiopicus (Schelorbates)
 aethiopicus (Schelorbates)
 aethiopicus [P. (Trianguis)]
 aethiopicus [A. (Uluguroides)]
affinis (Acrotitia) (=americana)
 affinis (Carabodes)
 affinis [D. (Epidamaeus)]
affinis (Eupelops) (=uraceus)
 affinis [S. (Flagrosuctobelba)]
 affinis (Mochlobates)
affinis (Oribatula) (=tibialis)
 affinis (Phthiracarus)
 affinis (*Sphaerozetes*) *sp. inq.*
 africana (Archeremella)
 africana (Basilobelba)
 africana (Beckiella)
 africana (Beklemishevia)
 africana (Eremella)
 africana (Galumnopsis)
 africana (Heterobelba)
africana (Hoplophorella) (=vitrina)
 africana (Indotritia)
africana (Lasiobelba) (=pori)
africana (Machuella) (=draconis)
 africana (Mesoplophora)
 africana (Neoamerioppia)
africana (Neoamerioppia)
 africana (Notogalumna)
 africana (Oribotritia)
 africana (Pedrocortesella)
 africana [H. (Phyllhermannia)]
 africana (Protoribotritia)
africana (Prototritia) (=armadillo)
 africana (Senoribula)
 africana (Separatoppia)
 africana [G. (Stenoppia)]
 africana (Szentivanyella)
 africana (Topalia)
 africana (Trichogalumna)
 africanus (Aleurodamaeus)
 africanus (Allozetes)
 africanus (Allozetes)
 africanus (Annectacarus)
 africanus (Annectacarus)
africanus (Berlesezetes) (=ornatissimus)
 africanus (Brachycthonius) *sp. inq.*
 africanus (Dolicheremaeus)
 africanus (Eohypochthonius)
 africanus (Eremulus) *sp. inq.*
africanus (Fosseremus) (=laciniatus)
 africanus (Gibbicepheus)
africanus (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
 africanus (Humerobates)
 africanus (Hypovortex)
 africanus (Liochthonius)
 africanus (Mahunkazetes)
 africanus (Melanozetes)
 africanus (Meristacarus)
 africanus (Micreremus)
 africanus (Neoeutegaeus)
 africanus (Parhypochthonius) *sp. inq.*
 africanus (Passalozetes)
 africanus (Passalozetes)
 africanus (Pheroliodes)
 africanus (Pilizetes)
 africanus (Plakoribates)

- africanus** (*Plasmobates*) *sp. inq.*
africanus (*Plenotocephus*)
africanus [E. (Pocsia)]
africanus (*Podoribates*) *javensis*
africanus (*Rostrozetes*) *sp. inq.*
africanus (*Scheloribates*) *fimbriatus*
africanus (*Scheloribates*) *fimbriatus*
africanus (*Tegeocranellus*) (=knysnaensis)
africanus (*Trhypochthonius*) *sp. inq.*
africanus [A. (*Trichacaroceras*)]
africanus [M. (*Trimalaconothrus*)] *sp. inq.*
africanus (*Uracrobates*)
afrominusculus [C. (*Klapperiches*)]
afromontanensis (*Oribotritia*)
afrum [N. (*Perezinigokalumna*)]
agalawatta (*Austrocarabodes*)
agartalensis (*Cosmochthonius*)
agathis (*Condylobelba*)
agathis [N. (*Leptosuctobelba*)]
agaveae [O. (*Zygoribatula*)]
agenjoi [C. (*Klapperiches*)]
agenjoi (*Parachipteria*)
agerus (*Spinotocephus*)
aggenitalis (*Euphthiracarus*)
aggenitalis (*Polillozetes*)
agilis (*Scheloribates*) (=pallidulus)
agressor (*Austrocarabodes*)
agressor (*Sagittazetes*)
agricola [D. (*Cylindroppia*)] (=cylindrica)
agricola (*Passalozetes*)
agricola (*Transoribates*)
agricola (*Transoribates*)
agricola (*Transoribates*)
agricolus (*Scheloribates*)
agrosticula (*Joshuella*)
agueroi (*Galumna*)
agulhasensis (*Notophthiracarus*)
agusana (*Magyaria*)
agusanensis [M. (*Cristonothrus*)]
agusanensis [S. (*Perscheloribates*)]
agusanus (*Dolicheremabodes*)
ahumerata [G. (*Monophauloppia*)] (=hispanica)
ainu (*Damaeus*)
aitu [P. (*Archiphthiracarus*)]
akhtyamovi (*Banksinoma*)
akidosus [X. (*Stonyxenillus*)]
akimovi [P. (*Vepracarus*)]
akitaensis (*Nothrus*)
akitaensis (*Pergalumna*)
akkeshi [L. (*Dorycranosus*)] *chiebunensis*
akramii [A. (*Rhaphigneta*)]
akusiensis (*Uroppia*)
akusiensis (*Uroppia*)
alachua [D. (*Epidamaeus*)] (=floridus)
alajuela (*Oribotritia*)
alamellae (*Allogalumna*) (=parva)
alamellata (*Ramusella*) (=clavipectinata)
alami [O. (*Multoribatella*)]
alandalusica (*Iberogalumnella*)
alas (*Allozetes*)
alas (*Tegeocranellus*)
alaskensis (*Holohmannia*)
alaskensis (*Maerkelotritia*) (=kishidai)
alaskensis (*Peloribates*)
alaskensis (*Propelops*)
alata (*Galumna*)
alata (*Galumna*)
alata (*Galumna*)
alata (*Galumna*)
alata [R. (*Insculptoppia*)]
alata (*Liebstadia*) (?=microptera)
alata (*Oribatula*) (=caliptera)
alata (*Oripoda*)
alata (*Pilogalumna*) (?=tenuiclava)
alatus [L. (*Dorycranosus*)] (=splendens)
alatus (*Ikarotocephus*)
alatus (*Neoliodes*)
alatus (*Peloribates*) (=glaber)
alatus (*Phyllozetes*)
alatus (*Tectocephus*)
alazon (*Euphthiracarus*)
albialatus [S. (*Perscheloribates*)]
albialatus [S. (*Perscheloribates*)]
albidus (*Austrocarabodes*)
albidus [I. (*Haplozetes*)]
albomaculata (*Trichogalumna*)
alborzi (*Anomaloppia*)
albulus (*Maculobates*)
albulus [M. (*Trimalaconothrus*)] (=obsessus)
albulus (*Tyrphonothrus*)
albulus (*Tyrphonothrus*)
alcecampestris (*Tectoribates*)
alces (*Berlesezetes*)
alces (*Ramusella*) (=clavipectinata)
aleinikovae [D. (*Epidamaeus*)]
alejnicovae [R. (*Insculptoppia*)]
alestensis (*Licnobelba*) (=latiflabellata)
alexandrinae (*Scheloribates*)
alfonsii [R. (*Insculptoppiella*)]
algarvensis [T. (*Latilamellobates*)]
algarvensis [S. (*Perscheloribates*)]
algicola (*Tripiloppia*)
alidagiensis (*Rhinoppia*)
aliena (*Suctobelba*)
alienus (*Damaeus*) (=riparius)
alienus (*Notophthiracarus*) Niedb., 1989
alienus (*Notophthiracarus*) Niedb., 2017
aligarhiensis (*Lauropia*) (=fallax)
alineata (*Carinogalumna*)
aliquantus [P. (*Archiphthiracarus*)]
alisanicus (*Topobates*)
alisonae (*Scapheremaeus*)
alius (*Liochthonius*)
alius (*Neoribates*) (=pallidus)
aliverdievae (*Hermanniella*)
aliverdievae (*Hermanniella*)
alleganiensis [B. (*Caenobelba*)]
allifera (*Oribatula*) *tibialis* (=caliptera)
allifera (*Pilogalumna*) (=crassiclava)
allmani (*Scapheremaeus*)
allocota (*Oribotritia*)
allocotos (*Indotritia*)
allocotos [P. (*Neophthiracarus*)]
allocotos (*Notophthiracarus*)
alloeasuta [S. (*Flagrosuctobelba*)]
alloeasuta [S. (*Flagrosuctobelba*)]
alluaudi (*Crotonia*)
almagrensensis [M. (*Trimalaconothrus*)]
almagulae (*Cultroribula*)
almeriensis (*Flabellobelba*)
almerodai (*Dolicheremaeus*)

- alpestris [A. (Izuachipteria)]
 alpestris (Liochthonius)
 alpestris [P. (Montizetes)]
 alpestris [P. (Montizetes)]
 alpha (*Allogalumna*)
alpina (Anachipteria) (=shtanchaevae)
alpina (Crotonia)
alpina (Oribatula) (=tibialis)
 alpina (Suctobelbella)
alpina (Tripiloppia)
 alpinus [M. (Calyptozetes)]
alpinus (Chamobates) (=birulai)
 alpinus (Damaeus)
 alpinus (Euphthiracarus) reticulatus
alpinus (Melanozetes) Halb., 15 (=stagnatilis)
 alpinus (Melanozetes) Schweiz., 56 sp. inq.
alpinus (Notophthiracarus) (=sinuosus)
 alpinus (Scutovertex)
 alpinus (Trichoribates)
 altaica [F. (Mexicoppia)]
 altaica (Moritzoppia) myrmophila
 altaica (Perlohmannia)
 altaica (Rhynchobelba)
 altaicus (Diapterobates)
 altaicus (**Ghilarovizetes**)
 altaicus [L. (Procorynetes)]
 altaicus [L. (Procorynetes)]
 altaicus (Trhypochthonius)
 altera (**Ceratoppia**)
 altera (Pergalumna)
 altera (Pergalumna)
altera (Pergalumna)
 altera (Pergalumna)
altera (Pergalumna)
alticola (Dolicheremaeus)
 alticola [D. (Epidamaeus)]
 alticola (*Protozetes*) digitifer
 alticola [L. (*Rhaphidosus*)]
 altimontana (Paraphauloppia)
 altimontana (*Paraphauloppia*)
 altimontanoides (*Paraphauloppia*)
 altimontanus (Areozetes)
 altimontanus (*Areozetes*)
 altimontanus (Diapterobates)
 altimontanus (Diapterobates)
 altimontanus [H. (*Platynothrus*)]
 ?altimonticola (*Liochthonius*)?
altimonticola (Liochthonius)
altimonticola (Liochthonius)
 altimonticola (Podopterotegaeus)
 altiplanicus (*Licneremaeus*)
 altissima (*Microtritia*) (=hauseri)
 altissimus (Diapterobates) variabilis
 altissimus [M. (Trimalaconothrus)]
 altitudinis (Litholestes)
 altitudinis (Litholestes)
altitudinis [S. (*Tropacarus*)] (=desmeti)
 altus [M. (Calyptozetes)]
altus (Liochthonius)
 altus (*Liochthonius*)
 alumbrensis (*Passalozetes*)
 altvateri (Suctobelba)
alvaradoi (Topobates) (=holsaticus)
 alvarezi (Intermedioppia)
 alvarezi (Microtegeus)
 alvarezius (*Scapheremaeus*)
 alveolatus (*Austrocarabodes*)
- alveolatus (Austrocarabodes)
 alveolatus (*Dolicheremaeus*)
 alveolatus (*Scapheremaeus*)
 alviolai (*Dolicheremaeus*)
 alvordensis (*Eueremaeus*)
alzani (Tegoribates) (=latirostris)
 alzueti (*Graptoppia*)
 amabilis [F. (Psammocephus)]
 amamiensis (*Dolicheremaeus*) infrequens
 amamiensis (*Pergalumna*)
 amamiensis (*Trichotocephus*)
 amarpurensis (*Zetorchella*)
 amazonensis [M. (*Perutritia*)]
 amazonensis (*Xenillus*)
 amazonica (*Acropia*)
 amazonica (*Multipulchroppia*)
 amazonicus (*Benoibates*)
 amazonicus (*Dolicheremaeus*)
 amazonicus (*Guaranozetes*)
 amazonicus (*Rhynchoribates*)
 amazonicus (*Spathulocephus*)
 amazonicus (*Xenillus*)
 ambigua (*Dampfiella*)
 ambigua (**Setogalumna**)
 ambiguus [Z. (*Protozetomimus*)]
 ambiguus (*Rhacaplacarus*)
 ambitus (*Lamellocephus*) (=personatus)
 amblyptera (*Oribatula*) tibialis
 amblyptera (*Oribatula*) tibialis
 ambohitra (*Vilhenabates*)
 amboroensis [P. (*Neophthiracarus*)]
 americana (*Acrotritia*) ardua
 americana (*Acrotritia*) ardua
americana (Acrotritia) ardua
 americana (*Acrotritia*) ardua
 americana (*Acrotritia*) ardua
 americana (*Cheloppia*)
 americana (*Crotonia*) sp. inq.
 americana (*Epilohmannia*) (=minuta)
 americana (*Furcoppia*)
 americana (*Joelia*) sp. inq.
 americanus (*Fosseremus*) sp. inq.
 americanus (*Kalyptozetes*)
 americanus (*Peloptulus*)
 americanus (*Peloptulus*)
 americanus (*Peloribates*) sp. inq.
 americanus (*Sellnickochthonius*)
 americanus (*Tectocephus*)
 americanus (*Tegoribates*)
 americanus (*Tegoribates*)
 americanus (*Tegoribates*)
 americanus (*Tegoribates*)
 americanus (*Trhypochthonius*) tectorum
 amica (*Autogneta*)
 amicabilis (*Brachychthonius*)
 amicorum (*Xenillus*)
 amictus (*Camisia*) sp. inq.
amicus [P. (*Archiphthiracarus*)] (=anonymus)
 amicus (*Camisia*) biurus ssp. inq.
 amieae (*Afroleius*)
 ammonoosuci (*Adoristes*)
 amnicus (*Limnozetes*)
 amnicus (*Limnozetes*)
 amoenus (*Rhacaplacarus*)
 amonstruosus (*Pseudotocephus*)
 amonstruosus (*Pseudotocephus*)
 amonstruosus (*Pseudotocephus*)

amorpha (Pergalumna)
amorphus (Africoribates)
 amparoeae (Ramonoppia)
ampla (Allogalumna)
ampla (Oribotritia)
ampliata (Oribotritia)
amplus (Dynatozetes)
 ampulla (Trachyoribates)
ampulla (Trachyoribates)
 amudariensis (Hydrozetes)
 amurica (Suctobelbella)
 amurica (Suctobelbella)
amus (Notophthiracarus)
amygdaliformis (Epilohmannia)
anakolos [N. (Steganacarellus)]
 anakolosus [X. (Stonyxenillus)]
 ananthakrishni [R. (Insculptoppia)]
anarensis (Austroppia) (=crozetensis)
 anarensis (Totobates)
anareolata (Lyroppia)
 anasillus (Xenillus)
 anauniensis (Nothrus)
 anauniensis (Nothrus)
anauniensis (Nothrus)
anauniensis (Nothrus)
anauniensis (Nothrus)
anauniensis (Nothrus)
anceps (Notophthiracarus)
 anceps (Oribotritia)
 anceps (Oribotritia)
anchiseta (Acrotritia) (=vestita)
 ancorhina [S. (Flagrosuctobelba)]
 andalusicabulensis (Paternoppia)
 andamanensis (Notophthiracarus)
andasibe [C. (Klapperiches)]
andasibe (Pergalumna)
andasibensis [P. (Archiphthiracarus)]
 andhraense (Pergalumna)
andicola (Edwardzetes)
andicola (Epiemulus) *granulatus*
andicola (Pergalumna)
andicola (Pergalumna)
andina (Borhidia)
andinus (Liochthonius)
andinus (Pecunculozetes)
andinus (Pedunculozetes)
andinus (Pirnodus)
andinus [L. (Procorynetes)]
andinus [N. (Protophthiracarus)]
andinus (Pseudotocepheus)
andrassyi [N. (Leptosuctobelba)]
andrei (Hoplophorella)
andrei (Hoplophorella)
 andrei (Licnoliodes)
 andrewi (Liochthonius)
 andrianovae [O. (Zygoribatula)]
andulau (Corynoppia)
 andulauensis (Dolicheremaeus)
anellata (Pergalumna)
 angarensis (Proteremaeus)
angelae (Aleurodamaeus)
 angelus (Pterochthonius)
 angelus (Pterochthonius)
 angelus (Pterochthonius)
angelus (Pterochthonius)
 angelus (Pterochthonius)
anglica (Achipteria) (=nitens)
angolensis (Basidoppia)
angolensis (Hoplophorella)
angolensis (Lamellobates) (=molecula)
angolensis [M. (Neobelba)] (?=glabriseta)
 angolensis (Nothrus) *sp. inq.*
angolensis (Oripoda)
angolensis (Phthiracarus) (=lentulus)
angolensis (Tegeozetes) *sp. inq.*
anguina (Oripoda)
angularis (Galumna)
angulata (Camisia) (=amicus)
 angulata (Cultroribula)
 angulata (Nanhermannia)
angulata [H. (Phyllhermannia)]
 angulata (Suctobelbella)
angulata [O. (Zygoribatula)] (=glabra)
angulatus (Austrocarabodes) *sp. inq.*
angulatus (Chamobates) (?=confusus)
 angulatus (Cosmopirnodus)
 angulatus [D. (Epidamaeus)]
angulatus (Malaconothrus)
 angulatus (Papillacarus)
angulatus (Papillacarus)
angulatus (Papillacarus)
angulatus (Papillacarus)
 angulatus (Peloribates)
 angulatus (Protoribates)
 angulatus (Punctoribates)
angulatus [S. (Rafacarus)]
 angulatus (Scheloribates) Will., 31
angulatus (Scheloribates) Ham., 58 (=willmanni)
angulatus (Tectocephus) (=sarekensis)
 angulatus (Trichoribates)
 angulatus (Tyrphonostrus)
 angulatus [M. (Trimalaconothrus)]
angulifer (Rostrozetes)
 angulosa (Oribatella)
angusi (Scapheremaeus)
angusta (Dampfella)
 angusta (Oribotritia)
angusta [G. (Stenoppia)]
 angustatus [L. (Dorycranosus)]
angustatus (Hoplophthiracarus)
 angustatus (Trichoribates)
angustifrons (Galumnella) (=nipponica)
angustior (Protoribates) (=capucinus)
 angustipes (Damaeus)
 angustirostratus [D. (Epidamaeus)]
 angustirostris (Scheloribates) laevigatus
angustirostrum (Tyrphonostrus)
angustirostrum (Tyrphonostrus)
angustissimus [T. (Latilamellobates)] (=latilamellatus)
 angustolamellata (Oribatula)
angustopili (Setoppia)
angustus [N. (Besuchetacarus)]
 angustus (Ceratozetes)
 angustus (Fuscozetes)
 angustus (Leptotocepheus)
angustus (Neseutegaeus)
 angustus (Scheloribates)
 angustus (Scheloribates)
angustus (Scheloribates)
anica (Pedrocortesella)
anichkini (Eremaeus)
 anjavidilavai (Afticarabodes)
 ankae (Pseudoamerioppia)
 ankaraensis (Epimerella)

ankaratra (Galumna)
 annamariae (Tereticepheus)
anneae (Bedoslohmannia)
annobonensis (Meristacarus) africanus
annobonensis (Meristacarus) africanus
annobonica (Magyaria)
annulata (Fenestrobella)
annulata (Granuloteratoppia)
annulata (Pergalumna)
annulus (Haplamerus)
anomala (Liebstadia) (=similis)
anomala (Oripoda)
 anomala (Ramuseltoppia)
anomalooides (Steganacarus) (=magnus)
anomalus (Peloribates) (=decumanus)
 anomalus (Steganacarus) magnus
 anomia (Camisia)
anomola (Oribatella)
 anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
anonymus [P. (Archiphthiracarus)]
 anonymus (Sellnickochthonius)
anoporosus (Tecteremaes)
 anoporosus (Zachvatkinibates)
anosculpturata (Hoplophorella)
anouchkae (Cavaecarabodes)
ansata (Camisia) (=spiniifer)
ansifera (Geminoppia)
antalata (Galumna) sp. inq.
antarcticus (Alaskozetes)
antarcticus (Alaskozetes)
antarcticus (Haplochthonius)
antarcticus (Magellozetes)
antarcticus (Magellozetes)
antarcticus (Totobates)
antarcticus (Totobates)
antennata (Setoppia)
 antennatus (Atropacarus)
antenniger (Neogalumna)
anteriorugosus (Scapheremaes)
anteriosetosus (Plateremaes)
 anterostratus (Fijibates)
antetriheterodactyla (Acrotritia) (=ardua)
 anthelionus (Sphdrocepheus)
antichthon [P. (Baloghates)]
antiguaensis (Benoiabates)
antiguaensis (Galumna)
antillensis (Acroppia)
antillensis (Allogalumna)
antillensis (Licneremaes) (=discoidalis)
antillensis [O. (Oxyoppiella)]
 antillensis (Protoribates)
antillensis (Protoribates)
 antipai (Euphthiracarus)
 antis (Eremulus)
 antonii (**Eulohmannia**) sp. inq.
antonioberleseii (Galumna) sp. inq.
antrosus (Atropacarus)
antsiranana (Lemurobates)
anufrievi (Pilizetes)
 anulatus (Leobodes)
anulatus (Leobodes)
 anuncata [R. (Insculptoppia)]
anzacensis (Schelorbates)

aokii (Acrotritia)
aokii (Acrotritia)
aokii (Annectacarus)
aokii (Apoplophora)
aokii (Autogneta)
 aokii (Ceratozetella)
aokii (Dolicheremaes)
 aokii [D. (Epidamaeus)]
 aokii (Eremaeozetes)
 aokii [S. (Flagrosuctobelba)]
aokii (Gibbicepheus)
 aokii [L. (Incabates)]
aokii (Megalotocepheus)
aokii (Notophthiracarus)
aokii (Oribotritia)
aokii (Oxyamerus)
aokii (Oxyamerus)
 aokii (Pergalumna)
aokii [N. (Protophthiracarus)]
aokii (Pseudotocepheus)
 aokii (Sellnickochthonius)
 aokii (Symbioribates)
 aokii (Trichoribates)
aokii (Tripiloppia)
aokii (Yoshiobodes) (=irmavi)
 aokii (Zetorchestes)
aokii (Zetorchestes)
aokii (Zetorchestes)
 aominensis (Gustavia)
 aomoriensis (Suctobelbata)
aotearoana [L. (Zeaotritia)]
aoutii (Phyllochthonius)
 apathyi (Chamobates) sp. inq.
 apatomorpha (Ctenobelba)
apenninicus [T. (Latilamellobates)] (=incisellus)
 aperta [S. (Dividoppia)]
aphelesa (Metabelba)
 aphidinus (Parhypochthonius)
aphidinus (Parhypochthonius)
aphidinus (Parhypochthonius)
aphidinus (Parhypochthonius)
aphidinus (Parhypochthonius)
 apicalis (Epiereumus) sp. inq.
apicalis (Eupelops)
apicalis (Oppiella) (=nova)
apiculata (Galumnella)
apiculatus (Phthiracarus) (=longulus)
apletosa (Lucoppia) (=burrowsi)
apoensis (Indoribates) (=punctulatus)
 apophysiger (Heminothrus)
 appalachia (Joelia)
 appalachicola (Berlesezetes) ornatissimus
appalachicola (Berlesezetes) ornatissimus
 appalachicola (Rostrozetes) ovulum ssp. inq.
 appalachicus (Damaeus)
 appalachicus (Eremaeus)
appalachicus (Palaeacarus) (=hystricinus)
 applicatus (Steganacarus)
apressala (Galumna)
approximata (Suctobelbila)
approximatus (Eupelops) (=plicatus)
 approximatus (Liochthonius)
aprofundata (Jacotella) (?=glabra)
 apuanicus (Carabodes)
 apunctatus (Licnoliodes)
aquarium (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
aquatica (Pseudantarctica)

- aquaticus* (*Heterozetes*)
***aquaticus* (*Heterozetes*)**
aquaticus (*Mainothrus*)
aquatilis (*Tyrphonothus*)
aquilinus (*Eurostocephus*)
***aquilus* (*Notophthiracarus*)**
arabia (*Oribatella*) *sp. inq.*
arabica (*Fortuynia*)
arabica (*Galumna*)
***arabica* (*Lasiobelba*) (=pori)**
arabica (*Pilogalumna*)
***arabica* (*Pilogalumna*)**
***arabicus* (*Eremulus*)**
aragonensis (*Hispanozetes*)
***araios* (*Notophthiracarus*)**
araneola (*Ctenacarus*)
araneola (*Ctenacarus*)
***araneola* (*Ctenacarus*)**
araneola (*Ctenacarus*)
***araneola* (*Ctenacarus*)**
araneola (*Ctenacarus*)
***araneola* (*Ctenacarus*)**
araucanus (*Eremaezetes*)
araucariae (*Oripoda*)
araujoi (*Neogalumna*)
***arborea* (*Arcoppia*)**
arborea (*Pergalumna*)
arborea (*Trichogalumna*)
arboreus (*Afronothrus*)
arboreus (*Eremaezetes*)
***arboreus* (*Humerobates*) (?=rostromellatus)**
arboreus (*Scapheremaeus*)
***arboreus* [A. (*Uluguroides*)]**
***arboricola* (*Brassiella*)**
arboricola (*Oribatula*)
***arboriseta* [P. (*Vepracarus*)] (=hirsutus)**
arcana (*Suctobelbella*)
arcana (*Suctobelbella*)
***arcanus* (*Scutoverticosus*)**
***archicostulata* [L. (*Bicristoppia*)]**
arcidiaconoae (*Lasiobelba*)
arcidiaconoae (*Lasiobelba*)
***arcta* (*Beckiella*)**
***arctata* (*Acrotritia*) (=ardua)**
***arctica* (*Ceratoppia*) (=quadridentata)**
arctica (*Cultroribula*)
arctica (*Oribatella*)
arctica (*Oribatella*)
arctica (*Pyroppia*)
arctica [D. (*Epidamaeus*)]
arctica [D. (*Epidamaeus*)]
arcticus [L. (*Dorycranosus*)] Banks, 1898 *sp. inq.*
***arcticus* [L. (*Dorycranosus*)] Gri., 1984 (=neonominatus)**
arcticus [D. (*Kunstidamaeus*)]
arcticus [P. (*Montizetes*)]
***arcticus* (*Sellnickochthonius*) (=immaculatus)**
arcticus (*Sphaerozetes*)
arcticus (*Sphaerozetes*)
***arctosus* (*Cosmochthonius*) (=lanatus)**
arcualis (*Arcoppia*)
***arcualis* (*Conozetes*)**
arcualis (*Hypovertex*)
arcualis (*Hypovertex*)
***arcuata* (*Anomaloppia*)**
***arcuata* (*Banksinoma*)**
***arcuata* (*Camisia*)**
arcuata [S. (*Flagrosuctobelba*)]
arcuata (*Micropia*)
- arcuata* (*Ramusella*)**
***arcuata* (*Suctobelbata*)**
arcuata [O. (*Zygoribatula*)]
arcuatissima [O. (*Zygoribatula*)]
***arcuatus* (*Scapheremaeus*)**
***arcuatus* (*Yambaramerus*)**
***arcuatus* (*Yoshiobodes*)**
***ardala* (*Crotonia*)**
ardua (*Acrotritia*)
ardua (*Acrotritia*)
***ardua* (*Acrotritia*)**
ardua (*Acrotritia*)
***ardua* (*Acrotritia*)**
ardua (*Acrotritia*)
***ardua* (*Acrotritia*)**
***ardua* (*Lamellarea*)**
***ardua* [T. (*Teratoppiella*)]**
arduinii (*Carabodes*)
arduus [L. (*Dorycranosus*)]
arenaria (*Graptoppia*)
arenarius (*Berlesezetes*)
arenocolus (*Scutovertex*)
***areolata* [G. (*Angulogalumna*)] (=starvi)**
areolata (*Epilohmannia*) *minuta*
***areolata* (*Galumnella*)**
***areolata* (*Nanhermannia*) (=elegantula)**
areolata [H. (*Phyllhermannia*)]
***areolata* (*Pilogalumna*) (=tenuiclava)**
areolatus (*Carabodes*)
areolatus (*Carabodes*)
***areolatus* (*Eueremaeus*) (=intermedius)**
areolatus (*Papillocephus*)
areolatus (*Reticulocephus*)
***areolatus* (*Rostrozetes*) (=ovulum)**
***areolatus* [H. (*Tuberemaeus*)]**
areolata [F. (*Cosmogalumna*)]
***argentinensis* (*Cultroribula*)**
***argentinensis* (*Eobrachychthonius*) (=oudemansi)**
argentinensis [L. (*Paralamellobates*)]
argentinensis [M. (*Pravoppia*)]
argentinensis (*Scapheremaeus*)
argentinensis (*Tenuelamellarea*)
argentinensis (*Xenillus*)
***argentinensis* (*Zetomimus*) (=furcatus)**
aridulus (*Eueremaeus*)
aridus (*Ametroproctus*)
arifi (*Paralopheremaeus*) *hispanicus*
***arilloi* (*Euphthiracarus*)**
arilloi [S. (*Flagrosuctobelba*)] *diversosetosa*
arilloi (*Rhinoppia*)
arilloi (*Xenillus*)
aristosa (*Hermanniella*)
aristosa (*Hermanniella*)
***aristosa* (*Hermanniella*)**
***armadillo* (*Prototritia*)**
armata (*Achipteria*)
***armata* [S. (*Dyobelba*)]**
***armata* [N. (*Leptosuctobelba*)]**
armata [P. (*Tectodamaeus*)]
***armata* [P. (*Tectodamaeus*)]**
***armatifera* (*Galumna*)**
***armata* (*Hoplophorella*)**
***armatus* (*Austrocarabodes*)**
armatus (*Ceratozetes*)
armatus (*Cuspidozetes*)
armatus (*Edwardzetes*)

armatus (Eupterotegaeus)
 armatus (Eupterotegaeus)
 armatus (Suctobelbiloides)
 armatus (Vermacarus)
 armazi (Scutovertex)
 armenicus (Ghilarovus)
armipes [P. (Minguezetes)] (=palustris)
 arnoldii (Diapterobates)
 arnoldii (Thamnacarus) *sp. inq.*
 arotroventer (Selenoribates)
arrecta (Hermannella) (=picea)
 arrogans (Austrocarabodes)
 arrugata (Galumna)
 articrostata (Lauropia)
artifex (Schelorbates) (?=fimbriatus)
 artigasi (Schelorbates)
 artillamellatus (Podoribates)
 artiodactylus (Atopochthonius)
 artiodactylus (Atopochthonius)
 artiodactylus (Atopochthonius)
artus (Holonothrus)
 artus (Holonothrus)
 artvinensis (Rhinoppia)
 arvernensis (Damaeus)
 asagiriensis (Eremobelba)
 ascendens (Schelorbates)
 ascissuratus (Scapheremaeus)
 asculpturatus (Mochlozetes)
 asejugalus (Peloribates)
 asensillata [M. (Perutritia)]
 aseta (Pletzenoppia)
 asetosa (Allogalumna)
 asetosa (Cycloppia)
 asetosa (Pergalumna)
 asetosa (Pseudoceratoppia)
 asetosus [L. (Nacunansella)]
 ashizuriensis (Malaconothrus)
 ashoroensis (Nothrus)
 ashoroensis (Trhypochthoniellus)
 asiatica [G. (Angulogalumna)]
 asiatica (Collohmanna)
asiatica (Cryptoplophora) (=abscondita)
 asiatica (Neoamerioppia)
 asiatica (Neoamerioppia)
 asiatica (Oribatella)
 asiatica (Oribotritia)
 asiatica (Oribotritia)
 asiatica (Paraceratoppia)
 asiatica [D. (Rykkella)]
 asiatica (Striatoppia)
 asiaticus (Cosmochthonius)
 asiaticus [T. (Cristonothrus)]
 asiaticus (Eohypochthonius)
 asiaticus (Microtegeus)
 asiaticus (Microzetes)
 asiaticus (Neogymnobates) luteus
 asiaticus (Nothrus)
 asiaticus (Nothrus)
 asiaticus (Parhypochthonius)
 asiaticus (Peloribates) rangiroaensis
 asiaticus (Peloribates) rangiroaensis
 asiaticus (Plakoribates)
 asiaticus (Plasmobates)
 asiaticus (Plasmobates)
 asiaticus (Truncopes) optatus
 asiaticus [H. (Tuberemaeus)]
 asiaticus (Unguizetes)

asinus [K. (Niosuctobelba)]
 askewi (Terratritia)
 asmodaeus (Selenoribates)
asothalomensis (Liochthonius) (=evansi)
 asper (Liochthonius)
 asper (Liochthonius)
 asper (Liochthonius)
 asper [B. (Passalobates)]
aspera (Indotritia) (=undulata)
 asperatus (Damaeolus)
 asperatus (Damaeolus)
 aspergillus [S. (Rafacarus)]
 asperula (Phauloppia) (=lucorum)
 asperula (Zetorchella) *sp. inq.*
 asperulus (Gymnodamaeus) (=bicastatus)
 aspidioti (Scapheremaeus) (=ovivorus)
 assamensis (Cosmochthonius)
 assamensis [T. (Cristonothrus)]
 assamica (Malacoangelia)
assimilis [P. (Archiphthiracarus)] (=montanus)
assimilis (Ramusella) (=clavipectinata)
 assimiloides (Ramusella)
 astatus (Papillochthonius)
 astrachanicus [P. (Semipunctoribates)]
 asymmetrica (Aeroppia)
 asymmetricus (Microzetes)
 asymmetricus (Pseudotocepheus)
 atahualpensis (Schelorbates)
 atavisticus (Comorozetes)
 ater (Notophthiracarus)
 aterrimus (Euzetes) (?=globulus)
 atthesis (Xenillus)
 atimonensis (Basilobelba)
 atlantica (Fortuynia)
 atlantica [L. (Incabates)]
 atlantica (Magyaria)
 atlantica (Metrioppia) *sp. inq.*
 atlanticus [P. (Archiphthiracarus)]
atlanticus (Damaeus) (=australis)
 atlanticus (Schelorbates) praecinctus
 atmetos (Limnozetes)
 atolanaro (Pseudotocepheus)
 atomaria (Galumna)
 atomaria (Suctobelba)
atomus (Minunthozetes) (?=tarmani)
atra (Pilogalumna) (=tenuiclava)
 atractus (Mesotritia)
 atraktus (Liacarus)
atratus [P. (Archiphthiracarus)]
 atrichosus [C. (Klapperiches)]
 attenuata (Oribotritia)
 attenuata (Oripoda)
 attenuatus (Dolicheremaeus)
 attenuatus (Liochthonius)
 atuelanus [T. (Cristonothrus)]
atypica (Hoplophorella) (=inelegans)
 atypica (Ramuloppia) ramiseta
 atypica (Trichogalumna)
 atypicus [S. (Guatemalozetes)]
 atypicus (Huilicheremaeus)
 atypicus (Mochlozetes)
 auberti (Podacarus)
 auburnensis (Tyrphonostrus)
 augusta (Pedrocortesella)
 aulicis (Notophthiracarus)
 aurantiacus (Neoribates)
 aurantiacus (Neoribates)

aurantiacus (Neoribates)
 aurata (Belba)
 auratus (Saxicolestes)
 aureonotata [G. (Tauroplophora)]
 aureopunctatus (Malaconothrus)
aureopunctatus (Malaconothrus)
aureus (Campbellobates)
aureus [P. (Neophthiracarus)]
 auriculata (Oripoda)
 auriculatus (Anellozetes)
 auriculatus (Carabodes)
 auriculus (Trichocephalus)
aurita (Hafenrefferia) (=gilvipes)
 auritus (Damaeus)
 auritus (Dolicheremaeus)
auritus (Eupelops) (=plicatus)
australianicus [P. (Neophthiracarus)]
australia (Epilohmannia) minuta
australicus (Cosmochthonius)
australiensis (Anderemaeus)
 australis (Africoribates)
 australis (Aleurodamaeus)
australis (Anachipteria) (=signata)
 australis [P. (Archiphthiracarus)]
 australis (Austrocarabodes)
 australis (Baloghacarus)
 australis (Camisia)
australis [L. (Convergoppia)]
 australis (Damaeus)
 australis (Damaeus)
 australis (Edwardzetes)
 australis (Eremulus)
 australis (Galumna)
 australis (Gymnodampia)
 australis (Gymnodampia)
 australis (Liochthonius)
 australis (Longocephalus)
 australis (Mesotritia)
 australis (Multioppia)
 australis (Nesiacarus)
australis (Notophthiracarus)
 australis (Oripoda) Berl., 16
australis (Oripoda) B. y M., 68 (=cordobensis)
australis (Paraphauloppia)
 australis (Paraphauloppia)
 australis (Pergalumna)
 australis (Pergalumna)
 australis (Pheroliodes)
 australis (Pheroliodes)
 australis (Pilizetes)
 australis (Pseudotocephalus)
 australis (Similochthonius)
 australis (Solenozetes)
 australis (Tyrphonothrus)
 australoides (Anachipteria) achipteroides ssp. inq.
 austriaca (Jacotella)
austriaca (Liebstadia) (=pannonica)
 austroafricanus (Notophthiracarus)
 austroafricanus (Trichonothrus)
 austroamericana (Monofurcoppia)
 austroamericanus [M. (Calyptozetes)]
 austroamericanus [M. (Calyptozetes)]
 austroamericanus (Gibbicephus)
 austroamericanus (Trichoribates)
auxiliaris (Berlesezetes) (=ornatissimus)
 avachai (Melanozetes)
 aveiroensis (Punctoribates)

avenifer (Eremulus)
avenifer (Eremulus)
 avenifer (Eremulus)
avenifer (Eremulus)
aveniferus (Zetomimus) (?=furcartus)
 avicula (Oribatella)
 aviger (Hypozetes)
 aysineep (Eueremaeus)
 ayyildizi (Ctenobelba)
azaisi (Rhynchoppia)
 azaleos [M. (Calyptozetes)]
 azarbaijaniensis (Arborichthonius)
azerbeidjanica (Berniniella) (?=silvatica)
azerbeidjanica (Oribatula) (=tibialis)
 azizia (Oribatella) sp. inq.
 azureana (Galumna)
 azorensis (Nothrus) palustris
 azorensis (Steganacarus) hirsutus
 azorensis (Xenillus) discrepans
 azoricus (Carabodes)
 azoricus (Melanozetes)
 azoricus (Pilocephus)
 azovicus (Scheloribates)
 azumaensis (Scheloribates)
 azumaensis [M. (Trimalaconothrus)]
 azumai (Dimidiogalumna)
azumai (Dimidiogalumna)
babalus (Basiceramerus)
 baburini (Oppiella)
 baccanensis (Gibbicephus)
 baccettii (Licnodamaeus)
bacilla (Mesoplophora)
bacillatus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
 bacillatus [L. (Rhaphidosus)]
bacillifera (Schalleria)
bacilliger (Austrocarabodes)
bacilliger (Pseudotocephus)
bacilligera (Aethioppia)
bacilligera (Arcoppia)
 bacilliseta [M. (Hammeroppia)]
 bacilliseta (Nothrus)
 bacillum (Damaeus) sp. inq.
bacillum [D. (Epidamaeus)] (=fujikawae)
backstroemi (Neoliodes)
bacula (Acrotritia)
bacula [M. (Parplophora)]
baculifera [N. (Leptosuctobelba)]
baculus (Hoplophthiracarus)
 baculus (Notophthiracarus)
badamdorji [P. (Porallozetes)]
 badensis [N. (Amerigloboppia)]
badensis (Liebstadia) (=longior)
baderi [B. (Gressittoppia)]
 baderi (Suctobelbila)
baderi (Xenillus) (=discrepans)
 badghysi [L. (Rhaphidosus)]
badia (Ceratoppia) (=bipilis)
 badius (Mainothrus)
 badius (Mainothrus)
 badius (Scheloribates)
 baetica (Lauropia)
baggioi [R. (Mantigueracarus)]
baggioi (Xenillus)
 bagnalli [R. (Insculptoppia)] sp. inq.
 bagnalli (Oribotritia) sp. inq.
 baguioensis (Dolicheremaeus)
bah (Notophthiracarus)

- bahamensis* [D. (*Epidamaeus*)]**
bahamensis (*Mochloribatula*)
- bahamensis* (*Mochloribatula*)**
 baicalica (*Zachvatkinella*)
 baichengensis (*Ramusella*)
 baikalica (*Oribotritia*)
 bajartogtokhi (*Hypovortex*)
 bajau [O. (*Acrotocepheus*)]
 bakeri [D. (*Epidamaeus*)]
bakeri [D. (*Epidamaeus*)]
 bako (*Pasocepheus*)
 balakrishnani [G. (*Indogalumna*)]
- balazsi* (*Eremobelba*)**
***balazsi* [H. (*Kakophthiracarus*)]**
balazsi (*Scapheremaeus*)
***balazsi* (*Scapheremaeus*)**
 balcanicus [S. (*Tropacarus*)]
 balearica (*Pseudoamerioppia*)
 balearicus [S. (*Tropacarus*)]
***baleensis* (*Achipteria*)**
***baleensis* (*Ceratozetes*)**
***baleensis* (*Galumnella*)**
baliensis (*Eremulus*)
baliensis [O. (*Oxyoppiella*)]
baliensis [S. (*Ussuribata*)]
 balikous (*Dolicheremaeus*)
 baloghi [P. (*Archiphthiracarus*)] F. y S., 57
***baloghi* [P. (*Archiphthiracarus*)] Mah., 82 (=bulbiferus)**
***baloghi* (*Arcoppia*) (=viperea)**
baloghi (*Arthrovertex*)
baloghi (*Ceratorchestes*)
***baloghi* [E. (*Ceratocepheus*)]**
baloghi (*Dolicheremaeus*)
baloghi (*Dolicheremaeus*)
baloghi [S. (*Flagrosuctobelba*)]
***baloghi* (*Galumna*)**
baloghi (*Hoplophorella*)
baloghi (*Hungarobelba*)
***baloghi* [H. (*Kakophthiracarus*)] (=clavatosensillus)**
***baloghi* [T. (*Latilamellobates*)] (=incisellus)**
baloghi (*Mabulatrichus*)
baloghi (*Machadobelba*)
baloghi (*Microzetes*)
baloghi (*Niphocepheus*) *nivalis*
baloghi* (*Niphocepheus*) *nivalis
***baloghi* (*Nodocepheus*)**
***baloghi* (*Nothrolohmannia*)**
***baloghi* (*Notophthiracarus*) (=janosbaloghi)**
baloghi (*Paratritia*)
***baloghi* (*Pelopsis*)**
***baloghi* (*Polyoppia*)**
***baloghi* [N. (*Protophthiracarus*)] Nied., 87**
***baloghi* [N. (*Protophthiracarus*)] Nied., 87**
***baloghi* [N. (*Protophthiracarus*)] Nied., 04 (=paraandinus)**
baloghi (*Protoribates*) *sp. inq.*
***baloghi* (*Scheloribates*) P. - Í., 82 (=caprai)**
***baloghi* (*Scheloribates*) C. y V., 83 (=neonominatus)**
baloghi (*Striatoppia*)
***baloghi* [T. (*Teratoppiella*)] (=pluripectinata)**
baloghi [P. (*Tripilobatella*)]
baloghi [O. (*Zygoribatula*)]
baloghius (*Scapheremaeus*)
baloghorum (*Cyrthermannia*)
***baloghorum* [P. (*Archiphthiracarus*)] (=bulbiferus)**
baltazarae (*Basilobelba*)
baluktotus [S. (*Perscheloribates*)]
banahawensis [O. (*Acrotocepheus*)]
- bandabanda* [H. (*Phyllhermannia*)]**
 bandae (*Odontocepheus*)
***bangladeshensis* (*Basiceramerus*)**
***banksi* [P. (*Archiphthiracarus*)]**
banksi (*Galumna*) Jac., 29
***banksi* (*Galumna*) (Jac., 29) (=iterata)**
***banksi* [L. (*Lancelalmoppia*)]**
banksi (*Lohmannia*)
***banksi* (*Lohmannia*)**
***banksi* (*Lucoppia*) (=burrowsi)**
banksi (*Oribatella*)
banksi (*Oribotritia*)
***banksi* (*Peloribates*) (=peloptoides)**
banksi [H. (*Platynothrus*)]
***banksi* [H. (*Platynothrus*)]**
***bannisteri* (*Pedrocortesella*)**
***baobab* [H. (*Senilochthonius*)]**
 baranae [O. (*Dzarogneta*)]
***barbara* (*Thalassozetes*)**
***barbarae* (*Adhaezozetes*)**
barbarae (*Tegeocranellus*)
***barbarae* (*Tegeocranellus*)**
 barbarossa, *Gymnodamaeus*
 barbata (*Basilobelba*)
***barbata* (*Beklemishevia*)**
 barbata (*Belba*)
***barbata* (*Hermanniella*) (=septentrionalis)**
***barbata* (*Heterobelba*)**
 barbata (*Machadobelba*)
 barbata (*Oribatella*)
 barbata (*Oxybrachioppia*)
 barbata (*Oxybrachioppia*)
 barbata (*Xiphobelba*)
***barbatis* (*Multioppia*) (?=wilsoni)**
***barbatula* (*Dolicheremaeus*) vilhenarum**
barbatula* (*Epilohmannia*) *sp. inq.
 barbatulus [D. (*Epidamaeus*)]
 barbatulus (*Scheloribates*) Mih., 56
 barbatulus (*Scheloribates*) Mih., 56
***barbatulus* (*Scheloribates*) Mih., 57 (=barbatulus Mih., 56)**
 barbatus (*Costeremus*)
***barbatus* (*Neoribates*)**
barbatus* (*Nodocepheus*) *dentatus
barbatus* (*Nodocepheus*) *dentatus
 barbatus (*Peloribates*)
 barbatus (*Perxylobates*)
***barbatus* (*Perxylobates*)**
 barbatus (*Scheloribates*)
 barbatus (*Tyrphonothrus*)
***barborae* (*Steganacarus*) (=spinosus)**
 barbulata [S. (*Paralalmoppia*)]
 barguzini [C. (*Triachipteria*)]
***barlowi* (*Paulianacarus*)**
***barnardi* (*Galumna*)**
***barrancensis* (*Pseudoamerioppia*)**
 barrancensis (*Pseudoamerioppia*)
 barrancensis (*Pseudoamerioppia*)
 barrancensis (*Tyrphonothrus*)
***barringtonensis* (*Novonothrus*)**
***barringtonensis* (*Pherliodes*)**
 bartkei (*Dolicheremaeus*)
 bartlae (*Archeremella*)
***bartosi* (*Belba*) (=patelloides)**
 basevensis (*Dolicheremaeus*)
***basidii* (*Basidoppia*)**
 basilewskyi (*Carabodes*) *sp. inq.*
 basilewskyi (*Galumna*)

- basilewskyi (Nothrus) sp. inq.**
basilewskyi (Pilizetes)
basilewskyi (Zetorchella)
 batarazaensis (*Dolicheremaeus*)
 bataviensis (*Neoliodes*)
 bataviensis (*Neoliodes*)
bataviensis (Neoliodes)
bathamae (Halozetes)
baudi (Charassobates)
 bavaricus (*Lepidozetes*)
 baviensis (*Nothrus*)
bawanglingensis [P. (Tectodamaeus)]
 bayanicus (*Protoribates*)
 bayartogtokhi [D. (*Epidamaeus*)]
 bayartogtokhi [D. (*Epidamaeus*)]
 bayartogtokhi (*Pantelozetes*)
 bayartogtokhi [H. (*Parawoasella*)]
bavlvi (Scapheremaeus)
bayoumii (Lasiobelba) (=arcidiaconoae)
 bayoumii (*Neoppia*)
beccus (Oribatula) (=caliptera)
becki (Acaroceras)
becki (Eohypochthonius)
 becki [L. (*Lancelalmoppia*)]
becki [L. (Lancelalmoppia)]
becki (Nothrus)
becki [H. (Phyllhermannia)]
beecroftensis [T. (Cristonothrus)]
 beemanensis (*Belloppia*)
 behanae [Z. (*Alpizetes*)]
 behanae [S. (*Dyobelba*)]
 behanae [Z. (*Protozetomimus*)]
behanae (Taeniogalumna)
behani (Ceratozetes)
 beijingensis (*Odonotocephus*)
 belbiformes (*Zachvatkinella*)
belgicae (Halozetes)
 belgicae (*Hypogeoppia*)
 bella (*Eremobelba*)
bella [S. (Flagrosuctobelba)] (?=nasalis)
 bella [C. (*Triachipteria*)]
 bella [C. (*Triachipteria*)]
bellesii (Pergalumna)
 bellicosa (*Eremobelba*)
 bellicosus (*Austrocarabodes*)
bellingeri (Indotritia)
bellissimus [H. (Tuberemaeus)]
bellula [O. (Coronoquadroppia)] (=galaica)
 bellus (*Carabodes*)
bellus (Pseudotectoribates) (=subsimplis)
 beloniensis [O. (*Zygoribatula*)]
 benacensis (*Eohypochthonius*)
benegasi (Oripoda)
 benenensis (*Papillacarus*)
 bengalensis [M. (*Archegotocephus*)]
 bengalensis (*Cosmochthonius*)
 bengalensis (*Dolicheremaeus*)
 bengalensis (*Haplacarus*) foliatus
 bengalensis (*Hoplophthiracarus*)
 bengalensis [L. (*Paramellobates*)]
 bengalensis (*Sphaerochthonius*)
 benguetana [H. (*Phyllhermannia*)]
 benguetensis [S. (*Perscheloribates*)]
benoiti (Drymobatoides)
benoiti (Hoplophorella) (=stilifera)
benoiti (Metabelba) sp. inq.
benoiti (Phthiracarus) sp. inq.
- bentonensis (*Achipteria*)
bertoni (Notophthiracarus)
benyovszkyi (Leptoppia)
bercziki [N. (Leptosuctobelba)]
 beresi [N. (*Confinoppia*)]
 beringiana (*Suctobelba*)
 beringianus [M. (*Calyptozetes*)]
 beringianus [A. (*Coropoculia*)]
 beringianus [A. (*Coropoculia*)]
berlesei (Arthrophlophora) (=vulpes)
 berlesei (*Brachychthonius*)
 berlesei (*Brachychthonius*)
berlesei (Camisia) (=biverrucata)
berlesei (Dolicheremaeus) (=damooides)
 berlesei [D. (*Epidamaeus*)]
berlesei (Eremulus)
berlesei (Eremulus)
 berlesei (*Eupelops*) sp. inq.
 berlesei (*Galumna*)
berlesei (Hoplophthiracarus)
berlesei [L. (Lancelalmoppia)]
berlesei (Nothrus)
 berlesei (*Oribatella*)
 ?berlesei (*Oribatella*)?
 berlesei (*Oribotritia*)
 berlesei (*Oribotritia*)
 berlesei (*Pantelozetes*)
berlesei (Phauloppia) (=lucorum)
 berlesei [H. (*Phyllhermannia*)]
 berlesei (*Pilobatella*)
berlesei (Plateremaeus)
berlesei (Steganacarus) (?=applicatus)
 berlesei (*Trichoribates*)
 berlesei (*Trichoribates*)
 berlesei (*Trichoribates*)
bermudensis (Carinozetes)
 berndhauseri [O. (*Acrotocephus*)]
 berndhauseri (*Multipulchroppia*)
berndhauseri (Multipulchroppia)
berndhauseri [B. (Passalobates)]
 berndhauseri (*Protoribates*)
berndhauseri (Setoxylobates)
berndhauseri (Topobates)
berndi (Didierotocephus)
 berninii [N. (*Ancestroppia*)]
 berninii (*Berniniella*)
 berninii (*Carabodes*)
berninii (Hoplophorella)
 berninii [R. (*Insculptoppia*)]
 berninii (*Oribatella*)
 berolina (*Cultroribula*)
bertheti (Lanceoppia)
 berzosai (*Rhinoppia*)
 beskidyensis (*Lauropia*)
 besucheti [O. (*Acrotocephus*)]
besucheti [S. (Flagrosuctobelba)] (=forsslundi)
 besucheti (*Oppiella*)
besuchetianus (Phthiracarus) (=laevigatus)
betschi (Rogerzetes)
 betzaida (*Galumna*)
bhadurii (Haplacarus)
bhadurii (Scheloribates)
bhaskari (Pergalumna)
bhutanensis (Cosmochthonius)
bhutanensis (Scheloribates)
bhutanicus (Euphthiracarus) sp. inq.
biangulata (Suctobelbella)

- biangulatus* [H. (*Capillonostrus*)]
biarcualis (**Scheloribates**)
biarcuata [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 biarea (*Trichoribates*)
 bicarinata (*Achipteria*)
 bicarinata (*Berniniella*)
bicarinata (**Berniniella**)
bicarinata (*Berniniella*)
bicarinata (*Camisia*) (= *segnis*)
bicarinata (*Ctenobelba*) (= *pectinigera*)
bicarinata (*Mesotritia*)
bicarinata (*Microtritia*)
bicarinata (*Oribotritia*) (= *africana*)
bicarinatus [P. (*Archiphthiracarus*)]
bicarinatus [N. (*Besuchetacarus*)]
 bicarinatus (*Hispanozetes*)
bicarinatus (*Hoplophthiracarus*)
bicarinatus (*Indoribates*)
bicarinatus [P. (*Metaphthiracarus*)]
bicarinatus [H. (*Capillonostrus*)] sp. inq.
bicarinatus [H. (*Capillonostrus*)] sp. inq.
bicarinatus [E. (*Pocsia*)]
 bicarinatus [S. (*Tropacarus*)]
bicaudata (**Grandjeania**)
bicaudata (**Grandjeania**)
bicentennaria (*Joshuella*)
 bichei (*Atropacarus*)
 biciliata (*Multioppia*)
biciliatus (*Nothrus*) (? = *anauniensis*)
 bicillata [R. (*Insculptoppiella*)]
 biclavata [S. (*Dyobelba*)]
biclavulus (**Hemileius**)
bicolor (**Carabodes**) sp. inq.
 bicolor (*Nothrus*) sp. inq.
bicolor (**Reductobates**)
biconcavus [Y. (*Dongnabodes*)]
bicornicula (*Bicyrthermannia*)
 bicorniculatus (*Hispanozetes*)
bicornis (*Astegistes*) (= *pilosus*)
 bicornis [M. (*Calyptozetes*)]
bicornis (*Gustavia*) (? = *longicornis*)
bicornis (*Minunthozetes*) (= *semirufus*)
 bicornis (*Scheloribates*)
bicornis (*Zetomimus*)
bicornis (**Zetomimus**)
bicornuta (*Bicyrthermannia*)
bicornutus (**Scapheremaeus**)
 bicostata [C. (*Berndamerus*)]
 bicostatus (*Gymnodamaeus*)
bicostatus (*Gymnodamaeus*)
bicristata [L. (*Bicristoppia*)]
bicristata (**Pergalumna**)
 bicristatus (*Arthrodamaeus*)
bicristatus [H. (*Platynothrus*)] (= *peltifer*)
 bicultrata (*Cultroribula*)
bicultrata (*Cultroribula*)
bicultrata (*Cultroribula*)
 bicuspidata (*Allosuctobelba*)
bicuspidata (**Cultroribula**)
 bicuspidata (*Cultroribula*)
bicuspidata (*Cultroribula*)
bicuspidata (*Furcoribula*) (= *furcillata*)
bicuspidata [G. (*Monophauloppia*)]
bicuspidata [G. (*Monophauloppia*)]
 bicuspidata (*Oromurcia*)
bicuspidata (*Oromurcia*)
bicuspidatus (**Anellozetes**)
- bicuspidatus* (*Arcozetes*)
 bicuspidatus (*Scheloribates*)
bidactyla (**Austrachipteria**)
 bidactylus (*Bipassalozetes*)
bidactylus (**Bipassalozetes**)
bidactylus [S. (*Bischeloribates*)]
bidactylus (*Ethiovertex*) (= *mahunkai*)
bidactylus (*Trixylobates*)
 bidens [C. (*Flexa*)]
bidens (*Pergalumna*) (= *emarginata*)
bidens (*Scotiazetes*)
 bidentata (*Allosuctobelba*)
 bidentata (*Arcoppia*)
bidentata (**Arcoppia**)
bidentata (**Austrachipteria**)
bidentatirostris (*Galumna*)
bidentatus (*Fuscozetes*)
bidentatus (*Liacarus*)
bidentatus (*Orthozetes*)
bidentatus (*Pelopsis*)
 bidentatus (*Zetomotrichus*)
 bidupensis (*Epieremulus*)
bifida [D. (*Cylindroppia*)] (= *casuarina*)
bifidatus (*Xenillus*) (= *tegeocranus*)
 bifidus (*Dolicheremaeus*)
bifilis (*Arcoppia*) sp. inq.
bifissurata (*Pergalumna*)
bifissurata (*Pergalumna*)
biflagellata (**Arcoppia**)
biflagellata (**Sphagnoppia**)
bifoliata (*Lohmannia*)
bifoveolata (*Coartobelba*)
bifurca (**Austrotritia**)
bifurcata (*Acrotitria*) (= *vestita*)
 bifurcata (*Banksinoma*) lanceolata
bifurcata (*Banksinoma*) lanceolata
bifurcata (**Brachioppiella**)
 bifurcata (*Eulohmannia*) ribagai
bifurcata (*Machadobelba*)
 bifurcata (*Mahunkana*)
 bifurcata (*Nanhermannia*)
bifurcatus (*Furcodamaeus*)
bifurcatus (*Hermannobates*)
bifurcatus (*Kalyptrazetes*)
bifurcatus (*Liochthonius*) sp. inq.
bifurcatus (*Pelopsis*)
bifurcatus (*Pelopsis*)
 bifurcatus (*Reteremuloides*)
bifurcatus (**Tumerozetes**)
biheterodactylus [I. (*Haplozetes*)]
 bilamellata (*Furcoribula*)
bilaminae (**Oribotritia**)
 bilineata (*Machuella*) ventrisetosa
bilineata (**Muliercula**)
 bilineatus (*Ameronothrus*)
bilineatus (**Ameronothrus**)
bilineatus (**Scheloribates**) sp. inq.
bilobatus (**Lobozetes**)
bilobus (*Eupelops*) (= *sulcatus*)
 bilongisetosus (*Nothrus*)
bilunatifer (*Eremaeozetes*)
 bimaculata (*Pergalumna*)
bimaculata (**Pergalumna**)
bimaculata [H. (*Phyllhermannia*)]
 bimaculatus (*Brachychthonius*)
bimaculatus (*Brachychthonius*)
bimaculatus (*Diapterobates*) (= *notatus*)

- bimorpha (Galumna)
binadalares (*Pilogalumna*)
binodosa [L. (*Bicristoppia*)]
binodosa (**Borenbuschia**)
binodulus (*Tyrphonothrurus*)
biovatus (**Eutegaeus**)
bipartita (*Acrogalumna*)
bipartita (**Acrotritia**)
bipartita (*Oribotritia*)
bipectinata [R. (*Paramedioppia*)]
bipilis (*Ceratoppia*)
bipilis (*Ceratoppia*)
bipilis (*Ceratoppia*)
bipilis (*Ceratoppia*)
bipilis (*Nothrus*) *palustris* ssp. inq.
bipilis [P. (*Triaunguis*)] Ham., 72
bipilis [P. (*Triaunguis*)] Ham., 72
bipilis [P. (*Triaunguis*)] P.-I. y B., 80 (= *praeoccupatus*)
biporosa (*Globogalumna*)
biporosus (*Ceratozetes*)
biputeus [N. (**Besuchetacarus**)]
biramula (*Mesotritia*)
biroi (**Birotegaeus**)
biroi (**Fenichelia**)
biroi (**Meristacarus**)
birulai (*Chamobates*)
birulai (*Chamobates*)
bisculpturatus (*Rhopalozetes*)
bisculpturatus (*Scapheremaeus*)
bisculpturatus [P. (*Triaunguis*)]
bisculpturatus [E. (*Trischeloribates*)]
biseriata (*Brachioppiella*)
biseriata (**Brachioppiella**)
bisetus (*Podopterotegaeus*)
bisignata [O. (*Zygoribatula*)] (?= *connexa*)
bisignatus (*Tectocephus*) (= *minor*)
bispina (*Cubachipteria*)
bispinatus (*Arthrovertex*)
bispinosus (*Nothrus*) sp. inq.
bispinosus [C. (*Xiphobates*)]
bistilus (*Nothrus*) *silvestris*
bistriata (*Camisia*) (= *horrida*)
bistriatus [H. (*Capillonothrus*)]
bisulcata (**Eremobelba**) sp. inq.
bisulcatus (*Stictozetes*)
bisulcatus (*Tritegeus*)
bisulcus (**Hoplophthiracarus**)
bithongabela (**Pedrocortesella**)
bituberculata (*Mahunkaia*)
bituberculata (*Mahunkaia*)
bituberculata (*Neosuctobelba*)
bituberculata [O. (*Oxyoppiella*)]
bituberculata [O. (*Oxyoppiella*)]
bituberculatus (*Austrocarabodes*)
bituberculatus (*Austrocarabodes*)
bituberculatus [D. (*Epidamaeus*)]
bituberculatus (*Scapheremaeus*)
biundata (*Exoribatula*)
biunguiculata (**Eulohmannia**) (= *ribagai*)
biunguis [S. (*Bischeloribates*)]
biurus (*Camisia*)
biurus (*Camisia*)
biurus (*Camisia*)
bivaginata (*Bursoplophora*)
biverrucata (*Camisia*)
biverrucata (*Camisia*)
biverrucata (*Camisia*)
bivittata [S. (*Ussuribata*)]
bizygata [O. (**Zygoribatula**)]
blacki (**Crotonia**)
blancharti (*Austrocarabodes*)
blancus (*Tyrphonothrurus*)
blascoi (*Vaghia*)
blaszaki (*Crotonia*)
blattarum [R. (*Sabahoppia*)]
blocki (**Laminoppia**)
blocki (*Oribatella*)
bloemfonteinensis [P. (**Ausoribula**)]
bloemfonteinensis (*Pilogalumna*)?
bloemfonteinensis (*Pilogalumna*)
bloszyki (*Beckiella*)
bloszyki (**Notophthiracarus**)
blythdalensis [P. (**Archiphthiracarus**)]
boedvarssoni (*Ocesobates*)
boevi (*Pilogalumna*) (= *tenuiclava*)
bogduulensis (*Diapterobates*)
bogorensis (*Meristacarus*)
bogorensis (*Tecteremaeus*)
bolei (*Dissorhina*) (= *ornata*)
boletorum (*Phauloppia*)
boletorum (**Trichoribates**) (?= *berlese*)
bolivari (*Mesoplophora*)
boliviana (*Pergalumna*)
boliviana (*Sternoppia*)
bolivianus (*Benoibates*)
bolivianus (*Dolicheremaeus*)
bolivianus (*Tegeocranellus*)
bolivianus (*Xenillus*)
bombretensis (*Nannerlia*)
bombuscaroensis (*Euphthiracarus*)
borneensis [D. (*Spatiodamaeus*)]
bonairensis (**Litoribates**)
bonairensis (*Protoribates*) *capucinus* ssp. inq.
bonairensis [O. (*Zygoribatula*)]
bonairensis [O. (*Zygoribatula*)]
bonairensis [O. (*Zygoribatula*)]
bonairensis [O. (*Zygoribatula*)]
bonangensis (**Notophthiracarus**)
bonifacioi (*Kalayaan*)
boninensis (*Austrocarabodes*)
boninensis [S. (*Lalmoppia*)]
boninensis (**Trichogalumna**)
boothianus (*Zetomimus*)
boraboraensis (**Transoribates**)
boraha (*Rugoppia*)
borbolai (*Dolicheremaeus*)
borbora (**Crotonia**)
borealis (*Achipteria*) Banks, 1898 sp. inq.
borealis (*Achipteria*) Ewing, 1918 (= *bentonensis*)
borealis [P. (*Archiphthiracarus*)]
borealis (*Banksinoma*)
borealis (*Camisia*)
borealis (*Camisia*)
borealis (*Camisia*)
borealis (*Ceratozetes*)
borealis (**Chamobates**) (= *pusillus*)
borealis (*Eobrachychthonius*)
borealis (*Eobrachychthonius*)
borealis (**Eremaeus**) Strenz., 52 (= *translamellatus*)
borealis (**Eremaeus**) Wen, 88 (= *neonominatus*)
borealis (*Exochocephus*)
borealis (**Hypochthoniella**) (= *crosbyi*)
borealis (*Liacarus*)
borealis (*Limnozetes*)
borealis (*Neoribates*)

- borealis* (*Phthiracarus*) (=longulus)**
borealis (Sellnickochthonius)
borealis (*Tectoribates*)
boreomontanus (*Eremaeus*)
boretosus (*Phthiracarus*)
boretosus (*Phthiracarus*)
***boretosus* (*Phthiracarus*)**
boreus [D. (*Spatiodamaeus*)]
borgesii (*Peloptulus*)
borhidii (*Allogalumna*)
borhidii (*Beckiella*)
borhidii (*Benoibates*)
borhidii [*B. (Canaloppia)*]
borhidii (*Eurhynchoribates*)
borhidii [*C. (Klapperiches)*]
borhidii (*Microtegeus*)
borhidii (*Microtegeus*)
borhidii (*Microtegeus*)
borneensis (*Anakingia*)
***bornemisszai* (*Acutozetes*)**
***bornemisszai* (*Setoppia*)**
***bornemisszai* [*T. (Viracochiella)*]**
***boronganensis* (*Drymobatooides*)**
borussicus (*Nothrus*)
borussicus (*Nothrus*)
borussicus (*Nothrus*)
***borussicus* (*Ophidiotrichus*) (=tectus)**
***boschmai* (*Synchthonius*) (=crenulatus)**
bosniae (*Tegeocranellus*) *sp. inq.*
***bostocki* (*Eutegaeus*)**
bostocki (*Eutegaeus*)
***botari* (*Lamellobates*) (=molecula)**
bothulifer (*Rostrozetes*)
botschi (*Trichoribates*) *sp. inq.*
botulus (*Kaszabozetes*)
boulfekhari [*S. (Tropacarus)*]
bouvetovaensis (*Alaskozetes*)
brachiatus (*Cepheus*)
brachistos (*Notophthiracarus*)
***brachyodon* (*Suctobelbella*) (=duplex)**
brachypterus (*Schelorbates*)
brachyramosa (*Arcoppia*)
brachyramosa (*Arcoppia*)
***brachyrostrum* (*Crotonia*) (=cophinaria)**
brachys (*Hoplophorella*)
***brachys* [*N. (Steganacarellus)*]**
brachysetosa (*Mesoplophora*)
***brachytrix* (*Mesotritia*) (=nuda)**
brachytrichina (*Oppia nitens*) *ssp. inq.*
bradleyi (*Galumna*) *sp. inq.*
brasilensis (*Cultroribula*)
brasilensis (*Nothrus*)
brasilensis (*Trhypochthoniellus longisetus*)
***brasilliana* (*Acrotritia*)**
brasilliana (*Acrotritia*)
***brasilliana* (*Acrotritia*)**
brasilliana (*Domatorina*) *plantivaga*
brasilliana* (*Mesoplophora*) *sp. inq.
brasillianus (*Dolicheremaeus*)
brasillianus (*Xenillus*)
brasiliensis (*Acaroceras*)
brasiliensis (*Allonothrus*)
brasiliensis (*Austrocarabodes*)
brasiliensis [*E. (Brasilotritia)*]
brasiliensis (*Eremulus*)
- brasiliensis* (*Galumna*)
brasiliensis (*Hoplophorella*)
brasiliensis [*R. (Mantigueracarus)*]
brasiliensis (*Mesotritia*)
brasiliensis (*Oripoda*)
brasiliensis [*R. (Rhynchoribatodes)*]
brasiliensis (*Sternoppia*)
brasiliensis (*Teratoppia*)
***brasiliensis* (*Unguizetes*) (=setiger)**
brasilocompressus (*Schelorbates*)
brasilosphericus (*Schelorbates*)
***brassi* (*Brassoppia*)**
***brassi* (*Reductobates*)**
brassicae (*Crotonia*)
***brauni* [*O. (Zygoribatula)*] (=propinqua)**
brazilianus (*Rhopalozetes*)
brazilianus (*Stelechobates*)
braziliensis (*Epieremulus*)
braziliensis (*Epieremulus*)
***braziliensis* (*Licneremaeus*)**
braziliensis (*Mucronothrus*)
brazilozetoides (*Berlesezetes*)
brazilozetoides (*Berlesezetes*)
brazilozetoides (*Berlesezetes*)
bregetovae (*Ceratozetella*)
bregetovae (*Damaeolus*)
bregetovae (*Ocesobates*)
brevialatus [*S. (Perscheloribates)*]
brevicarinata [*M. (Parplophora)*]
breviclava [*C. (Flexa)*]
breviclava (*Mainothrus*)
breviclava (*Membranoppia*)
breviclava (*Striatoppia*)
breviclava (*Tegezozetes*) *tunicatus*
breviclava (*Tegezozetes*) *tunicatus*
breviclavata [*F. (Mexicoppia)*]
breviclavatus [*L. (Procorynetes)*]
brevicornuta (*Crotonia*)
brevicornuta (*Oribatella*)
brevicornuta (*Oribatella*)
brevicostulata [*O. (Moritzoppiella)*]
breviculus (*Euphthiracarus*)
brevicuspidata (*Oribatella*)
brevicuspidatus (*Punctoribates*)
brevicuspidis [*O. (Monoribatella)*]
***brevicuspis* (*Ceratoppia*) (=spinipes)**
***brevicuspis* (*Eupelops*) (=occultus)**
brevicuspis (*Trichoribates*)
brevidentatus (*Diapterobates*)
brevifer (*Eueremaeus*)
brevilamellaris (*Trichoribates*)
brevilamellata* (*Oribatella*) *sp. inq.
brevilamellatus [*M. (Calyptozetes)*]
brevilamellatus (*Hemileius*)
brevilamellatus (*Liacarus*)
brevipectinata [*B. (Gressittoppia)*] *pepitensis*
brevipectinata [*M. (Multilanceoppia)*]
brevipectinata [*M. (Multilanceoppia)*]
***brevipectinata* [*T. (Teratoppiella)*]**
***brevipes* (*Ameronothrus*) (=nigrofemoratus)**
brevipes (*Micreremus*)
brevipes (*Mixacarus*)
brevipes (*Mixacarus*)
***brevipila* (*Afropia*)**
***brevipila* (*Oribatella*) (=foliata)**
brevipila (*Pilobatella*)

- brevipilis (Halozetes) belgicae*
brevipilis (Hoplophorella)
brevipilis (Hoplophorella)
brevipilosa (Ctenobelba)
brevipilosa [H. (Kakophthiracarus)]
brevipilosa [L. (Zeaotritia)]
brevipilus (Eupelops) sp. inq.
brevipilus [S. (Tropacarus)]
brevipodus (Schelorbates)
breviporosus (Maculobates)
breviporosus (Maculobates)
brevipertus [S. (Perschelorbates)]
brevirostris (Nothrus) sp. inq.
brevis (Berlesezetes)
brevis (Berlesezetes)
brevis (Carabodes)
brevis (Liochthonius)
brevis (Liochthonius)
brevis (Liochthonius)
brevis (Oribotritia)
brevis (Tuxenia)
brevis (Zetomimus)
brevisensilla (Macrogena)
brevisetia (Austrachipteria)
brevisetia (Eremobelba)
brevisetia (Eremobelba)
brevisetia (Galumna)
brevisetia (Indotritia)
brevisetia (Lauroppia)
brevisetia (Liochthonius)
brevisetia (Magyaria)
brevisetia (Mesostritia)
brevisetia (Oribotritia)
brevisetia (Paroppia)
brevisetia (Sadocephus)
brevisetia [P. (Tectodamaeus)]
brevisetia [L. (Zeaotritia)] (=brevisetosa)
brevisetiae [P. (Metaphthiracarus)]
brevisetiae [P. (Metaphthiracarus)]
brevisetiger [O. (Acrotocephus)]
brevisetiger (Cryptoppia)
brevisetiger [M. (Trimalaconothrus)]
brevisetiger (Nippobodes)
brevisetigera (Brassiella)
brevisetosa (Allogalumna)
brevisetosa (Allogalumna)
brevisetosa (Campachipteria)
brevisetosa [L. (Incabates)]
brevisetosa [H. (Kakophthiracarus)]
brevisetosa (Oribotritia)
brevisetosa (Schalleria)
brevisetosa (Tuxenia) (=brevis)
brevisetosa [L. (Zeaotritia)]
brevisetosa [O. (Zygoribatula)] Ewing, 09
brevisetosa [O. (Zygoribatula)] L. y B., 91 (=obsessa)
brevisetosus [D. (Epidamaeus)]
brevisetosus (Hypochthonius) (=rufulus)
brevisetosus [H. (Platynothrus)]
brevisetosus (Protorbates)
brevisetosus [K. (Rimandocephus)]
brevisetosus (Undulorbates)
brevisetosus (Xenillus)
brevisetus [M. (Archegotocephus)]
brevisetus (Hypozeptes)
brevisetus (Indorbates)
brevisetus (Perxylobates)
brevisetus (Pilizetes)
- brevisetus (Rhacaplacarus)**
brevisetus (Trhypochthoniellus)
brevisetus (Tritegeus)
brevisimile (Lauroppia)
brevispathulata (Eremobelba)
brevitarsus (Eremaeus)
brevitibialis [D. (Epidamaeus)]
brevitutorium [E. (Gamerozetes)]
brinoni (Globoppia)
brisbanensis (Crotonia)
brissago (Ceratozetella)
bromeliarum [O. (Multoribatella)]
bruneiana (Karenella)
bruneiensis [N. (Calyptophthiracarus)]
bruneiensis (Condylobelba)
bruneiensis (Dolicheremaeus)
bruneiensis (Maculobates)
bruneiensis (Maculobates)
bryani (Austrotritia)
bryani (Pergalumna)
bryani (Pergalumna)
bryani (Phauloppia)
bryobius [P. (Archiphthiracarus)]
bryobius [P. (Archiphthiracarus)]
bryobius [P. (Archiphthiracarus)]
bryobius [P. (Archiphthiracarus)]
bryobius [P. (Archiphthiracarus)]
bryophilus (Tegorbates)
bucephala (Beckiella)
bucephalus [O. (Acrotocephus)]
buffaloensis (Hoplophorella) Nied.,06
buffaloensis (Hoplophorella) Nied.,06(Not)(=diversisetosa)
bugiamapensis [C. (Berndamerus)]
bugiamapensis (Dolicheremaeus)
bugiamapensis (Hermannella)
bugiamapensis (Sphaerozetes)
bulanovae (Belba)
bulanovae [O. (Monoribatella)]
bulanovae (Neorbates)
bulanovae (Oribatula) (=interrupta)
bulanovae [Z. (Protozetomimus)] (=acutirostris)
bulanovae (Ptiloppia)
bulanovae (Rhinoppia) (=zachvatkini)
bulbifer (Oribotritia)
bulbiferus [P. (Archiphthiracarus)]
bulbipedata (Damaeus) sp. inq.
bulbipes (Belba) (=corynopus)
bulbifemoralis (Damaeus)
bulbosensillatus (Scapheremaeus)
bulbosus (Notophthiracarus)
bulbus (Notophthiracarus)
bulganensis (Dissorhina)
bulgarica (Furculoppia) (=furcata)
bulgaricus (Hypozeptes)
bulgaricus (Hypozeptes)
bulgaricus (Scutovertex)
bullager (Reductobates)
bullocki (Suctobelbella)
bunaensis (Schelorbates)
buntotanus (Pelorbates)
bunva (Hexachaetoniella)
burckhardtii [O. (Acrotocephus)]
burckhardtii (Pulchroppia)
buresi [T. (Tyrphonothrus)]
burii (Paraxylobates)
burrowsi (Lucoppia)
burrowsi (Lucoppia)

- burrowsi (*Lucoppia*)
burrowsi (**Lucoppia**)
butantaniensis (*Xenillus*)
butiae (*Austrocarabodes*)
byzovae (*Heterochthonius*)
byzovae (*Oribatella*)
cacainus (*Hoplophthiracarus*)
cachoeirensis (*Tecteremaeus*)
cadeti (**Austrocarabodes**)
 cadizi [P. (*Archiphthiracarus*)]
 caelatus (*Lamellovertex*)
caelestis (**Litoribates**)
 caelestis (*Steganacarus*)
 caesarea (*Licnobelba*)
 cagayana (*Bicyrtermannia*)
cajamarcensis (**Brachioppia**)
cajamarcensis (**Brachioppia**)
cajamarcensis [T. (*Tyrphonothrus*)]
cajamarcensis (*Tyrphonothrus*)
cajanumaensis [N. (*Protophthiracarus*)]
calcarata (**Fossoppia**)
calcarata [**M.** (**Hammeroppia**)] (=tremblevi)
calcarata (**Nothrolhmannia**)
 calcarata (*Oribatella*)
calcarata (*Oribatella*)
calcarata (**Teratoppia**)
 calcaratus (*Farchacarus*)
calcaratus (**Farchacarus**)
calcaratus (**Hardybodes**)
calcaratus [S. (*Perscheloribates*)] (=reiteratus)
calcaratus [C. (*Phyllocarabodes*)]
calcaratus (**Scheloribates**) **fimbriatus** Jac., 34
calcaratus (**Scheloribates**) L. y P., 90 (=praeoccupatus)
calcaratus (**Scheloribates**) Mah., 84 (=sudafricanus)
calcehtokensis (*Malaconothrus*)
 calcicola (*Galumna*)
 californica [C. (*Klapperiches*)]
 californicae (*Pergalumna*)
 californica (*Galumna*)
 californica [B. (*Protobelba*)]
 californicus (*Bipassalozetes*)
californicus (**Bipassalozetes**)
 californiensis (*Eremaeus*)
 californiensis (*Hydrozetes*)
caliginosus (**Notophthiracarus**) (=australis)
 caliptera (*Oribatula*)
caliptera (*Oribatula*)
 callainii [S. (*Tropacarus*)]
 callatisiana (*Multioppia*)
 callipus (*Scheloribates*)
callipus (*Scheloribates*)
 callipygis [C. (*Xiphobates*)]
callipygus (*Torpacarus*)
callitarsus (**Pedrocortesella**)
 callitoca (*Mongaillardia*)
 callosa (*Pedrocortesella*)
calmorum (**Pedrocortesella**)
 calotropica (*Hoplophorella*)
calugarae (**Kulievia**) (=paradecipiens)
calugarae (**Notophthiracarus**)
 calva (*Galumna*)
calva (**Galumna**)
 calva [T. (*Paragloboppia*)] sp. inq.
calycifera (**Mochloribatula**) (=bahamensis)
 cambricus (*Mycobates*)
camelus (**Crotonia**)
camelus (*Crotonia*)
- cameroni** (**Crotonia**)
camerunensis [**P.** (**Pseudopilizetes**)]
camerunensis (**Yoshiobodes**)
camillae (*Crotonia*)
campbellensis [M. (*Pravoppia*)]
campbellensis (*Stomacarus*)
 campestris (*Ceratozetes*)
campestris (**Coartobelba**)
campestris (**Scheloribates**) (=latipes)
campestris (*Tectoribates*)
campinaranensis (**Arcoppia**)
 camtschaticus (*Damaeus*) sp. inq.
 camtschaticus (*Scheloribates*)
canadaris (*Protoribotritia*)
canadensis (*Banksinoma*) lanceolata
canadensis (**Ceratoppia**) (=spinipes)
canadensis [D. (*Epidamaeus*)]
canadensis (**Limnozetes**) (=ciliatus)
canadensis (*Oribatella*)
canadensis (*Peloribates*)
canadensis (*Propelops*)
canadensis (*Propelops*)
canadensis (*Trhypochthoniellus*) longisetus
 canagaratnami (*Oripoda*)
 canagaratnami (*Rhopalozetes*)
 canaliculatus (*Neoliodes*) sp. inq.
 canariensis (*Anomaloppia*)
canariensis [N. (*Calyptophthiracarus*)] (=heterotrichus)
 canariensis [M. (*Hammeroppia*)]
 canariensis (*Hermannia*)
 canariensis [L. (*Incabates*)]
 canariensis (*Oribella*)
 canariensis (*Poroscheloribates*)
 canariensis (*Xenillus*) discrepans
canariensis [**O.** (**Zygoribatula**)] (=propinqua)
cancellata (**Magyaria**)
 cancellata (*Magyaria*)
 cancellata (*Zetorchella*)
 candidulus [N. (*Calyptophthiracarus*)]
canestrinii (**Acrotrititia**) (=ardua)
 canestrinii (*Hermanniella*) sp. inq.
 caneteae (*Dolicheremaeus*)
 cangioensis (*Ceratobates*)
 canlaonensis [H. (*Phyllhermannia*)]
 canningsi [A. (*Coropoculia*)]
canopeus (*Tyrphonothrus*)
 capense (*Oppia*)
capense (**Oppia**)
capensis (**Afrozetes**) magoebaensis
capensis (**Eremaeozetes**)
capensis (**Eupelops**)
capensis (**Galumna**)
capensis (**Halozetes**)
 capensis (*Hydrozetes*)
capensis (**Hydrozetes**)
capensis (**Neoliodes**) sp. inq.
capensis (**Pergalumna**) magnipora
 capensis (*Pergalumna*) magnipora
capensis (**Rhopalozetes**)
capevidalensis (**Notophthiracarus**)
 capillaris (*Pergalumna*) magnipora
 capillaris (*Pergalumna*) magnipora
capillata (**Capilloppia**)
capillata (**Rhynchoppia**)
capillata (**Xenolhmannia**)
 capillatus [H. (*Capillonothrus*)]
 capillatus [H. (*Capillonothrus*)]

- capillatus (Ceylobodes)
capillatus (Dolicheremaeus)
capillatus (Dolicheremaeus)
capillatus (Notophthiracarus)
capilligera [L. (Antennoppia)]
capistrata (Crotonia)
capita (Totobates)
capitanea (Oribotritia)
capitata (Eremobelba)
capitata (Eremobelba)
capitata (Gredosella)
capitata [O. (Zygoribatula)] Banks
capitata [O. (Zygoribatula)] Hall (?=clavata)
capitatus (Anderemaeus)
capitatus (Neogymnobates)
capitatus (Phthiracarus) sp. inq.
capitatus (Xenillus)
capitulum (Beckiella)
capitulum (Protozetes)
capizensis (Dolicheremaeus)
caporiacci (Multioppia) (?=laniseta)
caprai (Scheloribates)
caprai (Scheloribates)
caprai (Scheloribates)
capreolatus (Dolicheremaeus)
captator (Dissorhina) (=ornata)
capualensis (Pergalumna)
capucinus [O. (Fenestrobates)]
capucinus (Protoribates)
capucinus (Protoribates)
capucinus (Protoribates)
capucinus (Protoribates)
capucinus (Protoribates)
capucinus (Protoribates)
capucinus (Protoribates)
carbonarius [L. (Rhaphidosus)]
carboneli (Plasmobates)
carcharodon [S. (Flagrosuctobelba)]
carcharodon [S. (Flagrosuctobelba)]
cardosensis (Microtegeus)
cardosensis (Microtegeus)
cardosensis (Pergalumna)
carinata (Austrotritia)
carinata (Beckiella)
carinata (Coartobelba)
carinata (Vaghia)
carinata (Vaghia)
carinatissima (Berniniella)
carinatus (Carabocephus)
carinatus (Carabodes) (=subcarinatus)
carinatus (Dolicheremaeus)
carinatus (Eueremaeus)
carinatus (Euphthiracarus)
carinatus (Leobodes)
carinatus (Notophthiracarus)
carinatus [H. (Platynothrus)] Kramer, 1897 (=punctatus)
carinatus [H. (Platynothrus)] Banks, 1910 sp. inq.
carinatus (Rostrozetes)
carinatus (Scapheremaeus)
carinatus (Solenozetes)
carinatus (Suctoribates)
carinatus [S. (Tropacarus)]
carinatus [S. (Tropacarus)]
carinthiaca (Lauropopia) maritima ssp. inq.
carinulatus (Pheroliodes)
carioca (Crotonia)
carli (Mycobates)
carlosi (Steganacarus)
- carneus [L. (Haplozetes)]
carneus (Scheloribates) sp. inq.
carniolica [O. (Moritzoppiella)] (=neerlandica)
carolensis [L. (Carolohmannia)]
caroli (Synichotritia)
carolina (Ferolocella) (=tessellata)
carolinae (Oribotritia)
carolinae (Multioppia) (?=wilsoni)
carolinae (Nothrus) (=monodactylus)
carolinensis [S. (Dyobelba)]
carolinensis [L. (Rhaphidosus)]
carolinicus (Hypochthonius) rufulus ssp. inq.
carpathicus (Topobates)
carpatica (Dissorhina)
carpatica [M. (Multilanceoppia)]
carpetanus (Pilobates)
carrolli (Camisia)
cartalinicus (Liacarus) (?=subiasi)
carusoi (Steganacarus)
casabranquensis (Pheroliodes)
caspica [O. (Sacculoribatella)]
caspica [O. (Zygoribatula)]
cassolai (Cosmogmeta)
castagnoliae (Senectoppia) (=complicatum)
castanea (Banksinoma) (?=lanceolata)
castanea (Galumna) sp. inq.
castaneus [H. (Capillonothrus)]
castaneus (Comeremaeus)
castaneus (Liacarus)
castaneus (Sphaerozetes)
castlei (Scheloribates)
castriensis (Cultroribula)
castrii [C. (Klapperiches)] (=minusculus)
castrii (Microzetes)
casuarina [D. (Cylindroppia)]
catalauca (Hoplophorella)
catalaucus [P. (Archiphthiracarus)]
cataracta [S. (Rafacarus)] (=rafalskii)
catarinensis [Z. (Protozetomimus)]
cathayanus (Euphthiracarus)
catskillensis (Achipteria)
cattienensis (Protoribates)
cattienensis (Unguizetes)
cattienica (Furcoppia)
cattienica (Pergalumna)
caucasica (Mesoplophora) (=michaeliana)
caucasica (Suctobelba) scalpellata
caucasica (Zachvatkinella)
causicus (Cepheus)
causicus (Chamobates)
causicus (Eupelops)
causicus (Heterochthonius)
causicus (Microzetes)
causicus (Palaeacarus)
causicus (Pantelozetes) (=paolii)
causicus (Trichoribates)
caudalis (Crotonia)
caudata (Phauloppia)
caudata (Sellnickia) Berl., 1910 (=caudata Mich.)
caudata (Sellnickia) Mich., 1898
caudata (Sellnickia) Mich., 1898
caudatus [O. (Acrotocephus)]
caudatus (Afroleius)
caudatus (Dendrozetes)
caudatus (Nesopelops)
caudatus (Notophthiracarus)
caudatus (Poroliodes) (=farinosus)

- caulis (Notophthiracarus)**
 cavaticus [P. (Oribellopsis)]
cavaticus (Oribellopsis)
caverna (Hoplophorella)
 cavernalis (Galumna)
cavernalis [R. (Insculptoppia)]
cavernicolus [S. (Perschelorbates)]
 cavernicolus (Samarocephus)
 caverniculus (Turkmenitrichus)
cavernosa (Hoplophorella) (=neonominata)
 cavernosus (Acaroceras)
 cavernosus [P. (Archiphthiracarus)]
 cavernosus (Charassobates)
 cavernosus [N. (Steganacarellus)]
cavugensis (Heterozetes) (=minnesotensis)
 cazanicus (Hoplophthiracarus)
 cebuensis (Dolicheremaeus)
cejansis (Beckiella)
 celisi (Liacarus) *sp. inq.*
 celisi (Trichocarabodes)
 cellularis (Austrocarabodes)
 cellularis (Galumnella)
 cellulatifer (Scapheremaeus)
 cellulatus (Damaeolus)
 cellulosa (Eremobelba)
 cendanai (Basilobelba)
 cendsureni (Hypovertex)
 centenarius (Kalayaan)
centraliamericana [N. (Amerigloboppia)]
centroamericana (Allosuctobelba)
centroamericana [T. (Teratoppiella)]
centroamericanus (Euzetes)
 centroclathrata [F. (Cosmogalumna)]
 centrodentata (Rhinoppia)
centropterus [N. (Parakalumma)] (=robustus)
 centurion [M. (Neobelba)]
cephalota (Oppia) sp. inq.
 cephalotes (Aleurodamaeus)
 cephalotes (Carabodes) *sp. inq.*
cephalotum (Stauroma)
 cepheiformis (Cepheus)
cepheiformis (Cepheus)
 cepheiformis (Cepheus)
 cerebralis (Nodocephus)
 cerebrum (Carabodes)
 cereus (Arthrodamaeus)
 cernuus (Euphthiracarus)
ceroplastes (Pheroliodes)
cervicornia (Crotonia)
cervifer (Wallworkoppia)
 cervus (Javieroppia)
cervus (Javieroppia)
 cervus (Microtegeus) M., 83
cervus (Microtegeus) M., 96 (=paracervus)
cervus (Tectocephus) sp. inq.
 cespitum (Oribatella) *sp. inq.*
ceylanicus (Megalotocephus) (=mahunkarum)
ceylanicus [L. (Paralamellobates)] (=misella)
 ceylonica (Machadobelba)
 ceylonicus (Dolicheremaeus)
 ceylonicus (Megalotocephus)
 ceylonicus (Microtegeus)
 chaac (Scapheremaeus)
 chabarica [S. (Flagrosuctobelba)]
 chacoensis (Benoibates)
 chadaevae (Proteremaeus)
 chajulensis (Malaconothrus)
 chalazionus (Gymnodamaeus)
 chaliyamensis (Hoplophorella)
 chamartinensis [P. (Vepracarus)]
chambrieri (Mochlozetes)
 chamela (Haplochthonius)
chamela (Haplochthonius)
chamelensis (Archegozetes) (=longisetosus)
chamobatoides [L. (Incabates)] (=tenuifusus)
 champagnensis (Afrozetes)
 chancanii (Eremaezetes)
 chandleri [C. (Klapperiches)]
 changbaiensis (Parautogneta)
 changchunensis (Galumna)
 changlingensis (Ghilarovus)
 chapmani (Mixacarus)
 chaquensis (Scapheremaeus)
chatham [N. (Protophthiracarus)]
 chauhani (Schelorbates)
 chavinensis [E. (Multoribates)]
 chavinensis [E. (Multoribates)]
 chavinensis (Neoamerioppia)
 chavinensis (Neoamerioppia)
 chavinensis (Sphaerozetes)
 chavinensis (Sphaerozetes)
 chejuensis (Nippobodes)
cheloniella (Scapheremaeus)
 cheni (Neoribates)
 chernovae (Atropacarus)
chernovi (Lepidozetes) (=singularis)
 cherokee (Carabodes)
 cherokee (Carabodes)
 cherokee (Oribotritia)
 cherubin (Polypterozetes)
 chiatous (Eueremaeus)
 chiayiensis (Muliercula)
 chibai (Acutozetes)
 chichijimensis (Oribotritia)
chichijimensis (Oribotritia)
 chiebusensis [L. (Dorycranosus)]
 chilensis (Anderemaeus)
 chilensis (Domatorina)
 chilensis (Lamellozetes)
 chilensis (Multioppia)
 chilensis (Neoamerioppia)
 chilensis (Paraphauloppia)
 chilensis [N. (Protophthiracarus)]
 chilensis (Trhypochthoniellus)
 chiloensis (Crotonia)
 chimaera (Balogheremaeus)
 chimaera (Trichogalumna)
 chimalae (Zachvatkinella)
 chinensis (Fissicephus)
 chinensis (Gerloubia)
 chinensis (Gibbicephus)
 chinensis (Meristolohmannia)
 chinensis (Trachyoribates)
 chinonei (Sellnickochthonius)
 chinonei (Suctobelba)
 chinonei [S. (Ussuribata)]
 chiranensis (Tokunocephus)
 chirstlus (Carabodes)
 chistyakovi [L. (Antennoppia)]
chistyakovi (Oppiella) (=nova)
chistyakovi [P. (Triaunguis)]
 chitinofincta (Anomaloppia)
 chitralensis [S. (Flagrosuctobelba)]
 chitralensis (Trichogalumna)

chitralensis (Trichogalumna)
 chiyukiae (Pergalumna)
 choerognathus (Nasozetes)
 chongqingensis (Paralycus)
chrisengelbrechti [G. (Rostrogalumna)]
christineae (Tuparezetes)
 christovi (Arenozetes)
chroniosus (Liacarus) (=gracilis)
 chujoi (Galumna)
chujoi (Galumna)
 chukchi [D. (Epidamaeus)]
 chulumaniensis (Ramusella)
chulumaniensis (Ramusella)
 cicatricosus (Dolicheremaeus)
 cidarus (Liacarus)
ciliata (Leptogalumna)
ciliata (Leptogalumna)
ciliata (Leptogalumna)
ciliata (Leptogalumna)
ciliata (Teratoppia)
 ciliatus (Limnozetes)
 ciliatus (Limnozetes)
¿ciliatus (Limnozetes)?
 ciliosus (Atropacarus)
 ciliosus (Stomacarus)
ciliosus (Stomacarus)
 cincinnatus [D. (Epidamaeus)]
 cincta (Banksinoma)
cinctus (Torpacarus)
 cingulatus (Eremulus)
circula (Pergalumna) sp. inq.
circularis (Galumna)
circularis (Tumerozetes)
 circulus (Epieremulus)
circumalatus (Planobates)
 circumcarinatus (Topobates)
circumciliata (Pseudoamerioppia)
 circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
 circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
 circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
circumvallatus (Neoliodes) (=theleproctus)
cirripilis (Galumna) sp. inq.
circumita [Q. (Coronoquadroppia)]
cirrosus [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
 cisalpina (Ceratozetella)
 cisalpina [C. (Ceratozetella)]
 citelli (Oribella)
 cladonicolus (Trhypochthonius)
 cladonicolus (Trhypochthonius)
clandestinus [N. (Protophthiracarus)]
 clara (Hermannia)
clara (Mesotritia) (=maerkeli)
 clarencei (Achipteria)
clarki (Austrothrus)
clathratus (Sphaerozetes)
claudelionsi [R. (Insculptoppia)]
 clavasensilla (Belba)
clavasetosa (Hermanniella)
clavasetosa (Pseudoceratoppia)
 clavata [O. (Aciculoppia)]
 clavata [O. (Aciculoppia)]
 clavata (Acrotritia)
clavata (Acrotritia)
clavata (Acrotritia)
clavata (Acrotritia)
clavata (Aeroppia)
clavata (Beckiella)
clavata (Galumnopsis)
clavata [G. (Indogalumna)] (=neonominata)
clavata (Indotritia)
 clavata (Moritzoppia) sp. inq.
clavata (Oripoda)
clavata [H. (Phyllhermannia)]
clavata (Topalia)
 clavata [S. (Ussuribata)]
 clavata [O. (Zygoribatula)]
 clavatoflagellatus (Eremulus) sp. inq.
 clavatopilus (Xenillus)
clavatosensillus [H. (Kakophthiracarus)]
 clavatosensillus (Scutozetes)
 clavatotrichobothria [O. (Zygoribatula)]
clavatus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
 clavatus (Atropacarus)
 clavatus (Atropacarus)
clavatus (Atropacarus)
 clavatus (Birsteinus)
clavatus (Carabodes) Warb., 12 sp. inq.
clavatus (Carabodes) Jac., 38 (=neonominatus)
clavatus (Cristeremaeus)
clavatus (Euphthiracarus)
 clavatus (Fissicepheus)
 clavatus (Fissicepheus)
 clavatus (Haplochthonius)
 clavatus (Haplochthonius)
clavatus (Haplochthonius)
 clavatus [I. (Haplozetes)]
 clavatus (Hemileius)
 clavatus (Hoplophthiracarus)
 clavatus [T. (Latilamellobates)]
 clavatus (Liochthonius)
clavatus (Notophthiracarus)
 clavatus (Ommatocephus)
 clavatus (Oribellopsis)
 clavatus (Peloribates)
 clavatus [S. (Perschelorbates)]
clavatus [S. (Perschelorbates)]
 clavatus [L. (Procorinetes)]
clavatus (Protozetes)
 clavatus (Tectocephus) velatus
 clavatus (Tectocephus) velatus
 clavatus (Transorbates)
 clavatus [E. (Trischelorbates)]
clavatus [A. (Uluguroides)] pentatrichus
 clavatus (Unguizetes)
 clavatus (Unguizetes)
 clavellatus (Hoplophthiracarus)
clavifer (Hoplophorella)
clavifer (Phthiracarus)
clavifer (Scapheremaeus)
 clavifer (Dolicheremaeus)
 clavifer (Dolicheremaeus)
claviger [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
 claviger (Eupelops)
claviger (Hoplophorella)
 clavigera (Hermanniella)
 clavigera (Hermanniella)
 clavigera (Metabelbella)
 clavigera (Moritzoppia) unicarinata
 clavigera (Moritzoppia) unicarinata
 clavigerus (Atropacarus)
clavigerus (Notophthiracarus) (=pearcei)
 clavigerus [P. (Oribellopsis)] sp. inq.

clavigerus (Pseudotocepheus)
clavilanceolatus (Scheloribates)
clavimera (Setoppia)
claviopsis (Fissicepheus)
clavipectinata (Ramusella)
clavipectinata (Ramusella)
clavipectinata (Ramusella)
clavipectinata (Ramusella)
clavipectinata (Ramusella)
clavipectinatus (Scheloribates) (=latipes)
clavipes [D. (Paradamaeus)]
clavisensillata (Ceratoppia)
claviseta (Kuklosuctobelba)
claviseta (Kuklosuctobelba)
claviseta (Kuklosuctobelba)
clavisetosa (Zetorchella) (=latior)
clavisetus (Cordiozetes)
clavisetus (Euscheloribates)
clavisetus (Euscheloribates)
clavisetus (Scapheremaeus)
clemens (Phthiracarus)
clemens (Phthiracarus)
clericata (Carinogalumna)
closteros (Acrotritia)
closteros [P. (Archiphthiracarus)]
clypeator (Xenillus)
clypeator (Xenillus)
clypeator (Xenillus)
clypeatus (Pteramerus)
clypeatus (Scutovertex) sp. inq.
clypeatus (Zetomimus) (?=furcatus)
coarctatus (Haplimerus)
coarctatus (Pseudotocepheus)
cochleaformis (Carabodes)
cochlearia (Globoppia)
cochlearia (Hoplophorella) (=hamata)
cocuyana (Neomerioppia)
coetzeeae (Microlamellarea)
coetzeeae (Notophthiracarus)
coggii (Oribatula) (=tibialis)
cognata [O. (Oxyoppiella)] bituberculata
cognata [O. (Zygoribatula)]
cognatus [P. (Archiphthiracarus)]
coihici [K. (Glabroppia)]
coiffaiti (Perlohmannia)
¿coiffaiti (Perlohmannia)?
coineau (Arthrovertex)
coineau (Phauloppia) (=nemoralis)
colchica [O. (Monoribatella)]
colchicus (Ceratozetes)
colemanni [O. (Zygoribatula)]
coleoptrata (Achipteria)
coleoptrata (Achipteria)
coleoptrata (Achipteria)
coleoptrata (Achipteria)
coleoptrata (Galumna) (=lanceata)
colini [H. (Phyllhermannia)]
collaris (Hoplophorella)
colliger [P. (Neotocepheus)]
colloff [H. (Phyllhermannia)]
colloff [L. (Zeaotritia)] (=brevisetosa)
colobanthi (Halozetes) (=crozetensis)
colombiana (Acrotritia)
colombiana (Galumna)
colombiana (Hoplophorella)
coloradensis (Galumna)
coloradensis (Oppia)
colorado (Carabodes)
colossus (Galumna)
columbiana (Aeroppia) (=magnipilosa)
columbiana (Hermannella) (=subnigra)
columbiana (Pergalumna) (=emarginata)
columbianus [L. (Dorycranosus)]
columbianus [L. (Dorycranosus)]
columbianus (Eueremaeus)
columbianus (Eueremaeus)
columbianus (Xenillus)
columbreti [T. (Latilamellobates)]
comas (Carabodes)
comatus [P. (Archiphthiracarus)]
comatus [N. (Calyptophthiracarus)]
comatus (Hemileius) (=quadripilis)
comatus (Topobates)
combinatus (Umbellozetes)
comelicensis (Astegistes) (=pilosus)
comitalis (Nanhermannia)
comitalis (Nanhermannia)
communis (Totobates)
commutabilis (Phthiracarus) (=compressus)
commutata (Lauropia)
commutata (Oribatula)
comoroensis (Dimidiogalumna)
comoroensis (Sellnickochthonius)
comosa (Xenolohmannia)
comosus [P. (Neophthiracarus)]
compacta [I. (Afrotritia)]
compacta (Parasuctobelba)
comparabilis (Galumna)
comparabilis [H. (Phyllhermannia)]
comparandus (Pergalumna)
comparativus (Notophthiracarus)
complanatus (Pheroliodes)
complanatus (Plateremaeus)
completa (Indotritia) (=javensis)
completus (Nesiacarus)
complexa (Parasuctobelba)
complexa (Parasuctobelba)
complicata [O. (Aciculoppia)]
complicata (Pergalumna)
complicata (Senectoppia)
complicata (Tuxenia)
complicatus (Steganacarus) (=vestitus)
compositocarinata (Lauropia) sp. inq.
compressa (Setoppia)
compressus (Phthiracarus)
compressus (Phthiracarus)
compressus (Phthiracarus)
compta (Belba)
comteae (Acrotritia) (=vestita)
comteae (Eremobelba)
comteae (Euphthiracarus)
comteae (Rioppia)
concava (Camisia) (=spinifer)
concava (Separatoppia)
concavus (Bathocepheus)
concavus (Cosmochthonius)
concavus (Holonothrus)
concavus (Hoplophthiracarus)
concavus (Mixochthonius)
concavus (Pheroliodes)
concavus (Tegeocranellus)
concentricus (Neoliodes)

- concentricus* (*Neoliodes*)
concentricus (*Scheloriabates*)
concinna [O. (*Zygoribatula*)] (=connexa)
concinuus (*Hoplophthiracarus*)
concinuus (*Hoplophthiracarus*)
concolor (*Hoplophthiracarus*)
concolor (*Oppia*) (?=denticulata).
concolor [O. (*Zygoribatula*)] *sp. inq.*
concretus (*Maculobates*) *sp. inq.*
concurvatus (*Comorozetes*)
concurvatus (*Tectocephus*) (=sarekensis)
condylifer (*Condyloppia*)
confertus (*Cubabodes*)
confervae (*Hydrozetes*)
confervae (*Hydrozetes*)
confinis [N. (*Confinoppia*)]
confinis (*Cultroribula*)
confinis (*Cultroribula*)
conflata (*Granuloppia*)
confluens (*Allogalumna*)
confluens (*Plakoribates*)
confluentina (*Pergalumna*) *sp. inq.*
conformis (*Gymnodampia*) (=fusca)
conformis (*Phauloppia*) (=lucorum)
conformis (*Phthiracarus*) (=lentulus)
confundatus (*Hemileius*) (=initialis)
confusa (*Arcoppia*) (=robusta)
confusa (*Pergalumna*) (=louisianae)
confusa (*Ramusella*)
confusius (*Scheloriabates*)
confusus (*Chamobates*)
confusus (*Chamobates*)
confusus (*Xenillus*)
conglobatus (*Scheloriabates*) *parvus*
congoensis (*Granuloppia*)
congoensis (*Hermanniella*)
congoensis (*Neoctenogalumna*)
congregator (*Trhypochthonius*) *tectorum*
congruus (*Verachthonius*)
conica [S. (*Flagrosuctobelba*)]
conicus (*Malaconostrus*)
conicus (*Papillacarus*)
coniferina (*Behanpseudoppia*)
coniferus (*Nostrus*)
conirostris [S. (*Bischeloriabates*)]
conitus [M. (*Calyptozetes*)]
conitus [M. (*Calyptozetes*)]
coniunctus (*Tectocephus*) (=velatus)
coniunctus [S. (*Tropacarus*)]
conjuges [S. (*Perscheloriabates*)]
conjuges [S. (*Perscheloriabates*)]
conjuncta (*Berniniella*)
conjuncta (*Phauloppia*) (=lucorum)
conjunctus (*Ceratozetes*)
conjunctus (*Dolicheremaeus*)
conjunctus (*Lepidozetes*) (=singularis)
conjunctus (*Liacarus*) *sp. inq.*
conjunctus [P. (*Minguezetes*)]
conjunctus (*Zachvatkinibates*)
conjungenus (*Damaeus*)
connexa (*Gustavia*) (=magnilamellata)
connexa [O. (*Zygoribatula*)]
connexa [O. (*Zygoribatula*)]
connexa [O. (*Zygoribatula*)]
connexus (*Ophidiotrichus*) (=tectus)
consanguineus (*Microzetorchestes*) (=emeryi)
consectionus (*Peloriabates*)
consimilis [O. (*Acrotocephus*)]
consimilis (*Aeropopia*) (=floridana)
consimilis [M. (*Calyptozetes*)] (=sarekensis)
consimilis (*Indotritia*)
consimilis [L. (*Lancelalmoppia*)]
consimilis (*Nesutegaeus*)
consimilis (*Notophthiracarus*)
consimilis (*Suctobelba*)
conspectus (*Trhypochthonius*)
conspersus [P. (*Metaphthiracarus*)]
conspicua (*Pergalumna*)
conspicuus (*Notophthiracarus*)
conspicuus (*Ramsayellus*)
conspicuus (*Tricheremaeus*)
contactus (*Dolicheremaeus*)
contaminatus (*Eupelops*)
contigua (*Hexachaetoniella*)
contigua (*Hoplophorella*)
contiguus (*Ceratozetes*) (=conjunctus)
contiguus (*Exochocephus*)
contiguus [S. (*Kaibacepheus*)]
contiguus (*Liacarus*)
continua (*Nanhermannia*)
contortula (*Oribotritia*)
contortulus (*Notophthiracarus*)
contracta [O. (*Zygoribatula*)]
contractilis (*Phthiracarus*) (=laevigatus)
contractus (*Pseudotocephus*)
contractus (*Pseudotocephus*)
contraria (*Microtritia*)
contraria (*Oribotritia*)
contrarius (*Notophthiracarus*)
controversus (*Steganacarus*)
conundrum (*Pedrocortesella*)
convexa (*Hermannia*)
convexa (*Hermannia*)
convexa (*Hermannia*)
convexa (*Hermannia*)
convexa (*Novazelandiella*)
convexus (*Scapheremaeus*)
convexus (*Tegeocranellus*)
cooki (*Euphthiracarus*)
cooki [Z. (*Protozetomimus*)]
copectus (*Hemileius*)
cophinaria (*Crotonia*)
cophinaria (*Crotonia*)
copiosus (*Pheroliodes*)
copperminensis (*Trichoribates*)
copperminensis (*Trichoribates*)
copulata (*Furcoribula*) (=furcillata)
coracinus (*Liacarus*)
coracinus (*Liacarus*)
corae (*Cepheus*)
coralablensis (*Allodamaeus*)
corallifera [B. (*Gressittoppia*)]
corallium (*Lohmannia*)
cordatus (*Damaeus*)
cordiformis (*Eremaeus*) *hepaticus*
cordisetus (*Caveremulus*)
cordisetus [T. (*Cristonothrus*)]
cordobensis (*Oripoda*)
cordobensis (*Pheroliodes*)
cordobensis (*Ramusella*)
cordobensis (*Staurobates*) *schusteri*
cordylinosa (*Paraphauloppia*)
cordylus (*Notophthiracarus*)
coreana (*Galumna*)

coreana (Gymnodampia) crassisetiger
 coreana (Gymnodampia) crassisetiger
 coreana (Lohmannia)
 coreanus (Dolicheremaeus) infrequens
 coreanus [D. (Epidamaeus)]
 coreanus (Liacarus) gammatum
 coreanus (Perxylobates)
 coriaceus (Alaskozetes)
coriaceus (Alaskozetes)
 coriaceus (Carabodes)
 coriaceus (Carabodes)
 corletti (Acrotritia)
 corneri (Sabacarus)
corneri (Sabacarus)
corneri (Sabacarus)
 corniculata (Dissorhina) ornata
 corniculata [R. (Insculptoppia)] P.-I. y P., 97
corniculata [R. (Insculptoppia)] I.yV.,99(=neonominata)
 corniculata (Pergalumna)
 corniculatus (Fissicepheus)
corniculifera (Arcoppia)
 corniculifera (Arcoppia)
 ?*corniculifera (Arcoppia)?*
 corniger (Scapheremaeus)
 cornigera (Suctobelba)
cornigera (Suctobelbella) (?=acutidens)
 cornuta (Belba)
cornuta (Ceratoppia) (=bipilis)
cornuta (Crotonia)
 cornuta (Furcoppia)
cornuta (Furcoppia)
cornuta [H. (Kakophthiracarus)] (=multirugosa)
 cornuta (Negroppia)
 cornuta (Parapyroppia)
cornuta (Pedrocortesella)
cornuta (Suctobelba) (=cornigera)
 cornuta (Suctobelbella)
 cornuta (Suctobelbilla)
 cornutus (Ceratorchestes)
 cornutus (Costeremus)
cornutus [M. (Cristonothrus)]
 cornutus (Eueremaeus) sp. inq.
cornutus (Humerobates)
 cornutus (Iugoribates)
cornutus [C. (Magoebazetes)]
 cornutus (Microtegeus)
 cornutus (Scapheremaeus)
 cornutus (Tecteremaeus)
 cornutus (Tecteremaeus)
 cornutus (Tecteremaeus)
 cornutus [P. (Vepracarus)]
cornutus [P. (Vepracarus)]
 corolevuensis (Pergalumna)
corolevuensis (Pergalumna)
corolevuensis (Scheloribates) thermophilus
 coronarius (Dolicheremaeus)
 coronarius (Fissicepheus)
 coronarius (Fissicepheus)
coronata (Berniella) (=hauseri)
 coronata (Eremobelba)
 coronata (Galumna)
 coronata [N. (Leptosuctobelba)]
coronata (Nanheremania) (=dorsalis)
 coronata [H. (Phyllhermannia)]
 coronatus [L. (Dorycranosus)]
 coronatus [C. (Klapperiches)]
 coronatus (Seboetocephus)

coronopubes (Topobates)
coronospinosus (Novonothrus)
 corporaali (Oribotritia)
corpulentus (Austrocarabodes) sp. inq.
corpuscula (Anachipteria) (=howardi)
 corpusculum (Scheloribates)
 corpuzrarosae [G. (Atypicogalumna)]
 corpuzrarosae [I. (Philippizetes)]
corrugata (Oppiella) (=nova)
corrugatum (Senectoppia) (=complicatum)
corrugatus (Ameronothrus) (=lineatus)
corrugatus (Comorozetes)
 corrugis (Pergalumna)
 corsicanus (Ophidiotrichus)
 corsicanus (Saxicolestes)
 corticalis (Nothrus) sp. inq.
corticalis (Phauloppia) (?=lucorum)
 corticeus (Mycobates)
 corticis [N. (Parakalumna)]
corticola (Oripoda)
 corynopus (Belba)
 corynopus (Belba)
 corynopus (Belba)
 coscobensis (Pergalumna) emarginata ssp. inq.
 costai [N. (Calyptophthiracarus)]
 costai [N. (Calyptophthiracarus)]
 costanotus (Damaeus)
costaricensis (Paulianacarus)
costaricensis (Rugocheus)
 costaricensis (Scheloribates)
 costata (Allogalumna)
 costata (Allogalumna)
 costata (Galumna)
 costula (Licnodamaeus)
 costulata (Beckiella)
 costulata (Tectoppia)
 costulatus (Austrocarabodes)
 costulatus (Eremaezetes)
 costulatus (Eupelops)
 costulatus (Licneremaeus)
 costulatus (Microzetes)
 costulatus (Plateremaeus)
 costulatus (Trichocarabodes)
 costulifera [N. (Amerigloboppia)]
 cotopaxiensis (Nothrus)
covarrubiasi (Loboppia)
 covarrubiasi (Novonothrus)
 coweetaensis (Carabodes)
 coxalis [D. (Epidamaeus)]
 coxalis [D. (Epidamaeus)]
 cozadensis (Pilogalumna)
cozumelensis (Mesotritia)
 craigheadi [D. (Epidamaeus)]
crassa (Macrogena)
 crassata [O. (Oxyoppiella)]
 crassiclava (Pilogalumna)
crassicostata (Galumna) (=setigera)
 crassimarginatus (Austrocarabodes)
crassiori (Austrotritia) lebronneci
crassipes (Hermannia) (=gibba)
crassipes (Oribatula) (=tibialis)
 crassipilosa [O. (Bioribatella)]
crassipodus (Scheloribates)
 crassipora (Pergalumna)
 crassirostris (Punctoribates) sellnicki
 crassisensillatus [D. (Epidamaeus)]
crassiseta (Acutoppia)

crassiseta (Austroceratoppia)
crassisetae (Euphthiracarus)
 crassisetiger (Eohypochthonius)
crassisetiger (Eohypochthonius)
crassisetiger (Eohypochthonius)
 crassisetiger (Gymnodampia)
crassisetiger (Gymnodampia)
crassisetiger (Indoribates)
 crassisetiger (Protoribates)
 crassisetosa (Belba)
crassisetosa (Heterobelba)
crassisetosa (Mesoplophora)
crassisetosa [E. (Neoepilohmannia)]
crassisetosus [T. (Cristonothrus)] (=sarkarae)
 crassisetosus (Eueremaus)
 crassisetosus (Haplochthonius)
crassisetosus (Magellozetes)
 crassisetosus (Ommatocepheus)
crassisetosus [S. (Perschelorbates)]
crassisetosus (Perxylobates)
crassisetosus (Steganacarus) (?=carusoi)
crassisetosus (Suctoribates)
crassisetosus [T. (Tyrphonostrus)]
 crassisetus (Nothrus)
 crassispinosus [D. (Spatiodamaeus)] sp. inq.
 crassus (Afroleius)
 crassus [P. (Archiphthiracarus)]
 crassus (Liochthonius)
crassus (Nesopelops)
crassus [S. (Perschelorbates)]
crassus (Scapheremaus)
crassus (Schelorbates) Ham., 67
crassus (Schelorbates) Kul., 79 (=repetitus)
crassus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
 crassuta [M. (Multilanceoppia)]
 craterifer (Plesiodamaeus)
craterifer (Steganacarus)
craticula [H. (Phyllhermannia)]
cremersi (Metabelba) (=papillipes)
 crenata [Q. (Coronoquadroppia)]
crenata [Q. (Coronoquadroppia)]
crenata (Galumna)
crenata [R. (Insculptoppia)]
 crenatosetosa (Parabelbella)
crenellatus (Austrocarabodes)
crenophilus (Phthiracarus) (=longulus)
 crenula (Hoplophorella)
 crenulata (Tenuiala)
 crenulatus (Oribatodes)
 crenulatus (Synchthonius)
crenulatus (Synchthonius)
creta (Teratoppia)
cretensis [N. (Calyptophthiracarus)] (=pavidus)
 cretensis (Dissorhina)
 cribelliger [M. (Calyptozetes)]
 cribraria (Ferolocella)
 cribrarius (Euphthiracarus)
cribrarius (Euphthiracarus)
cribrarius (Euphthiracarus)
cribratus (Solenozetes)
cribriger (Pergalumna)
cribriger (Pergalumna)
 cricoides (Sellnickochthonius)
cricoides (Sellnickochthonius)
cricoides (Sellnickochthonius)
 crimicus (Schelorbates)

crinata (Hoplophorella)
crinita (Oribella) (=pectinata)
crinita (Zetorchella) (=pedestris)
crinitosimilis [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
 crinitus [M. (Archegotocepheus)]
crinitus [M. (Archegotocepheus)]
crinitus (Austrocarabodes) sp. inq.
crinitus (Benobates)
crinitus [H. (Capillonothrus)] (=thori)
 crinitus (Diapterobates)
 crinitus (Eupelops) sp. inq.
crinitus (Nothrus) (=berlesei)
 crinitus (Phthiracarus)
crinitus (Plenotocepheus)
 crinitus [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
 crispatus (Damaeus)
 crispirhina (Suctobelbella)
 crisposetosa [N. (Leptosuctobelba)]
crispus [P. (Archiphthiracarus)]
 crispus [P. (Archiphthiracarus)]
crispus [P. (Archiphthiracarus)]
 crispus (Dolicheremaus)
crispus (Eremulus)
crispus (Indoribates) (=punctulatus)
crispus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
crispus [M. (Trimalaconothrus)]
crispus [M. (Trimalaconothrus)]
 cristata (Apoplophora)
 cristata [O. (Dzarogneta)]
cristata (Microtritia)
 cristata (Moritzoppia) uncarinata
cristata (Quadroppia)
 cristata [G. (Stenoppia)]
 cristata (Ululohmannia)
 cristatus (Hoplophthiracarus) Aoki, 80
cristatus (Hoplophthiracarus) L., W. y C., 11
cristatus (Licneremaus)
 cristatus (Otocepheus)
cristatus (Otocepheus)
 cristatus (Rostrozetes)
 cristatus [N. (Steganacarellus)]
 cristatus (Tecteremaus)
 cristatus (Zetomimus)
 cristatus (Zetomimus)
 cristipes (Trematoppia)
croajngolongensis [H. (Phyllhermannia)]
cronadun [N. (Protophthiracarus)]
cronus (Arcoppia)
 crosbyi (Hypochthoniella)
 crosbyi [P. (Oribellopsis)]
 crosbyi [P. (Oribellopsis)]
 crossleyi [S. (Dyobelba)]
 crossleyi (Melanozetes)
crozetensis (Austroppia)
crozetensis (Austroppia)
crozetensis (Austroppia)
crozetensis (Halozetes)
crozetensis (Halozetes)
crozetensis (Halozetes)
crozetensis (Humerobates)
cruciata (Schalleria)
 cruciseta (Schelorbates)
 crux (Porrhoppia)
cruzae [P. (Vepracarus)]
cryophilus (Truncopes)
 cryptacus [S. (Grandjeanobates)]
 cryptisetosa (Moritzoppia)

- cryptodonta (Cryptogalumna)
 cryptomeriae (Arcoppia)
cryptonota (Lyriffissiella)
 cryptopa (Maerkelotritia)
cryptopa (Maerkelotritia)
cryptoreticulata (Pedrocortesella)
cryptus (Euscheloribates)
 crystallina (Dometorina)
csabai (Neoamerioppia)
csavatorum [G. (Bigalumnella)]
 csikii [C. (Klapperiches)]
 csiszarae (Atropacarus)
 csiszarae (Ctenobelba)
csiszarae (Lanceoppia)
csoengeyi (Pilizetes)
csuzdii (Dolicheremaeus)
csuzdii (Eremulus)
csuzdii (Hymenozetes)
csuzdii (Schalleria)
 ctenifera (Oxybrachioppia)
cuauhtemoctzini (Fuscozetes)
cubaensis (Pergalumna)
cubana (Allogalumna)
cubana (Beckiella)
cubana (Borhidia)
cubana (Galumna)
cubana (Mesoplophora)
cubana (Oripoda)
cubana [O. (Oxyoppiella)]
cubanus (Arceremaeus)
cubanus (Cosmozetes)
cubanus (Hermannobates)
cubanus (Licneremaeus)
cubanus (Rostrozetes)
cubanus (Scheloribates) praeincisus
cucheae (Pergalumna)
cucheana [L. (Bicristoppia)]
cuculla [H. (Kakophthiracarus)]
 cucullata (Achipteria)
 cucullata (Hoplophorella)
cucullata (Hoplophorella)
cucullata (Hoplophorella)
cucullata (Hoplophorella)
cucullata (Hoplophorella)
cucullata (Hoplophorella)
cuculloides (Hoplophorella) (=cucullata)
cucundus [N. (Protophthiracarus)] (=diazae)
 cuii [P. (Tectodamaeus)]
 culterisetosus [D. (Epidamaeus)]
cultrata (Epilohmannia)
cunangra (Acrotritia)
 cuneata (Galumna)
cuneatus (Lamellobates)
cuneiseta (Hoplophorella) (=hamata)
 cuneocostulata (Moritzoppia)
cupulata (Crotonia)
 cupulatus (Neoribates)
curarii [H. (Varioppia)] (=radiata)
curassensis (Hoplophorella) (=hamata)
curiosus [P. (Archiphthiracarus)]
curiosus (Notophthiracarus)
curiosus [S. (Perscheloribates)]
 curta (Achipteria)
curta (Achipteria)
curta (Achipteria)
curta (Oromurcia) (=lucens)
curtatus [N. (Protophthiracarus)]
- curticephala (Acrotritia)
curticephala (Acrotritia)
curticephala (Acrotritia)
curticephala (Acrotritia)
curtipes (Globoppia) sp. inq.
curtipetata (Eremobelba)
curtipila (Arcoppia)
 curtipilis (Ceratoppia) bipilis
 curtipilis [L. (Dorycranosus)]
 curtipilis [I. (Haplozetes)] vindobonensis
 curtipilis (Melanozetes) *sp. inq.*
curtipilus (Eupelops) (=sulcatus)
 curtipilus (Peloribates)
curtipilus (Peloribates)
curtipilus (Pilizetes)
curtipilus (Pseudotocepheus) sp. inq.
 curtipilus (Ramusella)
 curtipilus (Ramusella)
curtipilus (Ramusella)
curtipilus (Ramusella)
 curtiramosa [R. (Rectoppia)] stinatii
 curtiramosa (Rhinoppia) obsoleta
curtiseta (Arcoppia) arcualis
 curtiseta (Odontocepheus)
 curtiseta [S. (Plenoxyllobates)]
curtiseta (Pseudotocepheus)
curtiseta (Hoplophorella)
curtispina (Ceratozetes) subaquila
 curtispinosa (Basidoppia)
curtulus (Phthiracarus)
curtulus (Phthiracarus)
curtus (Damaeus) sp. inq.
curtus (Liacarus) (=inermis)
curtus (Liochthonius)
curva (Trichogalumna)
curva (Trichogalumna)
 curvata [H. (Phyllhermannia)]
curvatus (Granizetes)
curvatus (Granizetes)
 curvialatus (Scheloribates)
curvialatus (Scheloribates)
 curvicarinatus (Protoribates)
 curviclavata (Globoppia)
 curvidentatus (Liacarus) *sp. inq.*
curvifamulus (Galumna)
 curviporosa (Neogalumna)
 curvirhynchus [S. (Perscheloribates)]
curvirostrata (Arcoppia)
 curvisacculatus (Peloribates) acutus
curviseta (Austrothrus)
curviseta (Eremulus)
curviseta (Eutegaeus) (=bostocki)
curviseta [M. (Perutritia)]
curviseta (Phauloppia)
 curvisetiger [O. (Acrotocepheus)]
 curvisetiger (Austrocarabodes)
 curvisetosus (Fissicepheus)
 curvisetosus (Microtegeus)
 curvisetus (Dolicheremaeus) Mah., 74
curvisetus (Dolicheremaeus) Ham., 81 (=praeoccupatus)
 curvisetus (Malgasodes)
curvispina (Acropia)
 curypterus (Unguizetes)
 cuscensis (Brachioppia)
 cuscensis (Brachioppia)
cuscensis (Brachioppia)

- cusdensis* (*Podoribates*)
 cuspidatiformis (Chamobates)
 cuspidatus (Amerus)
 cuspidatus (Berlesezetes)
cuspidatus (*Ceratozetes*)
 cuspidatus (Chamobates)
cuspidatus (*Chamobates*)
cuspidatus (Chamobates)
 cuspidatus (Diapterobates) pusillus
cuspidatus (Dolicheremaeus)
 cuspidatus (Heterozetes)
cuspidatus (*Liacarus*) (=xylariae)
cuspidatus [F. (Parafurcobates)]
 cuspidatus (Podoribates)
 cuspidatus (Podoribates)
cuspidatus (Scapheremaeus)
cuspidatus (*Scotiazetes*)
cuspidentatus (*Tectocephus*) (=minor)
 cuspidodenticulata (Ceratozetella)
 cuticulatus [I. (Haplozetes)]
cuyi (Dolicheremaeus)
cuyi (Scheloribates)
cuyi [P. (Triaunguis)]
cyclonotus (*Neoliodes*) sp. inq.
cyclopeus (*Ceratozetes*)
 cyclops (Scapheremaeus)
cyclosoma (*Oppia*) (=denticulata)
cyclospora [O. (*Zygoribatula*)]
 cylindrica [D. (Cylindroppia)]
cylindrica [D. (Cylindroppia)]
cylindrica [D. (*Cylindroppia*)]
 cylindrica (Epilohmannia)
cylindrica (*Epilohmannia*)
cylindrica (Epilohmannia)
cylindrica (Epilohmannia)
cylindrica (Epilohmannia)
cylindrica (*Epilohmannia*)
cylindricus (*Torpacarus*)
 cymba (Cymbaeremaeus)
 cymba (Cymbaeremaeus)
cyncephalus (*Carabodes*) (=cephalotes)
cypha (Indotritia)
 daamsae (Lasiobelba)
dactylaris (*Pergalumna*)
 dactylaris [O. (*Zygoribatula*)]
 dactyloscopica (Jornadia)
dactyloscopica (*Jornadia*)
dactyloscopicus (Notophthiracarus)
 dactyloscopicus [C. (Xiphobates)]
 daghestanica (Belba)
 daghestanica (Epilohmannia)
daimonios [N. (Protophthiracarus)]
dalawaeus [S. (Bischeloribates)]
dalecarlica [A. (*Conchogneta*)] (=willmanni)
dalenii (Tripiloppia)
 daliensis (Ghilarovus)
 daliensis [P. (Tectodamaeus)]
 dallaii (Mystroppia)
 damavandica [R. (Rectoppia)]
danbartai (*Rhynchoribates*)
damjanovichi (*Cosmozetes*)
 damoeoides (Dolicheremaeus)
damoeoides (Dolicheremaeus)
damoeoides (*Dolicheremaeus*)
danae [S. (*Tropacarus*)] (=coniunctus)
 danaus (Scheloribates)
dandenongensis (Notophthiracarus)
- danos* (*Eueremaeus*)
danos [S. (*Guatemalozetes*)]
 danubialis (Sellnickochthonius)
 danubianus (Phthiracarus) sp. inq.
daoensis (Scheloribates)
 dargoltsiana [S. (*Flagrosuctobelba*)]
darjeelingensis (Megalotocephus)
darwinensis (Eremaeozetes)
darwini (*Eremaeozetes*)
darwini [P. (*Neophthiracarus*)]
darwini [M. (Trimalaconothrus)]
 dashidorzsi (Lepidozetes)
dasyopus (*Phthiracarus*) (?=laevigatus)
daviesae (Crotonia)
davisi (*Austrocarabodes*)
 davisi (Haplacarus)
davisorum (*Xenillus*)
dawidi (Brachioppiella)
 debililamellata (Rhinoppia)
debilis (*Eueremaeus*) (=quadrilamellatus)
 debilis (Mycobates)
debilitranslamellata [O. (*Zygoribatula*)] (=frisiae)
deboissezoni (Congoppia)
deboissezoni (*Congoppia*)
 decarinatus (Scheloribates)
 decarinatus (Scheloribates)
 decedens (Amerobelba)
 decempectinata (Lauroppia)
 decemsetiger (Adrodamaeus)
 decemsetiger (Adrodamaeus)
decemsetosa (Neoamerioppia)
dechambrieri (*Acaroceras*)
dechambrieri (*Oribatella*)
dechambrierorum (*Arcoppia*)
decipiens (*Acrogalumna*) (=longipluma)
decipiens (*Atropacarus*) (=immundus)
 decipiens (Oxyoppioides)
decorata (*Pergalumna*)
decorata (*Suctobelbella*)
decoratissima (*Pergalumna*)
 decoratus (Papillocephus)
decoratus (Plumobates)
 decoratus (Similochthonius)
decorus (Papillocephus)
decorus (*Rostrozetella*)
decoui (*Reticulocephus*)
 decui (Lasiobelba)
decumana (*Oribatella*) (=calcarata)
decumana (*Oribotritia*) (?=berlesei)
decumanus (*Peloribates*)
decurvatus (Afroleius)
 defectuosa (Ramusella)
 defectus (Fissicephus)
defectus (Fissicephus)
 deficiens (Anachipteria)
deficiens (*Beckiella*)
deficiens (Neoamerioppia)
deficiens (Papillocephus)
 deficiens (Similobates)
 deformatoides (Afroleius)
deformatus (*Xenillus*)
 deformis (Afroleius)
 degradatus (Meristacarus)
deharvengi (Bovicarabodes)
 delamarei (Niphocephus) nivalis
 delamarei (Provertex)
 delamellatus [P. (Montizetes)]

- delectum* (*Galumna*)
deleoni (*Zetorchella*)
delessei (*Suctobelbella*)
deletus [H. (*Tuberemaus*)]
delicata (*Lyroppia*)
delicata (*Suctobelbella*) (=subcornigera)
delicatissimus (*Plenotocephus*)
deliciosa (*Brachioppia*)
deliensis (*Trichoribates*) *sp. inq.*
delticus (*Pheroliodes*)
demeteri (*Basidoppia*)
demeteri (*Beklemishevia*)
demeteri (*Passalomonia*)
demeteri (*Scapheremaeus*)
demetorum (*Similobates*)
demetrii (*Gilarovella*)
demetrii (*Gilarovella*)
deminuta (*Oribotritia*)
deminutus [N. (*Steganacarellus*)]
denaliensis [C. (*Cyrtozetes*)]
denaliensis [C. (*Cyrtozetes*)]
dendricola (*Kokoppia*)
dendrisetosus (*Cryptacarus*)
dendroetus [C. (*Klapperiches*)] (=radiatus)
dendropectinata (*Mimoppia*)
dengi (*Leptogalumna*)
denigratus (*Pontiobates*)
denscanis [M. (*Neobelba*)]
densefoveolatus (*Dolicheremaeus*)
densipunctata (*Suctobelbilla*)
densoporosa (*Trypogalumnella*)
densus [P. (*Archiphthiracarus*)]
densus (*Eremulus*)
dentata (*Abchasiella*)
dentata (*Apoplophora*)
dentata (*Austroceratoppia*)
dentata (*Austrotritia*)
dentata (*Baloghoppia*)
dentata (*Furcoppia*) (=groblerae)
dentata (*Lauroppia*)
dentata [F. (*Mexicoppia*)]
dentata [F. (*Mexicoppia*)]
dentata (*Oribatula*) Mih., 1969 (=neonominata)
dentata (*Oribatula*) G. y S., 2000 (=praeoccupata)
dentata [H. (*Phyllhermannia*)]
dentata (*Pyroppia*) (=serrifrons)
dentata (*Suctobelbilla*)
dentata (*Suctobelbilla*)
dentata (*Suctobelbilla*)
dentata (*Suctobelbilla*)
dentata (*Suctobelbilla*)
dentata [O. (*Zygoribatula*)] *sp. inq.*
dentaticuspis [O. (*Bioribatella*)]
dentatus (*Cepheus*)
dentatus (*Chamobates*)
dentatus (*Eupterotegaeus*)
dentatus (*Humerobates*) (=rostromellatus)
dentatus (*Mabulatrichus*)
dentatus (*Mirabilozetes*)
dentatus (*Nemacepheus*)
dentatus (*Nodocephus*)
dentatus (*Nodocephus*)
dentatus (*Nodocephus*)
dentatus (*Pheroliodes*)
dentatus (*Pantelozetes*) (=paolii)
dentatus (*Plenotocephus*)
dentatus (*Protoribates*)
- dentatus* (*Protoribates*)
dentatus (*Protoribates*)
dentatus (*Protoribates*)
dentatus (*Pseudotocephus*)
dentatus (*Scheloribates*)
dentatus (*Sphodrocephus*)
dentatus (*Trichoribates*) novus
denticulata (*Lauroppia*)
denticulata (*Oppia*)
denticulata (*Oppia*)
denticulata (*Oppia*)
denticulatus (*Neseutegaeus*)
denticulatus (*Pilizetes*)
denticuspidatus (*Peloptulus*)
dentifer (*Edwardzetes*)
dentifer (*Edwardzetes*)
dentifer (*Edwardzetes*)
dentifera [O. (*Moritzoppiella*)]
dentilamellata (*Prionoribatella*)
dentilamellatus (*Eremaeus*) (=hepaticus)
dentipes (*Hermannia*) *sp. inq.*
dentirostrata (*Pergalumna*)
dentissima (*Novosuctobelba*)
dentissima (*Novosuctobelba*)
dentonvx (*Subphauloppia*)
dentotutorii (*Chamobates*)
depauperatus [C. (*Xiphobates*)]
depilata (*Strenzkea*)
depilatus (*Africoribates*)
depilatus (*Eupelops*) (=curtipilus)
depilatus [C. (*Klapperiches*)]
depilatus (*Orthozetes*)
depilis [L. (*Incabates*)]
depilis (*Mochloribatula*)
depressus (*Neoribates*)
depressus (*Neoribates*)
depressculus (*Euphthiracarus*)
depressus (*Tectocephus*) (=sarekensis)
desaussurei (*Cosmochthonius*)
desaussurei (*Kalyptrazetes*)
descombesi (*Machadobelba*)
deserticola (*Tectoribates*)
deserticola (*Thamnacarus*)
deserticus (*Bipassalozetes*)
desmeti [S. (*Tropacarus*)]
deswardti (*Aleurodamaeus*)
detectidens (*Pirnodus*)
detosus (*Liacarus*)
devilliersi (*Halozetes*) *marinus*
dewalteri (*Notophthiracarus*)
dhananjavi (*Allonothrus*)
diamantei (*Lophliodes*)
diamantensis (*Mikizetes*)
diamphidios (*Hoplophorella*)
dianae (*Unduloribates*)
diani (*Protoribates*)
diaphanus (*Atropacarus*) (=striculus)
diaphora [S. (*Campbelloppia*)]
diaphorillus (*Notophthiracarus*)
diaphoros (*Acrotritia*)
diaphoros (*Acrotritia*)
diaphoros (*Hoplophorella*)
diaphoros (*Microtritia*)
diaphoros (*Rhacaplacarus*)
diatropos (*Euphthiracarus*)
diatropos (*Hoplophorella*)

diatropos (*Steganacarus*)
diazae [*N. (Protophthiracarus)*]
dicella (*Crotonia*)
dicella (*Crotonia*)
diceros (*Allosuctobelba*)
dicrosa (*Rhynchobelba*)
dichosa (*Joboppia*)
dichosa (*Joboppia*)
dichotoma [*A. (Helvetobelba)*]
dickersoni [*L. (Dorycranosus)*]
dickinsoni [*C. (Klapperiches)*]
dicornus (*Eupelops*) *eximius*
dictyna (*Camisia*)
dictyna (*Camisia*)
didyma (*Austrotritia*)
didyma (*Indotritia*)
didyma (*Oribotritia*)
diehli [*O. (Acrotocephus)*]
differens (*Anomaloppia*)
differens (*Eupelops*) (=major)
differens [*I. (Haplozetes)*]
difficilis (*Galumna*) *sp. inq.*
difficilis [*P. (Neophthiracarus)*]
diffissa (*Suctobelbella*) (=italica)
diforamenatus (*Scheloribates*)
digita (*Cerachipteria*)
digitata (*Lamellarea*)
digitatus (*Scapheremaeus*)
digitifer (*Protozetes*)
digna (*Hoplophorella*)
dikra (*Acrotritia*)
dikra (*Acrotritia*)
dikroos (*Notophthiracarus*)
dikros (*Rhacaplacarus*)
dilatata (*Allogalumna*)
dilatata (*Allogalumna*)
dilatatus (*Euphthiracarus*)
dilatatus [*C. (Klapperiches)*]
dilatatus (*Hermannobates*)
dilatatus [*R. (Rhynchoribatodes)*]
dilatatus [*N. (Steganacarellus)*]
dillerorum (*Hermannobates*)
dilucidus [*N. (Protophthiracarus)*]
dilutus (*Liochthonius*)
dilutus (*Sphaerochthonius*) (=splendidus)
dimentmani (*Scheloribates*)
dimera (*Neoliodes*) (=theleproctus)
dimidiaspina (*Parabelbella*)
dimidiata (*Galumna*)
dimidiata (*Galumna*)
diminuta (*Setogalumna*)
diminutus [*L. (Nacunansella)*]
dimorpha (*Epilohmannia*)
dimorpha (*Epilohmannia*)
dimorpha (*Fortuynia*)
dimorpha (*Galumna*)
dimorpha (*Kodiakella*)
dimorphochaites (*Rostrozetes*)
dimorphus (*Hydrozetes*)
dindali [*S. (Dyobelba)*]
dinema (*Nothrus*) *sp. inq.*
dinghuensis [*H. (Phyllhermannia)*]
dinota (*Acrotritia*)
dipankari (*Malaconothrus*)
dipterocephalis (*Oribotritia*)
directa (*Wallworkoppia*)
discifer (*Anellozetes*)
discifer (*Nothrus*)
discifer (*Nothrus*)
discifer (*Scheloribates*)
discifer (*Totobates*)
discifera (*Galumna*)
discifera (*Galumna*)
discifera (*Galumna*)
discoidalis (*Beckiella*)
discoidalis (*Licneremaeus*)
discors (*Topobates*) (=medius)
discrepans [*O. (Acrotocephus)*] *duplicornutus*
discrepans (*Amiracarus*)
discrepans (*Muliercula*)
discrepans (*Plenotocephus*)
discrepans [*M. (Stylozetes)*]
discrepans (*Suctobelba*)
discrepans (*Xenillus*)
discrepans (*Xenolohmannia*)
discrepus (*Rhacaplacarus*)
discreta (*Apoplophora*) (=pantotrema)
discreta (*Neoppia*)
disiuncta (*Beckiella*)
disiuncta (*Pararamusella*)
disiuncta [*M. (Pravoppia)*]
disiunctus (*Xenillus*)
dispar (*Galumna*)
dispar (*Hoplophthiracarus*)
dispar (*Machadobelba*)
dispar (*Oribotritia*)
dispar (*Orthozetes*)
dispar (*Orthozetes*)
dispar [*P. (Porallozetes)*]
dispar (*Rostrozetes*)
dispar [*H. (Tuberemaeus)*]
disparilis [*E. (Pocsia)*]
dispariseta (*Anomaloppia*)
dispariseta (*Anomaloppia*)
dispariseta (*Anomaloppia*)
dispela (*Malaconothrus*)
dispersa (*Hexachaetoniella*)
dispersa (*Hexachaetoniella*)
dispersosetosa [*N. (Leptosuctobelba)*]
dispersus (*Notophthiracarus*)
dispersus (*Peloribates*)
dissecatus (*Vilhenabates*)
dissimilis (*Arcoppia*)
dissimilis (*Galumna*) *capensis*
dissimilis (*Hoplophorella*)
dissimilis [*C. (Klapperiches)*]
dissimilis (*Mesotritia*)
dissimilis (*Perlohmannia*)
dissimilis (*Perlohmannia*)
dissimiloides (*Arcoppia*)
dissonus [*P. (Archiphthiracarus)*]
dissonus [*P. (Neophthiracarus)*] (=praeoccupatus)
distenta (*Epimerella*)
distentus (*Neseutegaeus*)
distincta (*Galumna*) (=setigera)
distincta (*Hoplophorella*)
distincta (*Lauropia*)
distincta (*Oppiella*) (=neonominata)
distincta (*Oribella*) (=pectinata)
distincta (*Pergalumna*)
distincta [*C. (Triachipteria)*]
distincta [*C. (Triachipteria)*]
distinctus (*Dolicheremaeus*)
distinctus (*Dolicheremaeus*)

- distinctus (Eupelops)**
distinctus (Scheloribates)
distinctus [N. (Steganacarellus)]
distinguenda (Oromurcia) (?=bicuspidata)
ditrichosus (Megeremaeus)
divergens (Cultroribula) (=confinis)
divergens (Galumna)
divergens (Galumna)
divergens (Liebstadia) (=pannonica)
divergens (Oripoda)
divergens (Selenoribates)
diversa (Cultroribula)
diversa (Pergalumna) (=altera)
diversa (Pseudoceratoppia)
diversa [O. (Zygoribatula)] (=cognata)
diverseta (Rekharibatula)
diversiata (Allogalumna) (=integer)
diversicostulata (Moritzoppia)
diversidactylus (Scheloribates)
diversidactylus (Scheloribates)
diversipes [S. (Dyobelba)] (=carolinensis)
diversipilis [D. (Kunstidamaeus)]
diversipilus (Eupelops) (=plicatus)
diversiporosus [S. (Polyxylobates)]
diversiporosus [S. (Polyxylobates)]
diversiporosus [S. (Polyxylobates)]
diversiseta (Cosmochthonius) lanatus
diversiseta [T. (Paragloboppia)]
diversisetosa (Hermanniella)
diversisetosa (Hoplophorella)
diversisetosa (Hymenobelba)
diversisetosus (Xenillus)
diversosetosa [S. (Flagrosuctobelba)]
diversus [L. (Dorycranosus)] (=splendens)
diversus [D. (Epidamaeus)] tatricus *ssp. inq.*
diversus (Eupelops) (=uraceus)
diversus (Verachthonius)
divida (Acrotritia) (=rustica)
divida (Oribatula) (=interrupta)

divisa (Persuctobelba)
divisus (Caleremaeus) *sp. inq.*
dixa (Acrotritia)
djaparidzae (Ceratozetella)
djaparidzae [L. (Dorycranosus)]
djaparidzae [C. (Flexa)]
dkrivolutskyi (Galumna)
dlouhyi (Fijibates)
dlouhyi (Fijibates)
dlouhyorum [E. (Brasiliotritia)]
dlouhyorum [E. (Brasiliotritia)]
doderleini (Platylodes)
dodsoni (Pergalumna)
dogmai (Cuneoppia)
doliaris (Hermannia) *sp. inq.*
dolosa (Hermanniella)
dolosa [E. (Neoepilohmannia)]
dolosus (Sellnickochthonius)
domahidvi (Hymenobelba)
domesticus (Cosmochthonius) (=lanatus)
dominae (Chamobates) (=cuspidatus)
dominiaki [P. (Archiphthiracarus)]
domrowi (Nanhermannia)
domrowi (Pseudopirnodus)
donacunarensis (Dolicheremaeus)
donatoi (Steganacarus) (=vernaculus)
donghaksensis (Neogymnobates)
dongnaiensis [F. (Cosmogalumna)]
dongnaiensis (Lyroppia)
dongnaiensis (Pedrocortesella)
dongnaiensis (Sabahtritia)
donnabuangensis [N. (Protoptiracarus)]
dorvictorianoensis (Sadocepheus)
doratos (Metapyroppia)
doris (Lauropia)
dorni (Dolicheremaeus)
dorsalis (Carabodes) tsushimaensis
dorsalis (Galumna) (?=lanceata)
dorsalis (Nanhermannia)
dorsalis (Nanhermannia)
dorsalis (Nanhermannia)
dorsalis (Nanhermannia)
dorsalis (Rostrozetes) (=ovulum)
dorsata (Bankslinoma) (?=lanceolata)
dorsatus (Neoliodes) (=theleproctus)
dorsofoveolatus (Malaconothrus)
dorsofoveolatus (Malaconothrus)
doryphoros (Liacaroppia)
doryura (Zachvatkinella)
douglasensis (Passalozetes)
douhereti (Meristacarus)
doumandji [S. (Tropacarus)]
draco (Pteramerus)
draconis (Machuella)
draconis (Machuella)
draconis (Machuella)
dryas [M. (Calyptozetes)]
dubia (Dampfiella)
dubia [O. (Dzarogneta)]
dubia (Galumna) (=lanceata)
dubia (Hoplophorella)
dubia (Joelia)
¿dubia (Joelia)?
dubia (Lauropia) (=fallax)
dubia [A. (Weigmanniella)]
dubinini (Ameronothrus)
dubinini (Belba)
dubinini (Diapterobates)
dubinini (Hermanniella)
dubinini (Phthiracarus)
dubiosa (Hermanniella)
dubiosus (Trichoribates) *sp. inq.*
dubita [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
dubitanda (Pergalumna)
dubius (Ceratozetes) (=mediocris)
dubius [C. (Flexa)]
dubius (Maculobates)
dubius [E. (Pocsia)]
dubius (Sadocepheus)
dudichi [C. (Klapperiches)]
dudichi (Kokoppia)
dudichi [O. (Monoribatella)]
dudichi (Phthiracarus) (=boresetosus)
dudichi (Pilizetes)
duffy (Serratoppia)
dugdalei (Notophthiracarus)
dugesi (Adrodamaeus) (=femoratus)
dungeri (Hypogeoppia)
duoaculeus (Tyrphonostrus)
duodentata (Bicyrthermannia)
duodentata (Bicyrthermannia)
duoporosa (Trichogalumna)
duoseta [P. (Triaunguis)]
duoseta [P. (Triaunguis)]

duotrisetosa (Oribotritia)
 duplex [P. (Archiphthiracarus)]
duplex (Eupelops) (=torulosus)
 duplex (Euphthiracarus)
 duplex (Galumna)
duplex (Oribotritia)
 duplex (Suctobelbella) acutidens
duplex (Suctobelbella) acutidens
 duplicarinatus (Dolicheremaeus)
 duplicata (Acrotritia)
 duplicata (Acrotritia)
duplicata (Beckiella)
duplicata (Pergalumna) (=ventralis)
 duplicatus (Dolicheremaeus)
 duplicondyla [N. (Leptosuctobelba)]
 duplicornutus [O. (Acrotocephus)]
 durbanensis [P. (Triaunguis)]
durhamensis (Sphagnoppia)
 durian (Otocephus)
dusan (Microtritia) (=tropica)
 dwalteri (Dolicheremaeus)
 dynastes [R. (Rhynchoribatodes)]
dzaparidzei (Phauloppia) (=lucorum)
 echigoensis (Ceratotenualia)
echinata (Camisia) (=spinifer)
 echinatus (Papillacarus)
 echinatus (Papillacarus)
 echinodiscus (Atropacarus)
 echinopus (Damaeus)
 echinus (Notophthiracarus)
 eckeri [M. (Megazetes)]
 ecephyla (Crotonia)
 ecephylus (Notophthiracarus)
 ecephylus (Rhacaplacarus)
 ecuadorensis (Pergalumna)
 ecuadoriensis (Protoribates)
 ecuadorensis (Xenillus)
 ecuadoriensis (Ampullobates)
 ecuadoriensis (Cosmozetes)
 ecuadoriensis (Eupelops)
 ecuadoriensis (Gittella)
 ecuadoriensis (Holonothrus)
 ecuadoriensis [C. (Klapperiches)]
 ecuadoriensis [R. (Rhynchoribatodes)]
 edentatus (Rhynchoribates)
 ecuadoriensis (Truncozetes)
 edentulus (Hydrozetes)
 editae (Eremobelba)
 editae (Lauroppia)
 eduardi (Piffliella)
 eduardoi [R. (Rectoppia)]
 eduardoi (Rhinoppia)
 edwardensis (Halozetes)
 edwardsi (Edwardzetes)
 edwardsi (Edwardzetes)
 egelida [O. (Zygoribatula)]
 egenus (Chamobates) sp. inq.
 egregia (Galumna)
egregius [C. (Klapperiches)] (?=similis)
egregius (Malaconothrus) (=monodactylus)
egregius [P. (Neophthiracarus)]
egyptica (Lohmannia) (=paradoxa)
 eichhornia (Hydrozetes) sp. inq.
 eichhornicus [M. (Trimalaconothrus)]
 ejuncida (Acrotritia)
 ekaterinae [F. (Cosmogalumna)]
 eksteeni (Annectacarus)

eksteeni (Indotritia)
 etkactesi (Congocephus)
elamellata (Fortuvnia)
 elamellata [D. (Rykella)]
elastica (Mesotritia) (=nuda)
 elconsuleoensis [N. (Protophthiracarus)]
 elegans (Achipteria) sp. inq.
elegans (Austrocarabodes)
 elegans (Bipassalozetes)
elegans (Cryptoppia) (=mahunkai)
 elegans (Eremulus)
 elegans (Fissicepheus)
 elegans (Ghilarovus)
 elegans (Hypochthonius)
 elegans [L. (Incabates)]
 elegans [L. (Incabates)]
 elegans (Oppia) sp. inq.
 elegans (Pheroliodes)
 elegans (Pulchroppia)
 elegans (Scheloribates)
elegans (Scheloribates)
 elegans (Scheloribates)
 elegans (Selenoribates)
elegans (Sphaerochthonius) (=gemma)
 elegans (Sumatrotritia)
 elegans (Synchthonius)
 elegans (Synchthonius)
 elegans (Tectocephus) velatus
 elegans (Tectocephus) velatus
 elegans (Tectocephus) velatus
 elegans (Torpacarus)
 elegans (Totobates)
 elegans (Totobates)
elegans [M. (Trimalaconothrus)]
 elegantis [D. (Epidamaeus)]
elegantissima (Nanhermannia)
 elegantissima (Nanhermannia)
 elegantissima (Oribatula)
 elegantissima (Parasuctobelba)
 elegantula [S. (Flagrosuctobelba)]
 elegantula [S. (Flagrosuctobelba)]
 elegantula [S. (Flagrosuctobelba)]
 elegantula [S. (Flagrosuctobelba)]
 elegantula [S. (Flagrosuctobelba)]
 elegantula (Galumna)
 elegantula (Lanceoppia)
 elegantula (Mesotritia)
 elegantula (Nanhermannia)
 elegantula (Nanhermannia)
 elegantula (Nanhermannia)
 elegantula (Oribatula) sp. inq.
 elegantulus (Austrodamaeus)
 elegantulus [S. (Bischelorbates)]
 elevatus (Gibbicepheus)
 elevatus (Sadocephus)
 elifae (Rhinoppia)
 elimata (Galumna)
 elisabethae (Dolicheremaeus)
 elisabethae (Parabelbella)
 elisabethae (Sellnickochthonius)
 elisae (Ethiovertex)
 elisae (Subbelba)
 elizabethae (Suctobelbata)
 elizabethiensis (Notophthiracarus)
 elliptica [R. (Insculptoppia)]
 elliptica [R. (Insculptoppia)]
 elliptica [R. (Insculptoppia)]

- elliptica* [R. (*Insculptoppia*)]
ellipticus (*Nothrus*) *sp. inq.*
 elmela [R. (*Insculptoppia*)]
elongata (*Beckiella*)
elongata (*Cryptoppia*)
elongata (*Cultroribula*)
elongata (*Domotorina*)
elongata (*Epilohmannia*) (= *minuta*)
elongata [L. (*Incabates*)]
elongata [R. (*Insculptoppiella*)]
elongata (*Liebstadia*) (= *mongolica*)
elongata (*Oppia*) *sp. inq.*
elongata (*Oripoda*)
elongata (*Oripoda*)
elongata (*Pergalumna*)
elongata [S. (*Porokalumma*)]
elongata (*Protoripoda*) *sp. inq.*
elongata [*O. (Zygoribatula)*] (= *lata*)
elongatiporosa (*Pergalumna*)
elongatissima (*Nannerlia*)
elongatissimus (*Ceratozetes*) (? = *lagrecai*)
elongatus (*Dolicheremaeus*) Aoki, 67
elongatus (*Dolicheremaeus*) Aoki, 67
elongatus (*Dolicheremaeus*) Bal., 68 (= *repetitus*)
elongatus (*Edwardzetes*)
elongatus (*Edwardzetes*)
elongatus (*Eueremaeus*)
elongatus (*Hammerabates*)
elongatus (*Hemileius*) (= *eperezinigoae*)
elongatus (*Micreremus*)
elongatus (*Neoliodes*)
elongatus (*Neoribates*)
elongatus (*Odontocephus*)
elongatus (*Odontocephus*)
elongatus (*Papillacarus*)
elongatus (*Paralopheremaeus*) (= *legendrei*)
elongatus [S. (*Perscheloribates*)] (= *monodactylus*)
elongatus (*Pilobates*) (? = *carpetanus*)
elongatus (*Proteremaeus*)
elongatus (*Scheloribates*)
elongatus (*Thamnacarus*)
elongatus (*Thamnacarus*)
elongatus [H. (*Urubambates*)]
elsi [M. (*Parplohpora*)]
elsi (*Scheloribates*)
elsosneadensis (*Sellnickochthonius*)
elsosneadensis (*Sellnickochthonius*)
elsosneadensis (*Sellnickochthonius*)
elsosneadensis (*Williamszetes*)
emarginata [R. (*Paramedioppia*)]
emarginata (*Pergalumna*)
emarginata (*Pergalumna*)
emarginata (*Pergalumna*)
emarginatus (*Scapheremaeus*)
embeyisztini (*Licneremaeus*)
embrionalis (*Lohmannia*)
emeiensis [O. (*Hexatocephus*)]
emeiensis (*Liacarus*)
emeryi (*Microzetorchestes*)
emmae (*Phyllozetes*)
emmae (*Phyllozetes*)
emmae (*Phyllozetes*)
emmae (*Phyllozetes*)
emmae (*Phyllozetes*)
emcantadae (*Heptacarus*)
endroedyi [P. (*Archiphthiracarus*)]
endroedyi (*Limnozsetella*)
endroedyi (*Paraphauloppia*)
endroedyi [O. (*Zygoribatula*)]
endroedyyoungai (*Maculobates*)
endroedyyoungai (*Notophthiracarus*)
endroedyyoungai (*Suctobelbila*)
engelbrechti (*Austrotritia*)
engelbrechti [T. (*Cristonothrus*)]
engelbrechti (*Demisalto*)
engelbrechti (*Demisalto*)
engelbrechti (*Eupelops*)
engelbrechti (*Galumna*) Mah., 1997
engelbrechti (*Galumna*) J. y P. B., 2002 (= *discoidalis*)
engelbrechti (*Hoplophorella*)
engelbrechti (*Lamellobates*)
engelbrechti [C. (*Magoebazetes*)]
engelbrechti (*Microlamellarea*)
engelbrechti (*Nothrus*)
engelbrechti [H. (*Phyllhermannia*)]
engelmanni (*Multioppia*)
enghoffi (*Arcoppia*) *arcualis*
enigma (*Novazelandiella*)
enigmaticus [N. (*Besuchetacarus*)]
ennarpi (*Lepidacarus*)
enodis (*Ceratozetes*)
enoplura (*Jacotella*)
enoplura (*Jacotella*)
ensifer (*Austrocarabodes*)
ensifer [T. (*Cristonothrus*)]
ensifer (*Exoribatula*)
ensifer (*Gibbicepheus*) *sp. inq.*
ensifer (*Liochthonius*) (= *furcillatus*)
ensifer (*Phylacozetes*)
ensifer (*Protoribotritia*)
ensifera (*Eremella*)
ensifera (*Eremella*)
ensifera (*Hoplophorella*)
eoeryi (*Zachvatkinibates*)
eparmatos (*Notophthiracarus*)
eperezinigoae (*Hemileius*)
eperezinigoae (*Licnodamaeus*)
ephippiatus (*Trichoribates*) *sp. inq.*
ephippiger [N. (*Besuchetacarus*)]
ephippiger (*Eremaeozetes*)
ephippiger (*Eremaeozetes*)
epidamaeiformis (*Metabelbella*)
epilata (*Rhinoppia*)
epimeralis (*Protoribates*)
epiphytos (*Zachvatkinibates*)
eques (*Neoliodes*) *sp. inq.*
equestris (*Zetorchestes*)
equestris (*Zetorchestes*)
equestris (*Zetorchestes*)
equisetosus [N. (*Protophthiracarus*)]
erabuensis (*Trichotocephus*)
erabuensis (*Trichotocephus*)
erbanensis (*Xenillus*)
erectus (*Austrocarabodes*)
erectus (*Carabodes*)
erectus (*Idiozetes*)
erectus (*Idiozetes*)
erectus (*Neoribates*)
eremaeozetoides (*Pasocephus*)
eremitus (*Exochocephus*)
eremuloides [C. (*Berndamerus*)]
erfenisdamensis (*Licnodamaeolus*)

- ericus [M. (Neobelba)]
erinaceum [*N. (Calypthothiracarus)*] (=olivaceus)
 erinaceus (*Eupelops*)
 ermani [R. (Insculptoppia)]
 ermilovi (*Aleurodamaeus*)
ermilovi (*Unguizetes*)
erosus (*Sellnickochthonius*) (=immaculatus)
errinundrae [*H. (Phyllhermannia)*]
 erupentus (*Ceratozetes*)
 erzurumensis [Q. (Coronoquadroppia)]
escobari (*Hydrozetes*)
 escotata (*Moritzoppia*)
 espatulatus (*Odontocephus*)
espeletiae [*L. (Procorynetes)*]
espeletiae [*N. (Protothiracarus)*]
espeletiae [*S. (Reductoppia)*]
espeletiarum [*N. (Amerigloboppia)*]
espinarensis (*Nothrus*)
esposi (*Eremobelba*)
espozi (*Oxyoppia*) (=spinosa)
 esulcatus (*Epilohmannoides*)
 esulcatus (*Epilohmannoides*)
ethiopica (*Bursoplophora*)
ethiopica (*Microtritia*) (=tropica)
ethiopicus (*Notophthiracarus*)
ethiopicus [*S. (Perscheloribates)*]
 etruscus [P. (*Oribellopsis*)]
euaensis (*Crvptoribatula*)
euaensis (*Dampfiella*)
euaensis (*Dolicheremaeus*)
euaensis (*Galumna*)
eucalla [*O. (Zygoribatula)*] (=interrupta)
eugenius (*Scapheremaeus*)
eungella (*Crotonia*)
 eupalineus [P. (*Archiphthiracarus*)]
eupectinata (*Ctenoppia*)
euramosa (*Kokoppia*)
 eurhostus (*Opsioristes*)
europaea (*Allosuctobelba*) (=grandis)
 europaea (*Galumna*)
 europaea [*S. (Lalmoppia)*]
 europaea (*Suctobelbila*) dentata
 europaeus (*Hypochthonius*) rufulus
 europaeus (*Peloribates*)
 europaeus (*Peloribates*)
 europaeus (*Peloribates*)
 europaeus (*Trhypochthonius*) silvestris
 eurycupis (*Hafenrefferia*)
 eusebioi (*Dolicheremaeus*)
eusetosa [*H. (Phyllhermannia)*]
eusetosus (*Scheloribates*)
euthemellus (*Scapheremaeus*)
 eutricha [*O. (Monoribatella)*]
 evanescens [*S. (Perscheloribates)*]
 evansi (*Africoribates*)
evansi (*Belloppia*)
 evansi (*Liochthonius*)
 evansi (*Liochthonius*)
 evansi (*Liochthonius*)
 evansi (*Scutovertex*)
 eveana (*Mongaillardia*)
evergladus (*Hoplophorella*)
evexus (*Euphthiracarus*)
evexus [*R. (Mantigueracarus)*]
evexus (*Notophthiracarus*)
 evidens [*H. (Heterohermannia)*]
ewani (*Scapheremaeus*)
 ewingi (*Allodamaeus*)
 ewingi (*Allodamaeus*)
ewingi [*L. (Convergoppia)*]
 ewingi (*Oppia*) sp. inq.
 ewingi (*Oppia*) sp. inq.
 ewingi (*Oribatella*)
ewingi (*Phthiracarus*) (=japonicus)
 ewingi (*Steganacarus*)
 ewingi [*C. (Triachipteria)*]
 ewingi [*C. (Triachipteria)*]
exacutus (*Notophthiracarus*)
 exaggeratus [*H. (Capillonothrus)*]
 exarata [*O. (Zygoribatula)*]
 exastus (*Ophidiotrichus*)
 excavata (*Oripoda*)
 excavata (*Pedrocortesella*)
 excavata (*Suctobelbila*)
 excavata [*O. (Zygoribatula)*]
 excavatus (*Benoibates*)
 excavatus (*Cavernozetes*)
 excavatus (*Machadocephus*)
 excavatus (*Machadocephus*)
 excavatus (*Trhypochthoniellus*) (=longisetus)
 excavatus [*S. (Tropacarus)*]
 excellens [*C. (Klapperiches)*]
 excellens [*P. (Neophthiracarus)*]
excellens (*Scriptoripoda*)
excellens (*Setogalumna*)
 excelsior (*Eurhynchoribates*)
 excelsus [*O. (Acrotocephus)*]
excisa (*Camisia*) (=segnis)
 excisa (*Hammerella*)
excisa (*Multioppia*) (=neglecta)
 exclamationis (*Hymenobelba*)
 excrescens (*Brachioppia*)
 excultus (*Euphthiracarus*)
 exempta (*Hypogeoppia*)
 exigua (*Allogalumna*)
 exigua (*Galumna*)
 exigua (*Graptoppia*)
 exigua (*Subiasella*)
 exigua (*Subiasella*)
 exigualis (*Mycobates*)
 exigualis (*Mycobates*)
exiguareata (*Galumna*) (=lanceata)
 exiguus (*Scheloribates*)
 exilicornis (*Oribatella*)
 exilior (*Nothrus*) silvestris ssp. inq.
 exilior (*Parabelbella*)
exilior (*Scheloribates*) (?=minifimbriatus)
exilis (*Hermannia*) sp. inq.
 exilis (*Mixacarus*)
 exilis (*Mixacarus*)
 exilis (*Oribotritia*)
 exilis [*O. (Zygoribatula)*]
 exilis [*O. (Zygoribatula)*]
 exilium (*Eupelops*)
 eximius (*Rhacaplacarus*)
 exobothridialis (*Banksinoma*)
 exobothridialis (*Melanozetes*)
 exobothridialis [*H. (Phyllhermannia)*]
 exobothridialis (*Rhinoppia*)
 exornata [*H. (Phyllhermannia)*]
 exornatus (*Licneremaeus*)
 exornatus (*Patagonozetes*)
 expansa [Q. (*Coronoquadroppia*)]

expansum (Joboppia)
 expansus (Megeremaeus)
expansus [H. (Capillonothrus)] skoettsbergi
expansus (Tectocephus) (=sarekensis)
expositus (Liochthonius) (?=sellnicki)
 exserta [P. (Tectodamaeus)]
exspinosa [P. (Tectodamaeus)]
 exsudans (Oribatula)
 extensa (Oribatella)
 extensa (Oribatella)
 externus (Liacarus)
 extraneus (Adoristes) ovatus
 extraordinarius (Notophthiracarus)
extrema [N. (Amerigloboppia)]
extrema (Congoppia) (=deboissezoni)
 extrema (Granuloppia)
 extrema (Masthermannia)
 extrema (Subiasella)
extremodontata [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)
 extrudens (Berniniella)
 extrusa (Neoamerioppia)
exuvialis (Camisia) (=biurus)
 ezoensis (Nothrus)
 ezoensis (Punctoribates)
 ezzati (Bicyrthermannia)
fabulosus [R. (Parhynchoribates)]
facetus [P. (Neophthiracarus)]
facula (Chamobates) (?=subglobulus)
facundoi (Mixacarus)
 faeroensis (Maerkelotritia)
 fagei [D. (Spatiodamaeus)]
falcata (Cultroribula) (=bicultrata)
 falcata (Lauropia)
falcata (Pachygena)
falcata (Suctobelbella) (=longicuspis)
falcatus (Austrocarabodes)
falcatus (Austrocarabodes)
falcatus (Austrocarabodes)
falcatus (Carabodes)
falcatus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
falcidactylus (Thasecazetes)
 falciformis [P. (Archiphthiracarus)]
falklandica [H. (Phyllhermannia)]
falklandica [H. (Phyllhermannia)]
 fallax (Lauropia)
 fallax (Lauropia)
 fallax (Lauropia)
fallax (Lauropia)
 fallax (Lauropia)
 fallax (Ramsavellus) sp. inq.
fallax [P. (Triaunguis)] (=obtusus)
 falxa (Drepanoppia)
falzonii (Zetorchestes) (=micronychus)
 fanzagoi [C. (Triachipteria)]
 fanzagoi [C. (Triachipteria)]
 fanzagoi [C. (Triachipteria)]
 farinosus [D. (Epidamaeus)]
farinosus (Eupelops) (?=major)
 farinosus (Poroliodes)
 farinosus (Poroliodes)
 farsi [R. (Insculptoppia)]
 fasciata [R. (Rectoppia)]
fasciata [R. (Rectoppia)]
fasciata [R. (Rectoppia)]
fasciata [R. (Rectoppia)]
 fasciata [R. (Rectoppia)]
 fasciatus (Gephyrazetes)

fastigata (Pergalumna)
fatidicus (Notophthiracarus)
 faviger (Micreremus)
 fayoumensis (Pilogalumna) ornatula
 fazendae (Xenillus)
fecundus (Notophthiracarus)
fecundus (Notophthiracarus)
 fecundus [S. (Rafacarus)]
 fecundus (Xenillus)
 feideri (Acaroceras)
feideri [L. (Bicristoppia)]
feideri (Conoppia) (=palmicincta)
 feideri (Lauropia)
 feideri (Lucoppia)
 feideri (Lucoppia)
feideri [P. (Neophthiracarus)] (=australianicus)
feideri (Notophthiracarus)
feideri (Phthiracarus) (=zicmani)
 feideri (Scheloribates)
 femoralis (Carabodes)
femoralis (Neoliodes) (=striatus)
femoralis (Scheloribates) (=latipes)
 femoratus (Adrodamaeus)
 femoratus (Scheloribates)
 femoroserrata (Muliercula)
femurgibbus [P. (Tectodamaeus)]
 fenestralis (Arcoppia)
 fenestralis (Austrocarabodes)
fenestrata (Ctenobelba) (=pectinigera)
 fenestrata (Magyaria)
 fenestratus (Austrocarabodes)
fenicheli [E. (Trischeloribates)]
 fenneri (Nanhermannia)
fenneri (Nanhermannia)
 fennica (Oribotritia)
fernandezi (Retrozetes)
 fernandoi (Xenillus)
 ferox (Maorizetes)
ferox (Maorizetes)
 ferrugineus (Phthiracarus)
 ferrugineus (Phthiracarus)
ferrumequina [O. (Coronoquadroppia)] (?=circumita)
festoneata (Hypogeoppia) (=terricola)
 feuerborni (Limnozetes)
figuratus (Ceratozetes) (=enodis)
figuratus (Eueremaeus) (=oblongus)
 fijiensis (Arcoppia) corniculifera
fijiensis (Arcoppia) corniculifera
fijiensis (Dolicheremaeus)
fijiensis (Galumna)
fijiensis (Parasuctobelba)
 fijiensis (Scheloribates)
fijiensis (Scheloribates)
 fijiensis (Tyrphonothrus) crassisetosus
fijiensis (Tyrphonothrus) crassisetosus
 filamentosa (Ramusella)
filaris [N. (Phthirarica)]
filata (Acrogalumna) (=longipluma)
 filifera (Pergalumna)
filifera (Pergalumna)
 filiferus (Machadocephus)
filiferus [P. (Metaphthiracarus)] (=setosus)
 filiferus (Rhopalozetes)
 filiformis [P. (Archiphthiracarus)]
 filiformis [N. (Calyptophthiracarus)]
 filiformis (Parapyropia)
 filiformis (Pergalumna)

- filiger* (*Allogalumna*)
filigera (*Ramusella*)
filipina (*Ceratoppia*)
filipina (*Magyaria*)
filipina [H. (*Phyllhermannia*)]
filipina (*Sulcoribula*)
filipinus (*Dolicheremaeus*)
filipinus [H. (*Philoribates*)]
 filippovae [M. (*Neobelba*)]
 filosus (*Sacculozetes*)
filosus (*Sacculozetes*)
fimbriata [T. (*Teratoppiella*)]
fimbriatissimus (*Liochthonius*)
fimbriatissimus (*Liochthonius*)
fimbriatissimus (*Liochthonius*)
 fimbriatoides (*Scheloribates*)
fimbriatoides (*Scheloribates*)
fimbriatus (*Liochthonius*) Jac., 36
fimbriatus (*Liochthonius*) Ham., 58 (= fimbriatissimus)
fimbriatus [M. (*Megazetes*)]
 fimbriatus (*Scapheremaeus*)
 fimbriatus (*Scheloribates*)
fimbriatus (*Scheloribates*)
fimbriatus (*Scheloribates*)
fimbriatus (*Scheloribates*)
fimbriatus (*Scheloribates*)
fimbriatus (*Scheloribates*)
finitima (*Hoplophorella*)
finitima (*Hoplophorella*)
 finlandica (*Austrotritia*)
finlayi (*Kuklosuctobelba*)
finlayi (*Kuklosuctobelba*)
 fiorii (*Joelia*)
fiorii (*Joelia*)
 firmus (*Damaeus*)
firthensis (*Sphaerozetes*)
fischeri (*Camisia*) (= *biverrucata*)
fischeri (*Scapheremaeus*)
fischeri (*Scapheremaeus*)
 fissurata (*Austrotritia*)
fissurata (*Banksinoma spinifera*)
 fissurata (*Berniniella*)
fissurata (*Lauroppia*) (= *maritima*)
 fissurata (*Microtritia*)
fissurata (*Sternoppia*)
fissurata (*Suctobelbilla*)
fissuratus [L. (*Dorycranosus*)] (= *nitidus*)
 fissuratus (*Licnodamaeus*)
fissuratus (*Mucrobates*)
fissuratus (*Neoribates*) (= *pterotus*)
fissuratus [S. (*Perscheloribates*)]
 fissuratus [H. (*Tuberemaeus*)]
fissuratus [H. (*Tuberemaeus*)]
fixa (*Moritzoppia*) (= *unicarinata*)
 fjellbergi (*Ceratozetella*)
fjellbergi (*Ceratozetella*)
flabella [S. (*Flagrosuctobelba*)]
flabellatus (*Hardybodes*)
flabellatus (*Licnozetes*)
flabellifer (*Austrocarabodes*)
 flabellifera (*Galumna*)
flabellifera (*Galumna*)
flabellifera (*Galumna*)
flabellifera (*Galumna*)
flabellifera (*Galumna*)
flabellifera (*Galumna*)
flabellifera (*Suctobelbella*) sp. inq.
- flabelliger* (*Mycobates*)
 flabrarius (*Zetorchestes*)
flagellaris (*Eremobelba*) (= *gracilior*)
 flagellaris [R. (*Insculptoppiella*)]
flagellata (*Arcoppia*)
 flagellata (*Belba*)
flagellata (*Camisia*)
flagellata (*Crotonia*)
 flagellata (*Galumna*)
flagellata (*Gittella*)
flagellata (*Hauseroplophora*)
flagellata (*Mesotritia*) (= *maerkeli*)
 flagellata (*Neoamerioppia*)
flagellata (*Nothrolohmannia*)
flagellata (*Oribatella*)
flagellata (*Parabelbella*)
flagellata (*Paroppia*)
 flagellata (*Protoripoda*)
 flagellata [A. (*Rhaphigneta*)]
flagellata [S. (*Ussuribata*)]
flagellatissima (*Hymenobelba*)
flagellatissima (*Persuctobelba*)
 flagellatissimus [S. (*Tropacarus*)]
flagellatus [P. (*Archiphthiracarus*)]
flagellatus (*Austronothrus*)
flagellatus (*Brazilozetes*)
flagellatus (*Ctenamerus*)
flagellatus [D. (*Epidamaeus*)]
flagellatus (*Euphthiracarus*)
flagellatus [P. (*Neophthiracarus*)] (= *shiptoni*)
flagellatus (*Notophthiracarus*) Niedb., 2004
flagellatus (*Notophthiracarus*) Liu y OCon., 2014
flagellatus (*Novonothrus*)
flagellatus (*Pseudotocepheus*)
flagellatus (*Scheloribates*)
flagellatus (*Solenozetes*)
flagellatus [H. (*Urubambates*)]
flagelliapex (*Neoamerioppia*)
flagellifer (*Benoibates*)
 flagellifer (*Carabodes*)
 flagellifer (*Damaeus*)
flagellifer (*Epilohmannia*)
 flagellifer (*Eremulus*)
flagellifer (*Eremulus*)
flagellifer (*Eremulus*)
flagellifer (*Eremulus*)
flagellifer (*Eremulus*)
flagellifer (*Eremulus*)
flagellifer (*Heteroleius*)
 flagellifer (*Nippobodes*)
flagellifer (*Leptotocepheus*)
flagellifer [L. (*Magnobates*)]
flagellifer [L. (*Magnobates*)]
flagellifer [M. (*Megazetes*)]
flagellifer (*Microzetes*) (= *singaporensis*)
flagellifer (*Mikizetes*)
flagellifer (*Solenozetes*)
 flagellifera [S. (*Flagrosuctobelba*)]
flagellifera (*Pergalumna*) (= *cribriger*)
flagellifera (*Taiwanoppia*)
 flagelliformis (*Mesotritia*)
flagelliformis (*Mesotritia*)
flagelliformis (*Trimalaconthrus*)
flagelliseta (*Hermannobates*)
 flagelliseta [M. (*Neobelba*)]
 flagelliseta (*Suctobelba*)

- flagellisetosus (Scheloribates)
flagelloides (Austrotritia) lebronneci *ssp. inq.*
flagelloides [D. (Epidamaeus)]
 flagellum (Nothrus)
flagellum Neoribates
flagrus (Notophthiracarus)
flaheyi (Autogneta)
flamiferus (Scapheremaeus)
 flammeisetosa (Belba)
 flammeus (Liacarus)
flammula (Oribatella) (?=quadricornuta)
flatus (Mochlozetes)
 flavida [M. (Parpophora)]
flavida [M. (Parpophora)]
flavipes (Banksinoma) (?=lanceolata)
flavus (Euphthiracarus)
flavus (Eupterotegaeus)
flavus (Rostrozetes) (=ovulum)
flechtmanni [L. (Brasiloppia)]
 flechtmanni (Humerobates)
flechtmanni (Humerobates)
flexiloquus (Notophthiracarus)
 flexipilus [P. (Archiphthiracarus)]
flexisetosa (Hymenobelba)
flexisetosus (Phthiracarus) (=longulus)
 flexispinosus [D. (Epidamaeus)]
flexuosa (Epilohmannia)
flexuosa (Eremobelba)
 flexus [D. (Epidamaeus)]
floccosus [D. (Epidamaeus)]
 floralis (Pseudoamerioppia)
florens (Aokiella)
florens (Cyrthermannia)
 florens (Micreremus)
florens (Rostrozetes)
florens (Siculobata)
 floresiana (Parachipteria)
 floresianus (Melanozetes) azoricus
floridae (Fuscozetes) *sp. inq.*
floridae (Hoplophorella) (=hamata)
floridae (Notogalumna)
floridana (Aeroppia) *sp. inq.*
floridana (Aeroppia) *sp. inq.*
floridana (Mochloribatula)
floridana [O. Zygoribatula]
floridanus [N. (Parakalumna)] *robustus*
floridensis [L. (Dorycranosus)] *sp. inq.*
floridensis (Neoliodes) *sp. inq.*
floridensis (Peloribates)
floridus (Afrolelius)
floridus (Carabodes)
floridus (Carabodes)
floridus [D. (Epidamaeus)]
floridus [D. (Epidamaeus)]
floridus (Gibbicepheus)
florisbadensis [R. (Insculptoppia)]
flumengalei [A. (Conchogneta)]
 fluviatilis [H. (Capillonothrus)]
foensis (Hoplophorella)
 foliaceisetus (Austrocarabodes)
foliaceus (Caveremulus)
foliata (Basilobelba)
foliata (Bicyrthermannia)
 foliata (Corynoppia)
 foliata (Ctenobelba)
foliata (Dampfiella)
foliata (Eremobelba)
- foliata (Machadobelba)
 foliata (Oribatella)
foliata [H. (Phyllhermannia)]
 foliatifer (Sellnickochthonius)
 foliatoides (Corynoppia)
foliatus (Carabodes) (=chirstlus)
 foliatus (Cosmochthonius)
foliatus [T. (Cristonothrus)]
foliatus [T. (Cristonothrus)]
foliatus (Cymbaeremaeus)
foliatus (Haplacarus)
 foliatus (Haplacarus)
foliatus (Haplacarus)
foliatus (Haplacarus)
foliatus (Holonothrus)
foliatus (Javacarus)
foliatus (Javacarus)
 foliatus [P. (Millotacarus)] Mond. y Chakr., 82
foliatus [P. (Millotacarus)] Sark. y Sub., 84 (=sarbias)
 foliatus (Scutoribates)
foliatus (Sellnickochthonius)
foliatus (Sellnickochthonius)
 foliatus (Suctoribates)
foliatus (Torpacarus)
 foliifer [M. (Phyllolohmannia)]
 foliisetus (Ctenacarus)
foliosa (Striatoppia)
foliosa [S. (Ussuribata)]
 foliosus (Cepheus) *sp. inq.*
foliosus (Steganacarus)
 folium [D. (Epidamaeus)]
fonsciai (Hoplophorella)
 fonticula (Suctobelbila)
fonticula (Suctobelbila)
foraminiferus (Neoribates)
forceps (Lamellarea)
forceps (Schalleria)
forceps (Xenillus)
fordi (Galumna)
fordi (Galumna)
fordi (Galumna)
forficula (Paenoppia)
formica (Damaeus) *sp. inq.*
 formicaria (Pergalumna)
formicaria (Pergalumna)
 formosa (Berniniella)
formosa (Moritzoppia) (=unicarinata)
 formosana (Cyrthermannia)
 formosana (Heterobelba) stellifera
 formosana [M. (Multilanceoppia)]
 formosana (Quinquoppia)
 formosana (Quinquoppia)
 formosanus [H. (Tuberemaeus)]
 formosus (Peloribates)
formosus (Rugocephus)
 formosus (Sellnickochthonius)
 formosus (Trichoribates)
fornerisae (Ceratobates)
formicarius (Notophthiracarus)
formicatus (Megalotocephus)
 foroliiviensis (Damaeus) *sp. inq.*
forsslundi [P. (Archiphthiracarus)]
forsslundi (Carabodes) (=ornatus)
forsslundi (Eupelops)
forsslundi (Eupelops)
 forsslundi [S. (Flagrosuctobelba)]
forsslundi (Liochthonius) Ham., 52

forsslundi (*Liochthonius*) Mah., 69 (=evansi)
 forsslundi (Nanhermannia)
 forsslundi [P. (Oribellopsis)]
 forsslundi (Provertex)
forsslundi (Tripiloppia)
forsteri (Luxtoneremaeus)
 forsteri [H. (Phyllhermannia)]
forsteri [H. (Phyllhermannia)]
fortdauphini (Bovicarabodes)
fortis (Setoppia)
 fortisensillus [D. (Epidamaeus)]
 fortispinosus [D. (Epidamaeus)]
fortispinosus [D. (Epidamaeus)]
fortispinosus [T. (Laminizetes)]
 fossatus (Carabodes) sp. inq.
fossatus [H. (Platynothrurus)] sp. inq.
fossatus (Scutovertex)
fossilatus (Eueremaeus) (=quadrilamellatus)
fournieri [H. (Bornemiszaella)]
 foveiventris (Selenoribates)
 foveolata [G. (Apograptoppia)]
foveolata [G. (Apograptoppia)]
 foveolata (Baloghiella)
foveolata (Beckiella)
 foveolata (Brachyoripoda)
 foveolata (Camisia)
foveolata (Camisia)
foveolata (Camisia)
 foveolata [Q. (Coronoquattroppia)]
 foveolata (Ctenobelba)
 foveolata (Epilohmannia)
 foveolata (Foveolatoppia)
foveolata (Neoamerioppia)
 foveolata (Notogalumna)
foveolata [N. (Perezinigokalumma)]
 foveolata (Pergalumna)
foveolata (Pergalumna)
foveolata (Pergalumna)
 foveolata [H. (Phyllhermannia)]
 foveolata (Sabahtitia)
foveolata [K. (Stakarenoppia)]
foveolatus (Allonothrus)
foveolatus [P. (Archiphthiracarus)] (=pygmaeus)
 foveolatus (Berlesezetes)
 foveolatus (Cosmochthonius) lanatus
foveolatus (Cosmochthonius) lanatus
foveolatus (Cosmochthonius) lanatus
foveolatus (Dendroeremaeus)
foveolatus (Eremulus)
 foveolatus (Eueremaeus)
foveolatus (Eueremaeus)
foveolatus (Eupelops)
 foveolatus (Eupelops)
 foveolatus (Euphthiracarus) cribrarius
 foveolatus (Hispanozetes)
 foveolatus (Hoplophthiracarus) Aoki, 80
 foveolatus (Hoplophthiracarus) Aoki, 80
 foveolatus (Hoplophthiracarus) L., W. y C., 11
foveolatus [G. (Kalloia)]
foveolatus (Limnozetes) (=ciliatus)
 foveolatus (Microtegeus)
foveolatus (Microtegeus)
 foveolatus (Mixacarus) exilis
foveolatus [H. (Monoschelobates)]
 foveolatus (Peloptulus)
foveolatus (Peloptulus)
foveolatus (Plasmobates)

foveolatus (Podoribates)
foveolatus (Pseudotocephus)
foveolatus (Rostrozetes) (=ovulum)
foveolatus (Sadocephus)
 foveolatus (Scapheremaeus)
 foveolatus (Scutoribates)
 foveolatus (Setoxylobates)
 foveolatus (Spinotocephus)
foveolatus (Torpacarus)
 foveolatus [M. (Trimalacothonrus)]
foveolatus [M. (Trimalacothonrus)]
foveoreticulatus [N. (Protophthiracarus)]
fraenzlei (Paraphauloppia)
fragilis (Humerobates)
 fragilis [D. (Epidamaeus)]
fragilis (Parasuictobelba)
fragilis (Peloribates)
francisi (Zetomimus)
francoia (Eupelops) major ssp. inq.
frankeae (Caucasiozetes)
 franzi (Cerachipteria)
franzi (Fernandocephus)
franzi (Nooliodes)
franzi (Sadocephus)
 frater (Pergalumna)
frater (Pergalumna)
frater (Rhacaplacarus)
fratercula (Beckiella)
fraterculus (Gymnobodes)
 fraterculus [D. (Kunstdamaeus)]
 fraternalis (Gredosella)
fraternus [P. (Archiphthiracarus)]
freestatensis (Valbehanella)
friedrichi (Aeroppia)
frigida (Tripiloppia)
frigidus (Scheloribates) (=pallidulus)
 frisiae [O. (Zygoribatula)]
frisiae [O. (Zygoribatula)]
 frogneri (Mesoplophora)
frondeus (Hoplophorella) Niedb., 03
frondeus (Hoplophorella) Niedb., 04 (=prodorsocristata)
 frondeus (Jacotella)
frondeus [N. (Steganacarellus)]
 frondifer (Gehypochthonius)
 frondosa (Cosmohermannia)
frondosa (Cosmohermannia)
 frondosa (Suictobelbella)
 frondosa (Suictobelbella)
 frondosus (Gibbicepheus)
 frondosus (Gibbicepheus)
frondosus (Gibbicepheus)
frontatus (Epiemulus)
 frontinalis [L. (Dorycranosus)]
 frothinghami (Suictobelbella)
frouini (Lineoppia)
fucicolum (Ameronothrus) (?=marinus)
fueginus (Eutegaeus)
 fuentesi (Sellnickochthonius)
 fuerteventurae (Eupelops) claviger
 fuerteventurae (Subbelba) elisae
 fujianensis [P. (Archiphthiracarus)]
fujianensis (Hoplophthiracarus)
 fujianensis (Taiwanoppia)
 fujikawae (Dolicheremaeus)
 fujikawae [D. (Epidamaeus)]
 fujikawae (Oribella)
 fujikawae (Truncopes)

fujinitaensis (Trhypochthonius) tectorum
 fukushiraensis (Hypochthoniella)
fuliginus (Eupelops) (=plicatus)
 fulvus (Euphthiracarus)
fulvus (Halozetes)
fulvus (Neoribates)
fulvus (Notophthiracarus)
 fumigatus (Trichoribates) *sp. inq.*
 fumotoensis (Peloribates)
funafutiensis (Neoliodes) sp. inq.
 fungifer [H. (Phyllhermannia)]
 fungifer (Sphaerochthonius)
 fungisetosus (Scapheremaeus)
fungorum (Humerobates) (?=rostromellatus)
 funnagasatoensis (Eremella)
furca (Acrotritia)
 furcata (Acrotritia)
 furcata (Acrotritia)
furcata (Camisia) (=biurus)
 furcata [M. (Furculoppia)]
furcata (Heterobelba)
 furcata (Hoplophorella)
 furcata [R. (Insculptoppia)]
 furcata (Sabahtritia)
 furcata [P. (Tectodamaeus)]
 furcatus (Acaroceras)
 furcatus (Cavernocephus)
 furcatus (Dolicheremaeus)
furcatus (Lamellobates)
 furcatus [P. (Neophthiracarus)] *sp. inq.*
furcatus [H. (Platynothrus)] (=banksi)
 furcatus (Sellnickochthonius)
 furcatus (Sellnickochthonius)
 furcatus (Trichoribates)
 furcatus (Zetomimus)
furcatus (Zetomimus)
 furcillata (Furcoribula)
 furcillata (Furcoribula)
furcillata (Furcoribula)
 furcillatus (Dolicheremaeus)
 furcillatus (Liochthonius)
furcula (Dolicheremaeus)
 furtadoi (Laluritzenia)
 furugelma (Multioppia)
 furvus [P. (Archiphthiracarus)]
fusa (Indotritia)
fusa (Microtritia)
 fusca (Gymnodampia)
 fusca (Pedrocortesella)
fusca (Pergalumna) Berl., 16
fusca (Pergalumna) Mih., 56 (=myrmophila)
 fusca [O. (Zygoribatula)]
 fuscata (Galumna) *sp. inq.*
 fuscipes (Fuscozetes)
 fuscipes (Fuscozetes)
 fuscipes (Fuscozetes)
 ¿fuscipes (Fuscozetes)?
fuscomaculatus (Scheloribates) (=pallidulus)
 fuscosenillus (Scheloribates)
 fuscetosus (Peloribates)
fuscus (Liacarus) (=xylariae)
 fuscus (Umbellozetes)
 fusifer (Cavernocephus)
 fusifer (Gustavia)
 fusifer [I. (Haplozetes)]
 fusifer [I. (Haplozetes)]
 fusifer (Xenillus)

fusiformis (Anellozetes)
 fusiformis [L. (Dorycranosus)]
fusiformis (Eupelops)
fusiformis [R. (Insculptoppia)]
 fusiformis (Maerkelotritia)
 fusiformis (Notophthiracarus)
 fusiformis (Tenuialoides)
 fusiger (Brazilozetes)
fusiger (Cerachipteria) (?=pyrenaica)
fusiger (Ceratozetes) (=gracilis)
fusiger (Eupelops) (=plicatus)
 fusiger (Fusozetes)
fusiger (Minunthozetes) (=semirufus)
fusigera (Galumna) (=setigera)
 fusisetosa (Cubaoppia)
 fusticulus (Euphthiracarus)
 fusticulus [R. (Mantigueracarus)]
fusticulus (Notophthiracarus)
 fusuligera (Fusuloppia)
 fusulus (Euphthiracarus)
 fusulus (Euphthiracarus)
 fusulus (Notophthiracarus)
gabonensis (Congocephus)
gadubanudi (Crotonia)
 galaica [Q. (Coronoquadroppia)]
 galaica [Q. (Coronoquadroppia)]
 galaicus (Ocesobates)
 galapagensis (Torpacarus) *omittens*
 galapagoensis (Acaroceras)
 galapagoensis (Alismobates)
 galba (Liochthonius)
galeata (Hoplophorella) (=subsellata)
 galeodula (Beklemishevia)
 galeodula (Beklemishevia)
 galerulata (Heterobelba)
 gallardoi (Liebstadia)
gallonae (Solenozetes)
galula [O. (Zygoribatula)]
 gammatus (Liacarus)
 gaoligongensis (Cubachipteria)
 gapsaensis (Multioppia)
 gapudi (Dolicheremaeus)
 gapudi (Meristacarus)
 garciai (Beckiella)
 garciai (Dolicheremaeus)
 garciai (Papuacephus)
 gausi (Ceratozetes)
 gaveae (Mesoplophora)
 gaveae (Mesoplophora)
 gaveae (Mesoplophora)
 gebennicus (Belorchestes)
 gedaii (Allogalumna)
 gelasinus (Xenillus)
 geminata (Oribotritia)
geminatus (Papuacephus)
geminatus (Pseudotocephus)
 geminosetosus (Rostrozetes)
 geminus (Anachipteria)
 geminus (Chamobates)
 geminus [T. (Cristonothrus)]
geminus [T. (Cristonothrus)]
 geminus (Dolicheremaeus)
 geminus (Eupelops)
 gemma (Sphaerochthonius)
gemma (Sphaerochthonius)
 gemma (Sphaerochthonius)
gemma (Sphaerochthonius)

gemmula (Ceratozetes)
 genavensis (Atropacarus)
genavensis (Lamellocephus)
 genavensis [Z. (Protozetomimus)]
genavensium [O. (*Aciculoppia*)]
genavensium (Bursoplophora)
genavensium (Carinogalumna)
genavensium (Eurhynchoribates)
genavensium (Peloribates)
geneuxi (Rostrozetes) (=ovulum)
geniculata (Phauloppia) (?=lucorum)
geniculosus [D. (*Adamaeus*)] (=onustus)
genitalis (Dolicheremaeus)
genitalis [P. (*Triaunguis*)]
geographica (Eremobelba)
geographica (Galumnella)
geometrica [N. (*Leptosuctobelba*)]
geometricus (Epiemulus)
 geonjiensis (Protoribates)
georgensis (Rhopalozetes)
georgiae (Pseudantarcticola)
georgiae (Sandenia)
georgica [C. (*Triachipteria*)] (=patavina)
 georgiensis (Austrocarabodes) foliaceisetus
 georgii (Dolicheremaeus)
 gephyrus (Liacarus)
gerdi [M. (*Safrobates*)]
gerdweigmanni (Oribatella)
germaineae (Neotrichozetes) spinulosus
 germani (Congocephus)
germanicus [T. (*Latilamellobates*)] (=incisellus)
germanicus (Parhyphochthonius) (=aphidinus)
gessneri (Phauloppia) (=rauschenensis)
 getica (Lauropia)
 gevi (Damaeus)
ghanensis (Dolicheremaeus) magnus
ghanensis (Granuloppia)
ghanensis [A. (*Pseudonothrus*)] (=hirtus)
ghanensis (Teleoliodes)
ghanensis (Teleoliodes)
 gharbiensis (Galumna)
 ghardaensis (Selenoribates)
 ghilarovi (Punctoribates)
ghilarovi [L. (*Dorycranosus*)] (=acutus)
 ghiljarovi (Multioppia)
gibba (Austrotritia)
gibba (Globoppia)
 gibba (Hermannia)
gibba (Hermannia)
gibba (Hermannia)
gibba (Hoplophorella)
gibba [M. (*Parpophora*)] (=leviseta)
 gibber [P. (*Archiphthiracarus*)]
 gibber [N. (*Confinoppia*)]
 gibber (Hermannilla)
gibbera (Maerkelotritia) (=cryptopa)
gibbiceps (Carabodes)
gibbofemoratus [D. (*Epidamaeus*)]
gibbosa (Lasiobelba)
 gibbula (Galumna)
gibbus (Adrodamaeus) (=femoratus)
gibbus (Aleurodamaeus) (=setosus)
 gibbus (Eupelops)
 gibbus (Heterochthonius)
 gibbus (Peloptulus)
gibbus (Scapheremaeus)
 gigantea (*Achipteria*)
gigantea (Allosuctobelba)
 gigantea [P. (*Apolohmannia*)]
gigantea (Austrachipteria)
gigantea (Basilobelba)
 gigantea (*Collohmannia*)
 gigantea (*Epilohmannia*)
 gigantea (*Hermannia*)
gigantea (Metapyroppia)
gigantea (Oribatella) sp. inq.
giganteus (Galumnopsis)
 giganteus (*Humerobates*) rostromellatus
 giganteus (*Scheloribates*)
giganteus (Scheloribates)
giganteus (Trichoribates) latincisus
giganteus (Vilhenabates)
giganticus (Allonothrus)
giganticus (Dolicheremaeus)
 gigas (*Oribotritia*)
 gigas (*Oribotritia*)
gigas [H. (*Phyllhermannia*)]
gildersleeveae (Joshuella)
 gilmartinoi (*Multioppia*)
gilva (Arcoppia) (=tripartita)
 gilvipes (*Hafenrefferia*)
 gilvulus (*Scheloribates*) *sp. inq.*
 gilyarovi [D. (*Epidamaeus*)]
ginchiensis [R. (*Rectoppia*)]
 gisini (*Liochthonius*)
gitteae (Cryptoribatula) (=euaensis)
 giustii (*Licneremaeus*)
glaber (Berlesezetes)
glaber [L. (*Dorycranosus*)] (=nitidus)
glaber (Eobrachychthonius) (=latior)
glaber (Eupelops) (?=subexutus)
glaber (Gymnobates)
glaber [I. (*Haplozetes*)]
glaber (Hemileius)
glaber (Heminothrus)
glaber (Nooliodes)
 glaber (*Peloribates*)
glaber (Podoribates)
glaber (Scapheremaeus)
glaber (Scutovertex) (=sculptus)
 glaber [T. (*Tyrphonothrus*)]
glaber (Tyrphonothrus)
glabra (Brachioppia)
glabra (Galumna)
 glabra (*Jacotella*)
 glabra (*Jacotella*)
glabra (Lauritzenia)
 glabra (*Mesotritia*)
 glabra (*Multioppia*)
glabra (Phauloppiella)
glabra [H. (*Phyllhermannia*)] (=dentata)
glabra (Subphauloppia)
 glabra [O. (*Zygoribatula*)]
glabrata (Austrotritia)
glabrata (Mestotritia) sp. inq.
glabrata (Microtritia) Nied., 93
glabrata (Microtritia) Sta., 93 (=neonominata)
glabratus (Africoribates)
 glabrisensillata [A. (*Conchogneta*)]
glabriseta [M. (*Neobelba*)]
glabriseta (Novonothrus)
 glabriseta (*Oxybrachioppia*)
 glabrisetus (*Meristacarus*) heterotrichus
 glabrisetus [D. (*Spatiodamaeus*)]

- glabroclava* (Suctobelbella) (=acutidens)
glabrus (Austrocarabodes)
glabrus (Austroeremulus)
glabrus (Austroeremulus)
gladiata (Nanhermannia)
gladiata [H. (Phyllhermannia)]
gladiator [M. (Neobelba)] (=romandiola)
gladiator (Pseuderemulus)
gladiator (Rugozetes)
gladiola (Oribotritia)
gladius [R. (Mantigueracarus)]
laesarius (Holonothrus)
laesarius (Nothrus)
glandulosus (Scutovertex)
glauca (Hoplophorella) (=hamata)
glaucinus [D. (Paradamaeus)] (=clavipes)
glennicensis [P. (Neophthiracarus)]
glennicensis (Notophthiracarus)
globata (Paraphauloppia)
globifer [D. (Epidamaeus)]
globifer (Microtegeus)
globifer (Microtegeus)
globifer (Notophthiracarus)
globifer [L. (Procorynetes)]
globifer [L. (Procorynetes)]
globifera (Globoppia)
globiger [C. (Klapperichus)]
globiger (Malaconothrus) *sp. inq.*
globigera (Heteroppia)
globipes (Metabelba) (=papillipes)
globosa (Dissorhina) ornata
globosa (Dissorhina) ornata
globosa (Rhinoppia) (=subjectinata)
globosa [O. (Zygoribatula)]
globosus (Liacarus) (=subterraneus)
globosus (Longocephus)
globosus (Neoliodes)
globosus [C. (Paraceratorchestes)]
globosus (Phthiracarus)
globosus (Phthiracarus)
globosus (Phthiracarus)
globosus (Phthiracarus)
globula [L. (Incabates)]
globularis (Sphaerozetes) *sp. inq.*
globulifera (Globogalumna)
globulifera (Suctobelbilla) *sp. inq.*
globuliferus (Neolichthonius)
globuloides (Galumna) *sp. inq.*
globulus (Euzetes)
globulus (Euzetes)
globus [P. (Archiphthiracarus)]
glomerata (Prototritia)
glomerata (Prototritia)
glycyphagoides (Damaeus)
glycyphagoides (Damaeus)
gnammaensis (Tyrphonothrus)
gobiensis [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
gobiensis (Bipassalozetes)
gobletus (Pseudotocephus)
goblina (Brachioppiella)
gogolensis [T. (Cristonothrus)]
golbasiensis [R. (Insculptoppia)]
goldengatensis (Quattoppiella)
golondrinasensis [N. (Protophthiracarus)]
golosovae (Gozmanyina)
golosovae [R. (Insculptoppia)]
golosovae (Parabelbella)
- golosovae* (Parautogneta)
gomerae (Oribatella)
gomerensis [N. (Calyptophthiracarus)]
gomozovae (Rhinoppia)
gongylos [P. (Neophthiracarus)]
gongylos (Notophthiracarus)
gorgonia (Crotonia)
gorodkovi (Nanhermannia)
gorodkovi (Nanhermannia)
gozeensis (Truncopes)
gozmanyi [O. (Zygoribatula)] (=arcuatissima)
gracilata [O. (Zygoribatula)]
gracilata [O. (Zygoribatula)]
gracile (Acrotritia)
gracile (Acrotritia)
gracilior (Eremobelba)
gracilior (Eremobelba)
gracilior (Eremobelba)
gracilior (Micreremus) (=brevipes)
gracilipes (Cepheus) *sp. inq.*
gracilipes (Damaeus)
gracilipes (Damaeus)
gracilis [O. (Acrotocephus)]
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Ceratozetes)
gracilis (Eohypochthonius)
gracilis (Eohypochthonius)
gracilis (Eohypochthonius)
gracilis (Eohypochthonius)
gracilis (Eohypochthonius)
gracilis (Eremaeus)
gracilis (Fissicepheus)
gracilis (Gehypochthonius)
gracilis (Hammerella)
gracilis [M. (Hammeroppia)]
gracilis [M. (Hammeroppia)]
gracilis [M. (Hammeroppia)]
gracilis [M. (Hammeroppia)]
gracilis [M. (Hammeroppia)]
gracilis [H. (Heterohermannia)]
gracilis (Holonothrus)
gracilis (Iugoribates)
gracilis (Kokoppia)
gracilis [S. (Lalmoppia)]
gracilis [S. (Lalmoppia)]
gracilis (Liacarus)
gracilis (Mahunkaia)
gracilis (Malaconothrus) (=monodactylus)
gracilis (Neoribates)
gracilis (Neoribates)
gracilis (Nothrus)
gracilis (Nothrus)
gracilis (Paraphauloppia)
gracilis (Paraphauloppia)
gracilis (Phaluloppia)
gracilis (Protoribates)
gracilis (Protoribates)
gracilis (Sellnickochthonius)
gracilis (Sellnickochthonius)
gracilis (Separatoppia)
graciosa (Eremobelba)
graeca (Mesoplophora) (=michaeliana)
graeca (Multipulchroppia)

- graecus (Haplochthonius)
 graecus (Platyliodes)
grafatus (Dolicheremaeus)
grahamius (Scapheremaeus)
 gramenicus (Papillacarus)
 graminetum (Pergalumna)
 gramineus (Torpacarus)
 graminosus (Heptacarus)
 granalata (Galumna)
granalata (Galumna)
 grancanariae (Ctenobelba)
 grancanariae (Parabelbella)
 grancanariae (Subbelba) elisae
grandiporosus (Schelorbates)
grandis [O. (Acrotocepheus)]
grandis (Adoristes) (=ovatus)
 grandis (Allosuctobelba)
 grandis (Allosuctobelba)
 grandis (Allosuctobelba)
 grandis (Anachipteria)
grandis (Anachipteria)
grandis (Austrachipteria)
grandis (Austrachipteria)
 grandis (Berniniella)
grandis (Cepheus) (=dentatus)
grandis (Ceratozetes) (=gracilis)
grandis [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
grandis (Eobrachychthonius) (=latior)
 grandis (Eremaeus)
 grandis (Eremaeus)
 grandis (Eupelops) *sp. inq.*
grandis (Hermannia) (=convexa)
 grandis (Hermannia)
 grandis (Mochlozetes) W. y L., 96
grandis (Mochlozetes) L y. W., 96 (=grandis W. y L., 96)
grandis (Oppia) (=nitens)
 grandis [R. (Parhynchoribates)]
 grandis (Peloribates)
grandis (Peloribates)
grandis (Pheroliodes)
grandis (Ramsavellus)
grandis (Reticulocephus)
grandis (Schelorbates) (=latipes)
 grandis [M. (Trimalaconothrus)] angulatus
grandis [A. (Uluguroides)]
granditrichosus (Annectacarus)
 grandjeani (Acaronychus)
 grandjeani (Alaskozetes) antarcticus
 grandjeani (Berlesezetes)
grandjeani [N. (Calypthothiracarus)]
 grandjeani (Carabodes)
 grandjeani (Cryptacarus)
 grandjeani (Cryptogalumna)
 grandjeani (Dimidiogalumna)
grandjeani [D. (Epidamaeus)] (=puritanicus)
 grandjeani (Galumna)
 grandjeani (Hoplophorella)
grandjeani (Hypochthoniella) (=minutissimua)
 grandjeani (Masthermannia)
grandjeani (Mesotritia) (=nuda)
 grandjeani (Mochloribatula)
 grandjeani (Mongaillardia)
grandjeani (Nanhermannia)
 grandjeani (Niphocephus) nivalis
grandjeani [H. (Platynothrus)] (=peltifer)
grandjeani (Protophthora) (=palpalis)
 grandjeani (Prototritia)
- grandjeani (Prototritia)**
grandjeani (Rugozetes)
grandjeani (Solenoppia)
 grandjeani (Tricheremaeus)
 grandjeani [S. (Tropacarus)]
 grandjeani (Zetorchestes)
 grandjeani [O. (Zygoribatula)]
 grandjeanica (Porobelba)
 granifer (Topobates)
granifer (Topobates)
 granifera (Suctobelbella)
granosus [C. (Klapperiches)]
granpiedraensis [P. (Archiphthiracarus)]
granulata (Acrotritia)
granulata [L. (Antennoppia)]
 granulata (Baloghiella)
 granulata (Cycloppia)
 granulata [S. (Dyobelba)]
 granulata (Hermannia)
 granulata (Hermannia)
granulata (Hermannia)
 granulata (Pergalumna)
granulata (Pergalumna)
granulata (Pulchroppia)
 granulata (Suctobelba)
granulata (Topalia)
granulata (Wallworkoppia) (=machadoi)
 granulata [O. (Zygoribatula)]
 granulatus (Arotrobates)
granulatus (Arotrobates)
granulatus (Bipassalozetes) (=perforatus)
 granulatus (Carabodes)
 granulatus (Carabodes)
granulatus (Carabodes)
 granulatus (Dolicheremaeus)
granulatus [D. (Epidamaeus)] (=bayartogtokhi)
 granulatus (Epieremulus)
granulatus (Eurereumaeus) (=oblongus)
 granulatus (Javacarus)
granulatus (Javacarus)
 granulatus [D. (Kunstdamaeus)]
 granulatus (Liacarus)
 granulatus (Licnodamaeus)
granulatus (Licnodamaeus)
 granulatus (Micreremus)
 granulatus (Microtegeus)
granulatus [P. (Millotacarus)]
 granulatus [P. (Millotacarus)]
 granulatus (Neoribates)
 granulatus (Nesiacarus)
granulatus (Nesiacarus)
granulatus (Nesiacarus)
granulatus (Passalozetes) (=neonominatus)
 granulatus (Pseudotocepheus)
 granulatus (Rhacaplacarus)
 granulatus (Sadocephus)
 granulatus (Scutovertex)
granulatus (Tectocephus) (=velatus)
 granulatus [M. (Trimalaconothrus)]
 granulatus [L. (Undulozetes)]
 granulatus (Unguzetes)
 granuliala (Trichogalumna)
 granulimorpha (Galumna)
 granulosa [K. (Stakarenoppia)]
 granulosis (Cepheus) *sp. inq.*
granulosus [T. (Cristonothrus)]
 granulosis (Papillonotus)

graptoppioides (Tainsculptoppia)
 gratiosa (Liebstadia)
 gratiosa (Metabelbella) *sp. inq.*
 gratiosa [O. (Zygoribatula)]
gratus (Podoribates) (=longipes)
 gravouwensis (Schalleriella)
 grecus [P. (Oribellopsis)]
greensladeae (Novazelandiella)
 gregarius (Gymnodamaeus) *sp. inq.*
 gregorioi (Carabodes)
gregorvi (Indoribates)
 grenadaensis [L. (Dorycranosus)]
gressitti (Apotomocephus)
gressitti (Austrocarabodes)
gressitti (Flammaeremaus)
gressitti (Hemileius)
 gressitti [L. (Lancelalmoppia)]
gressitti (Notophthiracarus) (=quietus)
 gressitti (Peloribates)
gringai (Tyrphonostrus)
griseus (Atropacarus)
 griseus (Sellnickochthonius)
 grishinae (Punctoribates)
 groblerae (Furcoppia)
 groblerae (Paulianacarus)
groenlandicus (Ameronothrus) (=maculatus)
 groenlandicus [D. (Epidamaeus)]
 groenlandicus [D. (Epidamaeus)]
 groenlandicus (Propelops)
 groenlandicus (Propelops)
 grootaerti (Amiracarus)
 grossa (Oribotritia)
 grossmani (Damaeus)
 grossmani (Damaeus)
 grossmani (Hoplophthiracarus) *sp. inq.*
 grossus (Notophthiracarus)
 grucheti (Arcoppia)
 gruezoi (Dolicheremaus)
 gruezoi (Ikarotocephus)
 gruezoi [P. (Trianguis)]
grvmae (Camisia)
 gadarramica [O. (Zygoribatula)]
 gadarramicus (Carabodes)
 gadarramicus (Ceratozetes)
 gadarramicus (Ghilarovus) hispanicus
 gadarramicus (Humerobates) rostralamellatus
 gadarramicus (Niphocermus)
 guadeloupensis (Cyrthermannia)
 guanarteme (Steganacarus)
 guanicola (Moritzoppia)
 guanicola (Serratoppia)
 guanophilus (Sellnickochthonius)
guarani (Brachioppia) (=deliciosa)
 guarani [E. (Neoepilohmannia)]
 guehoi (Perxylobates)
 guehoi (Perxylobates)
guelticola [R. (Rectoppia)] (=mihelcici)
 guerini (Scapheremaus)
 gueyeae (Hydrozetes)
 gueyeae [P. (Vepracarus)]
 gueyeae [P. (Vepracarus)]
 guhitanus (Scheloribates)
guhitanus (Scheloribates)
 guilfordidei (Gymnodamaeus)
 guillaumeti (Malgacheliodes)
 guineana (Arcoppia)
 guiyangensis (Nothrus)

gumista [O. (Coronoquadroppia)] (=nasalis)
gundungurra (Malaconothrus)
 gunini (Scheloribates)
gunjina (Pedrocortesella)
 guttata [Q. (Coronoquadroppia)]
 guttatoides (Peloribates)
 guttatus (Peloribates)
 guyi (Limnozetes)
 guzhangensis (Lohmannia)
gygeri (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
gymnonota (Pedrocortesella)
goergyi (Lamellobates) (=molecula)
 goergyi (Multipulchroppia)
 gyrata (Ramusella)
 gyroplicatus (Dolicheremaus)
 gyros (Notophthiracarus)
haarlovi (Lanceoppia)
 hachijoensis (Dolicheremaus) infrequens
 hachijoensis (Dolicheremaus) infrequens
hagenensis (Idiozetes)
 hailongensis [O. (Zygoribatula)]
 hainanensis (Annectacarus)
 hainanensis (Hoplophthiracarus)
 hainanensis (Megalotocephus)
 hainardorum (Ramusella)
 hakonensis (Protoribates)
 hakonensis [M. (Trimalaconothrus)]
 hallaensis (Astegistes)
 hallasanensis (Acrotritia)
 halleri (Protoribates) *sp. inq.*
 halli (Pilagalumna) tenuiclava
hallidavi (Trichonothrus)
hallidavi [P. (Neophthiracarus)]
hallidavi (Notophthiracarus)
 halophilus (Eupelops)
 halophilus (Xenillus)
 halterata (Similoppia)
 hamanni [M. (Phyllolohmannia)]
 hamanni (Xiphobelba)
 hamata (Autogneta)
 hamata (Eremobelba)
hamata (Eremobelba)
 hamata (Hoplophorella)
 hamata (Hoplophorella)
hamata (Hoplophorella)
hamata (Hoplophorella)
hamata (Hoplophorella)
 hamata (Hoplophorella)
 hamata (Medioxyoppia)
 hamata (Moritzoppia) *sp. inq.*
 hamata (Suctobelbella) subcornigera
 hamata (Suctobelbella) subcornigera
 hamatus (Hoplophthiracarus)
 hamatus (Hoplophthiracarus)
hamatus (Hoplophthiracarus)
 hamidi (Hoplophorella)
 hamidi (Neoamerioppia)
 hamifer (Acaroceras)
hamifer (Galumna) (=angularis)
 hamifera (Parasuctobelba)
 hamiltoni (Globoppia)
hammeni [P. (Archiphthiracarus)] (=peristomaticus)
hammeni (Notophthiracarus)
 hammeni (Striatoppia)
hammeni (Striatoppia)
 hammerae (Aeroppia)

hammerae (*Anderemaeus*)
hammerae (*Annectacarus*)
hammerae (*Arcoppia*)
hammerae (*Austrachipteria*) J. y P. Bal., 92
hammerae (*Austrachipteria*) M., 97 (= *hammerae* J. y P. B., 92)
hammerae [*M. (Calypozetes)*]
hammerae (*Chamobates*) (= *javensis*)
hammerae *Dolicheremaeus*
hammerae [*D. (Epidamaeus)*]
hammerae (*Galumna*)
hammerae (*Glanderemaeus*)
hammerae (*Hermannobates*)
hammerae (*Malaconothrus*) (= *angulatus*)
hammerae (*Nanohystrix*)
hammerae (*Nodocephus*)
hammerae (*Pherioides*)
hammerae (*Pseudotocephus*)
hammerae (*Quadroppia*)
hammerae (*Quadroppia*)
hammerae (*Quadroppia*)
hammerae (*Quadroppia*)
hammerae (*Scapheremaeus*) (= *patella*)
hammerae (*Sellnickochthonius*) (= *lydiae*)
hammerae (*Senectoppia*) (= *multisulcatum*)
hammerae [*N. (Steganacarellus)*]
hammerae (*Suctobelbella*) (= *duplex*)
hammerae (*Trhypochthonius*) *sp. inq.*
hammerae (*Trichoribates*)
hammerae (*Xenillus*)
hamobatoides (*Ceratozetes*)
hamulifera (*Camisia*)
hamulifera (*Camisia*)
hamulifera (*Camisia*)
hamulus (*Rhacaplacarus*)
hangavi (*Pedrocortesella*)
hannecarti (*Brachioppiella*)
hanswursti (*Retrozetes*)
hanyensis (*Sellnickochthonius*)
haradai (*Adrodamaeus*)
haradai (*Austrocarabodes*)
haradai [*F. (Psammocephus)*]
haramachiensis (*Peloribates*)
hardyi (*Pedrocortesella*)
hardvi (*Pedrocortesella*)
harioti (*Ameronothrus*) *sp. inq.*
harpezus (*Kalyptrazetes*)
harrysmi (*Neogalumna*)
harteni (*Suctobelbella*)
hartensteini [*B. (Gressittoppia)*]
harunaensis (*Pergalumna*) (= *altera*)
harundinosus (*Hydrozetes*)
hastata [*S. (Flagrosuctobelba)*]
hastata (*Pergalumna*)
hastata (*Pergalumna*)
hastatus (*Compactozetes*)
hastatus [*D. (Epidamaeus)*]
hastatus (*Eremulus*)
hastatus (*Furcobates*)
hastatus (*Furcobates*)
hastatus (*Furcobates*)
hasticeps (*Achipteria*) *sp. inq.*
hastilis (*Neoctenacarus*)
hatanoensis (*Nothrus*)
haughlandae [*P. (Triaunguis)*]
hauseri (*Acrotritia*) (= *americana*)
hauseri (*Allosuctobelba*)
hauseri [*P. (Archiphthiracarus)*] (= *anonymus*)

hauseri (*Arthrovertex*)
hauseri (*Baloghacarus*)
hauseri [*Y. (Berndobodes)*]
hauseri (*Berniniella*) *serratirostris*
hauseri [*N. (Besuchetacarus)*]
hauseri [*L. (Bolkiah)*]
hauseri (*Borneremaeus*)
hauseri (*Cavaecarabodes*)
hauseri (*Chamobates*)
hauseri [*N. (Confinoppia)*]
hauseri [*T. (Cristonothrus)*]
hauseri [*T. (Cristonothrus)*]
hauseri (*Issaniella*) *mograbin*
hauseri (*Lamellobates*) (= *molecula*)
hauseri [*N. (Leptosuctobelba)*]
hauseri [*S. (Lucioppia)*]
hauseri (*Luxtonia*)
hauseri (*Masthermannia*)
hauseri (*Mesoplophora*)
hauseri [*F. (Mexicoppia)*]
hauseri (*Microtegeus*)
hauseri (*Microtritia*)
hauseri (*Nothrus*)
hauseri (*Oribotritia*)
hauseri (*Otocephus*)
hauseri (*Papillonotus*)
hauseri (*Papillonotus*)
hauseri (*Passalozetes*)
hauseri (*Pergalumna*)
hauseri (*Pseudotocephus*)
hauseri (*Rhynchoppia*)
hauseri [*R. (Sabahoppia)*] (= *blattarum*)
hauseri (*Sabahtritia*)
hauseri (*Suctobelbila*)
hauseri (*Tectereemaeus*)
hauseri [*M. (Trichogalumella)*]
hauseri (*Trichoribates*)
hauserorum (*Brachychthonius*)
hauserorum (*Bulbocephus*)
hauserorum (*Oxyamerus*)
hawaiiensis (*Campbellobates*) *acanthus*
hawaiiensis (*Fortuvnia*)
hawaiiensis (*Microtritia*)
hawaiiensis (*Neoliodes*)
hawaiiensis (*Oribotritia*)
hawaiiensis (*Paroppia*)
hawaiiensis (*Pergalumna*)
hawaiiensis (*Perglumna*)
hawaiiensis (*Tenuelamellarea*)
haydeni (*Hemileius*)
headlandi [*N. (Parakalumma)*]
heatherae (*Oribatella*)
hebes (*Unduloribates*)
hebes (*Unduloribates*)
hectorperezii (*Scapheremaeus*)
heegi (*Eupelops*) *sp. inq.*
heeli (*Phyllozetes*)
heimi (*Carabodes*) (= *labyrinthicus*)
heintoogensis [*C. (Triachipteria)*]
heleios (*Heterozetes*)
helenae (*Ceratozetella*) (= *fiellbergi*)
helenae [*O. (Fberminia)*]
helenensis (*Scheloribates*)
hellenica [*C. (Berndamerus)*]
hellenica (*Machuella*) (= *ventrisetosa*)
hellenicus (*Microzetes*)
helleri (*Lemuroppia*)

- helleri** [A. (Malgoceras)]
helluonis [P. (*Neophthiracarus*)]
 helvetica (Joshuella)
 helvetica (Metrioppia)
helvetica (*Metrioppia*)
 helvetica [R. (Paramedioppia)]
helveticus (*Brachychthonius*) (=bimaculatus)
 helveticus (Damaeus)
 helveticus (Hypocephus)
 helveticus (Kaszabobates)
 helveticus (Topobates)
helvinus (*Schelorbates*) (=lanceoliger)
hemileiformis [H. (*Monoschelobates*)]
hendriksi (*Austrocarabodes*)
henicos (*Oribotritia*)
 henroi (Allonothrus)
hepaticolus (*Birobates*)
 hepaticus (Eremaeus)
hepaticus (*Eremaeus*)
herculeana (*Ceratoppia*) (=bipilis)
 herculeanus (Steganacarus)
 herenessica (Austrotritia)
 hericius (Protocephus)
 hermanni (*Oribotritia*)
 hermannioides (*Melanozetes*) sp. inq.
herminae (*Porrhoteagus*)
hermosaensis (*Papuacephus*)
heroica (*Pergalumna*)
heros (*Carinogalumna*) sp. inq.
 herzegowinensis [A. (*Conchogneta*)] willmanni
 hesperidiana (*Lasiobelba*)
hesperis [T. (*Tanzanycha*)]
 hessei (*Capilloppia*)
hessei [O. (*Zygoribatula*)] (=oudemansi)
 heterocuspis (*Ceratozetella*)
 heterochaeta [O. (*Zygoribatula*)]
heterodactylus [S. (*Bischelorbates*)] (=mahunkai)
heterodactylus [P. (*Biunguis*)]
heterodactylus (*Cultrobates*)
heterodactylus (*Topobates*)
 heterodentata [O. (*Monoribatella*)]
heteropilosa (*Hoplophorella*)
heteropilosus (*Phthiracarus*)
heteropilosus [N. (*Protophthiracarus*)] (=neochilensis)
heteropoda (*Metabelba*) sp. inq.
heteroporosa [O. (*Zygoribatula*)] (=undulata)
 heteroporosus (*Fuscozetes*)
 heterosa [L. (*Antennoppia*)]
heterosa [L. (*Antennoppia*)]
 heterosa [P. (*Apolohmannia*)]
 heterosetiger (*Neoxenillus*)
 heterosetiger (*Neoxenillus*)
 heterosetiger (*Otocephus*)
 heterosetosa (*Acanthobelba*)
 heterosetosa (Belba)
 heterosetosa (*Ctenobelba*)
heterosetosa (*Hoplophorella*)
heterosetosus (*Austrocarabodes*)
 heterosetosus (*Cepheus*)
heterosetosus (*Euphthiracarus*)
 heterosetosus (*Hoplophthiracarus*)
heterosetosus (*Schelorbates*)
heterosetosus [N. (*Steganacarellus*)]
 heterosetus (*Otopentacephus*)
 heterospinifer (*Camisia*)
 heterotricha (*Apoplophora*)
 heterotricha (*Apoplophora*)
- heterotricha** (*Apoplophora*)
 heterotricha (*Epilohmannia*)
heterotricha (*Eremobelba*)
heterotricha (*Globoppia*)
heterotricha (*Hexoppia*)
heterotricha (*Hexoppia*)
heterotricha (*Indotritia*) (=krakatauensis)
heterotricha (*Mesoplophora*)
heterotricha [E. (*Multoribates*)]
heterotricha (*Oribotritia*)
heterotricha [H. (*Phyllhermannia*)]
 heterotricha (*Rhinoppia*)
heterotricha [G. (*Stenoppia*)] (=italica)
heterotricha [P. (*Tectodamaeus*)]
heterotricha [O. (*Zygoribatula*)] (=bonairensis)
heterotrichosus [P. (*Archiphthiracarus*)]
heterotrichosus [A. (*Baloghodes*)]
heterotrichus [O. (*Acrotocephus*)]
heterotrichus [N. (*Calyptophthiracarus*)]
heterotrichus (*Congocephus*)
heterotrichus (*Eremulus*)
heterotrichus [T. (*Cristonothrus*)]
heterotrichus (*Dolicheremaeus*)
heterotrichus (*Eurostocephus*)
heterotrichus (*Meristacarus*)
heterotrichus (*Meristacarus*)
heterotrichus (*Papillocephus*)
heterotrichus (*Phyllozetes*) (=emmae)
heterotrichus [E. (*Pocsia*)]
heterotrichus (*Rostrozetes*)
heterotrichus (*Sacculobates*)
heterotrichus (*Schelorbates*)
heterotrichus (*Sellnickochthonius*)
heterotrichus [N. (*Steganacarellus*)] Mah., 84
heterotrichus [N. (*Steganacarellus*)] Ni. (=novazelandicus)
heterotrichus (*Tyrphonothrus*)
heterotrichus (*Xenillus*)
 hettigei (*Ceylobodes*)
heveae (*Sellnickia*) (=caudata)
 hexagona (*Notogalumna*)
hexagonalis (*Cubabodes*)
 hexagonus [P. (*Minguezetes*)]
hexagonus [P. (*Minguezetes*)]
 hexagonus [P. (*Minguezetes*)]
 hexagonus [P. (*Minguezetes*)]
 hexagonus [P. (*Minguezetes*)]
 hexagonus (*Mixacarus*)
hexapili (*Lanceoppia*)
hexapilis (*Neoamerioppia*)
hexaporosa (*Behanpseudoppia*)
hexaporosus (*Dynatozetes*)
hexasacculata (*Sacculogalumna*)
hexasetosa (*Macrogena*)
 hexasetosus [Y. (*Dongnaibodes*)]
 hexasetosus (*Malaconothrus*)
hexasetosus (*Malaconothrus*)
hexatricha (*Basiloppia*)
hidasii (*Anderemaeus*)
hiemalis (*Nanhermannia*) (=dorsalis)
hieroglyphicus (*Scapheremaeus*)
 hierrensis (*Hemileius*)
higginsi (*Brachioppiella*)
higginsi (*Eueremaeus*)
higginsi (*Eupelops*)
higginsi [C. (*Klapperiches*)]
highlandensis (*Dentachipteria*)
 higoensis (*Triautogneta*)
hikurangi [S. (*Rafacarus*)]

- hillcrestensis** [P. (**Archiphthiracarus**)]
himachalensis [M. (**Furculoppia**)]
himalayensis (**Dolicheremaeus**)
himalayensis (**Eremaozetes**)
himalayensis (**Eremobelba**)
himalayensis [O. (**Indotocepeus**)]
himalayensis (**Megalotocepeus**)
himalayensis (**Nanhermannia**)
himalayensis (**Oxyamerus**)
hiore [N. (**Protophthiracarus**)]
hippy (**Machuella**) (=ventrisetosus)
hippy (**Ramusella**)
hirashimai (**Microtegeus**)
hirauchiae (**Suctobelbata**)
hirauchiae (**Trichoribates**)
hirokous (**Protoribates**)
hiroyoshii [F. (**Cosmogalumna**)]
hirsuta (**Masthermannia**)
hirsuta (**Masthermannia**)
hirsuta (**Masthermannia**)
hirsutus (**Dolicheremaeus**)
hirsutus (**Eupelops**) (=acromios)
hirsutus (**Heptacarus**)
hirsutus (**Heptacarus**)
hirsutus [P. (**Metaphthiracarus**)] (=setosus)
hirsutus (**Peloribates**) Banks, 1895 sp. inq.
hirsutus (**Peloribates**) Mah., 1983 (=neonominatus)
hirsutus (**Steganacarus**)
hirsutus [P. (**Vepracarus**)]
hirsutus [P. (**Vepracarus**)]
hirsutus [P. (**Vepracarus**)]
hirsutus [P. (**Vepracarus**)]
hirtus (**Brachychthonius**)
hirtus (**Eupelops**) (=major)
hirtus [P. (**Neophthiracarus**)]
hirtus [A. (**Pseudonothrus**)]
hirtus (**Trichoribates**) sp. inq.
hispanica (**Corynoppia**)
hispanica [L. (**Incabates**)]
hispanica [G. (**Monophauloppia**)]
hispanica (**Tenuelamellarea**)
hispanica (**Tenuelamellarea**)
hispanica [O. (**Zygoribatula**)]
hispanicus (**Adrodamaeus**)
hispanicus (**Carabodes**)
hispanicus (**Ghilarovus**)
hispanicus (**Paralopheremaeus**)
hispanicus (**Passalozetes**)
hispaniola (**Beklemishevia**)
hispaniola (**Lohmannia**) (=turcmenica)
hispida (**Pilogalumna tenuiclava**)
histracinus (**Hoplophthiracarus**)
histracinus (**Hoplophthiracarus**)
histracinus (**Hoplophthiracarus**)
histracinus (**Peloribates**) (=hubbardi)
hivaoa (**Nuhivabates**)
hivaoae (**Crotonia**) (=nukuhivae)
hoeli (**Ceratoppia**) (=sphaerica)
hoh (**Carabodes**)
hokkaidensis (**Hermannia**)
hokkaidensis (**Hermannia**)
hokkaidoensis (**Suctobelbella**)
hokkaiensis (**Cepheus**)
hokkaiensis (**Eueremaeus**)
holomonensis (**Achipteria**)
holoscripta (**Galumnopsis**)
holsaticus (**Topobates**)
holtmanni [O. (**Acrotocepeus**)]
holtmanni [O. (**Acrotocepeus**)]
homodactyla (**Galumna**) sp. inq.
honestus (**Sellnickochthonius**)
honsuensis (**Diapterobates**) variabilis
hooki [H. (**Platynothrus**)]
horakae [O. (**Acrotocepeus**)]
horakae (**Furculoppia**)
horaki (**Pseudoceratoppia**)
horologiorum (**Sacculobates**)
horreo [C. (**Flexa**)]
horrida (**Camisia**)
horrida (**Camisia**)
horrida (**Camisia**)
horrida (**Camisia**)
horrida (**Camisia**)
horrida [H. (**Kakophthiracarus**)] (=tuberculosissima)
horrida (**Metabelba**) sp. inq.
horrida (**Novosuctobelba**)
horridus (**Austrocarabodes**)
horridus (**Hermannobates**)
horridus (**Liochthonius**)
hortensis (**Neoamerioppia**)
hortobagyensis (**Phthiracarus**) (=longulus)
hortobagyensis [O. (**Zygoribatula**)] (=vulgaris)
horvathae (**Separatoppia**)
horvathorum (**Pergalumna**)
howardi (**Anachipteria**)
howardi (**Anachipteria**)
huancayensis (**Scheloribates**)
huancayensis (**Scheloribates**)
huangshanensis (**Allosuctobelba**)
huangshanensis (**Oppia**)
huanucoensis [H. (**Varioppia**)]
hubbardi (**Peloribates**)
hubeiensis (**Tenuiala**)
hubeiensis (**Tenuiala**)
hudsoni (**Galumna**)
hulli (**Hoplophthiracarus**)
humboldtensis [T. (**Cristonothrus**)]
humectus (**Zachvatkinibates**) sp. inq.
humeralis (**Diapterobates**)
humeralis (**Diapterobates**)
humeralis (**Euphthiracarus**)
humeralis (**Hemileius**)
humeralis (**Topobates**)
humerala (**Cultroribula**)
humerala (**Liebstadia**)
humerala (**Liebstadia**)
humerala (**Liebstadia**)
humerala (**Notoppia**)
humerala (**Oripoda**)
humerala (**Pedrocortesella**)
humeralus (**Cristeremaeus**)
humeralus (**Cristeremaeus**)
humeralus (**Epieremulus**)
humeralus (**Microtegeus**)
humeralus (**Microtegeus**)
humeralus (**Reductobates**)
humeralus (**Scapheremaeus**)
humeralus (**Scheloribates**) sp. inq.
humeralus (**Tyrphonothrus**) P. Bal., 97
humeralus [T. (**Tyrphonothrus**)]JPB02(=**humeralus**PB97)
humeralus (**Yoshiobodes**) (?=**nakatamarii**)
humeredens (**Ghilarovus**)
humicola [R. (**Insculptoppiella**)]

- humicola [R. (Insculptoppiella)]
 humicola [H. (Platynothrus)]
 humicola [H. (Platynothrus)]
 humida (Galumna)
 humidus (Yoshiobodes)
 humilis [P. (Archiphthiracarus)] Nied., 04
 humilis [P. (Archiphthiracarus)] Nied., 06 (=sudafricanus)
 humilis (Hermannella)
 hummelincki (Carabodes)
 hummelincki [C. (Triachipteria)]
 hunchunensis (Oribotritia)
 hungarica (Acrogalumna)
 hungarica (Berniniella)
 hungarica [O. (Bioribatella)]
 hungarica (Ceratoppia) sp. inq.
 hungarica [M. (Hammeroppia)] wilsoni
 hungarica (Oppia) sp. inq.
 hungarica (Psammogalumna)
 hungaricus (Aleurodamaeus)
 hungaricus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
 hungaricus (Carabodes)
 hungaricus (Exochocephus)
 hungaricus (Odontocephus)
 hungaricus (Peloribates)
 hungaricus (Peloribates)
 hungaricus (Sellnickochthonius) rostratus
 hungaricus (Sellnickochthonius) rostratus
 hungaricus [P. (Semipunctoribates)]
 hungarorum (Genavensia)
 hungarorum (Lohmannia)
 hungarorum (Malgasodes)
 hungarorum (Scapheremaeus)
 hungarorum (Taiwanoppia)
 hungarorum (Taiwanoppia)
 hungarorum (Tegeocranellus)
 hunti (Phylleremus)
 hunti [H. (Phyllhermannia)]
 hurkai (Miracarus)
 hurshi (Suctobelbella)
 huvsgulensis [L. (Procorynetes)]
 hvalina (Cheloppia)
 hyalinus (Carabocephus)
 hyalinus (Oxyamerus)
 hyalinus (Plasmobates)
 hyalinus (Vilhenabates)
 hydrophila (Pergalumna)
 hyeroglyphica (Acrotritia) (=americana)
 hygrophila (Rhinoppia)
 hygrophila (Trichogalumna)
 hygrophilus (Bullibates)
 hygrophilus (Eupelops)
 hygrophilus (Punctoribates) (=sellnicki)
 hygrophilus (Scheloribates)
 hylaeus (Mycobates)
 hylaius (Megeremaeus)
 hypergranulosa (Pergalumna)
 hypersetosus (Peloribates)
 hypogea (Hypogeoppia)
 hypoquercus (Phyllozetes)
 hyrcanica (Hafenferrefia) (=nevesi)
 hystricinus (Liochthonius)
 hystricinus (Liochthonius)
 hystricinus (Liochthonius)
 hystricinus (Palaeacarus)
 hystricinus (Palaeacarus)
 hystricinus (Palaeacarus)
 hystrix (Peloribates) sp. inq.
 ianus (Scutovertex)
 ibarakiensis [S. (Flagrosuctobelba)]
 iberica [C. (Bifurcobelba)]
 iberica (Bursoplophora)
 ibericus [L. (Dorycranosus)] Djap., 73 (=zachvatkini)
 ibericus [L. (Dorycranosus)] Djap., 74 (=splidens)
 ibericus [D. (Epidamaeus)] (=pyrenaicus)
 ibericus (Peloptulus)
 ibericus (Scheloribates)
 ibericus (Tectocephus) (=sarekensis)
 icaria [L. (Antennoppia)] (=quadriseta)
 ichnusae (Oribatella)
 idem (Liochthonius)
 ifeana (Mesoplophora) (=africana)
 ifeensis (Nothrus)
 ignobilis (Notophthiracarus)
 ignota (Belba) (=sculpta)
 ignota (Mesoplophora)
 ignotus (Adrodamaeus) (=siculus)
 igorotus (Basiceramerus)
 iheyaensis (Neoliodes)
 iheyaensis (Tectocephus)
 iheyaensis [O. (Zygoribatula)]
 ikeharai [C. (Klapperiches)]
 ilhabellae (Phylloribatula)
 ilicaensis [O. (Dzarogneta)]
 illecebrosus (Austrodamaeus) (=elegantulus)
 illinoisensis (Chamobates) sp. inq.
 illinoisensis (Hoplophthiracarus)
 illinoisensis (Hoplophthiracarus)
 illinoisensis (Hoplophthiracarus)
 illinoisensis (Hoplophthiracarus)
 illinoisensis (Quadroppia)
 illinoisensis (Quadroppia)
 illuminata (Oribatella)
 illuminata (Oribatella)
 ilocanus (Arthrovertex)
 ilyinae (Sellnickochthonius)
 imadatei (Archeogocephus)
 imadatei (Dolicheremaeus)
 imadatei (Pergalumna)
 imbecillis [P. (Archiphthiracarus)]
 imitans (Furcoppia)
 imitans (Paraxylobates)
 imitans (Paraxylobates)
 imitans (Pseudopirnodus)
 imitator (Epackozetes)
 imitator (Hypozetes)
 imitator (Hypozetes)
 imitator (Xenillus)
 immaculatus (Sellnickochthonius)
 immaculatus (Sellnickochthonius)
 immaculatus (Sellnickochthonius)
 immarginatus (Odontocephus)
 immundus (Atropacarus)
 impar (Prionoribatella)
 imparata (Phauloppia)
 impedita (Cosmogneta)
 impedita (Cosmogneta)
 impedita (Pedrocortesella)
 impeditus (Halozetes)
 imperatoria (Ceratozetella)
 imperatoria (Ceratozetella)
 imperfecta [F. (Cosmogalumna)]
 imperfecta (Galumna) (=teuri)
 imperfecta [A. (Izuachipteria)]
 imperfecta [A. (Izuachipteria)]

imperfecta (Trichogalumna)
imperfectus (Austrocarabodes)
 imperfectus (Cosmochthonius)
 imperfectus (Passalozetes)
imperfectus (Protoribates)
imperfectus (Protoribates)
imperfectus (Schelorbates)
 imperialis (Hafenferrefia) *sp. inq.*
impolita [H. (Tuberemaeus)]
impolitus [N. (Protophthiracarus)]
 impressus (Brachychthonius)
improvisus (Notophthiracarus)
improvisus (Pseudocarabodes)
 imreorum (Epilohmannia)
inaccessus [P. (Archiphthiracarus)]
inae (Afroleius)
inaequa (Hoplophorella)
inaequalis (Dolicheremaeus)
inaequalis (Licnodamaeus)
inaequipes (Parabelbella)
inaequirostris (Arcoppia)
 inaestimabilis (Steganacarus)
inauditus (Notophthiracarus)
inca (Beckiella)
inca (Pheroliodes)
incaensis (Arceremaeus)
incavatus (Nothrus)
incerta (Arcoppia)
incerta (Arcoppia)
incerta (Collohmannia) (=gigantea)
incerta (Galumna)
 incerta (Oribatula)
incertus (Phthiracarus) (=lentulus)
incertus (Poroschelorbates)
incertus (Salvus)
incertus (Ungizetes)
incipatus (Charassobates)
 incisa (Ceratoppia)
incisa (Galumna)
incisa [B. (Gressittoppia)]
incisa (Magyarica)
incisa (Microtritia)
 incisa (Moritzoppia)
 incisa (Oribatella)
incisa (Sternoppia)
 incisellus [T. (Latilamellobates)]
incisellus [T. (Latilamellobates)]
incisirostra (Oppia)
incisirostris (Tutorozetes)
incisiva [R. (Rectoppia)]
incisivus (Afronothrus)
incisivus (Afronothrus)
incisivus (Afronothrus)
incisivus (Afronothrus)
incisura [P. (Italobates)]
 incisus (Cepheus) *sp. inq.*
incisus (Chamobates) (=pusillus)
incisus (Hydrozetes) (=thienemanni)
incisus (Lugorbates) (=cornutus)
 incisus (Liacarus)
incisus (Neoribates)
inclinata (Pletzenoppia)
 incognita (Rhinoppia)
incognita (Oribotritia)
 incognitus [S. (Tropacarus)]
incomparabilis (Notophthiracarus)
incompatibilis [P. (Peloribatodes)]

incomperta (Pergalumna)
incomperta (Pergalumna)
 incomperta (Phauloppia)
incompleta (Allogalumna)
incompleta (Oribatula)
incompletus (Eupelops)
incompletus (Tecteremaeus)
incompletus (Tecteremaeus)
incompletus [P. (Vepracarus)]
 incomptus (Steganacarus)
 incondita (Hermanniella)
 inconditus (Atropacarus)
incrassatus (Neophysobates)
incrassatus [N. (Protophthiracarus)]
incredibilis (Euphthiracarus)
incredibilis [R. (Mantigueracarus)]
 incredibilis (Phthiracarus)
incrustata (Oribatula)
incrustatus [A. (Uluguroides)]
 inculpatus (Atropacarus)
incurva (Ceratozetella)
 incurva [S. (Lalmoppia)]
incurva (Protoripoda)
incurva [C. (Triachipteria)] distincta
incurva [O. (Zygoribatula)]
incurvata (Oribatella)
incurvata (Phauloppia) (=lucorum)
incurvata (Schalleria)
 incurvatus [M. (Calyptozetes)]
incurvatus [M. (Calyptozetes)]
incurvus (Dicrotegaeus)
indentata (Ceratoppia)
 indentatus [L. (Dorycranosus)]
indentatus [H. (Tuberemaeus)]
index (Acaroceras)
indes (Sphaerogalumna)
 indiana (Aeroppia)
indica (Apoplophora) (=pantotrema)
 indica (Arcoppia)
 indica (Basilobelba)
 indica (Epilohmannia) *minuta*
 indica (Eremobelba)
 indica [S. (Flagrosuctobelba)]
 indica (Galumna) *crenata*
 indica (Galumnella)
 indica (Lohmannia)
 indica (Malacoangelia) *remigera*
 indica (Mesotritia)
 indica (Multioppia)
 indica (Separatoppia)
indicator (Hydrozetes)
 indicus (Allonothrus)
indicus (Arhegozetes) (=longisetosus)
 indicus (Belbodamaeus)
 indicus (Dolicheremaeus)
 indicus (Eremulus)
 indicus (Flagellozetes) *porosus*
indicus (Hoplophthiracarus) (=repetitus)
 indicus [P. (Millotacarus)]
 indicus (Notophthiracarus)
 indicus (Sacculobates)
 indicus (Schelorbates) Oud., 15
indicus (Schelorbates) Oud., 15
indicus (Schelorbates) San., 92 (**=obsessus**)
 indicus (Uracrobates)
 indifferens [T. (Cristonothrus)]
indifferens [T. (Cristonothrus)]

indiligens (Notophthiracarus)
 indistincta (Pergalumna)
 indistinctus (Papillacarus)
indistinctus (Tumerozetes)
 indivisa (Pergalumna)
 indonesica (Galumna)
 indonesiensis (Allogalumna)
indubitatus (Notophthiracarus)
 indusiatus [M. (Trimalaconothrus)]
 induta (Eremella)
induta (Eremella)
 induta (Eremella)
induta (Eremella)
 induta (Eremella)
 inecola [P. (Minguezetes)]
inelegans (Hoplophorella)
 inelegans (Hoplophorella)
 inenarrabilis (Notophthiracarus)
 inenodabilis [N. (Leptosuctobelba)]
 inepta (Hoplophorella)
inepta (Hoplophorella)
 inermis (Liacarus)
 inermis (Liacarus)
inermis (Unguizetes)
 inexpectata (Epilohmannia)
inexpectata (Epilohmannia)
inexpectata (Muliercula)
 inexpectata (Rhynchobelba)
inexpectatus (Alismobates)
 inexpectatus (Hypozaetes)
inexpectatus (Javacarus)
 inexpectatus (Phthiracarus)
 inexpectatus (Spinozetes)
infinita (Pergalumna)
infissus [L. (Dorycranosus)] (=acutus)
 inflata (Dometorina)
 inflata (Hoplophorella)
inflatus [N. (Calvptophthiracarus)]
 inflatus (Physozaetes)
inflatus (Rhacaplacarus)
 inflexa (Oribatella)
inflexus (Tectocephus) (=sarekensis)
 infrequens (Dolicheremaeus)
infusionum [H. (Platynothrus)] (?=peltifer)
 inglisi (Euphthiracarus)
 inglisi (Euphthiracarus)
inhambanensis (Fortuynia)
 initialis (Hemileius)
 initialis (Hemileius)
 initialis (Hemileius)
 initialis (Hemileius)
 inlenticulatus (Passalozetes)
 inlenticulatus (Scutovertex)
innexa (Galumna)
inopinatus (Calvptophthiracarus) (=pavidus)
 inopinatus (Dolicheremaeus)
 inopinatus [C. (Phyllocarabodes)]
 inopinatus [C. (Phyllocarabodes)]
 inopinatus [E. (Pocsia)]
inornata (Baloghoppia)
 inornata (Berniniella)
 inornatus [P. (Archiphthiracarus)]
 inornatus [D. (Epidamaeus)] sp. inq.
inornatus (Rostrozetes)
inornatus [H. (Tuberemaeus)]
 inoucae (Hoplophthiracarus)
inquirenda (Galumna) sp. inq.

inquirenda (Hydrozetes) sp. inq.
 insculpta [R. (Insculptoppia)]
 insculpta [R. (Insculptoppia)]
insculptus (Annectacarus)
 insertus (Eremaeus)
 insignificans (Neoribates)
insignipes (Epilohmannia)
 insignis (Achipterina)
insignis (Achipterina)
insignis [L. (Antennoppia)]
 insignis (Banksinoma)
insignis (Farchacarus)
insignis (Lauritzenia)
 insignis [P. (Minguezetes)]
 insignis [P. (Minguezetes)]
insignis [P. (Minguezetes)]
 insignis [P. (Minguezetes)]
insignis [P. (Neophthiracarus)]
insignis (Papuazetes)
 insignis (Perlohmannia)
insignis (Rhynchoribates)
insignis [D. (Rykkella)]
insignis [M. (Safrobates)]
 insignitus (Hoplophthiracarus)
insignitus (Ocesobates) (=boodvardssoni)
 insitiva (Taiwanoppia)
insolens [P. (Archiphthiracarus)]
insolens (Hoplophorella)
insolita (Allogalumna)
insolita (Brachioppia)
 insolita (Chistyakovella)
 insolita [M. (Hammeroppia)]
insolita (Multioppia) (?=laniseta)
 insolita (Pluritrachoppia)
 insolitus (Dolicheremaeus)
 insolitus (Nippobodes)
 insolitus (Nippobodes)
 insolitus [C. (Phyllocarabodes)]
 insolitus [C. (Phyllocarabodes)]
 insolitus [E. (Pocsia)]
 insperatus (Scutoverticosus)
instans (Cosmozetes)
 insulana [S. (Flagrosuctobelba)]
insulana [S. (Flagrosuctobelba)]
 insulana [M. (Hammeroppia)]
insulana [M. (Hammeroppia)]
insulana [M. (Hammeroppia)]
 insulanus (Steganacarus)
insularis (Aeroppia)
insularis (Ameronothrus) (=maculatus)
insularis [P. (Archiphthiracarus)] (=bulbiferus)
 insularis (Atropacarus) striculus
insularis (Basilobelba)
insularis (Basilobelba)
insularis (Basilobelba)
 insularis (Bursoplophora)
 insularis (Dometorina) plantivaga
insularis (Gittella)
 insularis (Gymnodampia)
 insularis (Hoplophthiracarus)
insularis [R. (Insculptoppia)] (=insculpta)
insularis (Mesoplophora) (=africana)
insularis [M. (Multilanceoppia)]
 insularis (Parachipteria)
insularis (Phthiracarus)
 insularis (Protoripoda)
insularis (Scapheremaeus)

- insularis* (Scheloribates) (=praeincisus)
insularis [L. (Triungulozetes)] (=fusifer)
insularis [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
 insulata (Lasiobelba)
 integer (Allogalumna)
integer (Mixacarus)
 integer (Mycobates)
 integra (Multioppia)
interiunctus (Acaroceras)
interlamellaris (Beckiella)
interlamellaris (Heminothrus)
interlamellaris (Metabelbella)
intelamellaris [S. (Perschelorbates)]
interlamellaris [P. (Tectodamaeus)]
interlamellaris (Trichogalumna)
intermedia (Achipteria) (=coleoprata)
intermedia [A. (Conchogneta)] *sp. inq.*
intermedia [O. (Dzarogneta)]
intermedia [S. (Flagrosuctobelba)] (=subtrigona)
intermedia (Globoppia)
intermedia (Globoppia)
intermedia [H. (Heterohermannia)]
intermedia (Oribatula) (=caliptera)
intermedia (Pergalumna)
intermedia (Pergalumna)
intermedia (Serratoppia)
intermedius (Alaskozetes) *antarcticus*
intermedius (Alaskozetes) *antarcticus*
intermedius (Anellozetes)
intermedius (Austrocarabodes)
intermedius (Bipassalozetes)
intermedius (Eueremaeus)
intermedius (Eupelops)
intermedius (Euphthiracarus) (=reticulatus)
intermedius [C. (Flexa)]
intermedius (Fuscozetes)
intermedius (Halozetes)
intermedius (Haplochthonius)
intermedius (Hermannobates)
intermedius (Lamellobates)
intermedius (Lamellobates)
intermedius (Liochthonius)
intermedius (Liochthonius)
intermedius [C. (Mixozetes)]
intermedius (Peloribates)
intermedius (Pheroliodes)
intermedius (Tyrphonothrus) (=maior)
internodentatus (Liacarus) (=brevilamellatus)
interpositus [C. (Xiphobates)]
interrogata (Neoamerioppia)
 interrupta (Arcoppia)
 interrupta (Lohmannia) javana
 interrupta (Oribatula)
interrupta (Oribatula)
interrupta (Oribatula)
 interrupta (Pseudoppia)
interrupta (Pseudoppia)
interruptus (Carabodes)
interruptus (Cavernozetes)
 interruptus (Melanozetes)
interruptus (Scheloribates) praeincisus
interruptus (Scheloribates) praeincisus
interruptus (Scheloribates) praeincisus
intralamellata (Oppiella) (=nova)
 intrudens (Berniniella)
intrudens (Berniniella)
 inundata [A. (Conchogneta)]
- inupiaq* [C. (Cyrtozetes)]
inurbanus (Steganacarus)
inusitata (Sumatrotritia)
inusitatus [N. (Calyptophthiracarus)]
inusitatus (Notophthiracarus)
invenusta (Camisia)
invenusta (Camisia)
invenustus [P. (Archiphthiracarus)]
invisitata (Mesoplophora)
invisitata (Mesoplophora)
invitus (Ceratozetes)
involutus (Congocephus)
ionicus (Hellenamerus)
ionicus (Neoliodes)
ionthadosus (Xenillus)
iowaensis (Peloribates)
iracemae (Protoribates)
iranensis (Christovizetes)
iranensis [O. (Dzarogneta)]
iranensis (Galumna)
iranica (Allogalumna)
iranica (Anomaloppia) (=ozkani)
iranica (Beklemishevia)
iranica (Berniniella)
iranica [A. (Conchogneta)]
iranica [Q. (Coronoquadroppia)]
iranica [R. (Insculptoppia)]
iranica (Lauroppia)
iranica (Protoplophora)
iranica (Psammogalumna)
iranica (Ramusella) (=persica)
iranica [A. (Rhaphigneta)] (=akramii)
iranica (Serratoppia)
iranicus (Eobrachychthonius)
iranicus [I. (Haplozetes)]
iranicus (Mabulatrachus)
irazu (Galumna)
irenae (Eremaezetes)
iriomotensis [T. (Cristonothrus)]
irmayi (Beckiella)
irmayi (Octoppia)
irmayi (Yoshiobodes)
irmayi (Yoshiobodes)
irmayi (Yoshiobodes)
irregularis (Joshuella)
irregularis (Pergalumna)
irregularis (Rostrozetes)
irregularis (Rostrozetes)
irregularis (Xenillus)
irreprehensus (Phthiracarus)
isabelaensis (Neoribates)
isabelaensis (Oxyamerus)
isarogenesis [E. (Cerostocephus)]
ischnos (Acrotritia)
ishigakiensis (Austrotritia) (=saraburiensis)
ishigakiensis (Galumna) planiclava
ishikariensis (Nothrus)
ishikawai (Hoplophthiracarus)
islandica (Banksinoma) (=lanceolata)
islandica [C. (Ensicamisia)] (=solhoeyi)
ismalia (Xiphobelba)
issanielloides (Hermanniella)
italica (Achipteria)
italica (Allogalumna) (=parva)
italica [M. (Neobelba)]
italica (Nortonbelba)
italica [G. (Stenoppia)]

- italica (Suctobelbella)
italicus (Adrodamaeus) (=siculus)
italicus (Microzetorches) (=emervi)
italicus (Phthiracarus)
italicus (Phthiracarus)
italicus (Poecilochthonius)
italicus (Pocilochthonius)
italiensis (Sphaerozetes) (=orbicularis)
itascensis (Xenillus)
itaitiaiae (Tyrphonostrus) P. B., 97
itaitiaiae (Tyrphonostrus) J.y P.B.02 (=itaitiaiae P.B.97)
iterata (Galumna) sp. inq.
iterata (Galumna) sp. inq.
iteratus (Dolicheremaeus) magnus
iteratus (Schelorbates)
iteratus [M. (Trimalaconothrus)]
iteratus [M. (Trimalaconothrus)]
ithacensis (Galumna)
itoti (Yambaramerus)
itsukiensis (Belba)
itsukushima (Licnodamaeus)
iturrondobeitai (Cerachipteria)
iturrondobeitai (Foraminoppia)
iubatus (Notophthiracarus)
iunctiporosa (Pergalumna) (=myrmophila)
iuvenalis [M. (Parplophora)]
izabalensis (Torpacarus)
izinyosa (Setoppia)
izquierdoae [L. (Antennoppia)]
izuensis (Diapterobates)
izumiensis (Acutozetes)
jaccoudi (Apoplophora) (=pantotrema)
jaccoudi (Cosmozetes)
jacoti (Belba)
jacoti (Belba)
jacoti (Epilohmannoides)
jacoti (Epilohmannoides)
jacoti (Galumna) sp. inq. Whar., 38
jacoti (Galumna) M. et al., 87 (=iterata)
jacoti (Gymnodampia)
jacoti (Indotritia)
jacoti (Indotritia)
jacoti [H. (Kakophthiracarus)]
jacoti (Lanceoppia)
jacoti (Mesotritia)
jacoti (Mesotritia)
jacoti Neoribates B. y M., 67
jacoti Neoribates N. y K., 89 (=neonominatus)
jacoti (Oribatella)
jacoti (Phthiracarus)
jacoti (Sellnickochthonius)
jacoti (Sellnickochthonius)
jacquelinae (Bovicarabodes)
jahnae (Berniniella)
jaliscoensis (Nothrus)
jamaicaensis [C. (Klapperiches)]
jamalica (Moritzoppia)
jamiesoni (Anoplozetes)
janae (Metabelbella)
jandai (Dampfiella)
jandiae (**Pseudomultioppia**)
janetscheki (Liacarus)
janosbaloghi (Notophthiracarus)
japonensis (Eupelops)
japonensis [H. (Platynothrus)] peltifer
japonica (Allosuctobelba)
japonica (Austroceratoppia)
japonica (Austroceratoppia)
japonica (Autogneta)
japonica (Banksinoma)
japonica (Belba) compta
japonica (Belba) compta
japonica (Eremobelba)
japonica (Eremobelba)
japonica (Hexachaetoniella)
japonica (**Hexachaetoniella**)
japonica (**Hexachaetoniella**)
japonica (Mahunkana)
japonica (Mahunkana)
japonica [M. (Parplophora)]
japonica [M. (Parplophora)]
japonica (Ramuselloppia)
japonicus (Ceratozetes) (?=laticuspidatus)
japonicus (Diapterobates)
japonicus (Hydrozetes)
japonicus (Indoribates)
japonicus (Malaconothrus)
japonicus (Megalotocepheus)
japonicus (Megalotocepheus)
japonicus (Ommatocepheus) clavatus
japonicus (Palaeacarus) hystricinus
japonicus (Phthiracarus)
japonicus (Phthiracarus)
japonicus (Phthiracarus)
japonicus (Platyliodes)
japonicus (Platyliodes)
japonicus (Sabacarus)
japonicus (Scutovertex)
japonicus (Sellnickochthonius)
japonicus (Trhypochthonius)
japonicus (Trhypochthonius)
japonicus (Trhypochthonius)
javana (Lohmannia)
javana (Lohmannia)
javana (Lohmannia)
javanus (Indoribates)
javanus (Trhypochthonius)
javanus (Trhypochthonius)
javensis (Acutozetes)
javensis (Aribates)
javensis (Chamobates)
javensis (Haplacarus)
javensis (Haplacarus)
javensis (Idiozetes)
javensis (Indotritia)
javensis (Indotritia)
javensis (Indotritia)
javensis (Indotritia)
javensis (Indotritia)
javensis (Magyaria)
javensis (Orbiculobates)
javensis [H. (Phyllhermannia)]
javensis (Podoribates)
javensis (Pseudoamerioppia)
javensis (Pseudoamerioppia)
javensis (Schelorbates) fimbriatus
javensis (Schelorbates) fimbriatus
javensis (Spinotocepheus)
javensis [T. (Tyrphonostrus)] glaber
janneli (Ceratozetella) (=maxima)
jelevae (Acutoppia)
jesti (Hermannia)
jethurmerae (Crotonia)
jeweli (Ceratozetes) (=virginicus)

- jimenezi* (Arcereremaeus)
jindianensis (Scutovertex)
jindingensis (Cepheus)
jinggangshanensis [P. (Vepracarus)]
jinyunia (Acrotitia) (=sinensis)
jocelynae (Javacarus)
joffrevillei (Rugoceheus)
johanni (Adrodamaeus)
johnsi (Scapheremaeus)
johnstoni (Collohmanna)
johnstoni [D. (Epidamaeus)]
jonasi (Proteremaeus)
jongkyui (Pergalumna)
joonsooi [M. (Trimalaconothrus)]
jordanai (Liacarus)
jordani (Dendrozetes)
jornoti (Lohmannia)
josefstaryi [O. (Zygoribatula)]
josephineae (Oripoda)
jowettae [M. (Trimalaconothrus)]
jucunda [O. (Monoribatella)]
jucundior (Scheloribates)
juditae (Baloghia)
jueradae (Melanozetes) *sp. inq.*
jugata (Cerachipteria) *digita*
jugatus (Brachychthonius) *sp. inq.*
juglans (Benobates)
jugorum [O. (Zygoribatula)] (=exilis)
juliae (Lohmannia)
jumbongiensi [P. (Metaphthiracarus)]
juncta (Cultroribula)
juncta (Cultroribula)
junichiaokii (Dolicheremaeus)
junichiaokii (Dolicheremaeus)
junichiaokii (Galumnella)
juniperi (Rostrozetes)
junonis (Ramusella)
junonis (Ramusella)
jurobales [R. (Tectorhynchoribates)]
juvenalis (Phthiracarus) (=ferrugineus)
juvenalis [C. (Nanochthonius)]
vyotikanae (Graptoppia)
vyotsnai (Eremulus)
kadazan [O. (Acrotocepheus)]
kaindicola (Arcoppia)
kaisilai (Autogneta)
kalalao [L. (Bicristoppia)]
kalboprodorsalis (Peloribates)
kalimantanensis (Arcoppia) (=aequivoca)
kaliurangensis [S. (Flagrosuctobelba)]
kaluzi (Rhacaplacarus)
kamenskii (Palaeacarus)
kamaensis [D. (Spatiodamaeus)]
kamchatkicus (Fuscozetes)
kamerunensis (Granuloppia)
kamerunensis (Granuloppia)
kamillae [P. (Metaphthiracarus)]
kanaka (Tyrphonostrus)
kananaskis (Ceratozetes)
kananaskis (Eremaeus)
kananaskis (Veloppia)
kanangra (Pedrocortesella)
kanbulaensis [D. (Epidamaeus)]
kanekoi [L. (Dorycranosus)]
kanekoi (Gibbicepheus)
kanekoi (Gibbicepheus)
kanoi [H. (Phyllhermannia)]
kanoi [H. (Phyllhermannia)]
kantoensis [S. (Flagrosuctobelba)]
kapiti (Apoplophora)
kapiti (Apoplophora)
karajica (Galumna)
karamani (Steganacarus) (=magnus)
kardiae (Congocepheus)
karelicus [D. (Epidamaeus)]
kargi (Cosmogneta)
kargilensis (Protoribates) *sp. inq.*
karinae (Setoppia)
karioi [P. (Neophthiracarus)]
karpellesi (Euphthiracarus) *sp. inq.*
karppineni (Membranoppia) (=krivoluzkyi)
karppineni (Passalozetes)
karubei (Gibbicepheus)
kashmiriensis (Oribatella)
kaszabi (Achipterina)
kaszabi (Bipassalozetes) (=striatus)
kaszabi (Kaszabobates)
kaszabi (Peloribates)
kaszabi (Phthiracarus) (=boresetosus)
kaszabi (Rhacaplacarus)
kaszabi (Triteremella)
kawanoi (Hoplophthiracarus)
kayoveae (Congocepheus)
kazakhstani (Galumna)
kazakhstanicus (Gymnodamaeus)
kazakovi (Berniniella)
kebangica (Galumna)
keewatin (Megeremaeus)
keilbachi (Moritzoppia)
keilbachi (Moritzoppia)
keilbachi (Moritzoppia)
kelbadjarica [O. (Zygoribatula)] (=glabra)
kellvi (Novazelandiella)
keningau [O. (Acrotocepheus)]
keniaensis (Alismobates)
kenyaensis (Uroppia)
kenyaensis (Zetomotrichus)
keralensis (Cryptacarus)
keralensis (Dolicheremaeus)
keralensis (Haplacarus)
keralensis (Unguizetes)
keralensis [O. (Zygoribatula)]
kerangas [H. (Interoppia)]
keretinus [L. (Dorycranosus)]
keriensis [T. (Cristonothrus)]
keriensis [T. (Cristonothrus)]
keriensis [S. (Perscheloribates)]
kethleyi (Novonothrus)
kethleyi (Psammochthonius)
kethleyi (Psammochthonius)
kethleyi (Psammochthonius)
kethleyi (Tegeocranellus)
kevani (Eremaeus)
khaolak [S. (Lalmoppia)]
khaustovi (Microtegeus)
khencensis (Camisia)
khencensis (Liochthonius)
khentiicus (Ghilarovus)
khöii (Galumna)
khosrovica [O. (Dzarogneta)]
khugniensis (Liebstadia) (=saifulmalukensis)
khustaiensis [D. (Epidamaeus)]
kieviensis [C. (Xiphobates)] (=interpositus)
kiensis [T. (Cristonothrus)]

- kikonaiensis [H. (Capillonothrus)] capillatus
kilchini (Liacarus)
kimberleyensis (Pilogalumna)
kimberlevi (Tyrphonothrus)
kinabalu (Austrothrus)
kinabalu (Dampfiella)
kinabaluensis (Austrotritia)
kingi (Berlesezetes)
kingi (Damaeus) (=angustipes)
kintrishiana (Carabodes)
kirai (Pasocephus)
kirgisica (Ceratozetella)
kirghisicus (Liochthonius)
kirghizica (Maerlotritia) (=krivolutskyi)
kirikiri [P. (Neophthiracarus)]
kirishimaensis [F. (Cosmogalumna)]
kishidai (Epilohmannoides)
kishidai (Maerlotritia)
kishidai (Maerlotritia)
kittenbergeri (Pseudotectoribates) (=subsimitis)
kivuensis (Eupelops) sp. inq.
kiyosumiensis (Suctobelbila)
klabati (Euphthiracarus)
klabati (Euphthiracarus)
kluttzi [A. (Uluguroides)]
knighti [O. (Zygoribatula)]
knoepffleri (Phauloppia)
knowltoni (Gymmodamaeus) sp. inq.
knuellei (Lanceoppia)
knuellei (Tectocephus)
knuellei [M. (Trimalaconothrus)]
knysnaensis [N. (Steganacarellus)]
knysnaensis (Tegeocranellus)
kobauensis (Scapuleremaeus)
kochi (Camisia) (=biurus)
kochi (Eupelops) (=acromios)
kochi [P. (Neophthiracarus)]
kodiakensis [D. (Epidamaeus)]
kodiakensis [D. (Epidamaeus)]
koeszegiensis (Liacarus)
koghisensis (Retrozetes)
kokae [P. (Archiphthiracarus)]
koki (Brachioppia)
koki (Drepanoppia)
koki (Lamellarea)
koki [O. (Zygoribatula)] (=baloghi)
komareki (Nanhermannia)
komodensis (Rostrozetes)
komodensis (Rostrozetes)
konglinensis [P. (Vepacarus)]
kotschani [S. (Flagrosuctobelba)]
kotschani [N. (Pseudoneoribates)]
konwerskii [N. (Protophthiracarus)]
kootenai (Megeremaeus)
korannabergensis [N. (Steganacarellus)]
koreanus [P. (Vepacarus)]
koreense (Oribotritia) (=asiatica)
koreensis (Acrotritia)
koreensis (Fissicephus) coronarius
kornhuberi (Neoliodes)
korupensis (Hoplophorella)
kosarovi (Corynoppia)
kosarovi (Corynoppia)
kosarovi (Metabelbella)
koshiensis [N. (Parakalumma)]
kotozenus [T. (Cristonothrus)]
kotschyi (Pergalumna)
koumantanosi (Phthiracarus)
kovacsi (Lanceoppia)
koyukon [D. (Epidamaeus)]
krachan (Annectacarus)
kraepelini (Schelorbates)
krakatauensis (Indotritia)
krakatauensis (Indotritia)
krakatauensis (Indotritia)
krakatauensis (Indotritia)
krakatauensis (Indotritia)
krantzi (Dendroeremaeus)
krantzi (Dolicheremaeus)
kremenitsai (Atropacarus)
krisperi (Pergalumna)
kristinae (Magyaria)
krivolutskyi (Africogalumna)
krivolutskyi (Birsteinus)
krivolutskyi (Caucaseremaeus)
krivolutskyi (Ghilarovus)
krivolutskyi [A. (Gordeeviella)]
krivolutskyi (Hypocephus)
krivolutskyi [R. (Insculptoppia)]
krivolutskyi [S. (Lalmoppia)]
krivolutskyi (Maerlotritia)
krivolutskyi (Membranoppia)
krivolutskyi (Metrioppia)
krivolutskyi (Neoribates)
krivolutskyi (Oribatella)
krivolutskyi (Oribotritia)
krivolutskyi [H. (Platynothrus)]
krygeri (Oppiella) (=nova)
kuankuoshuiensis [P. (Tectodamaeus)]
kuehnelti (Eueremaeus) (=intermedius)
kuehnelti (Javacarus)
kuehnelti (Javacarus)
kuehnelti (Javacarus)
kuehnelti (Lasiobelba)
kuehnelti (Lasiobelba)
kuehnelti (Lasiobelba)
kuehnelti (Lasiobelba)
kuehnelti (Provertex)
kugohi (Hoplophthiracarus)
kugohi (Hoplophthiracarus)
kugohi (Hoplophthiracarus)
kugohi (Hoplophthiracarus)
kugohi (Hoplophthiracarus)
kujuensisi (Separatoribates)
kulaginae (Epilohmannia)
kulczynskii (Damaeus) (=flagellifer)
kulczynskii (Hoplophorella)
kumadai (Ocesobates)
kumaensis (Eupelops)
kumaensis (Ramusella)
kumasoi (Humerobates)
kumayaensis (Eupelops)
kumayaensis (Mabulatrachus)
kumayaensis (Oribatula)
kumayaensis (Protoribates)
kumayaensis (Tectocephus)
kumboensis (Rhacaplacarus)
kummeri (Dolicheremaeus)
kunsti (Operculoppia)
kunsti (Oribatella)
kunsti (Pergalumna)
kunsti [E. (Pocsia)]
kurchevae [O. (Multoribatella)]
kurikii (Tyrphonothrus) (=angulatus)

- kurilica [N. (Suctobelboidea)]
 kurosawai (Cepheus)
kurozumii (Eramaeozetes)
kurti (Tenuiala)
 kushiroensis [S. (Dyobelba)]
 kushiroensis [P. (Oribellopsis)]
kusseri [C. (Klapperiches)]
kusseri [C. (Klapperiches)]
kutchin (Ceratozetes)
 kvavadzei (Ghilarovus)
 kymatismosi [T. (Mangabebodes)]
kyphos (Hoplophorella)
kyushuensis (Phthiracarus) (=clemens)
labradorica [C. (Ensicamisia)] (=lapponica)
 labyrinthicus (Carabodes)
labyrinthicus (Carabodes)
labyrinthicus (Carabodes)
labyrinthicus (Euphthiracarus)
labyrinthicus (Microtegeus)
 labyrinthicus (Scheloribates)
lacandonicus (Allozetes)
laccosis (Hydrozetes)
 laciniatus (Fosseremus)
laciniatus (Fosseremus)
laciniatus (Fosseremus)
laciniatus (Fosseremus)
laciniatus (Fosseremus)
laciniatus (Fosseremus)
 lacouturieri (Rogerzetes)
 lacrimans (Zetomotrichus)
lacrimans (Zetomotrichus)
lacrimans (Zetomotrichus)
lacrimans (Zetomotrichus)
 lacunosa (Hoplophorella)
lacunosus (Liochthonius)
 lacustris (Hydrozetes)
lacustris (Hydrozetes)
laensis [T. (Cristonothrus)]
laensis (Nesopelops)
 laetabilis (**Rhacaplacarus**)
laetepictus (Eobrachyichthonius) (?=oudemansi)
 laetus (Malaconothrus)
laevigatus (Eupelops) (=plicatus)
 laevigatus (Phthiracarus)
laevigatus (Phthiracarus)
laevigatus (Phthiracarus)
 laevigatus (Scheloribates)
laevigatus (Scheloribates)
laevigatus (Scheloribates)
laevigatus (Scheloribates)
laevigatus (Scheloribates)
laevis (Archoplophora) (=rostralis)
laevis (Brachychthonius) sp. inq.
 laevis (Nanhermannia)
laevis (Paulianacarus)
laevis (Pergalumna) emarginata ssp. inq.
 laevis (Suctobelbella)
laevis (Suctobelbella)
 laevis (Tegeocranellus)
laevis (Tegeocranellus)
laevis (Tegeocranellus)
laeviusculus (Trichoribates) sp. inq.
 lagenula [L. (Lagenobates)]
¿lagenula [L. (Lagenobates)]?
 lagrecai (Ceratozetes)
lagrecai (Eutegaus)
lagunaensis (Notogalumna)
- lagunensis (Hemileius)
 laiae [S. (Porokalumma)]
 laiae (Suctobelbella)
 lakshadweepensis (Indotritia) *sp. inq.*
lambieae (Scapheremaes)
lamellata (Austrachipteria)
lamellata (Beckiella)
lamellata (Brassoppia)
lamellata [R. (Insculptoppia)] (=elliptica)
lamellata [T. (Latilamellobates)] (=obesus)
 lamellata (Limnozotella)
lamellata (Moritzoppia) (=unicarinata)
lamellata (Multioppia) (?=laniseta)
lamellata (Paraphauloppia)
lamellata (Parapyroppia) (=transitoria)
lamellata (Pseudoamerioppia)
 lamellata (Rhinooppia)
 lamellatus (Caucasiozetes)
 lamellatus [A. (Coropoculia)]
lamellatus (Geminozetes)
lamellatus (Neoliodes)
lamellatus (Oribatodes) (=mirabilis)
lamellatus (Scheloribatoides)
lamellatus (Trichocephus)
 lamellatus (Xenillus)
lamellicornis (Rugoppia)
laminatus (Scheloribates)
lamingtoni (Hoplophthiracarus)
lamingtoni [P. (Neophthiracarus)]
 laminipes (Ethiovertex)
laminipes (Ethiovertex)
 laminipes (Lopheremaeus)
lamottei (Ramogneta)
lanatus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
 lanatus (Cosmochthonius)
lanatus (Cosmochthonius)
lanatus (Cosmochthonius)
 lanatus (Cosmochthonius)
lanatus (Cosmochthonius)
lanatus (Cosmochthonius)
lancearia (Lanceoppia)
 lanceata (Galumna)
lanceata (Galumna)
lanceocrinus (Eremulus) sp. inq.
 lanceolata (Acrogalumna)
 lanceolata (Banksinoma)
lanceolata (Banksinoma)
lanceolata (Banksinoma)
lanceolata (Crotonia)
 lanceolata (Indotritia)
 lanceolata (Lohmannia)
lanceolata (Lohmannia)
lanceolata (Neoamerioppia)
lanceolata [M. (Neobelba)] (=sphagni)
 lanceolata (Pyroppia)
lanceolata (Pyroppia)
 lanceolata (Striatoppia)
lanceolata (Striatoppia)
lanceolata (Striatoppia)
lanceolata (Suctobelbata) spicata ssp. inq.
lanceolata (Suctobelbata) longicuspis
lanceolata [O. (Zygoribatula)] (=longisensilla)
 lanceolatus (Arotrobates)
 lanceolatus (Borneozetes)
lanceolatus (Euphthiracarus)
lanceolatus (Hoplophthiracarus)
 lanceolatus [S. (Perschelorbates)]
 lanceolatus [S. (Perschelorbates)]

- lanceolatus (Pseudotocephus)**
 lanceolatus (Scutozetes)
lanceolatus (Scutozetes)
lanceolatus (Scutozetes)
lanceolatus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
lanceolatus (Topobates)
lanceoliger (Scheloribates) sp. inq.
lanceosensilla (Galumna)
lanceosensilla (Galumnopsis)
lanceoseta (Hoplophorella)
lanceoseta (Karenella)
lanceosetoides (Hoplophorella)
lanceosetoides (Karenella)
lanceosetoides (Karenella)
lanceosetosus (Neoliodes)
laneus (Podoribates)
languida (Achipteria) sp. inq.
laniseta [M. (Hammeroppia)] wilsoni
laniseta [M. (Hammeroppia)] wilsoni
laniseta [M. (Hammeroppia)] wilsoni
lapelerii (Elaphoppia)
lapidaria (Suctobelba)
lapidarius (Chamobates) sp. inq.
lapponica [C. (Ensicamisia)]
lapponica [C. (Ensicamisia)]
lapponicus (Ameronothrus)
lapponicus (Edwardzetes) (=edwardsi)
lapponicus (Liochthonius)
lapponicus (Liochthonius)
lapshovi (Palaecarus)
largus [P. (Archiphthiracarus)]
largus [P. (Neophthiracarus)] (=repetitus)
larreae (Jornadia)
lasebikani (Nothrus)
laselvae (Galumna)
laselve (Oribotritia)
lasithiensis [S. (Tropacarus)]
lata (Cultroribula)
lata (Cultroribula)
lata (Cultroribula)
lata (Dometorina)
lata [S. (Flagrosuctobelba)]
lata (Galumna) (=tarsipennata)
lata (Hafenferrefia)
lata [R. (Insculptoppia)]
lata [O. (Zygoribatula)]
lata [O. (Zygoribatula)]
latebrosus (Notophthiracarus)
latens (Microzetes) (=septentrionalis)
latealveolatus (Austrocarabodes)
laterodentatus (Nodocephus)
laterospinosus (Rhacaplacarus)
laterostris [R. (Insculptoppia)] (=insculpta)
laterostris (Liacarus) (=longilamellatus)
laticephalus (Neamerus) (?=lundbladi)
laticeps (Cuneoppia)
laticeps (Epiereumus)
laticeps (Verachthonius)
laticlava [S. (Grandjeanobates)]
laticlava [S. (Grandjeanobates)]
laticlava (Hemileius) (=suramericanus)
laticostulatus (Eueremaus)
laticuspidata (Sulcoribula)
laticuspidatus (Ceratozetes)
laticuspidatus (Ceratozetes)
laticuspidatus (Peloptulus)
laticuspis (Cultroribula)
- laticuspis (Exochocephus)*
latidens (Berniniella)
latifasciata (Globoppia)
latiflabellata (Licnobelba)
latifolius (Phyllozetes)
latifolius (Phyllozetes)
latifolius (Phyllozetes)
latifolius (Phyllozetes)
latilamellaris (Tectocephus) (=sarekensis)
latilamellata (Palmitalia)
latilamellata (Schalleria)
latilamellata (Szentivanyella)
latilamellatus [C. (Fernandezbodes)]
latilamellatus [T. (Latilamellobates)]
latilamellatus (Liacarus)
latilamellatus (Limnozetes)
latilamellatus (Peloptulus)
latilamellatus (Xenillus)
latilamellatus (Zachvatkinibates)
latilobatus (Punctoribates) (=punctum)
latincisus (Trichoribates)
latiohumeralis (Reductobates)
latior (Carabocephus)
latior (Eobrachychthonius)
latior (Eobrachychthonius)
latior (Eobrachychthonius)
latior (Notophthiracarus)
latior (Notophthiracarus)
latior (Notophthiracarus)
latior (Notophthiracarus)
latior (Zetorchella)
latipectoralis (Suctobelbella)
latipes (Scheloribates) pallidulus
latipes (Scheloribates) pallidulus
latipes (Scheloribates) pallidulus
latipes (Scheloribates) pallidulus
latipilosa (Fenichelia)
latipilosus (Eupelops)
latipilosus (Eupelops)
latipilosus (Lepidozetes)
latipilosus (Lepidozetes)
latipluma (Acrogalumna) (=longipluma)
latirostrata (Coartobelba)
latirostratus (Trichoribates)
latirostris (Beckiella)
latirostris (Oribatula) sp. inq.
latirostris (Paraphauloppia)
latirostris (Oxamerus)
latirostris (Peloptulus)
latirostris (Scapheremaus)
latirostris (Suctobelbella)
latirostris (Suctobelbella)
latirostris (Tegoribates)
latiseta (Aokiella)
latisetosus (Neovochthonius)
latissimus (Annobonzetes)
latissimus (Austrocarabodes)
latissimus (Dinozetes)
latissimus [C. (Xiphobates)]
latisternalis [O. (Dzarogneta)]
latisternum (Cycloppia)
latitecta (Anachipteria) (=howardi)
latiusculus [L. (Dorycranosus)]
lativentris (Liacarus) (=subterraneus)
latoclava (Lyrifissiella)
latodentata [S. (Ussuribata)]
latohumeralis (Austrocarabodes)

latohumeralis (Campbellobates)latoincisus (Scheloribates)**latoincisus (Scheloribates)***latoincisus (Scheloribates)*

latolamellata (Gustavia)

latus (Allozetes)

latus (Annobonzetes)

latus [M. (Archegotocephus)]

latus (Cavernozetes)

latus (Cepheus)

latus (Cepheus)

latus (Cepheus)

latus (Feiderzetes)

latus (Liacarus) Ewing, 09**latus (Liacarus)** Schweiz., 56 (=major)

latus (Liochthonius) Mah., 82

latus (Liochthonius) Jac., 36 (=brevis)**latus (Neseutegaes)**

latus (Nippobodes)

latus (Peloribates)

latus [S. (Perscheloribates)]

latus (Plateremaeus)

latus (Scapheremaeus)**latus (Totobates)**

latus (Transoribates)

latus [E. (Trischeloribates)]**latus (Tyrphonothrus)**

latus (Unguizetes)

latus (Xenillus) (=clypeator)**laubieri [O. (Zygoribatula)] (=propinqua)**

laurisilvae (Hermanniella)

lauta [N. (Leptosuctobelba)]

lautus (Phthiracarus)

lavoipierrei (Paralycus)

*lavoipierrei (Paralycus)***lavoipierrei (Paralycus)**

lawariensis (Mixacarus)

lawariensis (Proteremaeus)

lawrencei (Galumna) inquirenda *ssp. inq.***lawrencei (Neoliodes)****lawrencei (Xenillus)****laxtoni (Suctobelbella) (?=subcornigera)**

laysanensis (Hypozetes)

laysanensis (Hypozetes)**lazitanicus [S. (Tropacarus)] (=patruelis)****leahae [S. (Paraleius)]**

lebanonensis (Xenillus)

lebedevi (Lauropia)

lebronnci (Austrotritia)**lebronnci (Austrotritia)**

lebruni (Paroppia)

lebruni (Paroppia)*lectronus (Liacarus)**ledensis (Dentizetes)*

leei [C. (Aokibelba)]

leei (Notophthiracarus)**leei (Pedrocortesella)****leei (Phylleremus)****leei [H. (Phyllhermannia)]***leei (Stomacarus)***leei (Stomacarus)****legendrei (Paralopheremaeus)***legendrei (Paralopheremaeus)***lejeunei (Galumna)****leleupi (Allogalumna)****leleupi (Heminothrus)** *sp. inq.***leleupi (Liacarus)** *sp. inq.***leleupi (Nothrus)** *sp. inq.***leleupi (Oppia)** *sp. inq.***leleupi (Scheloribates)****leliehoekensis (Phthiracarus)****lemannae [H. (Phyllhermannia)]****lemensis [P. (Triaunguis)]**

lemnae (Hydrozetes)

*lemnae (Hydrozetes)***lemnae (Hydrozetes)***lemnae (Hydrozetes)***lemnae (Hydrozetes)***lemnae (Hydrozetes)***lemuria [H. (Kakophthiracarus)]****lemuria (Lasiobelba)****lencoranicus (Liacarus) (=coracinus)****lencoranicus (Scheloribates) (=longus)**

lengersdorfi [D. (Kunstidamaeus)]

lenicomus (Mycobates) (=parmeliae)

lenis [M. (Multilanceoppia)] brevipectinata

lenkoi [E. (Neoepilohmannia)]**lenkoi (Oripoda)****lenticulata (Pergalumna)**

lenticulata [O. (Zygoribatula)]

lenticulata [O. (Zygoribatula)]

lenticulatus (Hypovertex)

lentulus (Phthiracarus)

*lentulus (Phthiracarus)***lentulus (Phthiracarus)**

lentus (Synchthonius)

leoi [K. (Rimandocephus)]

leoneae (Machadocephus)**leonilae (Hoplophthiracarus)****leonilae [H. (Phyllhermannia)]**

leontonycha [S. (Paraleius)]

*leontonycha [S. (Paraleius)]***leontonycha [S. (Paraleius)]**

leowae (Archeremella)

lepidus (Austrocarabodes)

lepidus (Austrocarabodes)*leporoides (Eremobelba)* *sp. inq.***leporosa (Eremobelba)** *sp. inq.*

leptaleus (Liochthonius)

lepteces (Oribotritia)

lepteces (Oribotritia)**lerellana (Lohmannia)****leslyae [O. (Coronoquadroppia)] (=monstruosa)**

leucaena (Arthrovertex)

leurolomasus (Gymnodamaeus)

leurolomasus (Gymnodamaeus)

levigata [O. (Zygoribatula)]

levipunctatus (Peloribates)

levis (Allozetes)

levis (Liochthonius) (=evansi)

levisensilla (Galumna)

leviseta [M. (Parplophora)]*leviseta [M. (Parplophora)]***leviseta [M. (Parplophora)]****levyi (Bovicarabodes)****lewissensis [N. (Steganacarellus)]****lewissmithi (Furcobates)**

leytensis (Dolicheremaeus)

leytensis [H. (Phyllhermannia)]

leytensis (Orthogalumna)

liacariformis (Suctobelbella)

liber (Punctoribates)

licnophora (Hoplophorella) (=cucullata)

licnophorus (Licneremaeus)

- licnophorus (Licneremaeus)
 licnophorus (Licneremaeus)
licnophorus (Licneremaeus)
 lichenis (Allomycobates)
lienhardi [O. (Acrotocepheus)]
lienhardi [N. (Besuchetacarus)]
lienhardi (Coronibatula)
lienhardi (Hoplophorella) (=vitrina)
lienhardi (Nasozetes)
lienhardi (Papillacarus)
lienhardi (Passalozetes)
lienhardi (Pseudotocepheus)
lienhardi (Ptiloppia)
lienhardi (Sabahtritia)
lienhardi (Suctobelbella)
lienhardi (Zetomotrichus)
lienhardorum [O. (Acrotocepheus)]
ligamentifer (Stomacaus)
 ligneus [P. (Archiphthiracarus)]
 "ligneus [P. (Archiphthiracarus)]"
lignivora [O. (Moritzoppiella)] (=splendens)
 ligulata (Cultroribula)
ligulifera (Hoplophorella) (=hamata)
 lijiangensis (Leobodes)
liklik (Malaconothrus)
 limae (Discoppia)
 limasetosa (Metabelba)
limbata (Acrotritia) (=duplicata)
 limbulatus (Eupelops) *sp. inq.*
limburgiensis (Oribella) (=pectinata)
 limpida (Dometorina)
linata (Pergalumna) (=myrmophila)
 linoae [C. (Cyrtozetes)]
 lindquisti (Eueremaeus)
 lindquisti (Gymnodampia)
lindsavae (Pheroliodes)
lineaporosa [O. (Zygoribatula)]
 linearis [B. (Passalobates)]
 linearis [B. (Passalobates)]
 linearis (Zetomotrichus)
lineasetosa (Austrocarabodes)
lineata (Apoplophora) (=pantotrema)
lineata (Cultroribella)
lineata [S. (Flagrosuctobelba)]
lineata [S. (Flagrosuctobelba)]
 lineata (Machuella)
lineata (Machuella)
lineata (Oribatula) (=repetita)
lineata (Protoripoda)
 lineata (Trichogalumna)
 lineata [O. (Zygoribatula)]
 lineatus (Ameronothrus)
 lineatus (Ameronothrus)
 ?lineatus (Ameronothrus)?
 lineatus (Brachychthonius)
lineatus (Dolicheremaeus)
lineatus (Eremaeozetes)
lineatus (Eremaeozetes)
lineatus (Geminozetes)
lineatus [M. (Megazetes)]
lineatus (Notophthiracarus)
 lineatus (Peloribates)
 lineatus [H. (Tuberemaeus)]
lineatus [H. (Tuberemaeus)]
lineola [O. (Zygoribatula)] (=exilis)
 lineolata (Heterogalumna)
 lineolatus (Bipassalozetes)
- lineolatus (Constrictobates)
 lineolatus (Dolicheremaeus) Bal. y Mah., 67
lineolatus (Dolicheremaeus) Ham., 81 (=hammerae)
lineolatus (Notophthiracarus)
lineolatus (Tyrphonostrus)
 lingulatus [L. (Dorycranosus)]
 linieatus (Licneremaeus)
 linjiangensis (Oribatella)
lionsi [L. (Hamoppia)]
lionsi (Notophthiracarus)
 liparus [P. (Archiphthiracarus)]
 lipataensis (Sphaerochthonius)
liratus (Notophthiracarus)
 lischanni (Melanozetes) *sp. inq.*
lisosetosus (Tyrphonostrus)
 liti (Dolicheremaeus)
 litoralis (Mabulatrichus)
 litoralis (Oribatella) arctica
 litoralis (Scheloribates)
litoralis (Sphaerochthonius)
 litosus (Caenosamerus)
 littlewoodae (Pulchroppiella)
littoralis (Halozetes)
littorea (Schusteria)
littoristicus [C. (Klapperiches)]
lividus [P. (Archiphthiracarus)]
lizelhugae [S. (Bischeloribates)]
lobata (Austrachipteria) Ham., 67
lobata (Austrachipteria) J. y P. B., 83 (=hammerae)
lobata (Karenella)
lobata (Oripoda)
 lobata (Suctobelbella) acutidens
 lobatus (Cepheus) *sp. inq.*
lobatus (Reticulocepheus) (=decou)
lobatus (Torpacarus)
 lobatus (Zachvatkinibates)
 lobodontata (Suctobelbella) *sp. inq.*
 loebli [O. (Acrotocepheus)]
 loebli (Hoplophthiracarus)
loebli (Hoplophthiracarus)
loebli (Lohmannia) (=paradoxa)
 lokobensis (Rhopalozetes)
 loksai (Coartobelba)
 loksai (Megalotocepheus)
 loksai (Rhinoppia)
loksai [P. (Tentaculozetes)]
longa [O. (Zygoribatula)] (=longisensilla)
 longelamellata (Oribatula)
 longesensillus (Achipteria) *sp. inq.*
longesensillus (Melanozetes) (=interruptus)
 longiareata (Pilogalumna) crassiclava
longibulbula (Crotonia)
longicarinatus (Epiemulus)
 longicarinatus (Hoplophthiracarus)
longicaudatus (Loftacarus)
longicaulis (Anellozetes)
longiceps (Pheroliodes)
 longiceps (Pheroliodes)
 longiciliata (Machadobelba)
 longiciliata [N. (Paractenogalumna)]
 longiclava (Coartobelba)
 longiclava (Galumna)
longiclava (Neoamerioppia)
 longiclava (Neoamerioppia)
 longicoma (Leoppia)
 longicoma (Neoamerioppia)
 longicoma (Peloribates)

- longicornis (Gustavia)
 longicornis (Gustavia)
longicornis (Protozetes)
longicornutus (Furcobates) (=hastatus)
longicurva (Suctobelbella)
 longicuspis (Ceratoppia)
longicuspis (Mahunkazetes)
 longicuspis (Scapheremaeus)
 longicuspis (Suctobelbella)
 longicuspis (Suctobelbella)
 longicuspis (Suctobelbella)
longicuspis (Suctobelbella)
 longicuspis (Suctobelbella)
longicuspis [O. (Zygoribatula)]
 longidentata (Suctobelbella)
longidorsus [T. (Cristonothrus)]
longifilis (Ceratoppia) sp. inq.
longifissus (Eupelops) (=subuliger)
 longifolius (Phyllozetes)
 longilamellata (Autogneta)
 longilamellata (Autogneta)
 longilamellata (Moritzoppia)
longilamellata (Oribatula) (=macrostega)
 longilamellatus (Liacarus)
 longilamellatus (Scapheremaeus)
 longilamellatus [P. (Triaunguis)]
 longilamellatus [P. (Triaunguis)]
longilinea [O. (Zygoribatula)]
longilineata (Neogalumna)
 longinoi (Allonothrus)
 longinqua (Nannerlia)
longior (Pergalumna) (=myrmophila)
 longior (Liebstadia)
 longior (Liebstadia)
 longior (Otocephus)
longior (Otocephus)
 longior (Paralycus)
longior (Pilobates) (?=carpetanus)
longior (Scheloribates)
 longior (Scheloribates)
 longipectinata (Trapezoppia)
 longipediseta [H. (Phyllhermannia)]
 longipes (Damaeus) Will., 41
longipes (Damaeus) Mih., 57 (=flagellifer)
 longipes (Neoliodes) sp. inq.
 longipes (Podoribates)
 longipes (Podoribates)
longipes (Trhypochthonius) sp. inq.
 longipes (Xenillus)
 longipila (Synichotritia)
 longipilis (Jornadia)
 longipilis [T. (Latilamellobates)]
 longipilis (Liacarus)
longipilis (Pseudoceratoppia)
longipilis (Trichoribates) (=brevicuspis)
longipilis [C. (Xiphobates)] (=interpositus)
 longipilosa (Dissorhina)
longipilosa [M. (Pravoppia)] (=loxolineata)
 longipilosa [T. (Sarawakiella)]
 longipilosa (Zetorchella)
longipilosus (Maculobates)
 longipilosus (Peloribates)
 longipilosus (Rhaplacarus)
 longipilus (Asperemaeus)
longipilus (Cryptacarus)
 longipilus (Dolicheremaeus)
 longipilus (Globozetes)
- longipilus (Liochthonius)**
 longipilus (Liochthonius)
 longipilus [P. (Neotocephus)]
 longipilus (Nothrus) Berl., 10
longipilus (Nothrus) Mi., 59 (=neonominatus)
longipilus (Oribatula) (=pannonica)
 longipilus (Xenillus)
 longipilus (Zachvatkinella) sp. inq.
 longipluma (Acrogalumna)
 longipluma (Acrogalumna)
longipluma (Acrogalumna)
 longipluma (Acrogalumna)
longipluma (Acrogalumna)
 longipluma (Lauritzenia)
 longipluma (Lauritzenia)
 longiporosa (Galumna) Fuji., 72
longiporosa (Galumna) Choi, 86 (=coreana)
 longiporosa (Neogalumna)
 longiporosa (Pergalumna)
longiporosa (Pergalumna)
longiporosa (Phauloppia) Kuli., 68 (=lucorum)
longiporosa (Phauloppia) P.-I., 76 (=lucorum)
longiporosa (Phauloppia) Mah., 82 (=lucorum)
longiporosa (Phauloppia) Djap., 85 (=lucorum)
longiporosa [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
 longiporosus (Ghilarovizetes)
longiporosus [L. (Haplozetes)] (=vindobonensis)
 longiporosus (Maculobates)
 longiporosus [P. (Minguezetes)]
longiporosus [P. (Minguezetes)]
 longiporosus [P. (Minguezetes)]
 longiporosus (Unguizetes)
longiporus (Acrogalumna) (=longipluma)
longiramosa (Wallworkoppia) (=cervifer)
 longirostralis (Euphthiracarus)
 longirostralis (Macrogena)
longirostris (Gustavia) (=maior)
 longirostris (Suctobelbella)
 longirostris (Suctobelbella)
 longirostris [M. (Trimalaconothrus)] Willm., 29
longirostris [M. (Trimalaconothrus)] H., 66 (=iteratus)
 longisacculus [I. (Haplozetes)]
longisacculus (Muliercula)
 longisensilla (Aeroppia)
longisensilla (Lasiobelba)
 longisensilla [O. (Zygoribatula)]
 longisensillata (Elaphoppia)
 longisensillata (Suctobelbella)
longisensillus (Atropacarus)
 longisensillus (Scarabacarus)
 longisensilus (Scheloribates)
longiseta (Condyloppia) pilosella
 longiseta (Damaeus)
longiseta (Dolicheremaeus) magnus
 longiseta (Epiemulus)
 longiseta (Eremaeus)
longiseta (Fortuynia)
longiseta (Furcoppia)
 longiseta (Genavensia)
longiseta (Globoppia) intermedia
longiseta (Globoppia) intermedia
 longiseta (Gustavia)
longiseta (Mesoplophora) (=cubana)
 longiseta (Oripoda)
 longiseta (Parabelbella)
 longiseta (Sadocephus)
 longiseta (Trichoppia)

- longiseta [O. (Zygoribatula)]
longisetae (Halozetes) belgicae
longisetae (Protoribates) (=oblongus)
 longiseta (Achipteria)
 longiseta [C. (Aokibelba)]
 longiseta (Arcoppia)
longiseta (Arcoppia)
 longiseta (Banksinoma)
 longiseta [O. (Bioribatella)] superbula
longiseta (Crotonia)
 longiseta (Epimerella) smirnovi
 longiseta (Eremobelba)
longiseta [M. (Hammeroppia)]
longiseta (Hermanniella)
longiseta (Kokoppia)
 longiseta (*Mesoplophora*)
 longiseta (Micropopia) minus
 longiseta (*Micropopia*) minus
longiseta (Oribatella) (=neominata)
 longiseta (Pergalumna)
longiseta (Pergalumna)
 longiseta (*Pergalumna*)
 longiseta [H. (Phyllhermannia)]
 longiseta (Quadroppia)
longiseta (Setoppia)
 longiseta (*Suctobelbella*)
longiseta (Tectoppia)
longiseta (Zetorchella)
 longisetosus (Annectacarus)
 longisetosus (Archegozetes)
longisetosus (Archegozetes)
 longisetosus (*Archegozetes*)
longisetosus (Austrocarabodes)
 longisetosus [N. (Calyptophthiracarus)]
 longisetosus (Eobrachychthonius)
 longisetosus (Eupelops)
longisetosus [C. (Flexa)] (=intermedius)
longisetosus (Haplochthonius)
 longisetosus (Heminothrus)
 longisetosus (*Heminothrus*)
longisetosus (Heminothrus)
 longisetosus (Hydrozetes)
 longisetosus [D. (Kunstdamaeus)]
longisetosus (Megatrachobates)
 longisetosus (Melanozetes) Ham., 52
 longisetosus (*Melanozetes*) Ham., 52
longisetosus (Melanozetes) Mah., 84 (=mahunkai)
longisetosus (Meristacarus)
 longisetosus (Miracarus)
longisetosus (Papillocephus)
 longisetosus (Peloribates) Will., 30
 longisetosus (Peloribates) Will., 30
 longisetosus (*Peloribates*) Will., 30
longisetosus (Peloribates) Tseng, 84 (=tsengi)
 longisetosus (Platyliodes)
longisetosus [N. (Protophthiracarus)] (=longisetus)
 longisetosus (*Rhynchoribates*)
 longisetosus [K. (Rimandocephus)]
 longisetosus (Scheloribates)
longisetosus (Steganacarus) (=herculeanus)
 longisetosus (Thamnacarus)
 longisetosus [M. (Trimalaconothrus)]
longisetosus [H. (Tuberemaues)]
 longisetosus (*Xenillus*)
 longisetosus (*Yungaseremaues*)
 longisetus (Euphthiracarus)
 longisetus (Galumnopsis)
- longisetus (Micreremus)**
longisetus (Notophthiracarus)
longisetus (Oribatodes) (=mirabilis)
 longisetus (*Pheroliodes*)
longisetus [N. (Protophthiracarus)] (=niedbalai)
longisetus (Sphaerochthonius)
 longisetus (*Sturmozetes*)
 longisetus (Trhypochthoniellus)
 longisetus (*Trhypochthoniellus*)
longisetus (Trhypochthoniellus)
 longisetus (*Trhypochthoniellus*)
longisetus (Trhypochthoniellus)
 longisetus (*Trhypochthoniellus*)
 longispina (*Ceratozetes*)
 longispina (Dissorhina)
 longispina (Oribatella)
 longispina [Z. (Protozetomimus)]
 longispinosus [D. (Epidamaeus)]
 longispinosus [D. (Epidamaeus)]
 longissima (*Goyoppia*)
 longissima (Pseudoppia)
longissimus (Heteroleius)
 longissimus (*Heteroleius*)
longissimus (Perxylobates)
 longissimus (*Vermacarus*)
 longistriatus (*Berlesezetes*)
 longitarsalis [B. (Lanibelba)]
 longitarsalis [B. (Lanibelba)]
longitudinalis (Suctobelbila)
 longiuscula (Protoribates) sp. inq.
longocuspидatus (Ceratozetes) (=gracilis)
 longohisterosoma (Moritzoppia)
 longqiensis (*Hoplophthiracarus*)
longula (Allogalumna)
longulus (Austrocarabodes) sp. inq.
 longulus (*Euphthiracarus*)
 longulus (*Phthiracarus*)
 longulus (*Phthiracarus*)
longulus (Phthiracarus)
 longus (Damaeus)
 longus (*Gymnobatoides*)
longus (Longocephus)
longus (Maculobates)
longus (Notophthiracarus)
 longus (*Parapirnodus*)
longus (Protoribates) (=oblongus)
longus (Pseudotocephus) (=neominatus)
 longus (Scheloribates)
longus (Tuberocephus)
 longyanensis (*Paulianacarus*)
 loongchiensis (*Lauritzenia*)
 lophothrichus (Protoribates)
 lophothrichus (*Protoribates*)
lophothrichus (Protoribates)
 lophothrichus (*Protoribates*)
lophothrichus (Protoribates)
lordhowensis (Pheroliodes)
loricata (Acrotritia) (?=ardua)
 losbanosensis (*Dolicheremaues*)
 louisae (*Eremaezetes*)
 louisbothai (*Floritrichus*)
 louiseae (*Nothrus*)
 louisiae [H. (Phyllhermannia)]
 louisianae (*Pergalumna*)
 louisianae (*Pergalumna*)
 lounsburyi (*Carabocephus*)
 louwi (*Brachioppia*)

- louwi (Scheloribates)**
lowmanae (Paraxylobates)
loxolineata [M. (Pravoppia)]
lucasi (Novonothrus)
lucasi (Scheloribates) (=laevigatus)
lucasisformis (Scheloribates) sp. inq.
lucens (Cantharozetes)
lucens (Oromurcia)
lucens (Oromurcia)
luchili (Scheloribates)
lucianus (Microtegeus)
lucida (Acrotritia) (=curticephala)
lucida [O. (Zygoribatula)]
lucidus (Afroleius)
lucidus [P. (Archiphthiracarus)] (=piger)
lucida (Phauloppia) (=rauschenensis)
lucidus (Dolicheremaeus)
lucidus [S. (Tropacarus)]
luciensis (Austrocarabodes)
luciensis (Scheloribates)
lucifer (Chamobates) (=cuspidatus)
lucorum (Phauloppia)
lucorum (Phauloppia)
lucorum (Phauloppia)
luculenta (Neolucoppia)
lucunosus (Nothrus)
lugubris (Nothrus) sp. inq.
luisae (Oribatella)
luisae (Striatoppia)
luisseae [M. (Phyllolohmannia)]
luisiae (Rugoppia)
luisiae (Triteremella)
luminosa (Cyrthermannia)
luminosa (Cyrthermannia)
luminosa [S. (Diphauloppia)]
luminosa (Oripoda)
luminosus [S. (Perschelorbates)]
luminosus [S. (Perschelorbates)]
luminosus (Perschelorbates)
lumotus [S. (Perschelorbates)]
lunai (Trichogalumna)
lunai (Trichogalumna)
lunare (Banksinoma) lanceolata
lunaris (Austrocarabodes)
lunaris (Berniniella)
lunaris (Galumna)
lunaris (Microzetes)
lunata [R. (Insculptoppia)]
lunatus [N. (Protophthiracarus)]
lunatus [N. (Steganacarellus)]
lundbladi [A. (Neamerus)]
lupitae (Kalyptrazetes)
lupus (Damaeus)
luridus [P. (Archiphthiracarus)]
luscus (Liacarus)
lusitanicus (Cosmochthonius)
lustrum (Limnozetes)
lustrum (Limnozetes)
lutea (Ceratooppiella)
lutea (Kodiakella)
luteoauratus [C. (Klapperiches)]
luteomarginatus (Lopholiodes)
luteomarginatus (Maculobates)
luteomarginatus (Scheloribates)
luteus (Anellozetes)
luteus [P. (Biunguis)]
luteus (Hypochthonius)
- luteus (Hypochthonius)
luteus (Hypochthonius)
luteus (Hypochthonius)
luteus (Maculobates)
luteus (Neogymnobates)
luteus [S. (Perschelorbates)]
luteus [S. (Perschelorbates)]
luteus [P. (Vepracarus)]
lutulentus (Atropacarus) (=csiszarae)
luxtoni [L. (Baioppia)]
luxtoni (Dolicheremaeus)
luxtoni (Epimerella)
luxtoni [R. (Insculptoppia)]
luxtoni [L. (Lagenobates)]
luxtoni (Malaconothrus) (=scutatus)
luxtoni [H. (Phyllhermannia)]
luxtoni (Scapheremaeus)
luzonensis (Arcoppia)
luzonensis [S. (Perschelorbates)]
luzonensis (Phylloribatula)
luzonica (Dampfiella)
luzonica (Epilohmannia)
luzonica (Magyaria)
luzonica (Setogalumna)
luzonicellus (Dolicheremaeus)
luzonicus (Dolicheremaeus)
lydia [N. (Parakalumma)]
lydiae (Sellnickochthonius)
lydiae (Sellnickochthonius)
lyrata (Crotonia)
lyrica (Galumna)
lyroseta (Ramusella)
mabar [O. (Zygoribatula)]
mabar [O. (Zygoribatula)]
macedi (Nothrus)
macedi (Nothrus)
macedonicus (Bipassalozetes)
macrochaeta (Metabelbella)
macfadyeni (Crotonia)
macfarlanei (Africoribates)
macfarlani (Stomacarus)
macfarlani (Stomacarus)
machadoi (Acrogalumna)
machadoi (Acrogalumna)
machadoi (Dolicheremaeus)
machadoi (Eremaezetes)
machadoi (Malaconothrus) sp. inq.
machadoi [M. (Neobelba)]
machadoi (Phthiracarus) sp. inq.
machadoi (Plasmobates) sp. inq.
machadoi (Rhacaplacarus)
machadoi (Rhynchobelba)
machadoi (Striatoppia) sp. inq.
machadoi (Wallworkoppia)
machadoi (Wallworkoppia)
mackenziensis [D. (Epidamaeus)]
macleani (Proteremaeus)
macquariensis (Halozetes) D., 58 (P.)
macquariensis (Halozetes) D., 58 (A.) (=marinus)
macrodentata (Austrachipteria)
macrodentata (Suctobelbella)
macrodentatus [O. (Acrotocephalus)]
macrodon (Suctobelbella) (=subcornigera)
macrofissura (Micreremus)
macrofoliatus (Archegecephus)
macrofoveolatus (Malaconothrus)
macromediocris (Ceratozetes)

- macromucronatus (Leptotocepheus)**
macronuda [L. (Incabates)]
macronycha (Hermannia) sp. inq.
macroonyx (Totobates)
 macropoda [P. (Tectodamaeus)]
 macroporosus (Eupelops) torulosus
 macroprius (Platyliodes)
 macroprius (Platyliodes)
 macroptera (Galumna)
macropunctatum (Lopholiodes)
 macrorostralis (Euphthiracarus)
 macrorostrum (Oribatula) sp. inq.
 macrosacculus (Neoribates)
macrosculpturatus [S. (Tropacarus)] (=balearicus)
 macroseta [S. (Flagrosuctobelba)]
 macrosetosus (Cosmochthonius)
macrosetosus (Ethiovertex)
 macrostega (Oribatula)
maculata (Crotonia)
maculata (Fortuynia)
 maculata [S. (Lalmoppia)]
 maculata [S. (Lalmoppia)]
 maculata [S. (Lalmoppia)]
maculata [S. (Lalmoppia)]
maculata (Oribatula) (=tibialis)
 maculata (Suctobelbella) subcornigera
 maculatus (Ameronothrus)
 maculatus (Ameronothrus)
maculatus (Ameronothrus)
maculatus (Austrocarabodes)
 maculatus (Notophthiracarus)
 maculatus (Papillonotus)
 maculatus (Scheloribates)
maculosa (Crassoribatula)
maculosa (Ctenobelba) (?=pectinigera)
 maculosus (Atropacarus)
 maculosus (Eremaeozetes)
madagascarensis (Allogalumna)
madagascarensis [I. (Haplozetes)]
madagascarensis (Hermannia)
madagascarensis (Lanceoppia)
madagascarensis (Meristacarus)
 madagascarensis (Meristacarus)
madagascarensis (Nothrus)
madagascarensis (Oribatella)
 madagascarensis (Striatoppia)
madagascarensis (Striatoppia)
 madagassica (Bursoplophora)
madagassica (Pustuloppia)
madagassica (Trichogalumna)
 madecassus (Rhopalozetes)
 madegassica [N. (Leptosuctobelba)]
 madegassica [M. (Parplophora)]
 madegassus (Pseudopirnodus)
 madeirensis (Anomaloppia)
 madeirensis (Liacarus)
madeirensis (Scapheremaeus) (=corniger)
madininensis (Teleiolodes)
maerkeli (Lanceoppia)
 maerkeli (Mesotritia)
 maerkeli (Mesotritia)
 maganda [H. (Phyllhermannia)]
magdalena (Scapheremaeus)
magellanic (Anderemaeus)
magellanic (Austroppia) (=crozetensis)
maghrebinus [S. (Tropacarus)] (=boulfekhari)
 magkakaibaenus (Peloribates)
 magna (Ceratozetella) imperatoria
magna (Furcoribula) (=furcillata)
 magna (Gigantoppia)
magna [B. (Gressittoppia)]
magna (Heterobelba)
magna (Hoplophorella) (=sculptilis)
magna (Kodiakella) (?=dimorpha)
 magna (Mongailardia)
 magna (Oribotritia)
magna (Oribotritia)
 magna (Oripoda)
 magna (Parachipteria)
magna (Polyoppia)
magna [O. (Zygoribatula)] (=connexa)
 magnicava [S. (Flagrosuctobelba)]
magnifera [S. (Flagrosuctobelba)]
 magnifica (Cultroribula)
 magnifica (Gustavia)
 magnificus (Zetomimus)
 magnilamellata (Anachipteria)
 magnilamellata (Gustavia)
 magnilamellatus [T. (Tyrphonostrus)]
 magnipilosa (Aeroppia)
magnipora (Pergalumna)
magniporosa (Paraphauloppia)
 magniporosus [P. (Triaunguis)]
 magniporosus (Uracrobates)
 magniporus (Eueremaeus)
magniserrata (Spinoppia)
magniseta (Oribatella) (=quadridentata)
 magnisetosus (Adrodamaeus)
magnisetosus (Peloribates)
 magnisetosus (Tyrphonostrus)
 magnodentata [S. (Ussuribata)]
magnus (Archezogetes)
 magnus (Archezogetes)
magnus (Archezogetes)
 magnus (Archezogetes)
 magnus (Carabodes)
 magnus (Damaeolus)
magnus (Dolicheremaeus) Bal., 1958
magnus (Dolicheremaeus) Aoki, 2006 (=junichiaoki)
 magnus (Dynatozetes)
 magnus (Eohypochthonius)
 magnus (Eohypochthonius)
 magnus (Eohypochthonius)
magnus (Eremaeus) (=cordiformis)
magnus (Humerobates) (?=guadarramicus)
magnus (Maculobates)
 magnus (Neobrachychthonius)
magnus (Nothrus)
magnus [D. (Saltatrichus)]
 magnus (Scheloribates)
 magnus (Steganacarus)
 magnus (Steganacarus)
magnus (Steganacarus)
 magnus (Topobates)
magnus (Topobates)
magnus (Tropacarus)
 magnus [P. (Triaunguis)]
 magnus [P. (Triaunguis)]
magoebaensis (Afrozetes)
magoebaensis [C. (Magoebazetes)]
 mahabaenus (Annectacarus)
 mahabasensillus (Dolicheremaeus)
 mahani (Oribatella)
 maharashtraensis (Haplacarus)

maheensis (Afronothrus) (=incisivus)
mahnerti (Ceratozetes) (=platyrhinoides)
 mahnerti (Ctenobelba)
mahnerti (Dolicheremaeus)
mahnerti (Scheloribates)
 mahunkai (Arcoppia)
mahunkai (Austrocarabodes)
 mahunkai (Bipassalozetes)
mahunkai [S. (Bischeloribates)]
mahunkai [O. (Coronoquadroppia)] (=monstruosa)
 mahunkai (Cryptoppia)
mahunkai (Dampfiella)
mahunkai (Epilohmannia)
mahunkai (Eremobelba)
mahunkai (Ethiovertex)
 mahunkai (Eurostocephus)
mahunkai (Hoplophorella)
 mahunkai (Hypochthoniella)
mahunkai [G. (Kalloia)]
 mahunkai (Leptotocephus)
mahunkai (Melanozetes)
mahunkai [P. (Neophthiracarus)] (=shiptoni)
mahunkai (Notophthiracarus) Niedb., 1987
mahunkai (Notophthiracarus) Niedb. y Sta., 2013
mahunkai (Oribotritia)
 mahunkai (Pergalumna)
 mahunkai (Perxylobates)
 mahunkai (Rhinoppia)
mahunkai (Setoppia)
 mahunkai (Tectoribates)
mahunkai (Tectoribates)
mahunkaius (Scapheremaeus)
mahunkarum (Cryptoppia) (=mahunkai)
 mahunkarum (Megalotocephus)
maidililae (Basilobelba)
maiensis (Lucoppia) (=burrowsi)
maigsius [P. (Trianguis)]
 mailloli (Provertex)
 maimaensis (Atopochthonius)
maior [H. (Capillonothrus)] (=capillatus)
maior (Ceratozetella) (?=maxima)
maior (Globoppia)
maior (Globoppia)
 maior (Gustavia)
maior (Sphaerozetes) (=neonominatus)
 maior (Tyrphonothrus)
 maior (Tyrphonothrus)
maior (Tyrphonothrus)
maior (Tyrphonothrus)
maior (Tyrphonothrus)
maiori (Haplochthonius)
 majestus (Gozmanyina)
 major (Achipteria) coleoptrata ssp. inq.
major (Anachipteria) Mih., 56 (=howardi)
 major (Anachipteria) Mih., 57 sp. inq.
major [L. (Antennoppia)]
major (Ceratozetella) (=maxima)
major (Eueremaeus) (?=travei)
 major (Eupelops)
 major (Eupelops)
 major (Galumna) sp. inq.
major (Granuloppia)
major (Hemileius)
 major [L. (Incabates)]
major [L. (Incabates)]
 major (Liacarus) brevilamellatus

major (Magellozetes) (=traegardhi)
major (Minunthozetes) (=semirufus)
 major (Oribatula) interrupta
major [H. (Platynothrus)] (=novaezealandicus)
major (Prototritia)
major (Scheloribates) praestantissimus
 major (Tritegeus)
 makarchevae (Sadocephus)
 makarchevae (Sucteremaeus)
 makarovae (Pachygena)
makarovae (Pergalumna)
 makii [L. (Incabates)]
makilingensis (Basiceramerus)
makilingensis (Galumna)
makilingensis (Truncopes)
makinismus (Birobates)
makokouensis (Solenozetes)
malabarica (Siculobata)
malabaricus (Drymobatoides)
malaconothroiformis (Trhypochthoniellus)
malagasensis (Notophthiracarus) aokii
malagensis (Phthiracarus)] (=longulus)
malakicondylus (Dolicheremaeus)
malakipinae (Allosuctobelba)
malakius (Dolicheremaeus)
malalatiniae (Erioppia)
malangensis (Dolicheremaeus)
malapectinata (Pulchroppia)
 malatestai [S. (Tropacarus)]
malaya (Apoplophora)
malaya (Oribatella)
maledivensis (Fortuynia)
malgache (Idiozetes)
maliit (Dolicheremaeus)
malindangensis [O. (Acrotocephus)]
malindangensis (Pentacephus)
malindangensis [H. (Phyllhermannia)]
malacoolaensis (Hoplophthiracarus)
malleensis (Eremaeozetes)
malleolus (Neoliodes) (=concentricus)
mambusaensis (Dolicheremaeus)
 mammillaris (Masthermannia)
 mammillaris (Masthermannia)
mammillaris (Masthermannia)
mammillaris (Masthermannia)
mammillaris (Masthermannia)
mammillaris (Masthermannia)
mammillatus (Rostrozetes)
manantialis (Tuxenia)
manantialis (Tuxenia)
mandelai (Kokoppia)
mandjeliae (Pentazetes)
mangamuka (Oribotritia)
 manganellii (Steganacarus)
 manganoi [C. (Klapperiches)]
mangrovi (Carinozetes)
 manguaiati (Bathocephus)
 maniculatus [M. (Trimalaconothrus)]
 manifera (Anomaloppia)
 manifera (Anomaloppia)
manifera (Dolicheremaeus)
 manifera [C. (Klapperiches)]
manipurensis [H. (Kakophthiracarus)]
manningsensis (Oribatella)
manoai (Scheloribates)
manzanoensis [P. (Minguezetes)] (=insignis)
 maershanensis (Caenosamerus) spatiosus

- maoershanensis [P. (Oribellopsis)] crosbyi
maoriensis (Scheloribates)
 marasensis (Epimerella)
 marauni [*O. (Fenestrobatas)*]
 marcuardi (Apoplophora)
 marcuzzii (Ctenobelba)
 margarita [N. (Leptosuctobelba)]
 margaritae (Malaconothrus)
 margaritae (Stictozetes)
 margaritata (Pergalumna)
 margaritata (Striatoppia)
 margaritata (Suctobelbila)
 margaritatus (Cosmochthonius)
 margaritatus [L. (*Undulozetes*)]
 margaritifera (Allogalumna)
 margaritifera (Striatoppia)
 margatensis (Eupelops)
 marginalis (Scapheremaeus)
 marginalis (Scapheremaeus)
 marginata (Pilogalumna) (?=*tenuiclava*)
 marginatus (Benoiabates)
 marginatus (Carabodes)
 marginatus (Gressittolus)
 marginatus (Gressittolus)
 marginatus (Javacarus) *sp. inq.*
 marginatus [B. (Lanibelba)]
 marginatus (Liacarus) *sp. inq.*
 marginatus (Malaconothrus)
 marginatus (Malaconothrus)
 marginatus (Neobrachychthonius)
 marginatus (Notophthiracarus)
 marginatus (Scutovertex)
 marginatus (Sturmozetes)
 marginedentata (Lauropopia) falcata
 marginedentatus (Scheloribates) *sp. inq.*
 marginepunctatus (Carabodes) (=labyrinthicus)
 margosetosa (Xiphobelba) (=hamanni)
 mariae (Galumna)
 mariae (Galumna)
 mariana (Hoplophorella) (=singularis)
 mariana [*O. (Zygoribatula)*]
 mariannae (Pseudoceratoppia)
 mariano (Gehypochthonius)
 marieae (Austrachipteria) (=hammerae)
 mariehammerae (Aeropopia)
 mariehammerae (Dicrotegaeus)
 mariehammerae (Dolicheremaeus)
 mariehammerae [*O. (Zygoribatula)*]
 marilyn (Neogymnobates)
 marina (Fortuynia)
 marina (Schusteria)
 marina [*O. (Zygoribatula)*]
 marinus (Ameronothrus)
 marinus (Ameronothrus)
 marinus (Halozetes)
 marinus (Halozetes)
 marionensis (Dometorina)
 marionensis (Halozetes)
 marionensis (Totobates)
 maritalis (Quadropia)
 maritima (Corynopopia)
 maritima (Lauropopia)
 maritima (Lauropopia)
 maritimus (Hoplophthiracarus)
 maritimus (Tyrphonothrus)
 maritimus (Zachvatkinibates)
 maritimus (Zachvatkinibates)
 markusi (Dolicheremaeus)
 marlenae (Crotonia)
 marmoratus (Scapheremaeus) (=marginalis)
 maroccanus (Cosmochthonius)
 maroccanus (Sellnickochthonius)
 marplatensis (Neoliodes)
 marquesalis (Scheloribates) indicus
 marquesana (Pergalumna) hawaiiensis
 marquesi (Pergalumna) bryani
 marshalli (Eueremaeus)
 marshalli (Multimaudheimia)
 marshalli [D. (Saltatrichus)]
 martensi (Rhacaplacarus)
 martii (Schalleria)
 martinezi [B. (*Gressittoppia*)]
 martinezi (Tegeocranellus)
 martyanensis (Ctenobelba)
 maruokaensis [H. (Phyllhermannia)]
 maruyamai (Ghilarovizetes)
 maryae (Oribatella)
 masahittoi (Autogneta)
 masahittoi (Autogneta)
 masani [H. (*Monoschelobates*)]
 masinasin (Eueremaeus)
 mastax (Lineoppia)
 mastigophora [L. (Aegyptogalumna)]
 mastigophora (Medioxyoppia)
 mastigos (Notophthiracarus)
 mastyx (Hermannella)
 matatati (Notophthiracarus)
 matecumbei (Galumna) macroptera
 matildebellae (Eremella)
 matritensis (Corynopopia) kosarovi
 matritensis (Oribella)
 matritensis (Pergalumna) semistritata
 matritensis [*O. (Zygoribatula)*] (=propinqua)
 matshabelii (Liacarus)
 matskasi (Xenillus)
 matuku [N. (*Protophthiracarus*)]
 matulis (Dolicheremaeus)
 matulis (Scheloribates)
 maurensis (Paraxylobates)
 maurii [E. (*Neoepilohmannia*)]
 mauritanica (Grandjeanoplophora)
 mauritii (Dimidiogalumna)
 mauritii (Dolicheremaeus)
 mauritii (Kuklosuctobelba) (=claviseta)
 mauritii [H. (Phyllhermannia)] Jac., 36
 mauritii [H. (Phyllhermannia)] Mah., 78 (=neonominata)
 mauritii (Pergalumna)
 mauritii (Pergalumna)
 mauritii (Pergalumna)
 mauritius (Drymobatoides)
 mauritius (Humerobates) rostralamellatus
 mauritius (Neoliodes)
 mauritius (Unguizetes)
 mauritius (Unguizetes)
 maurus (Notophthiracarus)
 mausiae (Hauserozetes)
 maxensis (Oripoda)
 maxima (Amerobelba) (=decedens)
 maxima (Austrachipteria)
 maxima (Ceratozetella) Berl., 08
 maxima (Ceratozetella) Berl., 08
 maxima (Ceratozetella) Will., 53 (=maxima Berl., 08)
 maxima (Galumna) Berl., 16 (=inquirenda)
 maxima (Galumna) Mih., 56 (=lanceata)

- maxima** (*Galumna*) alata
maxima (*Gittella*)
maxima (*Maerkelotritia*) (=cryptopa)
maximus (*Africoribates*)
maximus [*H. (Capillonostrus)*]
 maximus (*Damaeus*)
 maximus (*Mochlozetes*)
maximus (*Phthiracarus*) (=laevigatus)
maximus (*Rhopalozetes*)
maximus (*Schelorbates*)
 maximus [P. (*Triaunguis*)]
 maximus [P. (*Triaunguis*)]
maxsellnicki (*Cubachipteria*)
maya (*Lohmannia*)
 mayangheensis [D. (*Epidamaeus*)]
mayariana (*Cubachipteria*)
mayottei (**Hoplophorella**)
 mayuloes [S. (*Plenoxylobates*)]
 mazandaranica (*Anomaloppia*)
 mazandaranica (*Oppiella*) nova
mcadami (*Arcoppia*)
mcadami (*Arcoppia*)
 meakanensis [H. (*Capillonostrus*)]
 meakanensis (*Nothrus*)
 meakanensis (*Nothrus*)
 media [Q. (*Coronoquadroppia*)]
media (**Epilohmannia**) **cylindrica**
 media (*Galumna*)
 media (*Rhinoppia*)
media (*Rhinoppia*)
 media (*Suctobelba*) sp. inq.
 medialis (*Liacarus*)
 medialis (*Parasuctobelba*)
 medialis (*Pergalumna*)
 medialis (*Tenuialoides*)
 medialis (*Tenuialoides*)
mediocris [*P. (Archiphthiracarus)*] Nied., 1984 (=globus)
mediocris [*P. (Archiphthiracarus)*] Nied., 2017
 mediocris (*Ceratozetes*)
 mediocris (*Ceratozetes*)
 mediocris (*Ceratozetes*)
mediocris (**Ceratozetes**)
 mediocris (*Oribatella*)
 mediocris (*Pseudoppia*)
mediolamellatus (*Tegeocranellus*)
mediosetosus (*Archegozete*) **magnus**
mediosetosus (*Archegozetes*) **magnus**
 mediterraneus (*Arthrodamaeus*)
 mediterraneus (*Selenoribates*)
 medius (*Euphthiracarus*)
 medius (*Melanozetes*) sp. inq.
medius (**Notophthiracarus**)
medius (*Pseudotocepheus*)
medius (**Schelorbates**) (=angustus)
medius (**Topobates**)
 medogensis (*Euphthiracarus*)
 medusa (*Unduloribates*)
megacephalum (*Granuloppia*) (=neonominata)
megacephalum (*Hydrozetes*) sp. inq.
megaforamina (**Oribatula**)
 megale (*Oribotritia*)
megalonyx (*Schelorbates*)
megalotrichus (*Stelechobates*)
 meghalayensis (*Arcoppia*)
meghalayensis (*Euphthiracarus*) (=pakistanensis)
 megistos (*Eremaeus*)
mekistos (**Notophthiracarus**)
mekistos (*Rhacaplacarus*)
melanesiae (*Crotonia*) (=nukuhivae)
melanomerus (*Thalassozetes*)
 melisi (*Rhinoppia*)
melloi (*Pergalumna*)
melzeri [*C. (Paraceratorchestes)*]
membranifer (*Phthiracarus*) (=ferrugineus)
membraniger (**Eutegaeus**)
 membranigera (*Dudichella*)
membranigera (**Dudichella**)
membranulifer (*Phylacozetes*)
membranus (**Nesozetes**)
 memorabilis [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 menglunensis (*Allosuctobelba*)
 menglunensis (*Pergalumna*)
menkei [*L. (Baioppia)*]
mensarosi (**Atalotegaeus**)
 mercedesae [T. (*Paragloboppia*)]
meridiana (*Parabelbella*)
 meridianus (*Melanozetes*)
 meridianus (*Melanozetes*)
 meridianus (*Punctoribates*)
 meridionalis (*Belba*)
meridionalis [*O. (Bioribatella)*] (=superbula)
 meridionalis (*Bursoplophora*)
meridionalis [*N. (Calyptophthiracarus)*] (=candidulus)
meridionalis (**Chudalupia**)
 meridionalis (*Eupelops*) torulosus
 meridionalis [S. (*Flagrosuctobelba*)]
meridionalis [*L. (Incabates)*] (=pallida)
meridionalis [*T. (Latilamellobates)*] (=incisellus)
 meridionalis (*Paraceratoppia*)
 meridionalis (*Sellnickochthonius*)
meridionalis [*O. (Zygoribatula)*] (=propinqua)
merimna [*R. (Insculptoppia)*]
meristacaroides (**Meristolohmannia**)
meristos (*Acrotritia*)
meristos (*Notophthiracarus*)
meruensis (*Amerioppia*)
meruensis [*O. (Zygoribatula)*]
mesosetosa (**Oribatula**)
 messneri (*Suctobelbella*)
meszarosi [*H. (Kakophthiracarus)*] (=tuberculosisissima)
 metsamorcius (*Ghilarovus*)
 metulifera [*O. (Moritzoppiella)*]
 metzi (*Mochloribatula*)
 metzi [*O. (Monoribatella)*]
mexicana [*M. (Dysarcoppia)*]
mexicana (*Phylloribatula*)
mexicana (*Schalleria*)
mexicana (*Trichogalumna*)
mexicanus (*Microtegeus*)
 meyeri (*Antarcticola*)
 meyeri (*Joshuella*)
michaeli (*Cepheus*) (=cepheiformis)
 michaeli [Q. (*Coronoquadroppia*)]
 michaeli [D. (*Epidamaeus*)] sp. inq.
 michaeli (*Eueremaeus*)
michaeli (*Metabelba*) (=papillipes)
michaeli (**Notophthiracarus**)
michaeli (**Schelorbates**) (=laevigatus)
 michaeli (*Steganacarus*)
 michaeliana (*Mesoplophora*)
 michaeliana (*Mesoplophora*)
michaii (*Huilicheremaeus*)
 micheli (*Gibbicepheus*)
micheli (*Gibbicepheus*)

- micheli (Gibbicepheus)
micidus [P. (Archiphthiracarus)]
mickii (*Halozetes*) *belgicae*
microcephala (Gustavia)
microcephala (Gustavia)
microcephala (Gustavia)
microchaetus (Birsteinus)
microclava [H. (Capillonothrus)]
microclava (*Coartobelba*)
microclava (*Hemileius*)
microclava (*Schelorbates*) (=iteratus)
microdentata [F. (Mexicoppia)]
microdentata [F. (*Mexicoppia*)]
microdentata [O. (Moritzoppiella)]
microdentata (*Suctobelbella*)
microfissum (Galumna)
microfissum (Galumna)
microfoveolata (Oribatella)
microfoveolata (Oribatella)
microlaminatus (Austrocarabodes)
microlancearia (Lanceoppia)
micromorpha (Fortuynia) *elamellata*
micronychus (Zetorchestes)
microporosa (*Allogalumna*)
microporosa (Galumnella)
microporosa (*Luissubiasia*)
microporosa [O. (Zygoribatula)]
microporosus (Stictozetes)
microptera (*Conoppia*) Berl., 85 (=palmicineta)
microptera (*Conoppia*) Can., 86 (=palmicineta)
microptera (Liebstadia) *pannonica*
micropterus [M. (Megazetes)]
micropunctinatum (*Lopholiodes*)
microsculptatus (Bipassalozetes)
microseta (*Beckiella*)
microseta (*Lineoppia*)
microseta (*Metrioppia*) (=helvetica)
microseta (*Neoamerioppia*) *longiclava*
microseta [E. (*Pocsia*)]
microseta (*Totobates*)
microseta (*Trichogalumna*)
microsetosa (*Hermannella*)
microsetosa (*Oribotritia*)
microsetosa [G. (*Porogalumna*)]
microsetosa (*Pseudoceratoppia*)
microsetosus (Ceratozetes)
microsetosus (*Indoribates*)
microsetosus (*Mucrobates*)
microsetosus (*Schelorbates*) (=pajaki)
microsetosus (*Topobates*)
microspinus [D. (*Epidamaeus*)]
microsulcata [G. (*Indogalumna*)]
microtricha (Lanceoppia)
microtrichoides (Lanceoppia)
microtrichus [C. (*Klapperiches*)]
microtuberculata (Pergalumna)
microtuberculatus [D. (*Epidamaeus*)]
microtus (Globozetes)
midas (Otoppia)
mielcareki (*Hoplophthiracarus*)
mihelciana (Processoppia)
mihelcici (*Iugoribates*) (=cornutus)
mihelcici (*Liacarus*) (=ovatus)
mihelcici (*Processoppia*) (=mihelciana)
mihelcici [R. (*Rectoppia*)]
mihelcici [R. (*Rectoppia*)]
mikaeei (Ctenobelba)
- mikoi (Galumna)
mikoi (Rhinoppia)
mikoi (Scutovertex)
miliae (*Eremobelba*)
milii (*Striatoppia*)
milleri (*Anachipteria*) (=latitecta)
milleri (*Pergalumna*) *corrugis*
milleri (*Schelorbates*)
milleri (*Schelorbates*)
milloti (Nanhermannia)
milloti (*Rhopalozetes*)
mindanaoensis [P. (Archiphthiracarus)]
mindanaoensis (*Dolicheremaeus*)
mindanaoensis (*Hydrozetes*)
mindanensis (*Magyaria*)
mindanensis (*Megalotocepheus*)
mindanensis (*Xiphobelba*)
minidentata [O. (*Perspicuoppia*)]
minidentata (Rhinoppia)
minidentatus (*Pseudotorribates*)
minifimbriatus (*Schelorbates*)
minifimbriatus (*Schelorbates*)
minifimbriatus (*Schelorbates*)
minifimbriatus (*Schelorbates*)
minifoveolatus (*Cosmochthonius*)
minima (*Brachyriopoda*)
minima (*Ceratozetella*)
minima (*Epilohmannia*) *cylindrica*
minima [B. (*Gressittoppia*)]
minima (*Heterogalumna*)
minima [H. (*Kakophthiracarus*)]
minima (*Mesotritia*)
minima (*Microtritia*)
minima (*Microtritia*)
minima (*Microtritia*)
minima (*Microtritia*)
minima (*Microtritia*)
minima (*Microtritia*)
minima (*Neoamerioppia*)
minima (*Pilogalumna*)
minima (*Quadroppia*)
minima (*Serratoppia*)
minima (*Serratoppia*)
minima (*Suctobelbila*)
minima (*Wallworkoppia*)
minimarginatus (*Phthiracarus*) (=boresetosus)
minimedia (Rhinoppia)
minimicoma (*Lauritzenia*)
minimicoma (*Lauritzenia*)
minimus (*Atropacarus*) *obesus*
minimus (*Benoibates*)
minimus (*Charassobates*)
minimus (*Euphthiracarus*)
minimus (*Gymnobodes*)
minimus (*Malaconothrus*)
minimus (*Micreremus*) (=brevipes)
minimus (*Nodocepheus*)
minimus (*Nothrus*) *sp. inq.*
minimus [S. (*Perschelorbates*)]
minimus (*Punctorribates*)
minimus [H. (*Simkinia*)]
minimus [N. (*Steganacarellus*)]
minimus (*Totobates*)
minipora (*Pergalumna*)
miniporosa (*Galumna*)
miniporus [M. (*Safrobates*)]
minisetosa [H. (*Kakophthiracarus*)]
minisetosa (*Setogalumna*)

- minisetosus* [P. (*Neophthiracarus*)]
minitricha [A. (**Uluguroides**)]
minituberculata (Pergalumna)
minijambuta (**Scapheremaeus**)
minnesotensis (*Heterozetes*)
minnesotensis (*Propelops*)
minor (**Afroleius**)
minor [L. (**Antennoppia**)]
minor [P. (**Archiphthiracarus**)] (=bulbiferus)
minor (Belba) *sp. inq.*
minor (*Ceratozetes*) *gracilis*
minor [C. (*Cyrtozetes*)] *denaliensis*
minor (*Dolicheremaeus*) Berl., 13
minor (*Dolicheremaeus*) capillatus W. 62 (=neonominatus)
minor (*Dolicheremaeus*) magnus W., 62 (=iteratus)
minor (*Eupelops*) *acromios*
minor (*Gittella*)
minor (*Globoppia*)
minor (*Halozetes*) *marinus*
minor (*Heminothrus*)
minor (*Heminothrus*)
minor (*Hoplophthiracarus*) (=kugohi)
minor (*Jacotella*) (=quadricaudicula)
minor (*Macrogena*)
minor (**Maculobates**)
minor (Pergalumna)
minor (Pergalumna)
minor (**Plasmobates**) *sp. inq.*
minor (*Sternoppia*)
minor (*Suctobelbella*) *sp. inq.*
minor (*Tectocephus*)
minor (*Tectocephus*)
minor (**Tectocephus**)
minor (*Tectocephus*)
minor (**Tectocephus**)
minor (*Tectocephus*)
minor (**Teratoppia**)
minor (*Topobates*) (=scheloribatoides)
minor (**Zetorchella**)
minor (*Zetorchella*)
minor (**Notophthiracarus**)
minoricana (Pergalumna)
minus (*Hoplophthiracarus*) (=histicinus)
minus (*Microppia*)
minus (*Microppia*)
minus (**Microppia**)
minus (*Microppia*)
minus (**Microppia**)
minus (*Microppia*)
minus (*Microppia*)
minus [D. (**Saltatrichus**)]
minuscula (*Apoplophora*)
minuscula (*Cerachipteria*)
minuscula [O. (*Oxyoppiella*)]
minusculus (*Hammerabates*)
minusculus (**Holonothrus**)
minusculus [C. (*Klapperiches*)]
minusculus [C. (*Klapperiches*)]
minusculus (*Notophthiracarus*)
minusculus (*Notophthiracarus*)
minusculus [S. (*Perscheloribates*)]
minusculus (*Podoribates*)
minuta (*Belba*) (=bulanovae)
minuta (*Berniniella*)
minuta (*Epilohmannia*)
minuta (**Epilohmannia**)
minuta (*Epilohmannia*)
- minuta* (*Epilohmannia*)
minuta (*Eremobelba*)
minuta (**Furcoppia**)
minuta (*Galumna*)
minuta (*Galumna*)
minuta [H. (*Heterohermannia*)]
minuta (**Microlamellarea**)
minuta (*Microtritia*) (=minima)
minuta [O. (*Moritzoppiella*)]
minuta (*Neoppia*)
minuta (*Oppia*) (=nitens)
minuta (*Oribatella*)
minuta (*Oribatella*)
minuta (*Oribatula*) Ew., 09 (*L. m.*) (?=amblyptera)
minuta (*Oribatula*) Ew., 09 (*N. m.*) (?=amblyptera)
minuta (*Pedrocortesella*)
minuta (*Pseudoamerioppia*)
minutipes (*Micreremus*) (=brevipes)
minutisetarum (*Novoribatella*)
minutisetarum (*Novoribatella*)
minutisetosa [K. (*Glabroppia*)]
minutissima (*Dameobelba*)
minutissima (*Hypochthoniella*)
minutissima (*Hypochthoniella*)
minutissima (**Hypochthoniella**)
minutissima (*Hypochthoniella*)
minutissima (**Hypochthoniella**)
minutissima (*Hypochthoniella*)
minutissima (*Microppia*) (=minus)
minutissima (*Pteroripoda*)
minutissimus [P. (*Archiphthiracarus*)] (=pygmaeus)
minutissimus (*Ceratozetes*) Willm., 1951
minutissimus (*Ceratozetes*) Sub. y Ari., 2000 (=nanus)
minutus (*Aleurodamaeus*)
minutus P. (**Archiphthiracarus**)
minutus (*Eupelops*)
minutus [I. (*Haplozetes*)]
minutus [*I. (Haplozetes)*]
minutus (*Malaconothrus*)
minutus (**Pedunculozetes**)
minutus (*Peloribates*) (=repetitus)
minutus [S. (**Perscheloribates**)]
minutus [S. (*Perscheloribates*)]
minutus (*Pheroliodes*)
minutus (*Scutovertex*)
minutus (*Scutovertex*)
minutus (*Schelorbates*) (=praeoccupatissimus)
minutus (*Tectocephus*)
minutus (**Vilhenabates**)
mirabilis (*Atropacarus*)
mirabilis (*Cerocephus*)
mirabilis (**Dicrotegaeus**)
mirabilis (*Dinozetes*)
mirabilis (*Hardybodes*)
mirabilis (**Hardybodes**)
mirabilis (**Hymenozetes**)
mirabilis (*Hypocephus*)
mirabilis (*Hypovortex*)
mirabilis [H. (*Interoppia*)]
mirabilis (*Leobodes*)
mirabilis (*Lopheremaeus*)
mirabilis [G. (*Monophauloppia*)] (=hispanica)
mirabilis (*Nasobates*)
mirabilis (*Oribatodes*)
mirabilis (**Parasuctobelba**)
mirabilis (*Pheroliodes*)
mirabilis (**Retrozetes**)

mirabilis (Sabahtritia)
mirabilis [D. (*Spatiodamaeus*)] (=verticillipes)
mirabilis (*Sternoppia*)
mirabilis (Subpirnodus)
mirabilis [M. (Trimalaconothrus)]
mirabiloides (*Reticulocephus*)
miranda (*Hoplophorella*) Nied., 88 (C.)
miranda (*Hoplophorella*) Nied., 88 (A.)
mirandus (Microzetes)
mirena (Multimedioppia)
mirifica (*Microtritia*)
mirus (Berlesezetes) ornatissimus
mirus [R. (*Rhynchoribatodes*)]
mirus [N. (*Steganacarellus*)]
misamisensis (*Dolicheremaeus*)
misella [L. (*Paralamellobates*)]
misella [L. (*Paralamellobates*)]
misella [L. (*Paralamellobates*)]
misella [L. (*Paralemellobates*)]
mississippii (*Tegeocranellus*)
missouri (*Indotritia*)
misumaiensis (*Trhypochthonius*) silvestris
mitakensis (*Phauloppia*)
mitis (*Fissicephus*)
mitis (*Fissicephus*)
mitis (*Holonostrus*)
mitsensillus [D. (*Epidamaeus*)]
mitratus [N. (*Calyptophthiracarus*)]
mitratus (*Fissicephus*)
mitratus (*Sphodrocephus*)
mitrofanovi (*Serratoppia*)
mixoppia (*Neostrinatina*)
mixta (*Achipteria*) (=nitens)
mixtus (*Austrocarabodes*)
mixtus (*Euphthiracarus*) (=monodactylus)
mixtus (*Euscheloribates*)
miyajima (*Tegeozetes*)
miyamaensis (*Eupelops*)
miyamaensis (*Phthiracarus*) (=japonicus)
miyamaensis (*Podopteroetegeus*)
miyauchii (*Sellnickochthonius*)
mizusawai (*Tokunocephus*)
mochlosimilaris (*Scheloribates*)
moderata (*Oripoda*) sp. inq.
moderator (*Achipteria*) sp. inq.
moderatus (*Peloribates*)
moderatus (*Truncopes*)
modesta (*Phauloppia*) Banks, 04 (=lucorum)
modesta (*Phauloppia*) Banks, 10 (=lucorum)
modesta [H. (*Phyllhermannia*)]
modesta (*Striatoppia*)
modestior (*Neoliodes*) sp. inq.
modestus [P. (*Archiphthiracarus*)]
modestus (*Eremulus*) (=flagellifer)
modestus (*Microtegeus*)
modestus (*Trichotocephus*) erabuensis
modicus (*Euphthiracarus*)
modicus (*Notophthiracarus*)
moestus (*Scheloribates*) sp. inq.
mograbin (*Issaniella*)
mograbin (*Issaniella*)
moldavicus (*Punctoribates*)
molecula (*Lamellobates*)
molecula (*Lamellobates*)
molecula (*Lamellobates*)

molecula (*Lamellobates*)
molensis (*Pilogalumna*) (=ornatula)
mollicoma (*Hydrozetes*) (=lemnae)
mollicoma (*Plenotocephus*)
mollicoma (*Protoribates*)
mollicoma (*Protoribates*)
mollicoma (*Totobates*)
mollicomus (*Melanozetes*)
mollicomus (*Melanozetes*)
mollis (*Galumna*)
mollis (*Gressittolus*)
mollis (*Indotritia*) (=javensis)
mollis (*Liochthonius*)
mollis (*Liochthonius*)
mollis [H. (*Phyllhermannia*)]
mollisetosus (*Malaconothrus*) (=monodactylus)
mollisimilis (*Melanozetes*) (=mollisetosus)
molodovi [O. (*Monoribatella*)]
momitoi (*Crotonia*)
mongensis (*Cosmochthonius*)
monensis (*Allonothrus*)
mongolica (*Belba*)
mongolica (*Ceratoppia*)
mongolica (*Joshuella*)
mongolica (*Liebstadia*)
mongolica (*Maerkelotritia*) (=krivolutskyi)
mongolica [O. (*Zygoribatula*)]
mongolicus (*Adrodamaeus*)
mongolicus (*Bipassalozetes*)
mongolicus (*Birsteinus*)
mongolicus [A. (*Coropoculia*)]
mongolicus (*Eupelops*)
mongolicus (*Ghilarovus*)
mongolicus [P. (*Montizetes*)]
mongolicus (*Proteremaeus*)
mongolicus [D. (*Spatiodamaeus*)]
mongolicus (*Tectoribates*)
mongolicus (*Tyrphonostrus*)
mongolicus (*Zachvatkinibates*)
monicae (*Rhinoppia*)
monicae (*Pedrocortesella*)
moniles (*Bipassalozetes*)
monilipeda [M. (*Neobelba*)]
monilipes (*Caleremaeus*)
monobina (*Coartobelba*)
monoceros (*Banksinoma*)
monoceros (*Schalleria*)
monocerus (*Heterochthonius*)
monocornis [M. (*Calyptozetes*)]
monodactyla (*Acrotitria*) (=simile)
monodactyla (*Allogalumna*)
monodactyla (*Cryptobothria*)
monodactyla (*Liebstadia*) (=neonominata)
monodactyla (*Macrogena*)
monodactyla (*Parapyropia*) (=cornuta)
monodactylus (*Allonothrus*)
monodactylus (*Allonothrus*)
monodactylus (*Allonothrus*)
monodactylus (*Euphthiracarus*)
monodactylus (*Euphthiracarus*)
monodactylus (*Euphthiracarus*)
monodactylus (*Malaconothrus*)
monodactylus (*Malaconothrus*)
monodactylus (*Malaconothrus*)
monodactylus (*Malaconothrus*)
monodactylus (*Mycobates*)

monodactylus (Neophysobates)

monodactylus (Neoribates)

monodactylus (Nesopelops)

monodactylus (Nothrus)

monodactylus [S. (Perscheloribates)]

monodactylus (Protoribates) (?=capucinus)**monodactylus (Trhypochthonius) (=tectorum)**

monodactylus (Truncozetes)

monodentis (Coartobelba)

monofenestrella [N. (Leptosuctobelba)]

monolongisetosus (Nothrus)

monongahelae [C. (Ensicamisia)]

monoramai (Berlesezetes)

monosacculatus (Ceratobates)

monosetosa [L. (Carolohmannia)]

monospicus (Oribatella)**monozygata [O. (Zygoribatula)]**

monster (Persuctobelba)

monstrosus (Eremulus)**monstruosa (Acroppia)**

monstruosa [Q. (Coronoquadroppia)]

monstruosa [Q. (Coronoquadroppia)]

monstruosa [Q. (Coronoquadroppia)]

monstruosa (Dendrohermannia)

monstruosa (Dendrohermannia)

monstruosa (Parasuctobelba)

monstruosa (Pilobatella)

monstruusetosa (Basilobelba)

monstruosus (Cavernocephesus)

monstruosus (Hermannobates)

monstruosus (Nippobodes)

monstruosus (Rostrozetes)

monstruosus (Tectocarabodes)

montana (Arcoppia)

montana (Carinogalumna)

montana (Ceratoppia) (=spinipes)

montana (Heterobelba)

montana (Licnobelba) (=latiflabellata)

montana [O. (Moritzoppiella)]

montanus (Trichoribates) Irk, 39 (=monticola)**montanus (Trichoribates)** Ham., 61 (=hammerae)

montana (Oripoda)

montana (Pergalumna) Ham., 61

montana (Pergalumna) Ham., 72 (=tahitiensis)

montana (Pilogalumna) crassiclava

montana [S. (Quatobelba)] (=neonominata)

montana (Subbelba)

montana (Trichogalumna)

montanus (Aquanothrus)

montanus [P. (Archiphthiracarus)]

montanus (Carabodes)

montanus (Dolicheremaeus)

montanus (Eurhynchoribates)

montanus (Fuscozetes)

montanus (Hemileius) (?=humeralis)

montanus (Hypochthonius)

montanus (Liacarus)

montanus (Megeremaeus)

montanus (Neophysobates)

montanus (Nothrus)

montanus (Peloptulus)

montanus (Platylodes)

montanus (Trhypochthonius)

montanus [M. (Trimalaconothrus)]

montanus (Truncopes)

montanus (Verachthonius)

montanus (Verachthonius)

monteithi (Crotonia)**monteithi (Galumna)****monteithi (Nesutegaeus)****monteithi (Pheriodes)****monteithi (Pseudotocepheus)**

monticola (Anderemaeus)

monticola (Anderemaeus)

monticola (Calozetes)

monticola (Cavernocephesus)

monticola (Ceratozetes)

monticola (Galumna)

monticola (Heterogalumna)**monticola [G. (Indogalumna)] (=balakrishnani)**

monticola [P. (Nododamaeus)]

monticola (Nothrus)

monticola (Nothrus)

monticola (Sellnickochthonius)

monticola (Trichoribates)

monticolus (Birsteinus)

monticolus (Eremaeus)

monticolus (Propelops)

montigenus (Rhacaplacarus)

montis (Pedrocortesella)

montium (Phthiracarus) (=longulus)

montivagus (Diapterobates) sp. inq.

montkoupensis (Indotritia)**montensis (Acrogalumna)****montensis [S. (Perscheloribates)]**

monyx (Euphthiracarus)

moonsani (Xenillus)

mooseri (Eobrachychthonius) (=latior)**moraviacus [L. (Dorycranosus)] (=acutus)**

moraviae [D. (Kunstidamaeus)] lengersdorfi

morenoi (Paraphauloppia)

morenoi (Scapheremaeus)

morenoi (Scapheremaeus)**moresonensis [B. (Gressittoppia)]****moresonensis (Neoctenogalumna)****moribei (Thamnacarus) (=elongatus)**

morikawai (Odontocephesus)

moritzi [L. (Baiooppia)]

moritzi [S. (Flagrosuctobelba)] forsslundi

moritzi [M. (Hammeroppia)]

moritzi (Liochthonius)

moritzi (Mixochthonius) (=pilososetosus)**moritzi (Verachthonius)****morticina (Oribatella) (=cespitem)**

morulisensillatus (Scapheremaeus)

motasi (Lauroppia)

motomuka (Notophthiracarus)

moyae (Xenillus)

muara (Sellnickochthonius)

muara (Sellnickochthonius)

mucronatus (Annectacarus)

mucronatus (Annectacarus)

mucronatus (Centroribates)

mucronatus (Liacarus)

mucronatus (Liacarus)

mucronatus (Truncozetes)

muiri (Scheloribates)

muiricius (Scheloribates) sp. inq.

muliercula (Muliercula)

multesima (Allogalumna)

multesima (Allogalumna)

multiareolatus (Cribrozetes)

multiareolatus (Licnozetes)

multiciliata (Masthermannia)

multiciliata (Rhinoppia) hygrophila
multicorrugata [G. (*Stenoppia*)]
 multicuspidatus (Plakoribates)
multidentata (*Serratobelba*)
multidentatus (*Pantelozetes*) (=paolii)
multiiterata (*Galumna*) (=maxima)
 multiiteratus (Scheloribates)
multilineata (*Striatoppia*)
multipliosa (*Austrogneta*)
multipliosa (*Austrogneta*)
multipliosus [R. (*Mantigueracarus*)]
multipliosus (*Neogymnobates*)
multipliosus [M. (*Trimalaconothrus*)]
multiplisetus (*Topobates*)
 multiplumosa [S. (*Flagrosuctobelba*)]
multiplumosa [S. (*Flagrosuctobelba*)]
multiplumosa [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 multipora (Hermannella)
 multiporosa (Mochloribatula)
multiplurata (*Mochloribatula*)
multipunctata (*Multoribula*)
multirepetitus (Scheloribates)
multirugosa [H. (*Kakophthiracarus*)]
multisetosa (*Mesotritia*)
multisetosa [E. (*Neopiliohmannia*)]
multisetosa (*Oribotritia*)
multisetosa (*Trichocondyla*)
multisetosus (*Atropacarus*)
 multisetosus (Choixenillus)
multisetosus [P. (*Neophthiracarus*)]
multisetosus (*Topobates*)
multisetus (*Indoribates*)
multisulcatum (*Senectoppia*)
multisulcatus (*Trhypochthonius*) sp. inq.
multituberculata (*Enantioppia*)
multituberculata [K. (*Niosuctobelba*)]
multituberculata (*Suctobelbilla*)
multituberculatus [N. (*Steganacarellus*)]
mumfordi (*Scheloribates*)
mundus (*Phthiracarus*) (=longulus)
 mundus (Punctoribates)
 munesaensis [S. (*Bischeloribates*)]
munita (*Acrotritia*)
munizi [N. (*Perezinigokalumma*)]
 munkhbayari [D. (*Epidamaeus*)]
muraiae (*Bursoplophora*)
 muranyii (Dissorhina)
 murciensis (Atropacarus)
 murcioides (Mixacarus)
murpurensis [M. (*Trimalaconothrus*)]
 muronokiensis [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 murosensis (Liacarus)
murphyi [P. (*Archiphthiracarus*)] (=montanus)
 murphyi (*Dolicheremaeus*)
 murphyi (*Sumatrotritia*)
 murtazalievi (Liochthonius)
murvanidzeae (*Kokoppia*)
 musaevi [L. (*Dorycranosus*)]
musci (*Adrodamaeus*)
musci (*Phauloppia*) (?=lucorum)
musciola (*Anellozetes*)
musciola (*Benoiabates*)
musciola (*Haplochthonius*)
musciola (*Hemileius*)
musciola (*Peloribates*)
musciola (*Peloribates*)
musciola (*Stachyoppia*)

musciola (*Stachyoppia*)
muscorum (*Astegistes*) (?=pilosus)
 muscorum (Liochthonius)
muscorum (*Liochthonius*)
muscorum (*Tegeocranellus*)
muscorum (*Tegeocranellus*)
mussardi [G. (*Baobabula*)]
mussardi [R. (*Insculptoppia*)]
mussardi (*Liochthonius*)
mustaciata [O. (*Oxyoppiella*)]
mutabilis (*Dolicheremaeus*)
mutabilis (*Hoplophthiracarus*)
mutabilis [P. (*Neophthiracarus*)]
 mutabilis (Xenillus)
mutilus (*Camisia*) (=horrida)
mutalpina (*Trhypochthonius*) (=tectorum)
mwali [H. (*Kakophthiracarus*)]
 myricus [T. (*Latilamellobates*)]
myrmecophila (*Oppia*) (=nitens)
 myrmecophilus (Protoribates)
myrmobates (*Ceratozetes*) (?=conjunctus)
 myrmophila (Moritzoppia)
 myrmophila (Pergalumna)
myrmophila (*Pergalumna*)
mystax (*Galumna*)
mystax (*Nothrus*)
 nabhitabhatai (*Trichogalumna*)
nadchatrami (*Acutozetes*)
nadiji (*Mycobates*) (=parmeliae)
 nagaii (*Rostrozetes*)
 nagaii [H. (*Tuberemaeus*)]
 naganoensis (Protoribates)
 nagaroorica (*Eremobelba*)
 nagasatoensis (*Medioxyoppia*)
naginata [S. (*Flagrosuctobelba*)] (=elegantula)
 nagisa (*Schusteria*)
 nagoyae (*Medioxyoppia*)
 nagpalae (*Dolicheremaeus*)
nagyi (*Neoamerioppia*)
nahani (*Eueremaeus*)
*naia*s (*Zetomimus*)
naisselini (*Achipterina*)
naisselini (*Achipterina*)
 nakanei (*Fissicepheus*)
 nakatamarii [C. (*Aokibelba*)]
 nakatamarii (*Yoshiobodes*)
 nakatamarii (*Yoshiobodes*)
 naltschicki [T. (*Latilamellobates*)]
namadjiensis [H. (*Phyllhermannia*)]
 nana (Berniniella)
 nana [Q. (*Coronoquadroppia*)]
 nana [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 nana [O. (*Moritzoppiella*)]
 nana (*Nanhermannia*)
 nana (*Nanhermannia*)
nana (*Nanhermannia*)
 nana (*Nanhermannia*)
nana (*Nanhermannia*)
nana (*Nanhermannia*)
nana (*Ramusella*) (=curtipilus)
 nantahalaensis (*Carabodes*)
 nanus (*Ceratozetes*)
nanus (*Scheloribates*)
 naranensis (*Suctobelbilla*)
nasalis (*Aeroppia*)
nasalis (*Africoribates*)
nasalis (*Anoripoda*)

nasalis (Brachioppiella)
 nasalis [Q. (Coronoquadroppia)]
nasalis (Dolicheremaeus)
nasalis (Euphthiracarus)
nasalis (Eupterotegaeus)
 nasalis [S. (Flagrosuctobelba)]
nasalis [S. (Flagrosuctobelba)]
nasalis (Hammerabates)
nasalis (Hammerabates)
nasalis (Hoplophthiracarus)
 nasalis (Mucronothrus)
 nasalis (Mucronothrus)
nasalis (Mucronothrus)
nasalis (Mucronothrus)
 nasalis [G. (Naiazetes)]
nasalis (Oribotritia)
nasalis (Teratoppia)
nasalis [S. (Wallworkiella)]
nasata (Cyrthermannia) sp. inq.
 nashiroi (Scapheremaeus)
nashiroi (Scapheremaeus)
nasica (Pergalumna)
nasifera (Pergalumna)
naskreckii (Holonothrus)
 nasuorum [O. (Sacculoribetella)]
nasuta (Moritzoppia) (=clavata)
 nasuta (Perlohmannia)
nasuta (Protoripoda)
 nasuta (Rhinoppia)
 nasutus (Birobates)
 nasutus (Ceratozetes)
nasutus (Chamobates) (=subglobulus)
 nasutus [D. (Epidamaeus)]
nasutus (Eremaeozetes)
nasutus (Euphthiracarus)
natalensis (Afroleius)
natalensis (Afrozetes)
natalensis (Archeonothrus)
natalensis (Berlesezetes)
natalensis (Galumna) inquirenda
natalensis [C. (Magoebazetes)]
natalensis (Paraphysobates)
natalensis [H. (Phyllhermannia)]
natalensis (Protoribates)
natalensis (Protoribates)
natalensis [N. (Steganacarellus)]
nathanaeli [H. (Phyllhermannia)]
 nativa (Oribatula)
natmaensis (Schelorbates)
naturalisi (Galumna)
navalensis (Coetzeella)
navarrensis (Atropacarus) (=wandae)
 navicula (Heteroleius)
 nayoroensis (Cosmochthonius)
 nayoroensis (Diapterobates)
 nayoroensis (Oribatula)
 nayoroensis (Suctobelbella)
 nebaikini (Proteremaeus)
 nebulosa (Dampfiella)
nebulosus (Rostrozetes) (=poensis)
necrophagus (Halozetes)
neerlandica (Allogalumna) (=integer)
 neerlandica [O. (Moritzoppiella)]
 neerlandica [O. (Moritzoppiella)]
neglecta (Hoplophorella) (=lanceoseta)
 neglecta (Multioppia)
 neglecta (Multioppia)

neglecta (Multioppia)
 neglectus (Liochthonius)
 neglectus (Neoribates)
 neglectus (Sphaerozetes)
negroi (Cosmozetes)
negrosensis (Otocephus)
negrosensis [N. (Pseudoneoribates)]
neomatophora (Masthermannia) (=mammillaris)
 nemoralis (Eueremaeus)
 nemoralis (Phauloppia)
 nemoralis (Zachvatkinibates)
nemoricultricus (Pheroliodes)
nemorosus (Atropacarus) (=csiszarae)
 nemossensis (Tricheremaeus)
neochilensis [N. (Protophthiracarus)]
neomexicanus (Bipassalozetes)
neomexicanus (Bipassalozetes)
 neonominata (Brassiella)
neonominata (Brassiella)
neonominata [L. (Convergoppia)]
 neonominata (Cultroribula)
neonominata (Fusuloppia)
neonominata (Granuloppia)
 neonominata (Graptoppia)
neonominata (Graptoppia)
 neonominata (Hoplophorella)
neonominata [G. (Indogalumna)]
 neonominata [R. (Insculptoppia)]
 neonominata (Jacotella)
neonominata (Lasiobelba) (=pori)
 neonominata (Liebstadia)
neonominata (Microtritia)
 neonominata (Oppia)
 neonominata (Oppiella)
neonominata (Oribatella)
 neonominata (Oribatula) sp. inq.
neonominata (Pedrocortesella) (=reticulata)
neonominata [H. (Phyllhermannia)]
 neonominata [S. (Quatobelba)]
neonominata (Suctobelbella) (=lobata)
 neonominata (Suctobelbilla)
neonominatus (Anellozetes)
neonominatus [P. (Archiphthiracarus)] (=bulbiferus)
 neonominatus (Bipassalozetes) neomexicanus
 neonominatus (Carabodes)
neonominatus (Carabodes)
 neonominatus (Ceratozetes)
neonominatus (Dolicheremaeus) capillatus
 neonominatus [L. (Dorycranosus)]
 neonominatus (Eremaeus)
neonominatus (Eremaeus)
neonominatus (Liochthonius) (=latus)
neonominatus (Malaconothrus)
neonominatus [P. (Neophthiracarus)] (=reiteratus)
 neonominatus Neoribates
 neonominatus (Nothrus) borussicus ssp. inq.
neonominatus (Peloribates)
neonominatus (Pseudotocephus)
neonominatus (Schelorbates)
 neonominatus (Scutovertex)
 neonominatus (Sphaerozetes) globularis ssp. inq.
neonominatus [H. (Tuberemaeus)]
neonominatus [H. (Tuberemaeus)]
neonominatus (Xenillus)
neoplumosus [T. (Cristonothrus)]
neosimplex (Neobrachychthonius) (=marginatus)
neosota (Eremobelba) (=gracilior)

- neotricha (Hermannia)
neotricha (Monogalumella)
neotricha [E. (Neopiliohmannia)]
 neotrichostralis (Yoshiobodes)
 neotrichus (Niphocephus)
neotrichus [N. (Protophthiracarus)]
 neotrichus (Trichozetes)
 neotropica (Lyroppia)
 neotropica (Machadobelba)
 neotropica [H. (Phyllhermannia)]
 neotropicalis (Acrotritia) ardua
 neotropicalis (Dissorhina)
 neotropicalis [C. (Triachipteria)]
neotropicus (Afronothrus) (=incisivus)
 neotropicus (Allonothrus)
 neotropicus (Fissurobates)
 neotropicus (Heptacarus)
 neotropicus (Mixacarus)
 neotropicus [P. (Neopilizetes)]
 neotropicus (Papillocephus)
 neotropicus (Plakoribates)
 neotropicus (Plenotocephus)
 neotropicus (Suctoribates)
 nepalensis (Dolicheremaeus)
 nepalensis (Hoplophthiracarus)
 nepalensis (Oribotritia) (=gigas)
 nepalensis [S. (Perscheloribates)]
 nepalensis (Provertex) sp. inq.
 nepalica [L. (Antennoppia)]
 nepalica (Taiwanoppia)
 nepenthes [O. (Acrotocephus)]
nepos (Carabodes) (=coriaceus)
nepotulus (Eupelops) (=tardus)
nervosa (Eremobelba) (=gracilior)
 nervosa (Pergalumna)
 nervosa (Pergalumna)
 nervosa (Pergalumna)
 nervosus (Mystacozetes)
 nesebarensis (Bipassalozetes)
 netron (Euphthiracarus)
 neuquinus (Pherioides)
 nevadensis [H. (Capillonthrus)]
 nevesi (Hafenferrefia)
 nevesi (Hafenferrefia)
newelli (Setuloppia)
newtaipeiensis [U. (Pauracrobates)]
 nexilis [N. (Protophthiracarus)]
 ngongi (Rhacaplacarus)
 ngoyensis (Muliercula)
 niahensis [P. (Archiphthiracarus)]
 niccus (Selenoribates)
 nicki (Hemileius)
nicoleti (Achipteria) (=coleoprata)
nicoleti (Camisia) (=biverrucata)
nicoleti (Notophthiracarus)
 nicora (Lucoppia)
 nidicola (Ameronothrus)
nidicola (Globoppia)
 nidicola [D. (Kunstidamaeus)]
nidicola (Onychobates)
niedbalai (Acrotritia) (=vestita)
 niedbalai (Aleurodamaeus)
 niedbalai (Dolicheremaeus)
 niedbalai (Nothrus)
 niedbalai (Notophthiracarus)
 niedbalai [M. (Parplophora)]
niedbalai [N. (Protophthiracarus)]
- niedbalai [S. (Rafacarus)]** Liu y Zhang, 2013
 niedbalai [S. (Rafacarus)] P.-I. y Baggio, 1996
niger (Bipassalozetes)
 niger (Carabodes)
niger (Compactozetes)
niger (Notophthiracarus) (=schizocomus)
 niger (Scutovertex)
 niger [L. (Rhaphidosus)]
nigeriana (Bicyrthermannia)
nigeriensis (Hoplophorella) (=vitrina)
 nigeriensis (Allonothrus)
 nigeriensis (Peloribates)
 nigeriocompressus (Scheloribates)
 nigeriosphericus (Scheloribates)
nigerrimus (Chamobates) (=subglobulus)
 nigerrimus (Notophthiracarus)
 nigerrimus [L. (Procorynetes)]
 nigra (Galumna)
 nigra (Oribatella)
 nigrescens (Liacarus) sp. inq.
nigricans (Neoliodes)
nigricans (Tectoppia)
 nigricans (Tectoppia)
 nigricans (Trhypochthonius)
 nigricans (Trhypochthonius)
 nigriclavatus (Ampullobates)
 nigrisetosus (Eremulus)
 nigrisetosus (Eremulus)
 nigrisetosus (Zetomimus)
nigroclava (Novazelandiella)
 nigrofemoratus (Ameronothrus)
 nigrofemoratus (Ameronothrus)
 nigrolobatus (Megalotocephus)
 nigromaculatus (Spinotocephus)
 nigrosetosus [C. (Klapperiches)]
nikolskii [O. (Moritzoppiella)] (=splendens)
 nilamburicus (Phyllozetes)
 nilgiria (Galumna) sp. inq.
 niliaca (Galumna)
 niliaca (Striatoppia)
 niliaca (Striatoppia)
 niliaca [O. (Zygoribatula)]
 niliacus (Sellnickochthonius)
niloticus (Hydrozetes) Träg., 05 sp. inq.
niloticus (Hydrozetes) S., H. y R., 91 (=inquirenda)
nimbus (Dolicheremaeus)
nimirumi (Scheloribates) louwi
nimius [P. (Neophthiracarus)]
 nipponica (Galumnella)
 nipponica (Galumnella)
 nipponica (Kuklosuctobelba) claviseta
 nipponica (Trichogalumna)
nipponica (Trichogalumna)
 nipponica (Trichogalumna)
 nipponica (Trichogalumna)
 nipponica (Zachvatkinella)
 nipponicus (Cultrobates)
 nipponicus (Protoribates) crassisetiger
 nipponicus [M. (Trimalaconothrus)]
 nishinoi (Peloribates)
 nitens (Achipteria) Nic., 1855
 nitens (Achipteria) Nic., 1855
nitens (Achipteria) L. Koch, 1879 (=nitens Nic., 1855)
nitens (Achipteria) Kis., 1930 (=nitens Nic., 1855)
nitens (Euzetes) (=globulus)
 nitens (Ghilarovizetes) sp. inq.
 nitens (Liacarus)

- novus [(T. (*Tyrphonothrus*)] (=maior)
nubatamae (Tegeocranellus)
nuciferosa (Scapheremaeus)
nuda (*Galumna*)
nuda (*Galumna*)
nuda (*Granuloppia*)
nuda (*Hemileius*) (=quadripilis)
nuda [L. (*Incabates*)]
nuda [L. (*Incabates*)]
nuda (*Indotritia*)
nuda (*Mesotritia*)
nuda (*Mesotritia*)
nuda (*Mesotritia*)
nuda (*Mesotritia*)
nuda (*Mesotritia*)
nuda (*Mesotritia*)
nuda (*Pergalumna*)
nuda (*Pergalumna*)
nuda (*Tenuiala*)
nuda (*Tenuiala*)
nuda (*Tenuiala*)
nudiuscula (*Pelopsis*) (=bifurcatus)
nudus (*Guaranozetes*)
nudus [I. (*Haplozetes*)]
nudus (*Humerobates*)
nudus (*Humerobates*)
nudus (*Humerobates*)
nudus (*Neophysobates*)
nudus (*Scheloribates*)
nuevavizcayaensis (*Eurhynchoribates*)
nugarica (*Oribatella*)
nukuhiva (*Nuhivabates*)
nukuhivae (*Crotonia*)
nukusia (*Graptoppia*)
numatai [H. (*Capillonostrus*)]
numatai [H. (*Capillonostrus*)]
numerosa (*Pergalumna*)
numerosus (*Diapterobates*) (=humeralis)
numidiana [A. (*Rhaphigneta*)]
numidicus (*Dicatozetes*)
nunomurai (*Indotritia*)
nymphoides (*Hydrozetes*) (=californiensis)
oauensis (*Scheloribates*)
oaxacanus (*Acaroceras*)
obesa (*Pedrocortesella*)
obesus (*Atropacarus*)
obesus (*Dynatozetes*)
obesus [T. (*Latilamellobates*)]
obesus [T. (*Latilamellobates*)]
obesus (*Perxylobates*)
obesus (*Scheloribates*)
obesus (*Tyrphonothrus*)
oblectatoria (*Ceratoppia*)
obliqua (*Oripoda*)
obliquus [F. (*Pseudogeminozetes*)]
obliquus [P. (*Archiphthiracarus*)]
obliquus (*Cavernocephus*)
oblitera (*Hermanniella*)
;obliteratus (*Scapheremaeus*)?
obliteratus (*Scapheremaeus*)
oblonga (*Antarctica*) (=meyeri)
oblonga (*Hoplophorella*)
oblongarea (*Trichoribates*)
oblongata (*Rhinoppia*) (=loksai)
oblongisetosus [C. (*Nortonchthonius*)]
oblongus (*Ameronothrus*)
oblongus (*Diapterobates*)
oblongus (*Eueremaeus*)
oblongus (*Eueremaeus*)
oblongus (*Eueremaeus*)
oblongus (*Euphthiracarus*)
oblongus (*Nothrus*)
oblongus (*Nothrus*)
oblongus (*Odontocephus*) Karp., 1893 (=elongatus)
oblongus (*Odontocephus*) Banks, 1895 sp. inq.
oblongus (*Protoribates*)
oblongus (*Protoribates*)
oblongus (*Steganacarus*) (=magnus)
obscura (*Eremobelba*) sp. inq.
obscura (*Lauropia*) (=doris)
obscurus [P. (*Archiphthiracarus*)]
obscurus [P. (*Archiphthiracarus*)]
obscurus (*Austrocarabodes*)
obscurus (*Damaeus*) (=riparius)
obscurus (*Meristacarus*) madagascarensis
obscurus (*Sellnickochthonius*) (=immaculatus)
obscurusgibbus [P. (*Tectodamaeus*)]
obsessa (*Pergalumna*)
obsessa [O. (*Zygoribatula*)]
obsessus (*Dolicheremaeus*) (=hammerae)
obsessus [P. (*Neophthiracarus*)]
obsessus (*Scheloribates*)
obsessus [N. (*Steganacarellus*)]
obsessus [M. (*Trimalaconothrus*)]
obsidiana (*Pergalumna*)
obsoleta (*Ctenobelba*) (?=apatomorpha)
obsoleta (*Quadroppia*)
obsoleta (*Rhinoppia*)
obsoleta (*Rhinoppia*)
obsoleta (*Rhinoppia*)
obsoletior (*Hoplophorella*) (=hamata)
obsoletus (*Austrocarabodes*)
obsoletus (*Nothrus*) sp. inq.
obtecta (*Crotonia*)
obtectata (*Crotonia*)
obtectus (*Seteremaeozetes*)
obturatus [P. (*Archiphthiracarus*)]
obtusata (*Allosuctobelba*)
obtusa (*Arcoppia*)
obtusa (*Metabelba*)
obtusa (*Metabelba*)
obtusa (*Notohermannia*)
obtusa (*Notohermannia*)
obtusa (*Suctobelbella*)
obtusinotata (*Paraphauloppia*)
obtusisetus (*Dolicheremaeus*)
obtusus (*Ceratozetes*) (=campestris)
obtusus (*Eurhynchoribates*)
obtusus (*Ghilarovizetes*)
obtusus (*Scheloribates*)
obtusus [P. (*Trianguis*)]
obvia (*Pergalumna*)
obvia (*Pergalumna*)
obvia (*Pergalumna*)
obvia (*Pergalumna*)
obvia (*Pergalumna*)
obvia (*Pergalumna*)
occidentale (*Galumna*) (=alata)
occidentalis (*Ameronothrus*) (=lineatus)
occidentalis [M. (*Calyptozetes*)]
occidentalis (*Carabodes*) pulcher
occidentalis (*Eremaeus*)
occidentalis (*Hermanniella*)
occidentalis (*Karenella*) lanceoseta

occidentalis (*Podacarus*) *auberti*

occidentalis (*Protectoribates*)

occultus (**Campbellobates**)

occultus (*Eupelops*)

occultus (*Neolichthoni*)

occultus (*Phthiracarus*)

occultus (*Xenillus*)

oceanica [**O.** (**Zygoribatula**)]

oceanica [**O.** (**Zygoribatula**)]

oceanica (*Gustavia*)

oceanica (*Gustavia*)

oceanicus (**Liochthonius**)

oceanicus (*Neoribates*)

oceanicus (*Nothrus*)

oceanicus (**Nothrus**)

ocellatus (**Austrocarabodes**)

ocellatus (**Gressittolus**)

ocellatus (*Liacarus*)

ocellatus (**Liochthonius**) (= *hystricinus*)

ocellatus (*Neoliodes*) *sp. inq.*

ocellatus (*Ommatocephus*)

ocellatus (*Ommatocephus*)

ochraceus (*Atropacarus*)

ochthus [**P.** (**Archiphthiracarus**)]

ocotlicus (*Trichoribates*)

octo (*Fenestrobella*)

octocoma (**Oligoppia**)

octofilamentis (**Parhy pochthonius**) (= *aphidinus*)

octogonalis [**C.** (**Phyllocarabodes**)]

octomaculatus (*Eremaeozetes*)

octomaculatus (*Eremaeozetes*)

octomaculatus (**Eremaeozetes**)

octopunctata (**Galumna**) (= *alata*)

octosetosus (*Arthrodamaeus*)

octosetosus (*Hydrozetes*) *lacustris*

octosetosus [**P.** (**Neophthiracarus**)]

ocula (*Hoplophorella*)

ocularis (*Lamellobates*)

odontotus (*Acaroceras*)

oenipontanus [*N.* (*Calyptophthiracarus*)]

oenipontanus (*Carabodes*)

oesziae (*Sellnickochthonius*)

offarostrata (*Ceratoppia*)

officiosus (**Mochlozetes**)

ogawai [**P.** (**Vepracarus**)]

ogawai [**P.** (**Vepracarus**)]

ogilviensis (*Trichoribates*)

oginoi (*Dolicheremaeus*)

oglasae (*Odonotocephus*)

oglasae [*M.* (*Oglasacarus*)]

oglasae (*Ophidiotrichus*)

oglasticola (*Protoplophora*)

ogmos (*Notophthiracarus*) *Nied., 04 (Not.)*

ogmos (*Notophthiracarus*) *Nied., 04 (Arp.) (=venezolanus)*

oharensis [*D.* (*Epidamaeus*)]

ohat (**Phauloppia**) (= *lucorum*)

ohkuboi (**Trichogalumna**)

ohmensis (*Dolicheremaeus*)

ohnishi (*Liochthonius*)

oidematos (**Hoplophorella**)

okinawa (*Eremobelba*)

okinawa (*Eremobelba*)

okinawana (*Galumnella*)

okuyamai (*Mesotritia*)

okuyamai (*Mesotritia*)

olahi (*Cordiozetes*)

olbiopolitanus (*Kaszabobates*)

oleariae (**Mycozetes**)

oligochaeta (**Aethioppia**)

oligotricha (*Protoribotritia*)

oligotricha (*Protoribotritia*)

oligotricha (*Protoribotritia*)

olitor [*D.* (*Epidamaeus*)] *sp. inq.*

olivaceus [*N.* (*Calyptophthiracarus*)]

olivaceus (*Liacarus*) *sp. inq.*

olszanowskii (**Ecuadoribates**)

olszanowskii (**Nothrus**)

olympicus (*Sphaerozetes*)

ominei (*Peloribates*)

omissus (**Chamobates**) (= *schuetzi*)

omittens (**Torpacarus**)

omittens (*Torpacarus*)

omniphagous (**Pergalumna**) (= *emarginata*)

omo (**Carabodes**) (= *granulatus*)

omodeoi [**O.** (**Coronoquadroppia**)] (= *monstruosa*)

ondriasi (*Papillacarus*)

ondriasi (*Papillacarus*)

onkos (**Hoplophorella**)

onondaga (*Limnozetes*)

onondaga (*Limnozetes*)

onubensis (*Passalozetes*)

onustus [*D.* (*Adamaeus*)]

onustus [**D.** (**Adamaeus**)]

opacus [**P.** (**Archiphthiracarus**)] (= *bryobius*)

opacus (*Tegeocranellus*)

operata (*Pergalumna*)

opilioides (*Damaeus*)

opipara (*Oribotritia*)

opiparus [**P.** (**Neophthiracarus**)]

opisthosea [**M.** (**Trimalaconothrus**)]

opistodentata (*Suctobelbella*)

oppiana (**Nosybelba**)

opposita (**Beckiella**)

oppositus [**M.** (**Trimalaconothrus**)] *P. Bal., 97*

oppositus [**M.** (**Trimalacon.**)] *J.P.B., 02 (=oppositus P.B. 97)*

optabilis (**Austrotritia**) (= *saraburiensis*)

optatus (**Tyrphonothrus**) (? = *saxosus*)

optatus (*Truncopes*)

optatus (*Truncopes*)

optivus (**Rhacaplacarus**)

opuntiseta (*Striatoppia*)

opuntiseta (**Striatoppia**)

opuntiseta (*Striatoppia*)

opuntiseta (**Striatoppia**)

orangutan [**O.** (**Acrotocephus**)]

orangutan (*Pseudocarabodes*)

orbicularis (*Sphaerozetes*)

orbicularius (*Gymnodamaeus*)

orbiculata (*Banksinoma*)

orbiculata (*Hermanniella*)

orbiculata (*Peltenuiala*)

orbiculata (*Zetorchella*)

orbiculus (**Orbiculobates**)

ordunensis (*Rhinoppia*)

oregonae (*Camisia*)

oregonensis (*Achipteria*)

oregonensis (*Metrioppia*)

oregonensis (*Oribatella*)

oregonensis (*Oribotritia*)

oreia (*Moritzoppia*)

oresbios (*Ametroproctus*)

oresbios (*Ceratozetella*)

oresbios (*Eremaeus*)

orghidani [**L.** (**Magnobates**)]

orghidani (Multioppia)
oribatelloides (Achipterina)
oribatelloides (Liacarus) (=coracinus)
 orientalis (Arcoppia) fenestralis
orientalis (Arcoppia) fenestralis
orientalis [N. (Besuchetacarus)]
 orientalis (*Bipassalozetes*)
 orientalis (Cavaecarabodes)
 orientalis (Dolicheremaeus)
 orientalis (Dolicheremaeus)
 orientalis (Eremaeus)
 orientalis (Galumna) flabellifera
orientalis (Galumna) flabellifera
 orientalis (Lamellobates)
orientalis (Lamellobates)
 orientalis (Lauroppia)
orientalis (Leptotocephus)
orientalis (Lucoppia) (=burrowsi)
 orientalis (Melanozetes)
 orientalis (Metabelba)
orientalis [P. (Millotacarus)]
 orientalis (Oppia)
 orientalis (Oribatella)
orientalis [E. (Orinchobates)]
 orientalis (Palaeacarus)
orientalis (Parachipteria)
 orientalis (Pseudopyroppia)
orientalis (Pseudotocephus)
orientalis (Truncopes)
 orientalis [T. (Viracochiella)]
orientalis (Zetorchella)
orientata (Oppiella) (=nova)
oriformis (Podoribates)
orixaensis (Muliercula)
orknevensis (Berlesezetes) ornatissimus
orknevensis [B. (Gressittoppia)]
ornamenta (Pergalumna)
 ornamentus (Neoribates)
 ornata (Acrotritia)
ornata (Acrotritia)
 ornata (Apoplophora)
ornata [P. (Baloghates)]
 ornata [F. (Cosmogalumna)]
 ornata (Dissorhina)
 ornata (*Dissorhina*)
ornata (Dissorhina)
 ornata (*Dissorhina*)
ornata (Epilohmannia)
ornata (Eremobelba)
ornata (Gustavia)
 ornata (Jacotella) B. y C., 63
 ornata (*Jacotella*) B. y C., 63
ornata (Jacotella) P.-I., 72 (=neonominata)
ornata (Jacotella) Mah., 79 (=frondeus)
ornata (Magyaria)
 ornata [O. (Monoribatella)]
ornata (Suctobelbella)(=lobata)
 ornata (*Suctobelbella*)
ornata (Suctobelbilla) (=neonominata)
 ornata [O. (Zygoribatula)]
ornatissima (Apoplophora) (=pantotrema)
 ornatissima [P. (Baloghates)]
ornatissima (Exanthoppia)
 ornatissima (*Exanthoppia*)
ornatissima (Hypogeoppia) (?=exempta)
 ornatissima (*Masthermannia*)
 ornatissima (*Suctobelbella*)
 ornatissimus (Berlesezetes)
ornatissimus (Berlesezetes)
 ornatissimus (Berlesezetes)
ornatissimus (Berlesezetes)
 ornatissimus (*Berlesezetes*)
 ornatissimus (Damaeolus)
 ornatissimus (Eupterotegaeus)
 ornatissimus (*Eupterotegaeus*)
 ornatissimus (*Heminothrus*)
ornatissimus (Heminothrus)
ornatissimus [C. (Klapperiches)]
 ornatissimus (*Lepidacarus*)
ornatissimus (Lepidacarus)
 ornatissimus (*Plateremaeus*)
 ornatula (*Pilogalumna*)
ornatula (Pilogalumna)
ornatus (Africoribates)
 ornatus [P. (Archiphthiracarus)]
 ornatus (Carabodes)
ornatus (Charassobates)
 ornatus (Costeremus)
ornatus (Costeremus)
ornatus (Damaeus) (=torquisetosus)
 ornatus (*Dolicheremaeus*)
ornatus (Euphthiracarus)
ornatus (Eueremaeus) (=oblongus)
ornatus [C. (Fernandezbodes)]
ornatus (Fosseremus) (=laciniatus)
 ornatus (*Gymnodamaeus*)
 ornatus (Heptacarus)
ornatus (Mystacozetes)
ornatus [C. (Phyllocarabodes)] (=schatzi)
ornatus (Porrhotegaeus)
ornatus (Scapheremaeus)
 ornatus (Scutovertex)
ornatus (Scheloribates)
 ornatus (Tectoribates)
ornatus (Tectoribates)
ornatus (Xenillus)
ornatus (Zetorchestes)
 ornithorhyncha (*Rhynchobelba*)
ornithorhynchus (Fissicepheus)
 oronii (*Heminothrus*)
 oromurcii (*Diapterobates*)
 oroquietaensis (*Dolicheremaeus*)
orthodactyla (Heteroppia)
 orthogonia (*Camisia*)
 orthogonios (*Liacarus*)
orthogonios (Liacarus)
 ortizi (*Damaeus*)
 ortizi (*Rhacaplacarus*)
 oryzae (*Scheloribates*)
 oryzae (*Scheloribates*)
 oscensis (*Berniniella*) serratiostris
 oscensis (*Scheloribates*) labyrinthicus
 osithchnjukovi (*Phyllozetes*)
osornensis [H. (Capillonostrus)]
 osoyoosensis (*Eueremaeus*)
osunensis (Protoribates)
 ota (Autogneta)
otagoensis (Cultroribula)
otagoensis (Halozetes)
otagoensis (Notophthiracarus)
otaheitensis (Acrotritia) (=curticephala)
othneios (Hoplophorella) (=mahunkai)
otwavensis (Hoplophorella)
 oudemansi (*Achipterina*) Jacot, 29 sp. inq.

palmicincta (Conoppia)
palmicincta (Conoppia)
palmicincta (Conoppia)
palmicincta (Conoppia)
 palmifer (Carabodes)
palmifer (Carabodes)
palmifer (Carabodes)
palmifer (Carabodes)
 palpalis (Protoplophora)
palpalis (Protoplophora)
palpalis (Protoplophora)
 paludicola (Hypochthoniella)
 paludicola (Svalbardia)
paludicola (Svalbardia)
paludis (Hoplophthiracarus) (=illinoisensis)
 palustris (Heterozetes)
palustris (Lamellobates) (=molecula)
 palustris [P. (Minguezetes)]
palustris [P. (Minguezetes)]
 palustris (Nothrus)
palustris (Nothrus)
palustris (Nothrus)
 palustris (Nothrus)
 palustris (Oppiella) nova
palustris (Oribatella)
palustris (Oribatella)
 palustris (Scapheremaeus)
palustris (Scapheremaeus)
palustris (Scapheremaeus)
palustris (Scapheremaeus)
 palustris (Suctobelbella)
palustris (Suctobelbella)
palustris (Zeschelorbates)
panabokkei (Indoribates) (=punctulatus)
 panabokkei (Rhopalozetes)
 panayensis (Dolicheremaeus)
 panayensis (Pergalumna)
pandanensis (Notophthiracarus)
pandanus (Haplacarus)
pandus [P. (Archiphthiracarus)]
 pangasuganensis [O. (Acrotocephus)]
 pankovi [M. (Multilanceoppia)]
 pannonica (Liebstadia)
pannonica (Liebstadia)
 pannonica (Liebstadia)
 pannonica (Oribatula)
pannonicus (Pantelozetes) (=paolii)
pannonicus (Phthiracarus) (=longulus)
 pannonicus (Punctoribates)
 pannonicus (Scutovertex)
 pannosus (Dolicheremaeus)
 pantotrema (Apoplophora)
 pantotrema (Apoplophora)
pantotrema (Apoplophora)
paoliana (Rhinoppia) (=suspectinata)
 paolianus (Heminothrus)
paolianus (Heminothrus)
paoliensis [L. (Dorycranosus)]
paolii [G. (Apograptoppia)] (=foveolata)
paolii (Chamobates) (=schuetzi)
paolii [O. (Coronoquadroppia)] (=monstuosa)
 paolii [R. (Insculptoppia)]
 paolii (Pantelozetes)
paolii (Pantelozetes)
 paolii (Pantelozetes)
 papillaris (Schelorbates)
 papillaris (Taiwanoppia)

papillata (Basilobelba)
 papillata (Striatoppia)
papillata (Striatoppia)
 papillata (Striatoppia)
papillata (Striatoppia)
papillata (Zetorchella) (=pedestris)
 papillatus (Atropacarus)
 papillifer [H. (Tuberemaeus)]
papillifer [H. (Tuberemaeus)]
 papillipes (Metabelba)
papillipes (Metabelba)
 papillisetigera (Corynoppia)
 papillosus [P. (Archiphthiracarus)]
papillosus (Carabodes) (=coriaceus)
 papillosus (Microtegeus)
papineai (Geminoppia)
papua (Acroppia) (=processigera)
papua (Arcoppia) cronus
papua (Heminothrus)
papuana (Crvptobothria)
papuana (Dampfiella)
papuana (Neoamerioppia)
papuana [S. (Ussuribata)]
papuanus [P. (Guineobodes)]
papuanus (Humerobates)
papuanus (Orthozetes)
 papuanus (Reteremulus) aciculatus
papuanus (Reteremulus) aciculatus
papuanus (Yoshiobodes)
 papuensis (Dolicheremaeus)
papuensis (Dolicheremaeus)
papuensis (Eutegaus)
papuensis (Novonothrus)
papuensis (Tyrphonothrus)
papuensis (Symbioribates)
 paraafricanus [E. (Pocsia)]
paraajalueta (Oribotritia)
paraallocotos (Notophthiracarus)
 paraanalis (Graptopia)
paraandinus [N. (Protophthiracarus)]
 paraaokii (Oribotritia)
paraardua (Acrotritia)
parabacilla (Mesoplophora)
 parabadensis (Liebstadia)
parabaloghi [P. (Archiphthiracarus)]
 parabarbatu (Neoribates)
parabellingeri (Austrotritia)
parabilis (Schelorbates)
paraboliviana (Pergalumna)
parabonangensis [P. (Archiphthiracarus)]
 paraborealis (Liacarus)
 parabotrichus [P. (Archiphthiracarus)]
parabrasiliana (Acrotritia)
parabrasiliensis (Euphthiracarus)
parabrevipodus (Schelorbates)
 parabulanovae (Neoribates)
 paracalcicola (Galumna)
paracapillatus (Notophthiracarus)
 paracapucinus (Protoribates)
 paracapucinus (Protoribates)
 paracapucinus (Protoribates)
paracapucinus (Protoribates)
paracarinata (Suctobelbella)
paracarolinae (Oribotritia)
 paracattienica (Pergalumna)
 paracervus (Microtegeus)

- parachichijimensis (Oribotritia)**
parachistiyakovi [L. (Antennoppia)]
paraclavatus (Atropacarus)
paraclaviger (Atropacarus)
paraclericata (Pergalumna)
paraclosteros [P. (Metaphthiracarus)]
paraconsimilis (Indotritia)
paracontraria (Oribotritia)
paracorporaali (Oribotritia)
 paracorynopus (Belba)
paracrispus [P. (Archiphthiracarus)]
paracronadun [N. (Protophthiracarus)]
paracuriosus (Notophthiracarus)
 paracutidens (Suctobelbella)
 paradeciapiens (Kulievia)
paradecoratissima (Pergalumna)
paradikra (Acrotritia)
paradisparilis [E. (Pocsia)]
paradivida (Acrotritia)
paradoxa (Arthrophlophora)
paradoxa (Chavinia)
paradoxa (Galumnella)
 paradoxa (Graptoppia)
 paradoxa (Iberoppia)
 paradoxa (Lohmannia)
 paradoxa (Tuberoppia)
paradoxus [S. (Rafacarus)]
paraduplicornutus [O. (Acrotocepheus)]
paraecuatoriensis (Protoribates)
paraecuatoriensis (Truncozetes)
paraelongata (Pergalumna)
paraendroedyoungai (Notophthiracarus)
paraensis (Hoplophorella)
parafabulosus [R. (Parhynchoribates)]
paraflagellatus (Notophthiracarus)
paraflagellifera (Taiwanoppia)
paraflagelliformis (Mesotritia)
 parafoliata (Ctenobelba)
parafoveolatus (Hoplophthiracarus)
parafrater (Rhacaplacarus)
parafusticulus (Notophthiracarus)
 parafusulus (Euphthiracarus)
paragaveae (Mesoplophora)
parageographica (Galumnella)
 paragibbula (Galumna)
paraglobosus [P. (Archiphthiracarus)]
 paragranulata (Acrotritia)
paraguayensis (Afronthrus) (=incisivus)
paraguayensis (Nasobates) (=spinus)
 paraguayensis (Peloribates)
paraguayensis (Peloribates)
 paraguayensis (Pseudoamerioppia)
paraguayensis (Pseudoamerioppia)
paraguayensis (Torpacarus) omittens
paraguayensis [H. (Urubambates)]
 parahauseri (Microtritia)
 parahirtus (Brachychthonius)
paraincisa (Sternoppia)
paraincognita (Oribotritia)
paraindistincta (Pergalumna)
 parainsularis (Atropacarus)
 parainusitatus [P. (Metaphthiracarus)]
paraitalica [M. (Neobelba)] (=pseudoitalica)
parakazakhstani (Galumna)
parakunsti [E. (Pocsia)]
 paralaevigatus [P. (Archiphthiracarus)]
paralamingtoni [N. (Protophthiracarus)]
- paralargus [N. (Protophthiracarus)]**
paralemuria [H. (Kakophthiracarus)]
paraleviseta [M. (Parplophora)]
paraligneus (Phthiracarus) (=ferrugineus)
parallela [O. (Coronoquadropia)] (=circumita)
 parallela [N. (Nippohermannia)]
 parallela [N. (Nippohermannia)]
 parallelodentata [S. (Flagrosuctobelba)]
parallelos (Acrotritia)
parallelus (Annectacarus)
 parallelus [L. (Dorycranosus)]
 parallelus [L. (Dorycranosus)]
 parallelus (Oribatella)
parallelus (Poecilochthonius)
parallelus (Pseudotocepheus)
parallelus (Tumerozetes)
paralongisetosa (Pergalumna)
 paralongulus (Phthiracarus)
paraluminosus [S. (Perscheloribates)]
 paramachadoi (Allogalumna)
paramachadoi (Rhacaplacarus)
paramacrosacculatus (Neoribates)
paramadagascarensis [P. (Triaunguis)]
paramaigsius [P. (Triaunguis)]
paramastigophora (Galumna)
paraminimicoma [I. (Haplozetes)]
paraminisetosus [P. (Neophthiracarus)]
paramirabilis (Sternoppia)
parananus (Scheloribates)
paranasalis (Brachioppiella)
 paranepalica (Taiwanoppia)
paranetron (Euphthiracarus)
 paranovazealandica (Allogalumna)
paranovazealandiensis (Microtritia)
paraoblongus (Euphthiracarus)
paraocetopunctata (Galumna)
paraparvulus [N. (Steganacarellus)]
parapassimpunctata (Pergalumna)
parapauliani (Notophthiracarus)
 parapectinata (Rhinoppia)
parapilosus [P. (Neophthiracarus)]
 parapinnata (Suctobelbella)
 paraplanus (Sellnickochthonius)
parapocsi [P. (Archiphthiracarus)]
parapolysetosus [P. (Vepracarus)]
 parapulchellula (Ctenobelba)
parapulchellus [P. (Neophthiracarus)] Niedb., 06
parapulchellus [P. (Neophthiracarus)] Nie.16 (=reiteratus)
parapulchra (Mesoplophora)
 parapulverosa (Metabelba)
parapustulatus (Austrocarabodes)
pararadiata [R. (Rectoppia)]
pararafalskii [S. (Rafacarus)]
pararavidus (Notophthiracarus)
parareducta (Teratoppia)
parareductus (Notophthiracarus)
 parareticulata (Acrotritia)
 parareticulatus (Euphthiracarus)
pararidiculus (Notophthiracarus)
 pararotundus (Neoribates)
 pararusseolus (Allonothrus)
parasaucius (Notophthiracarus)
 parascaber (Galumna)
parasensillus (Wallworkoppia)
 parasentus (Notophthiracarus)
paraserrata (Apoplophora)
 paraserratus (Atropacarus)

- parashiptoni* [P. (*Neophthiracarus*)]
 parastigma (*Berniniella*)
parasimilis (*Euphthiracarus*)
 parasiti (*Paralycus*)
 parasomalicus (*Notophthiracarus*)
paraspiculifera (*Acrotritia*)
 paraspinosa (*Apoplophora*)
 paraspinosa (*Oribotritia*)
 paraspinosus [D. (*Epidamaeus*)]
paraspinosus [C. (*Klapperiches*)] (?=*similis*)
 parastenus [H. (*Kakophthiracarus*)]
 parastriculus (*Atropacarus*)
parasufflata [H. (*Varioppia*)]
 parasummersi (*Notophthiracarus*)
 paratanzicus (*Liacarus*)
paratenuis [H. (*Simkinia*)]
 paratina (*Dampfiella*)
 paratinctus (*Notophthiracarus*)
 paratranslamellatus [S. (*Perscheloribates*)]
paratripartita (*Hoplophorella*)
 paratryssos [P. (*Archiphthiracarus*)]
paratropica (*Microtritia*)
 paratsurusakii (*Pergalumna*)
 paratuberculatus (*Neoribates*)
 paratubulus (*Notophthiracarus*)
paratzitzikamaensis [S. (*Perscheloribates*)]
 paraumaetluisorum (*Oribatella*)
paraundulata (*Rhinoppia*)
paraunicarinatus (*Notophthiracarus*)
parausitatus (*Notophthiracarus*)
paravariolosus (*Notophthiracarus*)
paravenezolanus [C. (*Klapperiches*)]
 paravermiseta (*Perxylobates*)
paravesciculus (*Euphthiracarus*)
paravicianus (*Hoplophthiracarus*)
paraweigmanni [M. (*Trimalacothonrus*)]
 paraweni (*Galumna*)
 parayunnanensis [D. (*Epidamaeus*)]
parazeucta (*Galumna*)
 pardinus (*Hoplophorella*)
 parilloi (*Notophthiracarus*)
paripilis (*Neoamerioppia*)
parisi (*Oribatula*) (=interrupta)
 parisiensis (*Hydrozetes*) lacustris
 parittractus (*Ceratozetes*)
parki (*Weigmannia*)
 parmata (*Basilobelba*)
 parmata (*Basilobelba*)
 parmatus [P. (*Archiphthiracarus*)]
 parmeliae (*Mycobates*)
 parmeliae (*Mycobates*)
 particula (*Neoribates*)
 partiocrispa (*Subbelba*)
partita (*Indotritia*)
partita (*Oribotritia*) (=exilis)
partita (*Pelopsis*) (=bifurcata)
 parva (*Allogalumna*)
 parva (*Autogneta*)
 parva [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 parva (*Furcoppia*)
 parva (*Galumna*)
parva (*Graptoppia*) (=neonominata)
 parva (*Pedrocortesella*)
 parva (*Pergalumna*)
 parva (*Rhinoppia*) sp. inq.
 parvialatus (*Schelorbates*)
parviaures (*Oppia*) (=elongata)
 parvilamellatus (*Ommatocephus*)
parvilamellatus (*Protorbates*) (=capucinus)
 parvipilosa (*Synichoritia*)
parviporosa (*Galumna*)
 parvisetiger (*Ghilarovizetes*)
 parvisetigerum (*Neoribates*)
parvoglobosus (*Humerobates*)
parvula (*Galumna*) (=tarsipennata)
 parvula (*Gustavia*)
 parvula [O. (*Monoribatella*)]
parvula (*Porobelba*) Mih., 55 (=spinosa)
parvula (*Porobelba*) Mih., 56 (=spinosa)
parvulus (*Adrodamaeus*) (=siculus)
 parvulus (*Atropacarus*)
 parvulus (*Ceratozetes*)
 parvulus (*Ceratozetes*)
 parvulus (*Paralycus*)
 parvulus (*Scapheremaeus*)
 parvulus (*Scapheremaeus*)
 parvulus (*Schelorbates*)
parvulus [N. (*Steganacarellus*)]
 parvulus (*Transorbates*)
 parvus (*Akansilvanus*)
 parvus (*Eohypochthonius*)
parvus (*Eupelops*) (=occultus)
parvus (*Liacarus*) (?=brevilamellatus)
 parvus [H. (*Monoschelobates*)]
parvus (*Nothrus*) (=pulchellus)
 parvus (*Schelorbates*)
 parvus (*Schelorbates*)
parvus [H. (*Simkinia*)] (=ovalis)
 parvus (*Trichotocephus*)
 parvus (*Umbellozetes*)
parvulevi (*Phauloppia*) (=rauschenensis)
 passimpunctata (*Pergalumna*)
passimpunctatus [P. (*Archiphthiracarus*)] (=pygmaeus)
 patagonica (*Paroppia*)
 patagonica [M. (*Pravoppia*)]
 patagoniensis (*Liochthonius*)
 patakii (*Austrocarabodes*)
 patavina [C. (*Triachipteria*)]
patchlorum (*Heterozetes*) (=aquaticus)
 patella (*Scapheremaeus*)
patella (*Scapheremaeus*)
 patelloides (*Belba*)
 patoi (*Temburongia*)
 patrius [M. (*Calyptozetes*)]
 patruelis [S. (*Tropacarus*)]
 paucesculptus (*Passalozetes*)
pauciareolatus [T. (*Cristonothrus*)]
 paucipectinatus (*Hypochthonius*) rufulus
pauciramosa (*Multioppia*)
 pauciseta (*Taiwanoppia*)
pauciseta (*Taiwanoppia*)
 ?paucisetosa (*Pergalumna*)? sp. inq.
 paucituberculata [S. (*Dyobelba*)]
 paucus [P. (*Archiphthiracarus*)]
 paucus [P. (*Archiphthiracarus*)]
 paucus [P. (*Archiphthiracarus*)]
paucus [P. (*Archiphthiracarus*)]
 paulae (*Antongilibodes*)
 pauliani (*Brachychthonius*)
 pauliani (*Galumnella*)
 pauliani (*Galumnella*)
 pauliani (*Machadocephus*)
 pauliani (*Notophthiracarus*)
 pauliani [H. (*Phyllhermannia*)]

- pauliani (Pseudotocepheus)**
pauliani (Scapheremaeus)
pauliensis (Pergalumna)
pauliensis (Pseudotocepheus)
pauliensis (Scheloribates)
paulista (Hydrozetes)
pauyi (Indotritia)
pauper (Coartobelba)
paupelor (Crotonia)
pavidus [N. (Calypthothiracarus)]
pavidus [N. (Calypthothiracarus)]
pavlovskii [D. (Epidamaeus)]
pavlovskii (Papillacarus)
pawnee (Oribatella)
payatosensillus [E. (Trischeloribates)]
pearcei (Notophthiracarus) sp. inq.
pearsei (Gymnodamaeus)
pecki (Oribotritia)
pectigera (Neoamerioppia)
pectinata (Acrogalumna) sp. inq.
pectinata (Acrotritia) (=americana)
pectinata (Hammerella)
pectinata (Hammerella)
pectinata (Kokoppia)
pectinata (Kokoppia)
pectinata (Lucoppia) (=burrowsi)
pectinata (Mesoplophora) (=michaeliana)
pectinata (Multipulchroppia) Bal. y Mah., 67
pectinata (Multipulchroppia) Aoki, 67 (=siamensis)
pectinata (Nanhermannia)
pectinata (Oribella)
pectinata (Oribella)
pectinata (Schalleria)
pectinata [T. (Teratoppiella)] Bal., 61
pectinata [T. (Teratoppiella)] B. y M., 69 (=pluripectinata)
pectinatus (Bipassalozetes)
pectinatus (Dolicheremaeus)
pectinatus (Eremobodes)
pectinatus (Eremulus)
pectinatus [M. (Phylloohmannia)]
pectinatus (Protoribates) (?=lophothrichus)
pectinatus (Spinozetes)
pectinifera (Belba) sp. inq.
pectiniger (Oxyzetes)
pectinigera (Ctenobelba)
peculiaris (Andesamerus)
peculiaris (Bornebuschia)
peculiaris (Platvamerus)
pedanos [P. (Archiphthiracarus)]
pedanos (Euphthiracarus)
pedanos (Notophthiracarus)
pedemontanus (Chamobates) sp. inq.
pedestris (Zetorchella)
peduncularius (Liochthonius)
pegazzanoae (Cepheus)
pehuen (Gozmanyina)
pellitus (Pheroliodes)
pellucida (Allogalumna)
pellucidus [P. (Archiphthiracarus)]
peloponnesiaca (Dissorhina) ornata
peloptoides (Peloribates)
peloptoides (Peloribates)
peloptoides (Peloribates)
peltifer [H. (Platynothrus)]
peltifer [H. (Platynothrus)]
peltifer [H. (Platynothrus)]
peltifer [H. (Platynothrus)]
- peltifer [H. (Platynothrus)]**
peltifer [H. (Platynothrus)]
peltiferinus [H. (Capillonothrus)] capillatus ssp. inq.
pembertoni (Euscheloribates)
pembertoni (Galumna) australis
pembertoni (Protoribates)
pendula (Pulchroppia)
penetrabilis (Mochlozetes)
penetrabilis (Mochlozetes)
penicillata (Acrotritia) P.-I., 69 (=americana)
penicillata (Acrotritia) Mah., 82 (=koreensis)
penicillata [S. (Flagrosuctobelba)]
penicillata [S. (Flagrosuctobelba)]
penicillatus (Hardybodes)
penicillatus (Hoplophthiracarus)
penicillatus [C. (Klapperiches)]
penicillatus (Scheloribates) (=barbatulus)
penicillifer (Brassella)
penicillifer (Punctizetes)
penicillifer (Punctizetes)
penicilliger (Xenillus)
penicillum (Autogneta)
penicillus [C. (Klapperiches)]
penicillus (Liochthonius)
peniculatus (Carabodes) (=palmifer)
peniculatus (Nippobodes)
peniculus (Phyllochthonius)
pennata (Krivolutskiella)
pennata [O. (Zygoribatula)]
pennata [O. (Zygoribatula)]
pennatus (Rhabdozetes)
penniseta (Suctobelbila)
pentagona (Graptoppia)
pentasacculus (Ecuadoribates)
pentasetarum [C. (Magoebazetes)]
pentasetarum (Novoribatella)
pentasetata [D. (Cylindroppia)]
pentasetosus (Carabodes)
pentatrichus [A. (Uluguroides)]
pepitensis [B. (Gressitoppia)]
pepitensis [B. (Gressitoppia)]
pepitensis (Liochthonius)
peracuta [S. (Flagrosuctobelba)]
peracuta [S. (Flagrosuctobelba)]
peracutus (Scheloribates)
peracutus (Steganacarus) (=sol)
perangustus (Reductobates)
perarmata (Suctobelbella)
perarmatus (Eupelops) (=major)
perates (Mycobates)
perbella (Kuklosuctobelba)
perdentata [N. (Leptosuctobelba)]
peregovitsi (Anomaloppia)
peregrinus (Meriocepheus)
perelegans (Liochthonius)
perennis (Pteroripoda)
perexigua (Mesoplophora) (=michaeliana)
perezi (Galumna)
perezinigo (Annectacarus)
perezinigo (Arcoppia)
perezinigo (Carabodes)
perezinigo (Chamobates)
perezinigo (Cosmochthonius)
perezinigo (Ctenobelba)
perezinigo (Hypogeoppia)
perezinigo (Jacotella) (=frondeus)
perezinigo [L. (Lancelalmoppia)]

- perezinigo (Liacarus)
perezinigo [R. (Mantigueracarus)]
 perezinigo (Nothrus)
 perezinigo (Nothrus)
perezinigo (Notophthiracarus)
 perezinigo (Peloribates)
 perezinigo (Rostrozetes)
 perezinigo (Sphaerozetes)
perezinigo (Steganacarus) (=hirsutus)
 perfecta (Multioppia)
 perfectus (Trichoribates) *sp. inq.*
perfectus [S. (Tropacarus)] (=brevipilus)
perforata (Crotonia)
 perforata (Suctobelbella)
 perforatoides [H. (Tuberemaeus)]
perforatoides [H. (Tuberemaeus)]
 perforatulus (Scutovertex)
 perforatus (Bipassalozetes)
perforatus (Schelorbates)
perforatus (Scutovertex) (=neonominatus)
 perforatus [H. (Tuberemaeus)]
perforatus [H. (Tuberemaeus)]
 perfusorius (Liochthonius)
pergeli (Arcoppia) (=rugosa)
pergrata (Hoplophorella)
 periculosa (Brachioppiella)
 periculosa (Brachioppiella)
 perinfamis (Cyrthermannia) *sp. inq.*
perisi (Anachipteria) (=howardi)
 perisi (Arcoppia)
perisi (Dolicheremaeus)
 perisi (Hoplophorella)
perisi (Schelorbates)
 peristomaticus [P. (Archiphthiracarus)]
 peritus (Ceratozetes)
 peritus (Ceratozetes)
perkinsi (Humerobates)
perkinsi (Phauloppia)
 perlongoides (Birsteinus)
perlongum (Trichoribates) (=longipilis)
 perlongus [Z. (Alpizetes)]
 perlongus (Birsteinus)
perlongus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
perlucidus (Phthiracarus) (=insularis)
perlucundus [N. (Steganacarellus)]
 permirus (Hoplophorella)
permixta [S. (Ussuribata)]
 permixtus (Bipassalozetes) *sp. inq.*
permixtus (Xenillus) (=clypeator)
 permodica (Mesoplophora)
 permodica (Mesoplophora)
 permodica (Mesoplophora)
pernettyae [S. (Campbelloppia)]
perolata (Oppia) (=nitens)
 perona [P. (Nododamaeus)]
 perparvus [N. (Steganacarellus)]
perpendiculata (Suctobelbella) (=acutidens)
perpropinquus [P. (Neophthiracarus)]
 perproxima [C. (Triachipteria)]
 perpusilla (Oribotritia)
perpusillus (Liochthonius) (=brevis)
 perreti (Cavernocarabodes)
 perreti (Dolicheremaeus)
 perreti (Mahnerozetes)
 perreti (Peloribates)
 perrugosa (Eremobelba)
 persetosus (Pseudopirnodus)
- persiangulfi (Rostrozetes)
 persiangulfia (Lauroppia)
 persica (Pergalumna)
 persica (Ramusella)
 persicus (Zetomotrichus)
persimilis [P. (Archiphthiracarus)]
persimilis (Rhacaplacarus) (=somaticus)
 persimilis (Trichoribates)
 persimplex (Phthiracarus)
 personatus (Lamellocephus)
 personatus (Steganacarus) spinosus
 perspicua [O. (Perspicuoppia)]
pertenuis [P. (Archiphthiracarus)]
 pertenuis [M. (Parplophora)] Niedb., 01
pertenuis [M. (Parplophora)] Niedb., 01
pertenuis [M. (Parplophora)] Niedb., 06 (=niedbalai)
perti (Notophthiracarus)
pertineata [L. (Lancelalmoppia)]
 pertrichosa (Pergalumna)
 pertusus (Cepheus) *sp. inq.*
 peruensis (Acrotritia)
 peruensis (Acrotritia)
 peruensis (Aeroppia)
 peruensis (Berlesezetes)
 peruensis (Berlesezetes)
 peruensis [T. (Cristonothrus)]
 peruensis [T. (Cristonothrus)]
 peruensis (Neoribates)
 peruensis (Nothrus)
 peruensis (Nothrus)
 peruensis (Suctobelbila)
 peruensis (Xenillus)
 pervalidus (Notophthiracarus)
 perversus (Atropacarus)
pervicax (Hoplophorella)
pervigens (Rhacaplacarus)
peseki (Dampfiella)
 petalus (Caudamaeolus)
 petalus [J. (Euryacarus)]
peterjaegeri (Eurostocephus)
 petiolata (Laroppia)
 petiti [C. (Triachipteria)]
petri (Ceratozetes) (=simulator)
 petrinjensis (Globozetes)
 petrocoriensis (Microzetes)
 petrofagus (Scutovertex)
 petrohuensis (Austroppia)
 petronia (Maudheimia)
 petrosus (Scapheremaeus)
 petrovae (Umbellozetes)
petrovi (Ceratozetes) (=campestris)
 petrunkevitchi (Hydrozetes)
 peullaensis [B. (Plaesioppia)]
 peyrierasi (Malgachebates)
 phaenotus (Peloptulus)
 phalangioides (Metabelbella)
 phalerata (Apoplophora)
 phaleratus [N. (Protophthiracarus)]
 phaseola (Schalleriella)
 phaseolus (Brazilozetes)
 phasganus [S. (Rafacarus)]
 philippica (Dampfiella)
 philippinensis [O. (Acrotocephus)]
 philippinensis (Allosuctobelba) grandis
 philippinensis (Allozetes)
 philippinensis (Campbellobates)
 philippinensis (Carinogalumna)

- philippinensis (Dolicheremaeus)
philippinensis (Eupelops)
philippinensis (Farchacarus)
philippinensis (Nesiacarus)
philippinensis (Oripoda)
philippinensis [L. (Philippizetes)]
philippinensis (Ramusella)
philippinensis (Schelorbates)
philippinensis (Suctotegeus)
philodendrus (Tuparezetes)
 phitosi (Hauseroplophora)
 phitosi (Liochthonius)
 phitosi (Microzetes)
phongnhae (Austrachipteria)
phoretica (Neoamerioppia)
phoxos (Notophthiracarus)
 "phoxos (Phthiracarus)"
phoxos (Phthiracarus)
phryxothrixus (Xenillus) (=occultus)
phylliferus (Zetorchestes)
phylliferus (Zetorchestes)
phylliformis (Carabodes)
phylliformis (Nothrus)
phylliformis [H. (Phyllhermannia)]
phylliformis [S. (Ussuribata)]
phyllodes [N. (Steganacarellus)]
 phyllophora (Oribatella)
phyllophora [H. (Phyllhermannia)]
 phyllophorus (Atropacarus)
phyllophorus (Atropacarus)
phyllophorus (Machadocephus)
phyllophorus (Neoeutegaeus)
 phyllophorus (Sellnickochthonius)
 phyllophorus (Sphaerochthonius)
phyllophorus (Sphaerochthonius)
 phylloseta (Oxymystroppia)
 phyllosetus (Zetorchestes)
phyllotrichus (Dolicheremaeus)
phymatha (Indotritia)
phymatos (Hoplophorella)
physoseta [M. (Stylozetes)]
phytophilus (Eupelops) (=acromios)
pianmaensis (Cubachipteria)
 picea (Hermanniella)
 picea (Hermanniella)
 picea (Hermanniella)
picipes (Diapterobates) (=humeralis)
picturatus (Austrocarabodes)
 pictus (Scutovertex)
piffli (Arcoppia)
piffli (Eremobelba)
piffli (Heptacarus)
piffli (Lanceoppia)
piffli (Mesotritia) (=nuda)
 piger [P. (Archiphthiracarus)]
 "piger [P. (Archiphthiracarus)]"
pigerrima (Camisia) (=biurus)
 pileatus (Scutovertex)
pileiformis (Nothrus) sp. inq.
pilifera [S. (Flagrosuctobelba)]
pilifera [S. (Flagrosuctobelba)]
pilligera (Liebstadia) sp. inq.
pilipes (Tyrphonothrus)
pilipinus (Eremulus)
pilipinus (Eremulus)
pilipinus (Peloribates)
pilisinopia (Karenella)
- pilosa (Epilohmannia)
pilosa (Galumnella)
 pilosa (Liebstadia)
pilosa (Lucoppia) (=burrowsi)
pilosa [O. (Oxyoppiella)] (=polynesia)
 pilosa (Phauloppia) Koch, 1841
 pilosa (Phauloppia) Koch, 1841
 pilosella (Cenobelba)
pilosella (Condyloppia)
pilosellus (Malaconothrus)
 pilosellus (Pilobates)
pilosellus (Pilobates)
 pilosetosus (Scutovertex)
pilososetosa (Phylloribatula)
 pilososetosa (Suctobelbella) acutidens
 pilososetosus (Mixochthonius)
pilososetosus (Mixochthonius)
pilosus (Africoribates)
pilosus [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
 pilosus (Astegistes)
 pilosus (Bipassalozetes)
pilosus [J. (Euryacarus)]
pilosus [P. (Neophthiracarus)]
 pilosus (Parhypochthonius)
 pilosus (Peloribates)
pilosus (Peloribates)
 pilosus (Schelorbates) *sp. inq.*
pilosa (Trichoribates) (=brevicuspis)
 piluliferus (Neoliochthonius)
piluliferus (Neoliochthonius)
 pinarbasiensis [R. (Insculptoppia)]
pinarensis (Hoplophorella)
pinarensis (Microtritia)
 pinea [O. (Moritzoppiella)]
 pinguis [D. (Epidamaeus)]
pinguis (Rostrozetes)
pinguis (Scapheremaeus)
pinguisetosa (Acrotritia) (=ardua)
 pinguisetus (Peloribates)
pinguisetus (Peloribates)
 pini (Fuscozetes)
 pini [B. (Lanibelba)]
pini [B. (Lanibelba)]
 pinicola (Oripoda)
 pinicola (Oripoda)
pinicola [H. (Phyllhermannia)]
 pinicus (Propelops)
pinicus (Propelops)
 pinifera (Ramusella)
pinatifilis (Hammerella) sp. inq.
pinnatus (Austrocarabodes)
pinnatus (Eutegaeus)
pinnatus (Schelorbates) sp. inq.
pinnigera (Lohmannia)
pinnigera (Suctobelbella)
 pinsapi (Rhinoppia)
 piramidalis (Odontocephus)
pirata [F. (Multifossoppia)]
 pirenaiicus (Carabodes)
piriformis (Belba) (=rossica)
piriformis (Nothrus)
 piriformis (Sphaerozetes)
piriformis (Trichoppia)
 pirinensis (Carabodes)
 pirovaci (Acrotritia)
pisacensis (Paraphauloppia)
pisacensis (Scapheremaeus)

- pisgahi* (*Euphthiracarus*) (=pulchrum)
pistillifer (*Fosseremus*) (=laciniatus)
pitentzin (*Tyrphonothrus*)
piton [N. (*Perezinigokalumma*)]
pius (*Brachychthonius*)
pius (*Brachychthonius*)
planatus (*Belorchestes*)
planeta (*Neosuctobelba*)
planiclava (*Galumna*)
planicornis (*Eupelops*) (?=acromios)
planisetus (*Austrocarabodes*)
planissima [G. (*Monophauloppia*)]
plantivaga (*Domatorina*)
plantivaga (*Domatorina*)
plantivaga (*Domatorina*)
plantivaga (*Domatorina*)
plantivaga (*Domatorina*)
planus [N. (*Besuchetacarus*)]
planus (*Eobrachychthonius*)
planus (*Eobrachychthonius*)
planus (*Heteroleius*)
planus [M. (*Trimalaconothrus*)] *sp. inq.*
platakisi (*Atropacarus*)
platenis (*Hydrozetes*) *sp. inq.*
platenis (*Podoribates*)
platenis (*Podoribates*)
platenis (*Siculobata*) *sicula*
platynota [M. (*Neobelba*)]
platypterus (*Acanthozetes*)
platyrhina (*Ceratozetella*)
platyrhinoides (*Ceratozetella*)
platyrhinus [M. (*Trimalaconothrus*)]
platyrhinus [M. (*Trimalaconothrus*)]
platyrhinus [M. (*Trimalaconothrus*)]
plegados (*Notophthiracarus*)
plenus (*Phthiracarus*)
plesiomorphica (*Nortonbelba*) *italica*
plethotricha (*Umashanchaeviella*)
pletzenae [L. (*Convergoppia*)] (=neonominata)
pletzenae (*Pheroliodes*) (=africanus)
pletzenae (*Pletzenoppia*)
plicata [S. (*Flagrosuctobelba*)]
plicata (*Machuella*) *ventrisetosa*
plicatus (*Eupelops*)
plicatus (*Eupelops*)
plokosus (*Gymnodamaeus*)
plowmanae (*Allogalumna*)
plumalae (*Pergalumna*) *weberi*
plumata [S. (*Flagrosuctobelba*)]
plumata [K. (*Niosuctobelba*)]
plumata [R. (*Paramedioppia*)]
plumata (*Pergalumna*)
plumatus (*Atropacarus*)
plumatus (*Cosmochthonius*)
plumatus (*Cosmochthonius*)
plumatus (*Cosmochthonius*)
plumatus (*Cosmochthonius*)
plumifer (*Plumozetes*)
plumiger (*Spathulocephesus*)
plummeri [O. (*Monoribatella*)]
plumosa [S. (*Flagrosuctobelba*)]
plumosa (*Zetorchella*)
plumosulus (*Yoshiobodes*)
plumosus [T. (*Cristonothrus*)]
plumosus [D. (*Epidamaeus*)]
plumosus (*Eremaeus*)
plumosus (*Halozetes*)
- plumosus* (*Heptacarus*)
plumosus (*Heptacarus*)
plumosus [Z. (*Keralotrichus*)]
plumosus (*Liochthonius*) Mah., 69
plumosus (*Liochthonius*) Chin. y Aoki, 72 (=alius)
plumosus (*Otocephesus*)
plumosus (*Peloribates*)
plumosus (*Sellnickochthonius*)
plumosus (*Yoshiobodes*)
pluosiae [M. (*Sagittabodes*)]
pluripectinata [O. (*Dzarogneta*)]
pluripectinata [T. (*Teratoppiella*)]
pluriseta (*Nanhermannia*) Mah., 84
pluriseta (*Nanhermannia*) Mah., 88 (=sabahensis)
pluriseta (*Pulchropiella*)
plurisetus (*Benoibates*)
plurisetus (*Paradolicheremaeus*)
pluritrichosus (*Balogoizetes*)
pocsi (*Allogalumna*)
pocsi [P. (*Archiphthiracarus*)] (=anonymus)
pocsi (*Eupelops*)
pocsi (*Eurhynchoribates*)
pocsi [B. (*Gressittoppia*)]
pocsi [R. (*Insculptoppiella*)]
pocsi [C. (*Klapperiches*)]
pocsi [M. (*Megazetes*)]
pocsi (*Peloribates*)
pocsi (*Pergalumna*)
pocsi [H. (*Phyllhermannia*)] *sp. inq.*
pocsi (*Suctobelbila*)
pocsiana (*Sternoppia*)
pocorum (*Basidoppia*)
poensis (*Rostrozetes*) *ovulum*
poensis (*Rostrozetes*) *ovulum*
poggii [C. (*Klapperiches*)]
polaris [T. (*Latilamellobates*)]
polaris [T. (*Latilamellobates*)]
polilloensis (*Cavaecarabodes*)
polilloensis (*Oxymerus*)
polilloensis [H. (*Phyllhermannia*)]
polita (*Oxyoppia*)
polita [M. (*Parploffora*)]
polita [M. (*Parploffora*)]
politus (*Ceratoppia*) (=bipilis)
politus (*Eueremaeus*) (=columbianus)
politus (*Rhacaplacarus*) (=eximius)
pollinivorus (*Saxicolestes*)
pollinosus (*Metabelba*) (=pulverulenta)
polonicus (*Amerus*)
polpaicoensis [Z. (*Protozetomimus*)]
polychothomus [L. (*Dorycranosus*)]
polychothomus [L. (*Dorycranosus*)]
polygonalis (*Licneremaeus*)
polygonalis (*Licneremaeus*)
polygonalis (*Licneremaeus*)
polygonalis (*Sphaerozetes*)
polygonalis (*Sphaerozetes*)
polygonalis (*Sphaerozetes*)
polygonata (*Lunoribatula*)
polygonata (*Lunoribatula*)
polygonata (*Neoamerioppia*)
polygonatus (*Afroleius*)
polygonatus (*Papillacarus*)
polygonatus (*Rostrozetes*)
polygonatus (*Schelorbates*)
polygrammus (*Joshuella*)
polynesia [O. (*Oxyoppiella*)]

- polynesia [O. (Oxvoppiella)]
polynesia [O. (Oxyoppiella)]
polynesica (Striatoppia) similis
polynesius (Nesopelops)
polyphyllos (Adhaesozetes)
 polyporetetes (*Carabodes*)
 polyporus (*Galumna*) *sp. inq.*
 polyptychus [M. (*Archegotocephus*)]
 polysetosa [C. (*Aokibelba*)]
 polysetosa [C. (*Aokibelba*)]
 polysetosus (*Neoliodes*)
 polysetosus (*Scapheremaeus*)
 polysetosus [P. (*Vepracarus*)]
 polystriata [H. (*Heterohermannia*)]
polytretos (Euphthiracarus) (=crassisetae)
 polytricha (*Camisia*)
polytrichus [A. (Uluguroides)]
 polytuberculata (*Oribatula*)
 pomboi [D. (*Eudamaeus*)]
 pomboi (*Humerobates*)
 pondoklowii [P. (*Archiphthiracarus*)]
 pontica (*Lasiobelba*)
 ponticula [S. (*Flagrosuctobelba*)]
ponticula [S. (Flagrosuctobelba)]
 ponticuliger (*Scheloribates*)
 ponticus (*Cosmochthonius*)
 ponticus (*Phthiracarus*) *sp. inq.*
ponticus (Scheloribates) (=pallidulus)
pontiger (Carabodes) (=marginatus)
 pontiger (*Ceratobates*)
 pontigera (*Coartobelba*)
 popovi (*Suctobelbila*)
 poppei (*Adoristes*) *ovatus*
 poppei (*Adoristes*) *ovatus*
poppi (Lanceoppia)
 porcella (*Eremobelba*)
 porcella (*Nasozetes*)
 porcellus (*Neoliodes*) *sp. inq.*
 porcinolus (*Dolicheremaeus*)
 porcula (*Meristacarus*)
 porcula (*Meristacarus*)
 porcula (*Meristacarus*)
 pori (*Lasiobelba*)
 pori (*Lasiobelba*)
pori (Lasiobelba)
 porifera (*Arcoppia*)
 poronota (*Trypogalumnella*)
 porosa (*Fenichelia*)
 porosus (*Acaroceras*)
 porosus (*Eremaeus*)
 porosus (*Flagellozetes*)
 porosus (*Haplacarus*)
 porosus (*Javacarus*)
 porosus (*Javacarus*)
 porosus (*Javacarus*)
 porosus (*Nehypochthonius*)
 porosus (*Nehypochthonius*)
 porosus (*Nehypochthonius*)
 porosus (*Nehypochthonius*)
 porosus (*Peloribates*)
 portentosus [P. (*Neophthiracarus*)]
 porticus (*Trhypochthoniellus*)
 porticus (*Trhypochthoniellus*)
 posticus (*Nothrus*) *sp. inq.*
 potchefstroomensis (*Scheloribates*)
praearcuata (Arcoppia)
 praeconcaucus (*Leobodes*)
 praedatoria (*Dometorina*)
 praeincisus (*Scheloribates*)
 praeincisus (*Scheloribates*)
 praeincisus (*Scheloribates*)
 praeincisus (*Scheloribates*)
praeincisus (Scheloribates)
 praeincisus (*Scheloribates*)
 praelineatus (*Scheloribates*)
 praelineatus (*Scheloribates*)
 praeoccupata (*Achipteria*)
praeoccupata [F. (Cosmogalumna)] (=imperfecta)
praeoccupata [S. (Flagrosuctobelba)] (=plumata)
 praeoccupata (*Hoplophorella*)
 praeoccupata (*Oribatula*)
 praeoccupatissimus (*Scheloribates*)
 praeoccupatus (*Dolicheremaeus*)
praeoccupatus (Malaconothrus) (=machadoi)
praeoccupatus [P. (Neophthiracarus)]
 praeoccupatus (*Nothrus*)
praeoccupatus (Peloribates) (=tsengi)
 praeoccupatus [H. (*Platynothrus*)]
praeoccupatus (Scheloribates)
 praeoccupatus [P. (*Triaunguis*)]
 praeoccupatus [P. (*Triaunguis*)]
 praestans [O. (*Moritzoppiella*)]
 praestantissimus (*Scheloribates*)
 praetiosa (*Notogalumna*)
praetiosa (Notogalumna)
 praetritia (*Epilohmannia*)
pragensis (Punctoribates) (=punctum)
 prahuensis [M. (*Trimalaconothrus*)]
 prasadi (*Belba*)
 prasadi (*Christovizetes*)
 pratensis (*Anachipteria*)
pratensis (Mesoplophora) (=cubana)
 pratensis (*Nothrus*)
 pratensis (*Nothrus*)
 pratensis (*Podoribates*)
 prelli (*Suctobelbata*)
 prelli (*Suctobelbata*)
 preptos (*Hoplophorella*)
 presbytis [C. (*Ensicamisia*)]
 pretiosa (*Banksinoma*)
 prima (*Baloghiella*)
 prima [O. (*Zygoribatula*)]
 primorica (*Oppiella*)
 primoricus (*Scheloribates*)
 primus [N. (*Besuchetacarus*)]
 primus (*Papillocephus*)
princeps (Heminothrus) (=targionii)
principalis (Diapterobates) (=reticulatus)
 principalis [S. (*Polyxylobates*)]
prionotus (Protoribates) (=lophothrichus)
 prior (*Liochthonius*)
 prior (*Phthiracarus*) (=longulus)
 prismaticus [T. (*Cristonothrus*)] *sp. inq.*
 problematica (*Erioppia*)
problematica (Moritzoppia) (=incisa)
 problematica (*Topalia*)
 problematicus (*Fijibates*)
problematicus [L. (Haplozetes)] (=vindobonensis)
 problematicus [C. (*Klapperiches*)]
probus [P. (Neophthiracarus)]
 procera (*Dampfiella*)
 procera (*Hoplophorella*)
 procera (*Leptoppia*)
 procera (*Mesotritia*)

- procerus (Carabodes)
procerus (Notophthiracarus) (=niedbalai)
processa (Galumnella)
 processigera (Acroppia)
 processigera (Acroppia)
processigera (Acroppia)
 processus (Anellozetes)
 processus (Ceratorchestes)
processus (Magellozetes)
 processus (Magellozetes)
 processus (Malaconothrus)
 processus (Scheloribates)
 processus [M. (Stylozetes)]
 prodigiosa (Decoroppia)
 prodigiosus (Licneremaeus)
 prodorsissima [O. (Zygoribatula)]
 prodorsocristata (Hoplophorella)
producta [O. (Monoribatella)] (=ornata)
 producta (Rhinoppia)
 profundus (Elliptochthonius)
 prolixus (Notophthiracarus)
 prolongata (Oribatella)
 prolongata (Oribatella)
 promecus (Cryptacarus)
 promecus (Cryptacarus)
 prominens (Aleurodamaeus)
 prominens (Hoplophorella)
prominens (Oripoda)
 prominens (Passalozetes)
 prominens (Passalozetes)
 prominens (Peloribates)
 prominens (Phauloppia)
 prominens (Suctobelbella)
 promissus (Pseudotocephus)
 propexa (Metabelba)
 propinqua (Indotritia)
 propinqua (Metabelba) sp. inq.
 propinqua (Oppiella) nova
propinqua (Pedrocortesella)
 propinqua [O. (Zygoribatula)]
propinquus (Bipassalozetes) (=perforatus)
 propinquus (Licneremaeus) sp. inq.
 propinquus (Liochthonius)
 propinquus (Phthiracarus) boresetosus
 propinquus [H. (Tuberemaeus)]
 prosopis (Parapirnodus)
 prostrata (Dampfella)
 protrusus [N. (Besuchetacarus)]
 protrusus (Euphthiracarus)
 protrusus (Hoplophthiracarus)
protrusus (Neoribates)
 proxima (Acrotritia)
 proximus (Acaronychus)
 proximus (Eueremaeus)
 proximus (Hemileius)
 proximus (Hoplophthiracarus)
proximus (Hoplophthiracarus)
 proximus (Hoplophthiracarus)
 proximus (Tectoribates)
prudens (Trichoribates) (?=angustatus)
 prunum (Carabodes)
 psadilliferus (Stictozetes)
 psammophylus (Brachychthonius)
 psammophylus (Ceratozetes)
 pseudoaciculatus (Papillacarus)
pseudoaciculatus (Papillacarus)
pseudoadilatatus [T. (Cristonothrus)]
 pseudoareolatus (Lamellozetes)
 pseudoareolatus [H. (Tuberemaeus)]
 pseudoauritus (Damaeus)
pseudoborussicus (Nothrus) (=anauniensis)
 pseudobrevisetiger (Nippobodes)
 pseudocallipygus (Torpacarus)
 pseudocarينات [S. (Tropacarus)]
 pseudocircumita [Q. (Coronoquadroppia)]
 pseudocircumita [Q. (Coronoquadroppia)]
pseudocircumita [Q. (Coronoquadroppia)]
 pseudoconfinis (Neotrichoppia)
 pseudocontiguus (Liacarus)
 pseudocorrugata [M. (Pravoppia)]
pseudocorynopus (Belba) (=patelloides)
pseudocostulata (Brachioppia) (=deliciosa)
 pseudofurcatus (Acaroceras)
 pseudofurcatus (Dolicheremaeus)
 pseudofurcatus (Rostrozetes)
 pseudofusiger (Minunthozetes)
 pseudoglabra (Multioppia)
pseudohigginsii [B. (Gressittoppia)]
 pseudohystricinus (Liochthonius)
 pseudoimmaculatus (Brachychthonius)
 pseudoitalica [M. (Neobelba)]
pseudojacoti (Neoribates)
 pseudokhoii (Galumna)
 pseudolamellatus (Malaconothrus)
 pseudolaticeps (Verachthonius)
pseudomaculatus (Ameronothrus) (=maculatus)
 pseudomahnerti (Ctenobelba)
 pseudomargaritata (Pergalumna)
 pseudomediocris (Ceratozetes)
 pseudomochlosimularis (Scheloribates)
 pseudonigra [O. (Multoribatella)]
 pseudonodosa [H. (Heterohermannia)]
 pseudoornatissima (Suctobelbella)
 pseudopapillipes (Neobelba)
 pseudoporosus (Peloribates)
 pseudoprincipalis (Scheloribates)
 pseudoreticulatus (Alismobates)
 pseudoreticulatus (Austrocarabodes)
 pseudoreticulatus (Scapheremaeus)
 pseudornata (Suctobelbella)
pseudosculptus (Eupterotegaeus) (?=ornatissimus)
 pseudosejugalis (Pergalumna)
 pseudosetosus (Fuscozetes)
 pseudosetosus (Fuscozetes)
 pseudosomalicus (Rhacaplacarus)
pseudotatricus [D. (Epidamaeus)] (=atricus)
 pseudotriquetra (Galumna)
 pseudotuberculatus (Notophthiracarus)
 pseudoturcmenica (Lohmannia)
 pseudovermiseta (Sicaxylobates)
 psyla (Basidoppia)
 pterata (Pilogalumna) (=ornatula)
 pterinervis (Pergalumna)
 pterinervis (Pergalumna)
pterolineata [G. (Indogalumna)]
 pterota (Hafenrefferia) (=gilvipes)
 pterotus Neoribates
 pterygoides (Totobates)
 pubescens (Krivolutskiella)
 pubescens (Scheloribates)
 pudicus (Phthiracarus)
 puella (Epilohmannia)
 puella (Epilohmannia)
 puertoinceensis (Rhynchoppia)

- puertomontensis* (*Oribatella*)
 puertomontensis (Ramusella)
puertomontensis (Ramusella)
puertomontensis (Ramusella)
puertomontensis (Ramusella)
pugio (*Acaroceras*)
 pulchella (Eremella)
pulchella (*Eremobelba*)
 pulchella (*Galumnella*)
 pulchella [H. (*Heterohermannia*)]
pulchella (*Phylloribatula*)
pulchella (*Rohria*)
pulchella (*Suctobelbila*)
 pulchellula (*Ctenobelba*)
 pulchellus (*Dendracarus*)
pulchellus (*Eupelops*) (=tardus)
pulchellus [P. (Neophthiracarus)]
 pulchellus (*Nothrus*) Berl., 10
pulchellus (*Nothrus*) Tseng, 82 (=praeoccupatus)
pulchellus (*Scapheremaeus*)
 pulcher [L. (*Dorycranosus*)]
pulcher (*Holonothrus*)
 pulcher [C. (*Klapperiches*)]
pulcher (*Malaconothrus*) Mih., 57 (=monodactylus)
pulcher (*Malaconothrus*) Ham., 61 (=neonominatus)
pulcher (*Pareutegaeus*)
 pulcherrima (*Magyaria*)
 pulcherrimus (*Cosmopirnodus*)
pulcherrimus (*Cosmopirnodus*)
 pulcherrimus (*Licnodamaeus*)
pulcherrimus (*Ommatocephus*) (=ocellatus)
pulcherrimus (*Rostrozetes*) (=ovulum)
pulcherrimus (*Trichthonius*)
pulcherrimus (*Trichthonius*)
 pulcherrimus [S. (*Tropacarus*)] carinatus
 pulchra (Belba)
 pulchra (*Carinabella*)
pulchra (*Crotonia*)
 pulchra [O. (*Monoribatella*)]
 pulchra (*Multioppia*)
 pulchra [M. (*Parliphora*)]
 pulchra [M. (*Parliphora*)]
 pulchra (*Pedrocortesella*)
pulchra (*Pedrocortesella*)
pulchra (*Pedrocortesella*)
 pulchra [H. (*Phyllhermannia*)]
 pulchra (*Suctobelbella*) sp. inq.
 pulchra (*Veloppia*)
pulchra (*Veloppia*)
pulchritude (*Cavaecarabodes*)
pulchrum (*Euphthiracarus*)
 pulla (*Austrachipteria*)
pulla (*Oribotritia*)
pulleni (*Scapheremaeus*)
 pullus (*Notophthiracarus*)
pulverosa (*Metabelba*) (=pulverulenta)
 pulverulenta (*Metabelba*)
 pulverulenta (*Metabelba*)
pulvillifer (*Cymbaeremaeus*) (=cymba)
 pulvillus (*Xenillus*)
pumila (*Oribotritia*)
 pumila (*Suctobelbella*)
 pumilatus (*Nothrus*)
pumilis (*Tumerozetes*)
pumilus (*Notophthiracarus*)
pumularis (*Trichogalumna*)
 punctata (*Adoribatella*)
 punctata (*Brachyoriopoda*)
punctata (*Gittella*)
punctata [L. (Incabates)]
punctata (*Moritzoppia*) (=clavata)
punctata (*Oribatella*)
punctata (*Oripoda*)
 punctata (*Parachipteria*)
 punctata (*Parachipteria*)
punctata (*Parachipteria*)
punctata (*Pergalumna*) (=retalata)
 punctata [H. (*Phyllhermannia*)]
 punctata (*Suctobelbata*)
 punctata (*Suctobelbata*)
punctata (*Trichogalumna*)
 punctatus [O. (*Acrotocephus*)]
 punctatus [M. (*Calyptozetes*)]
 punctatus [M. (*Calyptozetes*)]
 punctatus (*Constrictocephus*)
 punctatus (*Dolicheremaeus*)
punctatus (*Eremulus*)
 punctatus (*Hoplophthiracarus*)
punctatus (*Nesopelops*)
 punctatus [H. (*Platynothrus*)]
 punctatus [H. (*Platynothrus*)]
punctatus (*Pseudotocephus*)
punctatus (*Rostrozetes*)
 punctatus (*Rostrozetes*)
 punctatus (*Scutovertex*)
punctatus (*Tectoribates*) (=proximus)
 punctatus (*Tegeocranellus*)
punctatus [P. (*Triaunguis*)]
 punctatus [P. (*Triaunguis*)]
 punctatus (*Trichoribates*)
punctatus [H. (*Tuberemaeus*)] (=neonominatus)
punctatus [H. (*Urubambates*)]
 punctatus [P. (*Vepracarus*)]
 punctatus [P. (*Vepracarus*)]
punctillata (*Suctobelbila*)
punctipennis (*Galumnella*)
 punctocostulata (*Suctobelbila*)
punctulata (*Hermanniella*) (=picea)
 punctulata (*Multipulchroppia*) schauenbergi
punctulata (*Oribatella*) sp. inq.
 punctulata (*Pergalumna*)
punctulata (*Pilobatella*)
 punctulata (*Pilobatella*)
 punctulatus (*Atropacarus*)
 punctulatus [L. (*Dorycranosus*)]
punctulatus (*Euphthiracarus*) Berl., 13 (=cribrarius)
 punctulatus (*Euphthiracarus*) Jac., 30
 punctulatus (*Hispanozetes*)
 punctulatus (*Indoribates*)
punctulatus (*Malaconothrus*) Ham., 52 (=monodactylus)
punctulatus (*Malaconothrus*) Bal., 58 (=machadoi)
 punctulatus (*Proteremaeus*)
punctulatus *Neoribates*
punctulatus (*Rostrozetes*) (=ovulum)
punctulatus (*Steganacarus*) (=personatus)
 punctulatus (*Tectocephus*)
 punctulatus (*Xenillus*) sp. inq. Banks, 1895
punctulatus (*Xenillus*) J. y P. B., 1984 (=neonominatus)
punctulifer (*Rostrozetes*) (=ovulum)
 punctum (*Punctoribates*)
 punctum (*Punctoribates*)
 punctum (*Punctoribates*)
punctum (*Punctoribates*)

- punctus** [M. (Trimalaconothrus)]
pundamiliensis (Scapheremaeus)
puriceus (Trhypochthoniellus) (=longisetus)
puntaarenasensis (Pseudotocepheus)
pupula [L. (Lagenobates)] (?=lagenula)
puritanicus [D. (Epidamaeus)]
 puritanicus [D. (Epidamaeus)]
 purpurarius [C. (Klapperiches)]
puruczkyi [H. (Tuberemaeus)]
 purvisi (Malaconothrus)
pusilla (Galumna)
pusilla (Mesoplophora)
pusilla (Oribatella)
pusillus (Allozetes)
pusillus (Allozetes)
 pusillus (Chamobates)
 pusillus (Diapterobates)
 pusillus (Gymnodamaeus)
 pusillus (Liochthonius)
pusillus (Phthiracarus)
pusillus (Phthiracarus)
pustulata [O. (Dzarogneta)]
pustulata [H. (Kakophthiracarus)]
 pustulata (Reticuloppia)
pustulatus (Cepheus) sp. inq.
 pustulatus (Dolicheremaeus)
 pustulatus (Limnozetes)
pustuloreticulatus (Austrocarabodes)
 putinglupa (Dampfiella)
 putinglupaensis [P. (Trianguis)]
puyeu (Novonothrus)
pylaerti [P. (Archiphthiracarus)]
 puzanovi (Epimerella)
pymaireneri (Crotonia)
pygiseta (Uracrobates)
pygmaea (Heterogalumna)
 pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
pygmaeus [P. (Archiphthiracarus)]
 pygmaeus (Malaconothrus)
pygmaeus (Malaconothrus)
 pygmaeus (Malaconothrus)
pygmaeus (Pseudotocepheus)
pyramidalis (Neoliodes)
 pyramidalis (Neoribates)
 pyramidalis (Trizetes)
 pyrenaica (Cerachipteria)
 pyrenaica (Hungarobelba)
 pyrenaicus [D. (Epidamaeus)]
 pyrenaicus (Microzetes)
pyri (Galumna) (=flabellifera)
 pyriiformis (Allonothrus)
pyriformis (Machuella) ventrisetosa
 pyriformis (Truncopes)
pyrigerum (Adoristes) (=ovatus)
 pyrigerus (Paralycus)
pyrostigmata [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
 qianensis (Trhypochthoniellus)
 qinlingensis (Gymnodampia)
quadracantha (Camisia) (=spinifer)
 quadrangulus (Carabodes)
quadrata [S. (Flagrosuctobelba)]
quadrata (Lamellarea)
 quadriareatus (Minunthozetes)
- quadrucarina** [S. (Flagrosuctobelba)] (=elegantula)
quadrucarinata (Austrotritia)
 quadrucarinata (Quadroppia)
 quadrucarinata (Quadroppia)
quadrucarinata (Quadroppia)
 quadrucarinata (Quadroppia)
 quadricaudicula (Jacotella)
quadricornis [L. (Paralamellobates)]
 quadricornuta (Bicyrthermannia)
 quadricornuta (Oribatella)
 quadricornuta (Oribatella)
quadricornutus (Hymnozetes)
 quadricuspidatus (Cultrobates)
quadricuspis (Oribatella) (?=quadricornuta)
 quadridentata (Achipteria)
quadridentata (Austrachipteria)
quadridentata (Austrogneta)
 quadridentata (Ceratoppia)
 quadridentata (Ceratoppia)
 quadridentata (Ceratoppia)
 quadridentata (Nanhermannia)
quadridentata (Nanhermannia)
 quadridentata (Oribatella)
 quadridentata (Oribatella)
quadridentatus (Phylacozetes)
 quadrifasciatus (Mixacarus)
 quadrifoveolata [O. (Oxyoppiella)]
quadrilhastatus [D. (Spatiodamaeus)] (=verticillipes)
 quadrilamellatus (Eueremaeus) oblongus
 quadrilamellatus (Eueremaeus) oblongus
 quadrilineata (Striatoppia)
quadrilineatus (Scapheremaeus)
 quadrilineatus (Schizozetes)
quadrilineatus (Schizozetes)
 quadrilobatus (Sphaerozetes)
 quadrilobatus (Sphaerozetes)
 quadrimaculata (Allogalumna)
 quadrimaculata [S. (Lalmoppia)]
quadrimumcronata (Oribatella) (=eutricha)
quadrupertitus (Fosseremus) (=laciniatus)
 quadripilis (Hemileius)
quadrripilosa (Elaphoppia)
 quadrripilosa (Elaphoppia)
 quadrripilus [L. (Haplozetes)]
quadrripilus [L. (Haplozetes)]
 quadrripilus (Nothrus)
quadrripilus (Nothrus)
 quadrriporosa [G. (Porogalumnella)]
quadrriporosa [G. (Porogalumnella)]
 quadrireticulatus (Scapheremaeus)
 quadriritunda [H. (Phyllhermannia)]
quadriseriata [H. (Heterohermannia)] (=reticulata)
quadriseriatus (Steganacarus) (?=applicatus)
 quadriseta [L. (Antennoppia)]
 quadriseta (Gymnodamaeus)
quadrisseta (Sternoppia)
 quadrissetosa (Metrioppia)
quadrissetosa (Oppia) sp. inq.
quadrissetosa (Paraphauloppia)
 quadrissetosa (Quadroribula)
quadrissetosa (Quadroribula)
quadrissetosus (Microtegeus)
 quadrissetosus (Microtegeus)
quadrissetosus (Microtegeus)
 quadrissetosus (Neoribates)
quadrispinata (Oribatella)
quadristriatus (Microtegeus)

- quadristriatus (Microtegeus)*
quadristriatus [H. (Platynothrus)] Ham., 58
quadristriatus [H. (Platynothrus)] C.K. 78 (= *praeoccupatus*)
quadrutuberculata (Lauropia) (=marginedentata)
quadrutuberculata (Rugoppia)
quadrutuberculatus [D. (Spatiodamaeus)]
quadrivertex (Zachvatkinibates)
quadrivertex (Zachvatkinibates)
quadrus [N. (Besuchetacarus)]
quagesetosa [P. (Ausrribula)]
quasidivida (Acrotitia)
quasigaveae (Mesoplophora)
quasiminisetosus [P. (Neophthiracarus)]
quasimodo (Selenoribates)
quasisimilis (Notophthiracarus)
quasisomalicus (Notophthiracarus)
quasitakahashii (Eupthiracarus)
quasiuluguruensis (Notophthiracarus)
quateorum [O. (Acrotocephus)]
quaternarius [R. (Mantigueracarus)]
quathlambae [G. (Stenoppia)]
quattuor (Setoppia)
quatuor (Neosuctobelba)
queenslandensis (Notophthiracarus)
queenslandiae (Crotonia)
queenslandica (Hoplophorella) (=singularis)
queenslandica (Novazelandiella)
quezonensis (Dolicheremaeus)
quezonensis (Galumnella)
quezonensis [S. (Perschelorbates)]
quezonensis [S. (Perschelorbates)]
quezonica (Heterobelba)
quietus (Notophthiracarus)
quindecim (Topobates)
quinquecostata (Parasuctobelba)
quinquedentata [S. (Flagrosuctobelba)]
quinquenodosa (Suctobelbila)
quinquenodosa (Suctobelbila)
quinquenodosa (Zeasuctobelba)
quinquepilosa (Graptoppia) (=paraanalis)
quinquesetosa (Cultroribula)
quintus (Schelorbates) laevigatus
rabacalensis [P. (Metaphthiracarus)]
rabori (Epilohmannoides)
rabus (Notophthiracarus)
rachii (Machadocephus)
racovitzae [L. (Dorycranosus)] (?=acutus)
raczi (Microzetes)
radiata (Arcoppia)
radiata (Multioppia)
radiata (Multioppia)
radiata (Multioppia)
radiata (Pilogalumna) (=tenuiclava)
radiata [R. (Rectoppia)]
radiata [R. (Rectoppia)]
radiata [H. (Varioppia)]
radiatus (Cubabodes)
radiatus (Eutegaeus)
radiatus [C. (Klapperiches)]
radiatus [N. (Protophthiracarus)]
radiatus [N. (Protophthiracarus)]
radiatus (Pseudotocephus)
radula (Eurhynchoribates)
rafaelius (Mexiceremus)
rafalskii [P. (Archiphthiracarus)] (=cognatus)
rafalskii (Notophthiracarus)
rafalskii (Berniniella) (=hauseri)
rafalskii (Hoplophorella)
rafalskii [H. (Kakophthiracarus)]
rafalskii (Kokoppia)
rafalskii (Oribotritia)
rafalskii [S. (Rafacarus)]
rafalskii (Rhacaplacarus)
rafalskii (Tyrphonothrus)
rafflesiae [O. (Acrotocephus)]
rajskii (Brachioppiella)
rakhali (Schelorbates)
ramensis [T. (Cristonothrus)]
rameus [C. (Aokibelba)]
ramifera (Pulchroppia)
ramifera (Pulchroppia)
ramirezae [P. (Vepracarus)]
ramirezi [H. (Bornemiszaella)]
ramiseta (Ramuloppia)
ramiseta (Ramuloppia)
ramiseta (Congoppia)
ramosa (Brachioppiella)
ramosa [S. (Flagrosuctobelba)]
ramosa (Pseudobrachioppiella)
ramosa (Schalleria)
ramosus (Cepheus) sp. inq.
ramosus (Neoliodes)
ramosus (Neoliodes)
ramosus [S. (Plenoxylobates)]
ramosus (Trhypochthoniellus)
ramosus [P. (Vepracarus)]
ramsayi (Austrotritia)
ramsavi (Crotonia)
ramsavi (Lanceoppia)
ramsavi (Notophthiracarus)
ramulifera [M. (Furculoppia)] (=furcata)
ramulifera [R. (Insculptoppia)]
ramulosus (Ctenamerus)
rangifer (Arcoppia)
rangifera (Multioppia)
rangiroaensis (Hoplophorella)
rangiroaensis (Pelorbates)
rangiroaensis (Pelorbates)
ranokaoensis (Sabacarus) (=corneri)
ranomafanensis [P. (Archiphthiracarus)]
rapaensis (Eupelops)
rapax (Notophthiracarus)
rapoportii (Poecilochthonius) (=spiciger)
rara (Ceratoppia)
rara (Metabelba)
rara [O. (Perspicuoppia)]
rarisetosa [F. (Mexicoppia)]
rarisetosus (Licnodamaeus)
rarisetosus [P. (Montizetes)]
rartuberculatus [B. (Lanibelba)]
raris (Singabodes)
rasile (Acrotitia) (=sinensis)
rasilis [G. (Indogalumna)]
rasilis [G. (Indogalumna)]
rastelligera (Rastellobata)
rastratus [C. (Xiphobates)]
rattura [L. (Lancelamoppia)]
ratubakensis (Pelorbates)
raulti (Paralycus)
rauschenensis (Phauloppia)
rauschenensis (Phauloppia)
rausensis (Trichoribates)
rausensis (Trichoribates)
ravenala [L. (Lancelalmoppia)]

- raveni (Crotonia)
ravidus (Notophthiracarus)
 rawisensis (Dolicheremaeus)
 raychaudhurii (Hoplophorella)
 razdolnicus (Euphthiracarus)
 recasensis (Damaeus)
 recenfesevpi (Aleurodamaeus)
 recta (Beckiella)
 recta (Oribotritia)
 recta (Pilogalumna) tenuiclava
 rectangularis [C. (Cyrtozetes)]
rectisetosus [P. (Archiphthiracarus)] (=montanus)
rectosetosus (Hypochothionius) (=luteus)
 rectus (Euphthiracarus)
rectus (Hemileius)
 rectus (Podoribates)
 rectus (Scheloribates)
 rectus (Scheloribates)
 rectus (Scheloribates)
 rectus (Tyrphonostrus)
 recursa (Mesotritia)
 redempta (Ceratozetella)
reducta [P. (Ermilovia)]
reducta (Hoplophorella) (=repetita)
 reducta (Leptogalumna)
reducta (Oribatella)
 reducta [G. (Porogalumnella)]
 reducta (Teratoppia)
 reductus [L. (Afroliochothionius)]
 reductus (Benoiabates)
 reductus (Benoiabates)
 reductus (Biroabates)
reductus (Biroabates)
reductus (Notophthiracarus) (=parareductus)
reductus (Ozacarus)
 reductus (Papillocephus)
reductus (Phthiracarus)
reductus [H. (Platynostrus)]
 reductus [N. (Steganacarellus)]
 reductus (Vilhenabates)
redux (Achipteria) (=coleoprata)
 reevesi (Ceratozetella)
 reevesi [S. (Dyobelba)]
reevesi (Eueremaeus) (=columbianus)
 reevesi [G. (Naiazetes)]
 reevesi [G. (Naiazetes)]
refracta (Acrotritia)
 refracta (Acrotritia)
refracta (Acrotritia)
 refracta (Acrotritia)
 regalis (Achipteria) sp. inq.
regalis (Hoplophorella) (=singularis)
 regalis (Lohmannia)
 regalis [T. (Teratoppiella)]
regeli (Liacarus) (=matshabelii)
 regia (Suctobelba)
 rehmabia (Lepidacarus) ornatissimus
reiterata (Galumna) (=coreana)
reiteratus [P. (Neophthiracarus)]
 reiteratus [S. (Perscheloribates)]
 relictus [S. (Rafacarus)]
 remigera (Hoplophorella)
 remigera (Malacoangelia)
 remigera (Malacoangelia)
 remigera (Malacoangelia)
remigera (Malacoangelia)
 remigera (Malacoangelia)
- remota (Apoplophora) (=pantotrema)
 remota (Cubachipteria)
remota [R. (Insculptoppia)]
 remota (Lasiobelba)
 remota (Lasiobelba)
 remota (Pergalumna)
remota (Pergalumna)
remotus (Notophthiracarus)
 remotus (Torpacarus)
 remyi (Ramusella)
 reniformis [O. (Acrotocephus)]
reniformis (Pergalumna)
 renukae (Dolicheremaeus)
 renukae (Eremulus)
 repetita (Hoplophorella)
 repetita (Oribatula)
repetitivus (Scheloribates)
repetitus (Dolicheremaeus)
 repetitus (Hoplophthiracarus)
repetitus [P. (Neophthiracarus)]
 ¿repetitus (Peloribates)?
 repetitus (Peloribates)
 repetitus (Scheloribates)
 repetitus [M. (Trimalaconothrus)]
 repetitus [M. (Trimalaconothrus)]
 replazamentica (Hydrozetes) sp. inq.
repostus (Notophthiracarus)
 restata (Cycloppia)
 restata (Cycloppia)
restrictus [P. (Metaphthiracarus)] (=brevisetae)
 retalata (Pergalumna) nervosa
 retalteca (Indotritia) sp. inq.
 retestriatus (Scapheremaeus)
 rethejumi (Mystroppia)
 retiaria (Basilobelba)
 retiaria (Basilobelba)
 retiaria (Basilobelba)
 retiaria (Basilobelba)
 reticularis (Steganacarus)
 reticulata (Acrotritia)
 reticulata (Anakingia)
reticulata (Brassiella) (=neonominata)
 reticulata [C. (Caucasiobelba)]
reticulata (Crotonia)
 reticulata (Dudichoplophora)
reticulata (Galumna)
 reticulata (Hermannia)
 reticulata [H. (Heterohermannia)]
 reticulata [H. (Heterohermannia)]
 reticulata (Hoplophorella)
 reticulata (Jacotella)
 reticulata (Lohmannia)
reticulata (Lucoppia) (=feideri)
 reticulata (Magyaria)
 reticulata (Oribatella)
 reticulata (Oribatella)
 reticulata (Pedrocortesella)
reticulata (Reticuloppia)
 reticulata (Sternoppia)
 reticulata (Suctobelba)
 reticulata (Synichotritia)
 reticulata [T. (Teratoppiella)]
 reticulata [S. (Ussuribata)] Ham., 82
reticulata [S. (Ussuribata)] Chin., 03 (=chinonei)
 reticulata (Zetorchella)
 reticulatoides (Oribatella)

- reticulatoides* (*Oribatella*)
 reticulatoides (*Suctobelbella*)
reticulatus (*Adelphacarus*)
 reticulatus (*Alismobates*)
reticulatus (*Alismobates*)
reticulatus (*Allonothrus*) *russeolus*
reticulatus (*Allonothrus*) *russeolus*
 reticulatus (*Arthrodamaeus*)
 reticulatus (*Bipassalozetes*)
reticulatus (*Bulleremaeus*)
 reticulatus (*Carabodes*)
 reticulatus [A. (*Coropoculia*)]
reticulatus [A. (*Coropoculia*)]
 reticulatus (*Cosmochthonius*)
reticulatus (*Cosmochthonius*)
reticulatus (*Cosmochthonius*)
 reticulatus (*Diapterobates*)
reticulatus (*Diapterobates*)
reticulatus (*Eremaozetes*)
 reticulatus (*Eupelops*)
 reticulatus (*Euphthiracarus*) Berl., 1913
reticulatus (*Euphthiracarus*) Niedb., 2004 (= *arilloi*)
reticulatus (*Heptacarus*)
reticulatus (*Heptacarus*)
reticulatus (*Hymenozetes*)
 reticulatus [M. (*Inigozetes*)]
reticulatus (*Lamellobates*)
 reticulatus (*Liacarus*)
reticulatus (*Licnocephus*)
reticulatus [C. (*Magoebazetes*)]
 reticulatus (*Microtegeus*)
reticulatus (*Microtegeus*)
reticulatus (*Nesiacarus*)
 reticulatus (*Nothrus*)
 reticulatus (*Ommatocephus*)
 reticulatus (*Peloptulus*)
reticulatus (*Peloribates*)
reticulatus (*Pheroliodes*)
reticulatus (*Reticulocephus*)
reticulatus (*Rhacaplacarus*)
 reticulatus (*Scapheremaeus*)
reticulatus (*Scheloribates*)
reticulatus (*Torpacarus*)
 reticulatus (*Trhypochthoniellus*)
reticulatus [M. (*Trimalaconothrus*)] Bal., 58 *sp. inq.*
reticulatus [M. (*Trimalaconothrus*)] Yam., 77 (= *repetitus*)
 reticulatus (*Unguizetes*)
reticulatus (*Unguizetes*)
 reticulatus (*Zetorchestes*)
reticulofemorata (*Beckiella*)
 retilia (*Ceratoppia*)
retractus (*Caleremaeus*)
retorsus [N. (*Phthirarica*)]
 retroversa (*Pergalumna*) *intermedia*
retusa (*Indotritia*)
retusa (*Indotritia*)
reunionensis (*Nothrus*)
 reyesi (*Dolicheremaeus*)
rhachis (*Notophthiracarus*)
 rhadamanthus (*Gehypochthonius*)
rhadamanthus (*Gehypochthonius*)
rhadamanthus (*Gehypochthonius*)
rhadamanthus (*Gehypochthonius*)
rhadamanthus (*Gehypochthonius*)
rhamphosus (*Eupterotegaeus*)
 rhinina [R. (*Rectoppia*)]
 rhinoceros [G. (*Kabylogalumna*)]
- rhodopeia [M. (*Neobelba*)]
rhomboides [P. (*Trianguis*)]
rhopalota (*Acrotritia*)
 ribagai (*Eulo hmannia*)
ribagai (*Eulo hmannia*)
 ribagai (*Eulo hmannia*)
ricknuttalli [B. (*Gressittoppia*)]
ridiculus [N. (*Phthirarica*)]
riezuae (*Acrotritia*) (= *curticephala*)
rigida [L. (*Antennoppia*)] *sp. inq.*
rigida (*Hermanniella*) *subnigra*
rigidicoma (*Peloribates*)
rigidiseta (*Lanceoppia*)
rigidisetosus (*Liochthonius*)
 rigidisetosus (*Scheloribates*)
rigidisetus (*Eremulus*)
rigidus [P. (*Trianguis*)]
rileyi (*Mycobates*) *sp. inq.*
rimachensis (*Rostrozetes*)
 rima (*Pergalumna*)
 rimandoi (*Dolicheremaeus*)
rimi (*Notophthiracarus*)
rimosa [P. (*Bigalumna*)]
rimosus (*Austrocarabodes*)
rimosus (*Austrodamaeus*) (= *elegantulus*)
 rimosus (*Carabodes*)
 rimosus (*Carabodes*)
 rimosus (*Eremulus*)
rimosus (*Hoplophthiracarus*) (= *kugohi*)
 rimosus (*Microtegeus*)
 rimosus (*Neoribates*)
ringueleti (*Hydrozetes*)
ringwoodensis (*Dentachipteria*)
rioensis (*Protoribates*)
rioyuyapichisensis [R. (*Rhynchoribatodes*)]
 riparius (*Damaeus*)
 riparius (*Thalassozetes*)
ritza [O. (*Coronoquadroppia*)] (= *media*)
 riyadihensis (*Scheloribates*) *sp. inq.*
 rizali (*Kalayaan*)
 rjabini (*Hexachaetoniella*)
 robertsi [N. (*Steganacarellus*)]
 robertsi [N. (*Steganacarellus*)]
robinsoni (*Eurhynchoribates*)
robensis (*Pheroliodes*)
 robusta (*Arcoppia*)
 robusta (*Austrotritia*)
robusta (*Austrotritia*)
 robusta (*Berniniella*)
 robusta (*Cosmohermannia*)
robusta (*Cosmohermannia*)
 robusta (*Hermanniella*)
robusta (*Machuella*) *ventrisetosa*
 robusta (*Oribatula*)
robusta (*Separatoppia*)
robusta [O. (*Zygoribatula*)] (= *similitricha*)
 robustia (*Arcoppia*)
robustior (*Hoplophthiracarus*) (= *histicinus*)
robustior [H. (*Platynothrus*)]
robustior (*Protoribates*) Ja., 37 (X. oblongus r.)
robustior (*Protoribates*) Ja., 37 (X. capucinus r.) (= *robustior*)
 robustus [M. (*Arhegotocephus*)]
robustus [T. (*Cristonothrus*)]
 robustus (*Dolicheremaeus*)
robustus (*Eohypochthonius*)
 robustus [D. (*Epidamaeus*)] *sp. inq.*
 robustus (*Hemileius*)

robustus (Holonothrus)

robustus (Liacarus) Ew., 18 (=nitens)
robustus (Liacarus) Mih., 54 (=gracilis)
robustus (Nothrus) truncatus ssp. inq.
robustus [N. (Parakalumma)]
robustus [N. (Parakalumma)]
robustus [N. (Parakalumma)]
robustus (Peloribates)
robustus (Peloribates)
robustus (Pheroliodes)
robustus [D. (Saltatrichus)]
robustus (Scheloribates) v. P., 63
robustus (Scheloribates) Mih., 69 (=angustirostris)
rodickae (Scapheremaeus)
rodriguezii (Protoribates)
rogersi (Eremaozetes)
roguini (Eremaozetes)
rohdendorfi (Metabelba)
rohri (Cosmozetes)
rohri [T. (Cristonothrus)] P. Bal., 97
rohri [T. (Cristonothrus)] J. y P. Bal., 02 (=rohri P. B., 97)
rohri (Xenillus)
roigi [N. (Leptosuctobelba)]
roissi (Eueremaeus)
romandiola (M. (Neobelba))
romaniae [D. (Kunstidamaeus)] tecticola
romanicus [H. (Urubambates)]
romeroi (Hydroecocephus)
romyi (Dolicheremaeus)
ropalus (Atropacarus) (=phyllophorus)
rosaeus (Basiceramerus)
rosarius (Arthrodamaeus)
rosauraruizae (Pilogalumna)
rossica (Belba)
rossica (Berniniella)
rossica (Galumna)
rossica (Oppiella) (=nova)
rossica (Oribatella)
rossicus (Adrodamaeus)
rossicus (Aphelacarus) (=acarinus)
rossicus (Ovochthonius)
rossicus (Propelops)
rossicus [H. (Simkinia)] (?=ovalis)
rostralis (Archoplophora)
rostralis (Archoplophora)
rostralis (Archoplophora)
rostralis (Archoplophora)
rostralis (Austrothrus)
rostralis (Diapterobates)
rostralis (Ghilarovizetes)
rostralis (Hypozeptes)
rostrata (Camisia) (=segnis)
rostrata (Dometorina)
rostrata (Galumna) sp. inq.
rostrata (Galumnopsis)
rostrata (Heterobelba)
rostrata (Mesoplophora)
rostrata (Pilogalumna)
rostrata [G. (Rostrogalumna)] (=chrisengelbrechti)
rostrata [O. (Zygoribatula)] (=fusca)
rostratus (Acutozetes)
rostratus (Acutozetes)
rostratus (Angullozetes)
rostratus (Eupterotegaeus)
rostratus (Fijibates)
rostratus (Fijibates)

rostratus (Mucronothrus) (=nasalis)

rostratus [S. (Perscheloribates)]
rostratus (Rhynchoribates)
rostratus (Sellnickochthonius)
rostratus (Sellnickochthonius)
rostratus (Sphaerozetes)
rostratus (Tubulozetes)
rostratus (Scheloribates)
rostratus (Scheloribates)
rostratus [D. (Cylindroppia)] cylindrica
rostratus [D. (Cylindroppia)] cylindrica
rostromellatus (Humerobates)
rostromellatus (Humerobates)
rostromellatus (Humerobates)
rostromellatus (Humerobates)
rostromellatus (Humerobates)
rostopilosus [T. (Cristonothrus)]
rostopilosus (Fijibates) Sanyal, 88
rostopilosus (Fijibates) Sanyal et al., 06 (=sanvali)
rostopilosus [I. (Mancoribates)]
rostopilerus (Nesozetes)
rostopilerus [H. (Interoppia)]
rostopilerus [H. (Interoppia)]
rostopilerus (Apoplophora) (=pantotrema)
rostopilerus [(Z. (Protozetomimus))]
rostopilerus (Diapterobates)
rostopilerus [Z. (Protozetomimus)] (=acutirostris)
rothschildi (Crotonia)
rotoitiensis (Notophthiracarus)
rotoruensis (Compactozetes)
rotoruensis (Lopholiodes)
rotunda (Arcoppia)
rotunda (Ceratozetella)
rotunda (Exoribatula)
rotunda (Fortuynia)
rotunda (Fortuynia)
rotunda (Neoamerioppia)
rotunda (Pergalumna)
rotunda [S. (Porokalumma)]
rotunda (Pseudopyroppia)
rotunda (Suctobelbella)
rotundata (Cultroribula) (=bicultrata)
rotundata (Oribatula) sp. inq.
rotundata (Tuberoppia) Gol. 70
rotundata (Tuberoppia) Gol. 74 (=rotundata Gol. 70)
rotundatus (Arcozetes)
rotundatus (Fuscozetes)
rotundatus (Lamellobates) (=molecula)
rotundatus [T. (Latilamellobates)] incisellus
rotundatus (Liacarus) sp. inq.
rotundatus (Pheroliodes)
rotundatus (Scheloribates)
rotundatus (Sellnickochthonius)
rotundiceps (Allogalumna)
rotundiceps (Allogalumna)
rotundiclava (Scheloribates) (=sandvicensis)
rotundigranulatus (Gymnodamaeus)
rotundirostrum [I. (Mancoribates)]
rotundocuspis (Diapterobates)
rotundocuspis (Diapterobates)
rotundocuspis (Trichoribates)
rotundus (Alismobates)
rotundus (Aokiella)
rotundus (Hammerabates)
rotundus (Hoplophthiracarus)
rotundus (Neoribates)
rotundus (Neoribates)
rotundus (Phthiracarus) Ew., 08 (=globosus)
rotundus (Phthiracarus) Berl., 23 (=lentulus)

- rotundus* [*N. (Protophthiracarus)*]
 rotundus (Protoribates)
rotundus (Steganacarus) (=magnus)
rotundus (Trichoribates) (=angulatus)
rotundus [E. (Trischeloribates)]
 roubali (Neoribates)
 roubali (Neoribates)
roubali (Phthiracarus) (=laevigatus)
royi [*M. (Calyptozetes)*]
 roynortoni (Chamobates)
roynortoni (Pterochthonius)
 roynortoni (Pulchroppia)
 rubeni (Epimerella)
rubens (Fuscozetes) (?=intermedius)
ruber (Dipterobates) (=humeralis)
 rubescens (Meristacarus)
rubescens (Meristacarus)
rubida (Lasiobelba)
 rubra (Epilohmannia)
rubra [H. (Phyllhermannia)]
rubripedes (Dolicheremaeus)
rubripedes (Dolicheremaeus)
rubrus (Humerobates) (?=rostromellatus)
 ruchljadevi [*O. (Zygoribatula)*]
rudentiger (Dentizetes)
rudentiger (Macrogena)
rudentigera (Amerioppia)
 ruderalis (Passalozetes)
rudrasagarensis (Berlesezetes)
rufafulvus (Protoribates) sp. inq.
 rufulus (Hypochthonius)
rufulus (Hypochthonius)
rufulus (Hypochthonius)
rufulus (Hypochthonius)
 ruga [*K. (Niosuctobelba)*]
 rugata (Allogalumna)
rugiceps (Scheloribates)
rugifrons [P. (Neopilizetes)] sp. inq.
rugifrons [O. (Zygoribatula)] (=exarata)
 ruginervis (Galumnopsis)
 rugosa (Arcoppia)
rugosa (Autogneta) (=parva)
 rugosa (Epilohmannia) minuta
rugosa (Galumna)
 rugosa (Galumnella)
rugosa (Galumnella)
 rugosa (Gustavia) *sp. inq.*
rugosa (Hermannia) (=convexa)
rugosa [G. (Indogalumna)] (=rasilis)
 rugosa (Senectoppia) Aoki, 76
rugosa (Senectoppia) Ham., 79 (=multisulcatum)
 rugosa (Serratobelba)
 rugosa (Zetorchella)
rugosa [O. (Zygoribatula)] (=exarata)
rugosala (Pergalumna) sp. inq.
 rugosior (Carabodes)
rugosior (Carabodes)
rugosula (Galumnella)
 rugosula (Oribatella)
rugosus (Austrocarabodes)
rugosus (Benoibates)
 rugosus (Bipassalozetes)
rugosus (Gibbicepheus)
rugosus (Gibbicepheus)
rugosus (Haplacarus)
 rugosus (Limnozetes)
- rugosus (Microtegeus)
 rugosus (Microzetes)
 rugosus (Neoliodes)
 rugosus (Paulianacarus)
rugosus (Scheloribates)
rugosus (Scutovertex) (=sculptus)
rugosus (Truncozetes)
rugulosa (Camisia) (=horrida)
 rugulosus (Paulianacarus)
 ruizi [*C. (Nanochthonius)*]
rumbleseatus (Odontocephus)
rumbleseatus (Odontocephus)
runcifer (Masthermannia)
runcinata (Camisia) (=horrida)
runcinata (Oribatula)
ruseki (Hermannobates)
ruseki (Hoplophorella)
 russeolus (Allonothrus)
 russeolus (Allonothrus)
 russeolus (Allonothrus)
 russeolus (Allonothrus)
 russiae (Dolicheremaeus)
 rustenburgensis [*S. (Perschelorbates)*]
 rustenburgensis (Scapheremaeus)
 rustica (Acrotritia)
 rustica (Acrotritia)
rustica (Acrotritia)
rustica (Acrotritia)
rusticus (Pheroliodes)
 ruttneri (Trhypochthonius)
 ruwenzorii (Mesotritia)
 ruzsinszkyi [*S. (Flagrosuctobelba)*]
rwandensis (Congocephus)
 rybalovi (Rhacaplacarus)
rysardi (Crotonia) (=ovata)
 ryukyuensis (Mochlozetes)
 ryukyuensis (Mochlozetes)
ryukyuensis (Oribotritia) (=chichijimensis)
 ryukyuensis (Peloribates)
 ryukyuensis (Peloribates)
saakadzei (Phauloppia) (=lucorum)
 sabahensis (Arcoppia) bidentata Mah., 87
sabahensis (Arcoppia) Mah., 88 (=aequivoca)
 sabahensis [*N. (Leptosuctobelba)*]
 sabahensis (Nanhermannia)
 sabahna (Austroceratoppia)
 sabahna (Galumna)
 sabahna (Hoplophorella)
 sabahnus [*U. (Calugarella)*]
 sabahnus (Dolicheremaeus)
 sabahnus (Microtegeus)
sabinae (Eremaezetes)
sabitai (Pergalumna)
saboorii [L. (Aegyptogalumna)] (=mastigophora)
saboorii (Amerobelba)
 sabulosa [*O. (Zygoribatula)*]
 sabulosus [*B. (Passalobates)*]
 sacchareus (Tegeocranellus)
saccharomycetoides (Epiereulus) (=geometricus)
 saccularis (Sacculogalumna)
 sacculifera (Oripoda)
 sacculifera [*A. (Weigmanniella)*]
 sacculiferus [*P. (Sacculoptulus)*]
sacculiferus [S. (Tropacarus)] (=grandjeani)
 sacculipunctatus (Scheloribates)
sacculus [M. (Trimalaconothrus)]

sacsahuamanensis (Scheloribates)
sacsahuamanensis (*Schelorbates*)
sacyae (*Hoplophorella*)
 sadbinia [O. (Dzarogneta)]
 sadoensis (Nothrus)
saetosa (*Suctobelba*) (=granulata)
 saeva (Orthogalumna)
saeva (*Orthogalumna*)
saeva (*Orthogalumna*)
saeva (*Orthogalumna*)
 sagami (Goyoppia)
 sagatus (Reptacarus)
sagitta (*Galumnopsis*)
sagitta [M. (*Sagittabodes*)]
sagittatus (*Flagellocephus*)
 sahariensis (Aphelacarus) acarinus
 sahariensis (Masthermannia)
 sahariensis [R. (Rectoppia)] fasciata
 saifulmalukensis (Liebstadia)
 sajisei (Eurostocephus)
 sakamorii (Phauloppia)
 sakaryaensis (Corynoppia) andulau
sakeni (*Berniniella*) (=sigma)
 salamoni (Xenillus)
salasi [H. (*Bornemiszaella*)]
salebrosus (*Notophthiracarus*)
 salebrosus (Scheloribates)
 salicifolius (Eohypochthonius)
salicinus (*Caveremulus*)
 salicis (*Neoribates*)
salina [O. (*Zygoribatula*)]
 salish (*Eremaeus*)
saljanica (*Oribatula*) (=amblyptera)
 salmani [R. (Insculptoppia)]
 salmanticensis (Hypogeoppia) terricola
 salonae (Foraminoppia)
saltaensis (*Fosseremus*) (=laciniatus)
saltaensis (*Liochthonius*)
saltaensis (*Liochthonius*)
saltaensis (*Liochthonius*)
saltaensis (*Mochlozetes*)
 saltator (Zetorchestes)
 saltator (Zetorchestes)
 saltuensis (*Gymnodamaeus*) sp. inq.
salvadoralii (*Aleurodamaeus*)
salvadoriensis [N. (*Amerigloboppia*)]
samadi (*Oppia*) sp. inq.
 samaina (Rhinoppia)
samarensis (*Dolicheremaeus*)
samarensis (*Epilohmannoides*)
samarensis (*Indoribates*)
samarensis (*Microzetes*)
samarensis (*Nothrolhmannia*)
samarensis [E. (*Orinchobates*)]
samarensis [H. (*Phyllhermannia*)]
samarensis (*Sacculogalumna*)
samarensis [N. (*Steganacarellus*)]
samarus [O. (*Acrotocephus*)]
sambhui (*Arcoppia*)
samirani (*Schelorbates*)
samoensis (*Galumna*)
samoensis (*Nesopelops*)
samoensis (*Oribotritia*)
samoensis [C. (*Klapperiches*)]
samoensis [C. (*Klapperiches*)]
 samsinaki (Euscheloribates)
 samsinaki (Euscheloribates)

samueli (*Rogerzetes*)
sanctaelenae [G. (*Indogalumna*)] (=rasisil)
 sanctaeluciae (Haplochthonius)
 sanctaeluciae (*Haplochthonius*)
 sanctaeluciae (*Haplochthonius*)
 sanctaemariae (Melanozetes) azoricus
sanctipauli [E. (*Brasiliotritia*)] (=dlouhyorum)
sanctipauli (*Xenillus*)
sandvicensis (*Schelorbates*) praeincisus
 sandvicensis (Scheloribates) praeincisus
sandvicensis (*Schelorbates*) praeincisus
sandvicensis (*Schelorbates*) praeincisus
 sangumburiensis [P. (*Archiphthiracarus*)]
 sangumburiensis [P. (*Trianguis*)]
 sanjiangensis [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 sanpabloensis (*Domatorina*)
sanremensis (*Lucoppia*) (=burrowsi)
 sanukiensis (Eobrachychthonius)
 sanukiensis (Ghilarovus)
 sanvicensis [P. (*Archiphthiracarus*)]
 sanyali (*Fijibates*)
 saraburiensis (Austrotritia)
 saraburiensis (Austrotritia)
saraburiensis (*Austrotritia*)
 sarahae (*Phthiracarus*)
 sarawak (*Sabahtritia*)
 sarawaki (*Apoplophora*)
 sarawaki (*Hoplophorella*)
 sarawaki [E. (*Pocsia*)]
 sarbias [P. (*Millotacarus*)]
 sardoa (*Oribatella*)
sardoa (*Oribatula*) (=tibialis)
 sarekensis [M. (*Calyptozetes*)]
 sarekensis [M. (*Calyptozetes*)]
 sarekensis (*Suctobelbella*) acutidens
 sarekensis (*Suctobelbella*) acutidens
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarekensis (*Tectocephus*) velatus
 sarkarae [T. (*Cristonothrus*)]
sarkarae [P. (*Millotacarus*)] (=sarbias)
 sarvari (Belba)
 sasakawai (Belba)
 sasakawai (Belba)
 saskai [O. (*Oxyoppiella*)]
 saskai (*Pilizetes*)
sassafrasensis (*Notophthiracarus*)
 saswatii (Scheloribates)
satanicus (*Selenoribates*)
satellitius (*Galumna*) (=alata)
 satsumaensis (Allosuctobelba) tricuspidata
saucius (*Hoplophorella*)
 saudicus (Hypozetes) translamellatus
 saudicus (Scheloribates)
 saudiensis (Scheloribates) sp. inq.
sauli [H. (*Phyllhermannia*)]
 savagei [C. (*Triachipteria*)]
 saxea (Schusteria)
 saxicola (*Domatorina*) plantivaga
 saxicola (Ghilarovus)
 saxicola (Hypovortex)
saxicola (*Oribatula*) (=major)
 saxicola (Phauloppia)

- saxicola (Scheloribates)
saxosus [T. (Tyrphonothrus)]
sayedi [O. (Zygoribatula)]
scaber (Camisia) (?=biverrucata)
scaber (Carabodes)
scaber (Galumna)
scaber (Stictozetes)
scabra [H. (Heterohermannia)]
scabra [H. (Heterohermannia)]
scalaris (Liochthonius) (=sellnicki)
scalifera [O. (Oxyoppiella)]
scalifera [O. (Oxyoppiella)]
scaliger (Platyliodes)
scaliger (Platyliodes)
scalpellata (Suctobelba)
scapellata (Hoplophorella) (=vitrina)
scapulatus (Mysterozetes)
schachtachtinskoi [H. (Urubambates)]
schalleri (Acaroceras)
schalleri (Rostrozetella)
schatzi (Eremaezetes)
schatzi (Galapagacarus)
schatzi (Hoplophorella)
schatzi [C. (Klapperiches)]
schatzi (Ocesobates)
schatzi [C. (Phyllocarabodes)]
schatzi [C. (Phyllocarabodes)]
schatzi (Scapheremaeus)
schatzi (Torpacarus)
schatzi (Zachvatkinibates)
schauenbergi [P. (Archiphthiracarus)] (=crispus)
schauenbergi (Austrocarabodes)
schauenbergi (Cryptacarus)
schauenbergi (Cryptacarus)
schauenbergi (Hoplophorella) (=hamata)
schauenbergi (Multipulchroppia)
schauenbergi (Neoppia)
schauenbergi (Pilobatella)
schauenbergi (Scheloribates)
schauenbergi [O. (Zygoribatula)]
schawalleri (Vilhenabates)
scheloribatoides (Topobates)
schizocoma (Notophthiracarus)
schneideri (Ameronothrus)
schneideri (Phauloppia) (=lucorum)
scholzi (Passalozetes)
schoutedeni [L. (Paralamellobates)] (=misella)
schubarti (Ameronothrus)
schubarti (Orbiculobates)
schuetzi (Chamobates)
schuetzi (Chamobates)
schuilingi (Allonothrus)
schuilingi (Allonothrus)
schuilingi (Allonothrus)
schuilingi (Allonothrus)
schusteri (Ameronothrus)
schusteri [P. (Archiphthiracarus)]
schusteri (Autogneta)
schusteri [L. (Convergoppia)]
schusteri (Epilohmannia)
schusteri [H. (Heterohermannia)]
schusteri (Microtritia)
schusteri (Nesiacarus)
schusteri (Oribotritia)
schusteri (Staurobates)
schusteri (Notophthiracarus)
schusteri (Zetorchestes)
schusteri (Zetorchestes)
schwartzi (Austrocarabodes)
schweizeri [L. (Hamoppia)]
schweizeri (Liacarus) Forss., 63 (=major)
schweizeri (Liacarus) Wooll., 68 (=major)
schweizeri (Steganacarus) (=vernaculus)
schwendingeri (Mahunkaia)
scilierensis (Trichoribates)
scimitarum (Tyrphonothrus)
scissurata (Oripoda)
scitus [P. (Archiphthiracarus)]
sclerotrichus (Trhypochthonius) *sp. inq.*
scoparius (Hermannobates)
scopolii [P. (Neophthiracarus)]
scopulae [C. (Flexa)]
scopulus (Neoxenillus)
scotiae (Halozetes) sp. inq.
scotiae [M. (Pravoppia)]
scotti (Acrotritia)
scotti (Nothrus) (=seychellensis)
scripta (Galumna)
scriptus [M. (Megazetes)]
scrobinus [H. (Tuberemaeus)]
scrofa (Suctobelbella)
scrupeus (Hoplophthiracarus)
sculperens (Ethiovertex)
sculpta (Belba)
sculpta (Lasiobelba)
sculptilis (Hoplophorella)
sculptilis (Oppiella) (=nova)
sculptilis [S. (Rafacarus)]
sculptrata (Hexachaetoniella)
sculptrata (Hexachaetoniella)
sculptrus (Xenillus)
sculpturata (Aeroppia)
sculpturata (Aeroppia)
sculpturata (Condylobelba)
sculpturata (Epilohmannia)
sculpturata (Epilohmannia)
sculpturata (Oribatella)
sculpturata [H. (Phyllhermannia)]
sculpturata (Pulchroppia)
sculpturata (Siculobata)
sculpturata [O. (Zygoribatula)]
sculpturatus (Fosseremus)
sculpturatus (Fosseremus)
sculpturatus [H. (Tuberemaeus)]
sculptus (Adrodamaeus) (=hispanicus)
sculptus (Eupelops) sp. inq.
sculptus (Scutovertex)
sculptus (Scutovertex)
sculptus (Tritegeus)
sculptus (Tyrphonothrus)
scutata (Berlesiella)
scutata (Suctobelbilla)
scutata (Suctobelbilla)
scutatus (Malaconothrus)
scutatus (Plakoribates)
scutatus (Tyrphonothrus) *sp. inq.*
scuticus (Euphthiracarus)
scuticus (Notophthiracarus)
scutigera (Lyroppia)
scutigera (Lyroppia)
scymus (Carabodes) (=labyrinthicus)
scytheae (Lanceoppia)
secata (Arcoppia)
secunda (Terratritia)

- secta (Suctobelba)
sectus (Microzetorchestes) (=emervi)
 secunda (Galumnopsis)
 secundus [A. (Baloghodes)]
 secundus [E. (Pocsia)]
 sedecimus [R. (Mantigueracarus)]
 sedlaceki (Rhynchoppia)
sedlaceki (Rhynchoppia)
seemani (Crotonia)
 segestris (Neoliodes)
seghetti (Scheloribates) (=callipus)
 segmella (Subiasella)
segmentatus (Arthrovertex)
 segnis (Camisia)
 segnis (Camisia)
 segnis (Camisia)
 segnis (Camisia)
 segnis (Camisia)
segnoides (Camisia) (=segnis)
 sejugata (Zetorchella)
 sejugatus (Annectacarus)
sejunctus (Liacarus) (=koeszegiensis)
 selgae (Damaeus)
 selgae (Punctoribates)
 selgae (Xenillus)
 sellnicki (Achipteria)
 sellnicki (Adelphacarus)
 sellnicki (Adelphacarus)
 sellnicki (Beckiella)
 sellnicki (Belba)
 sellnicki (Ceratozetella)
sellnicki [L. (Convergoppia)]
 sellnicki (Galumnopsis)
sellnicki (Indotritia) (=krakatauensis)
 sellnicki (Liochthonius)
 sellnicki (Liochthonius)
 sellnicki (Liochthonius)
sellnicki (Maerkelotritia) (=kishidai)
 sellnicki (Melanozetes)
 sellnicki (Melanozetes)
 sellnicki (Mystroppia)
sellnicki (Mystroppia)
 sellnicki (Nanhermannia)
sellnicki [P. (Neophthiracarus)] (=obsessus)
sellnicki (Phthiracarus) (=ferrugineus)
 sellnicki (Pilizetes)
 sellnicki (Punctoribates)
 semengok [C. (Klapperiches)]
semiaciculatus (Rhacaplacarus)
 semiareolatus (Cosmochthonius)
semiareolatus (Cosmochthonius)
 semiareolatus (Licneremaeus)
 semibarbulata (Lohmannia)
 semicapillatus (Dolicheremaeus)
 semicirculata [O. (Zygoribatula)]
semiconvexus (Scapheremaeus)
 semicostulata (Arcoppia)
 semidentata (Suctobelbella)
 semidesertus (Scheloribates)
 semifoveolatus (Cosmochthonius)
 semifoveolatus (Cosmochthonius)
 semilunatus (Austrocarabodes)
 semilunatus (Dolicheremaeus)
 seminervosa (Pergalumna)
 seminuda (Oppia)
 seminuda (Trichogalumna)
 seminuda (Trichogalumna)
 seminudus [P. (Triaunguis)]
seminudus [P. (Triaunguis)]
seminulum (Euzetes) (?=globulus)
 semiornatus (Scapheremaeus)
semiornatus (Sellnickochthonius) (=immaculatus)
 semiplumosa [S. (Flagrosuctobelba)]
semiplumosa [S. (Flagrosuctobelba)]
 semiplumosa [S. (Flagrosuctobelba)]
semireticulata (Pedrocortesella)
 semirufus (Minunthozetes)
 semirufus (Minunthozetes)
 semirugosa (Zetorchella)
 semistriata (Pergalumna)
 semota (Mesotritia)
 semovitusi (Trhypochthonius)
 senecionis [N. (Amerigloboppia)]
 senegalensis (Nothrus)
 senegalensis [T. (Paragloboppia)]
 senensis (Amiracarus)
senex (Atropacarus) (=striculus)
 sengbuschi (Ramusella)
 sengbuschi (Ramusella)
sengbuschi (Ramusella)
 sengbuschi (Ramusella)
 seniczakae [R. (Insculptoppia)]
 seniczaki (Neogalumna)
seniczaki [M. (Trimalaconothrus)]
 sensiclavata [R. (Insculptoppia)] sp. inq.
sensifus (Notophthiracarus)
 sensilla [B. (Gressittoppia)]
 sensillinuda [S. (Flagrosuctobelba)]
 sentus (Notophthiracarus)
 separata [S. (Ussuribata)]
 separatum (Nothrus)
 sepilok (Dampfiella)
 septatus (Nothrus)
septentuberculatus (Pseudotocepheus) (=amonstruosus)
 septenia (Parisuctobelba)
septentrionalis [H. (Capillonothrus)] (=capillatus)
 septentrionalis (Eupelops)
 septentrionalis (Eupelops)
 septentrionalis (Hermanniella)
 septentrionalis (Hermanniella)
septentrionalis (Indotritia) (=krakatauensis)
 septentrionalis [S. (Lalmoppia)]
 septentrionalis (Microzetes)
 septentrionalis (Trhypochthonius) *silvestris*
sequoiae (Galumna)
 serangos (Euphthiracarus)
 serapi (Austroceratoppia)
 sergienkoeae [T. (Latilamellobates)]
 sergienkoeae (Scheloribates)
 sergienkoeae [C. (Xiphobates)]
 seropedica (Masthermannia)
 seropedicalensis (Nothrus)
 serrata (Achipteria)
 serrata (Allosuctobelba)
 serrata (Apoplophora)
 serrata (Ctenobelba)
 serrata (Epilohmannia)
 serrata (Hermanniella)
 serrata (Lohmannia)
 serrata (Machadobelba)
 serrata (Mesotritia)
 serrata (Metrioppia)
 serrata (Metrioppia)
 serrata (Oribatella)

- serrata (Oribotritia)
serrata [H. (Phyllhermannia)]
serrata (Serratoppia)
serrata (Serratoppia)
serratiostris (Berniniella)
serratiostris (Berniniella)
serratiostrum (Suctobelbella)
serratmarginata (Liebstadia) (=similis)
serratoseta (Peloribates)
serratus (Atropacarus)
serratus (Caveremulus)
serratus (Compactozetes)
serratus (Eremulus)
serratus (Eurhynchoribates)
serratus [P. (Montizetes)] (=bavartogtokhi)
serratus (Notophthiracarus)
serratus (Pantelozetes)
serratus (Scutovertex)
serratus (Tansocephus)
serratus (Tricheremaeus)
serratus (Trichoribates)
serrifrons (Pyroppia)
serrifrons (Pyroppia)
serrula [P. (Archiphthiracarus)] (=pygmaeus)
serrula [O. (Monoribatella)]
serrula (Oribotritia)
serrulata (Arcoppia)
serrulata (Arcoppia)
serrulatus (Phthiracarus)
servadeii (Belba) *sp. inq.*
sestai (Microzetes)
setacea (Hermanniella) (=subnigra)
setantis (Trhypochthonius)
setanus [P. (Metaphthiracarus)]
setanus [P. (Metaphthiracarus)]
setata (Gymnodampia)
setiformis (Acrogalumna) (=longipluma)
setiformis [N. (Calyptophthiracarus)]
setiformis (Conoppia)
setiformis [H. (Phyllhermannia)]
setiformis [H. (Phyllhermannia)]
setiger (Eremaeus) (=cordiformis)
setiger (Neoribates)
setiger [S. (Perschelorbates)]
setiger (Pseudotocephus)
setiger (Pseudotocephus)
setiger (Pseudotocephus)
setiger (Sadocephus) undulatus
setiger [D. (Spatiodamaeus)]
setiger (**Sphaerozetes**)
setiger (Stomacarus)
setiger (Unguizetes)
setiger (Xenillus)
setigera (Galumna)
setigera (Heteroppia)
setilonga (Berniniella)
setoensis (Epilohmannoides)
setosa (Banksinoma)
setosa (Banksinoma)
setosa (Dampfiella)
setosa [S. (Flagrosuctobelba)]
setosa [S. (Flagrosuctobelba)]
setosa [G. (Porogalumnella)]
setosa (Xiphobelba)
setosa [O. (Zygoribatula)]
setosellus (Phthiracarus) (=longulus)
setosoclavata [S. (Flagrosuctobelba)]
- setosus (Aleurodamaeus)
setosus (Ceratorchestes)
setosus (Epactozetes)
setosus (Fuscozetes)
setosus (Fuscozetes)
setosus (Humerobates)
setosus (Megalotocephus) japonicus
setosus [P. (Metaphthiracarus)]
setosus [P. (Metaphthiracarus)]
setosus [P. (Metaphthiracarus)]
setosus [Z. (Protozetomimus)]
setosus (Topobates)
setosus (Trhypochthoniellus) longisetus
setosus (Trhypochthoniellus) longisetus
setosus (Trhypochthoniellus) longisetus
setosus (Xenillus)
setoumi (Malaconothrus)
setulosa [A. (Izuachipteria)]
setulosa [M. (Parplophora)]
setus (Eobrachychthonius)
sexareata (Pergalumna) (=myrmophila)
sexclavatus (Rostrozetes) sp. inq.
sexcornuta (Schalleria)
sexdentata [O. (Monoribatella)]
sexdentata [O. (Monoribatella)]
sexdentata (Suctobelbella) *sp. inq.*
sexdentatus (Pseudotocephus) sp. inq.
sexidimorphus (Pseudotocephus)
sexmaculata (Multioppia) (?=laniseta)
sexnodosa (Suctobelbilla)
sexnodosa (Suctobelbilla)
sexnotatus (Eobrachychthonius) (=latior)
sexparus (Epilohmannoides)
sexpilosa (Ceratoppia)
sexpilosa (Ceratoppia)
sexpilosa (Goyoppia)
sexpilosa (Hexachaetoniella)
sexpilosus [G. (Neocarabodes)]
sexpilosus [G. (Neocarabodes)]
sexsetosa (Pseudoceratoppia)
sexsetosa [S. (Ussuribata)]
sextiana (Acrotritia) (=curticephala)
seychellensis (Dolicheremaeus)
seychellensis (Nothrus)
seychellensis (Ramsayellus)
seychelli (Allonothrus) schuilingi
sevdi (Lanceoppia)
sezeki [Q. (Coronoquadroppia)]
sgardelisi [C. (Triachipteria)]
shagdarsureni (Eupelops)
shaldybinae (Ceratozetella)
shaldybinae [R. (Insculptoppia)] (=insculpta)
shaldybinae (Oribatella)
shaldybinae [P. (Triaunguis)]
shaldybinae (Zachvatkinibates)
shapensis (Nothrus)
sharipovi (Moritzoppia) escotata
sharjah [O. (Zygoribatula)]
shauni (Pseudotocephus)
shealsi (Austrotritia) (=saraburiensis)
shealsi (Belloppia)
shealsi (Belloppia)
shealsi (Notophthiracarus)
sheshanensis [R. (Insculptoppia)]
shibai (Fortuynia) elamellata
shibai (Rostrozetes)
shigeruus (Schelorbates)

- shikoku (Oribotritia)
shillongensis (Eremobelba)
shimanoi (Hermannia)
shimojanai (Thalassozetes)
shinanoensis (Multioppia)
shiptsyni [L. (Dorycranosus)]
shiptoni [P. (Neophthiracarus)]
shiraensis [S. (Perscheloribates)]
shirakamiensis (Phthiracarus) (=persimplex)
shirakamiensis (Caenosamerus)
shirakamiensis (Protoribates)
shirakamiensis (Tectocephus)
shiranensis [C. (Cyrtozetes)]
shironeseta (Suctobelbella)
shogranensis (Acrogalumna)
shogranensis (Acrogalumna)
shogranensis (Coartobelba)
shogranensis (Euphthiracarus)
shogranensis (Euphthiracarus)
shogranensis (Sphaerozetes)
shqipetarica (Dissorhina)
shtanchaevae (Anachipteria)
shtanchaevae (Epilohmannia)
shtanchaevae (Machadobelba)
shukuminensis (Cultroribates)
shvanderovi (Protoribates)
siamensis (Dolicheremaeus)
siamensis (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
siamensis (Multipulchroppia)
siamensis (Rhabdoribates)
sibirica [C. (Ensicamisia)]
sibirica (Pyroppia)
sibirica [C. (Triachipteria)]
sibiricus (Neoribates)
sibiricus [H. (Platynothrus)] Sitn., 75
sibiricus [H. (Platynothrus)] Sitn., 75
sibiricus [H. (Platynothrus)] Sitn., 75
sibiricus [H. (Platynothrus)] Kriv., 84 (=krivolutskvi)
sibiricus (Punctoribates)
sicafer (Sicaxylobates)
sicarius (Pherliodes)
sicata (Dometorina)
sicca (Galumna) (=setigera)
siccatus (Diapterobates) (=rotundocuspidatus)
sichuanensis (Gymnodampia)
sichuanensis (Phthiracarus)
scilicoma (Notophthiracarus)
scilifera [S. (Flagrosuctobelba)]
sicula [P. (Siciliophora)]
sicula (Siculobata)
sicula (Siculobata)
sicula (Siculobata)
sicula (Siculobata)
sicula (Siculobata)
siculus (Adrodamaeus)
siculus (Eupelops) (=plicatus)
siculus (Scutovertex) (=minutus)
siculus (Siciliotrichus)
sidorchukae (Rhacaplacarus)
siefi (Loftacarus)
siefi (Loftacarus)
sierramadrensis (Peloribates)
sierriensis (Euphthiracarus) (=tanythrix)
sigifurcatus (Notophthiracarus)
sigma (Berniniella)
sigmolamellatus (Eremulus)
signata (Anachipteria)
signata (Dissorhina)
signatus (Cosmochthonius)
sikhotealinicus (Euphthiracarus)
sikkimensis (Scheloribates)
silesius (Liebstadia) (=similis)
silva (Cymbaeremaeus)
silva [S. (Ussuribata)]
silvai (Beckiella)
silvanus [G. (Naiazetes)]
silvanus (Novonothrus)
silvatica (Berniniella)
silvatica (Parautogneta)
silvatica (Pergalumna)
silvatica [D. (Vesiculobates)]
silvaticus (Malaconothrus)
silvestris (Eueremaeus) oblongus
silvestris (Eupelops)
silvestris (Neoliodes)
silvestris (Nothrus)
silvestris (Nothrus)
silvestris (Nothrus)
silvestris (Nothrus)
silvestris (Nothrus)
silvestris (Pergalumna)
silvestris (Trhypochthonius)
silvestris (Trhypochthonius)
silvicola (Drymobates)
silvicola (Limnozetes)
silvicola (Limnozetes)
silvicola (Neoeutegaeus)
silvicola (Striatoppia)
silvicus (Nothrus)
silvosus (Carabodes)
similanensis (Temburongia)
simile (Acrotritia) (=rustica)
similesuperbula (Oribatella)
similidentata (Suctobelbella)
similifallax (Lauroppia)
similis (Acaroceras)
similis (Acrotritia)
similis (Amiracarus)
similis (Austrocarabodes)
similis (Berniniella) (=bicarinata)
similis (Cepheus)
similis (Ceratozetella)
similis (Ceratozetes) (=neonominatus)
similis (Chavinia)
similis (Chavinia)
similis (Dampfiella)
similis (Dampfiella)
similis (Eobrachychthonius)
similis (Eupelops)
similis (Galumna)
similis (Galumna)
similis [G. (Gibbibodes)]
similis [M. (Hammeroppia)]
similis (Heminothrus)
similis (Hermannia)
similis (Hoplophthiracarus)
similis [L. (Incabates)]
similis [C. (Klapperiches)]
similis (Liacarus) (=coracinus)
similis (Licneremaeus) (=novus)
similis (Liebstadia)
similis (Liebstadia)
similis (Liebstadia)
similis (Liebstadia)

- similis* (*Limnozetes*)
similis (**Liochthonius**)
similis (*Lohmannia*)
similis (*Lyroppia*)
similis (Machadobelba)
similis (Malacoangelia)
similis (**Mesoplophora**)
similis (Mesotritia)
similis (**Mesotritia**)
similis (*Microtegeus*)
similis (Moritzoppia) (=unicarinata)
similis (Multipulchroppia)
similis (*Neoamerioppia*)
similis (Neoribates)
similis (**Notophthiracarus**)
similis (Oribatella)
similis (*Pareutegaeus*)
similis [V. (Phalacrozetes)]
similis (Phthiracarus)
similis [H. (Phyllhermannia)]
similis [N. (Protophthiracarus)] (=radiatus)
similis (**Schizozetes**)
similis (**Sellnickochthonius**)
similis (*Sellnickochthonius*)
similis [D. (Spatiodamaeus)] (=verticillipes)
similis (Steganacarus)
similis (Striatoppia)
similis (Suctobelbella)
similis [M. (Trimalaconothrus)] sp. inq.
similis [H. (Tuberemaeus)]
similis (*Unguizetes*)
similitricha [**O. (Zygoribatula)**]
simillima [S. (Flagrosuctobelba)] (=semiplumosa)
similoides (Dampfiella)
simonettae (Steganacarus)
simplex (**Afroleius**)
simplex (Berniniella) (=inornata)
simplex (*Charassobates*)
simplex (*Ctenobelba*) sp. inq.
simplex (Cycloppia) (=restata)
simplex (*Cyrthermannia*)
simplex (**Dolicheremaeus**)
simplex (Eupelops) (=major)
simplex [S. (Flagrosuctobelba)]
simplex (Fusuloppia) (=neonominata)
simplex (**Globoppia**) sp. inq.
simplex (*Haplobelba*)
simplex (*Haplochthonius*)
simplex (*Haplochthonius*)
simplex (**Haplochthonius**)
simplex (Haplochthonius)
simplex (**Haplochthonius**)
simplex (*Liacarus*) coracinus sp. inq.
simplex (*Liochthonius*)
simplex (*Liochthonius*)
simplex (**Liochthonius**)
simplex (Liochthonius)
simplex (**Liochthonius**)
simplex (Lophotocephus)
simplex (**Lophotocephus**)
simplex (Machadobelba)
simplex (Micropia) (=minus)
simplex (*Microtritia*)
simplex (*Microtritia*)
simplex (*Nipponiella*)
simplex (**Notophthiracarus**)
simplex (Protoribates) (=halleri)
- simplex (Pseudotocephus) (=amonstruosus)
simplex (*Rhynchobelba*)
simplex (*Scapheremaeus*)
simplex (*Scheloribates*) Ger., 1849 sp. inq.
simplex (Scheloribates) Stor., 1925 (=multiiteratus)
simplex (Suctobelba) (=chinonei)
simplex (Tyrphonothrus) (=glaber)
simplex (*Vaghia*)
simplex (*Vilhenabates*)
simplirostratus (Papillacarus)
simpliciseta [G. (Kalloia)]
simpliciseta (**Triteremella**)
simplicisetosus (*Cosmozetes*)
simplicisetosus (Paulianacarus)
simplicisetus (*Microzetes*)
simplicisetus (**Microzetes**)
simplicissima [S. (Lalmoppia)] sp. inq.
simplitricha (Multioppia)
simulator (*Ceratozetes*)
sinaraja (Truncopes)
sinarmatus (**Afrotecephus**)
sinatus [V. (Phalacrozetes)]
sine (Scheloribates) (=angustirostris)
sinensis (Acrotritia)
sinensis (**Acrotritia**)
sinensis (Acrotritia)
sinensis (**Acrotritia**)
sinensis (Arcoppia fenestralis)
sinensis (Fortuynia)
sinensis (Pergalumna) obvia
sinensis (Nesiacarus)
sinensis (Perxylobates)
sineornata (**Gustavia**)
singaporensis (Austrotritia)
singaporensis (Dolicheremaeus)
singaporensis (Microzetes)
singularis [M. (Archegotocephus)]
singularis [F. (Cosmogalumna)]
singularis (Euphthiracarus)
singularis (Hoplophorella)
singularis (**Hoplophorella**)
singularis (Hoplophorella)
singularis (**Hoplophorella**)
singularis (Hoplophorella)
singularis (Lepidozetes)
singularis (Lepidozetes)
singularis (Mahunkobates)
singularis (Metabelba)
singularis (Protoribates) (=capucinus)
singularis (Sacculoppia)
singularis (Suctobelbella)
singularis (Suctobelbella)
singularis [H. (Tuberemaeus)]
singularis [H. (Tuberemaeus)]
singularis [H. (Tuberemaeus)]
singularis (Xenillus)
sinica (Banksinoma)
sinica (Mahunkana)
sinica [S. (Ussuribata)]
sinicus (Allonothrus)
siniloanensis (Philippotocephus)
sinlimes (**Perxylobates**)
sinlimes (Perxylobates)
sinornata (**Allogalumna**)
sintranslamella (*Oribatella*)
sinuata (Camisia) (=horrida)
sinuata [S. (Flagrosuctobelba)]

- sinuata** [**S. (Flagrosuctobelba)**]
sinuata [**S. (Flagrosuctobelba)**]
 sinuata [L. (Incabates)]
 sinuofrons (Galumna)
sinuosociatus (**Austrocarabodes**)
sinuosus (**Notophthiracarus**)
sinuosus (**Scapheremaeus**)
 sisiri (Gibbicepheus)
 sisiri (Zetorchella)
sitnikovae [**D. (Cylindroppia)**] (=casuarina)
 sitnikovae (Diapterobates)
sitnikovae (Diapterobates)
sitnikovae (**Ferolocella**) (=cribraria)
 sitnikovae (Fissicepheus)
sitnikovae (**Membranoppia**)
 sitnikovae (Moritzoppia)
sitnikovae (**Oribatula**) (=interrupta)
sikoettsbergi [**H. (Capillonothrus)**]
sikoettsbergi [**H. (Capillonothrus)**]
sikoettsbergi [**H. (Capillonothrus)**]
skookumchucki (**Quadroppia**) (=quadricarinata)
 skrjabini (Hololohmannia) *sp. inq.*
 skrjabini [O. (Zygoribatula)]
 slaveki (Umbellozetes)
slossonae (**Fuscozetes**) (=fuscipes)
 smirnovi [D. (Epidamaeus)]
 smirnovi (Epimerella)
 smirnovi (Thamnacarus)
 smirnovi [O. (Zygoribatula)]
smithersi (**Megatrichobates**)
smithi (**Spineremaeus**)
 smiti (Fortuynia)
smiti (**Fortuynia**)
 snowdonensis [C. (Triachipteria)]
socia [**O. (Zygoribatula)**] (=cognata)
socotrensis [**O. (Zygoribatula)**]
sol (**Gustavia**) (=microcephala)
sol (**Helioppia**)
 sol (Helioppia)
sol (**Steganacarus**)
 solhoeyi [C. (Ensicamisia)]
solhoeyi [C. (Ensicamisia)]
solhoeyi [C. (Ensicamisia)]
 solhoeyi (Mesotritia)
solifera (**Interbelba**)
 solita [S. (Flagrosuctobelba)]
solitaria (**Oribotritia**)
solitarius (**Notophthiracarus**)
sollertia (**Basilobelba**) (=retiaria)
 soloduchi [C. (Aokibelba)]
solomonensis (**Apoplophora**)
solomonensis (**Notophthiracarus**)
somalica (**Pergalumna**)
 somalicus (Eupelops)
somalicus (**Eupelops**)
somalicus (**Rhacaplacarus**)
 songliensis (Diapterobates)
soniae (**Hauseroplophora**)
 soonkii (Gymnodampia)
soosi [**L. (Hamoppia)**]
sordida (**Camisia**) (=spinifer)
 sordidus (Austrocarabodes) *sp. inq.*
sordidus (**Notophthiracarus**)
soror (**Eutegaeus**)
 soror [R. (Insculptoppia)]
soror [**R. (Insculptoppia)**]
 soror (Metabelbella)
 soror [**M. (Trimalaconothrus)**] *sp. inq.*
sororia (**Hoplophorella**)
 sorrentensis (Suctobelba)
 sottoetgarciai (Zetorchella)
 sottoetgarciai (Zetorchella)
 souchnaiensis (Protoribates)
southafricanensis (**Eremulus**)
southensis (**Zealandozetes**)
southensis (**Zealandozetes**)
 soyeri (Pirnodus)
 spadix (Phthiracarus)
sparsa (**Mesoplophora**)
spasmenosi (**Basilobelba**)
 spathulata (Epilohmannia)
 spathulata (Epilohmannia)
spathulata [**H. (Phyllhermannia)**]
spathulatus (**Austrocarabodes**)
spathulatus (**Ceratobates**)
spathulatus (**Cubabodes**)
 spathulatus (Oxyamerus)
 spathulatus (Oxyamerus)
spathulatus (**Rhynchoribates**)
 spathulatus (Rogerzetes)
spathulatus (**Rogerzetes**)
 spathulifer (Machadobelba)
 spathuloides (Epilohmannia)
 spatiosus (Caenosamerus)
 spatiosus (Caenosamerus)
spatulasetosus (**Trichoribates**)
spatulata (**Hoplophorella**) (=hamata)
 spatulatus (Dolicheremaeus)
 spatulatus (Otocephus)
 specifica (Neogalumna)
 speciosa (Oppia)
 speciosus (Dolicheremaeus) *sp. inq.*
spectabilis (**Fissurobates**)
spectabilis (**Rhynchoribates**)
 spectabilis (Sphaerochthonius)
 sphaerica (Ceratoppia)
sphaerica (**Ceratoppia**)
sphaericus (**Annobonzetes**)
sphaericus (**Liacarus**) (=xylariae)
 sphaericus (Punctoribates)
sphaeroclava [**I. (Mancoribates)**]
sphaerodendron (**Sternoppia**)
sphaeroides (**Scheloribates**)
sphaeroides (**Scheloribates**)
 sphaeroides (Topobates)
sphaeroideus (**Austrocarabodes**)
 sphaerula (Austrocarabodes)
sphaerula (**Taeniogalumna**)
 sphaerula (Unguizetes)
 sphaerula (Unguizetes)
 sphaerulus (Ellipsozetes)
sphaerulus (**Phthiracarus**) (=globosus)
sphagni (**Limnozetes**) (=ciliatus)
 sphagni [M. (Neobelba)]
sphagnicola [**K. (Niosuctobelba)**]
sphagnicola (**Processoppia**)
sphagnicola (**Trhypochthonius**) (=nigricans)
sphagnicola (**Tyrphonothrus**) (=maior)
sphagnicolus (**Hydrozetes**)
 spherisensilla [O. (Zygoribatula)] exilis
spicata (Suctobelbata)
 spiciger (Poecilochthonius)
spiciger (**Poecilochthonius**)
 spiciger (Poecilochthonius)

spiciger (*Poecilochthonius*)
 spiculatus (*Ceratozetes*)
spiculifer [Y. (*Berndobodes*)]
spiculifera (*Acrotritia*) (=sinensis)
spiculifera [O. (*Oxyoppiella*)]
spiculifera [O. (*Oxyoppiella*)]
spiculigera (*Suctobelbella*) *sp. inq.*
spilotus [X. (*Stonyxenillus*)]
 spina (*Joelia*)
spinatus (*Eupterotegaeus*)
spinatus (*Neseutegaeus*)
spinatus (*Rhacaplacarus*)
spindleformis (*Cycloppia*)
spindleformis (*Eremulus*)
spindleformis (*Neoribates*)
 spinifer (*Camisia*)
spinifer (*Camisia*)
spinifer (*Camisia*)
spinifer (*Camisia*)
spinifer (*Eremulus*)
spinifera (*Baloghia*)
spinifera (*Banksinoma*)
spinifera [M. (*Hammeroppia*)]
spiniferus (*Rhacaplacarus*)
spiniformis (*Carabodes*)
spiniformis (*Notophthiracarus*)
spiniformis (*Peloribates*)
spiniformis [N. (*Steganacarellus*)]
 spiniger [H. (*Kakophthiracarus*)]
spiniger (*Liacarus*)
spiniger [P. (*Tectodamaeus*)]
spinipes (*Ceratoppia*) *bipilis*
spinipes (*Ceratoppia*) *bipilis*
spinipes (*Ceratozetella*) (?=maxima)
spinipes (*Nosybelba*)
spinipes (*Physobates*)
spinipes (*Scutovertex*) *sp. inq.*
spinipes (*Tikizetes*)
spiniseta (*Hermanniella*)
spinitecta (*Heterobelba*)
spinogenuala (*Trichoribates*)
spinosa (*Achipteria*) *armata ssp. inq.*
spinosa (*Apoplophora*)
spinosa (*Gymnodampia*)
spinosa (*Mesotritia*) (=maerkeli)
spinosa (*Oribotritia*)
spinosa (*Oxyoppia*)
spinosa (*Phauloppia*) (=lucorum)
spinosa (*Porobelba*)
spinosissima (*Heterobelba*)
spinosissima (*Lucoppia*) (=burrowsi)
spinosus (*Carabodes*)
spinosus (*Cepheus*)
spinosus (*Cosmochthonius*)
spinosus (*Eremulus*)
spinosus (*Eupelops*) (=acromios)
spinosus (*Megeremaeus*)
spinosus (*Nasobates*)
spinosus (*Papillacarus*)
spinosus (*Seteremaeus*)
spinosus (*Steganacarus*)
spinosus (*Steganacarus*)
spinosus [M. (*Stylozetes*)]
spinosus (*Tectocephus*) (=velatus)
spinosus [P. (*Triaunguis*)]
spinosus (*Trhypochthonius*) *tectorum*
spinosus [C. (*Xiphobates*)] (=rastratus)

spinosus (*Zetomimus*)
spinulosa (*Peloptoribula*)
spinulosa (*Synichotritia*)
spinulosa (*Synichotritia*)
spinulosus (*Neotrichozetes*)
spinus (*Euphthiracarus*)
spinus [H. (*Kakophthiracarus*)]
spinus (*Notophthiracarus*)
spinus (*Rhacaplacarus*)
spirochaeta [S. (*Ussuribata*)]
spirochaeta [S. (*Ussuribata*)]
spirofilus [H. (*Platynothrus*)] (=peltifer)
 spirulatus (*Hemileius*)
spitsbergensis (*Ceratozetes*)
spitsbergensis (*Ceratozetes*)
splendens [L. (*Dorycranosus*)]
splendens [O. (*Moritzoppiella*)]
splendens [O. (*Moritzoppiella*)]
splendens [O. (*Moritzoppiella*)]
splendidus (*Sphaerochthonius*)
splendidus (*Sphaerochthonius*)
splendidus (*Sphaerochthonius*)
splendidus (*Sphaerochthonius*)
splendidus (*Sphaerochthonius*)
splendidus (*Sphaerochthonius*)
spongiosus (*Eupelops*)
spooft (*Ameronothrus*) (=marinus)
 spora (*Muliercula*)
spora (*Muliercula*)
springmythi (*Nothrus*)
springthorpei (*Pheroliodes*)
spumosa (*Heterobelba*)
spurcus (*Notophthiracarus*)
sqamaceus (*Umbellozetes*)
squamiger (*Neoliodes*) *sp. inq.*
squamiseta (*Suctobelbella*)
squamosa (*Suctobelbilla*)
squamosa (*Suctobelbilla*)
squamosus (*Austrocarabodes*) *imperfectus*
squarrosa (*Oppiella*) (=nova)
squarrosa (*Quadroppia*)
stabelchodi (*Trichoribates*) *sp. inq.*
stagaardi (*Capillibates*)
stagnatilis (*Melanozetes*)
starki (*Adrodamaeus*)
staryi [G. (*Angulogalumna*)]
staryi (*Tamdamaeus*)
stebaevae (*Costeremus*)
stebaevae (*Licnodamaeus*)
steinboeckii (*Eupterotegaeus*) (=ornatissimus)
steineri (*Scutovertex*) (=sculptus)
steinmanni (*Fissicepheus*)
steinmanni (*Pilogalumna*)
stellata (*Cyrthermannia*)
stellata (*Cyrthermannia*)
stellata (*Pedrocortesella*)
stellatus (*Passalozetes*)
stellatus (*Peloribates*)
stellifer (*Cuspitiegula*)
stellifer (*Hymenozetes*)
stellifer (*Hypozetes*)
stellifer (*Passalozetes*)
stellifera (*Heterobelba*)
stellifera (*Heterobelba*)
stellifera (*Multioppia*)
stellifera (*Multioppia*)
stellifera (*Multioppia*)

- stenodes* [R. (*Mantigueracarus*)]
stenolamellatus (*Exochocephus*)
stenos [H. (*Kakophtthiracarus*)]
stenotus (*Phthiracarus*)
stenotus [N. (*Steganacarellus*)]
stenotus [N. (*Steganacarellus*)]
stepensis (*Xenillus*) (=sculptus)
stepposa (*Jacotella*) (=austriaca)
stercus (*Trhypochthonius*) *tectorum*
stercus (*Trhypochthonius*) *tectorum*
sterigma (*Acrotritia*)
sterigma (*Acrotritia*)
sterigma (*Crotonia*)
sternalis [S. (*Metaleius*)] (?=*strenzkei*)
sticta (*Niloppia*)
stigmata (*Granuloppia*)
stigmata (*Granuloppia*)
stigmatus [T. (*Cristonothrus*)]
stigosus (*Hoplophthiracarus*)
stiktos (*Eueremaeus*)
stilifera (*Hoplophorella*)
stilifera (*Hoplophorella*)
stilifera (*Hoplophorella*)
stilifera (*Hoplophorella*)
stipatus (*Ghilarovus*)
stipularis [K. (*Stakarenoppia*)]
storkani (*Oribotritia*) *sp. inq.*
storkani (*Pergalumna*)
stramineus [P. (*Archiphthiracarus*)] (?=*bryobius*)
strandii (*Diapterobates*) (=notatus)
stratus (*Scapheremaeus*)
strenzkei (*Bipassalozetes*)
strenzkei (*Eupelops*)
strenzkei (*Gehyphochthonus*)
strenzkei (*Lanceoppia*)
strenzkei (*Liochthonius*)
strenzkei (*Liochthonius*)
strenzkei (*Liochthonius*)
strenzkei [S. (*Metaleius*)]
striata (*Apoplophora*) (=pantotrema)
striata (*Joshuella*)
striata (*Joshuella*)
striata (*Macquarioppia*)
striata (*Microtritia*)
striata (*Oribotritia*)
striata (*Pergalumna*)
striata (*Phauloppiella*)
striata (*Sabahtritia*)
striata (*Sternoppia*)
striata [O. (*Zygoribatula*)] (=exarata)
striatiprodorsum (*Pergalumna*)
striatissima (*Microtritia*)
striatissima [O. (*Zygoribatula*)] (=connexa)
striatissimus (*Cosmozetes*)
striatissimus (*Neoribates*)
striatomarginatus (*Scapheremaeus*)
striatus (*Adrodamaeus*)
striatus (*Adrodamaeus*)
striatus (*Bipassalozetes*)
striatus (*Ceratozetes*)
striatus (*Damaeus*)
striatus (*Hispanozetes*)
striatus (*Megatrichobates*)
striatus (*Meristacarus*)
striatus (*Neoliodes*)
striatus (*Neoliodes*)
striatus [L. (*Paralamellobates*)] (=misella)
- striatus* (*Peudotectoribates*) *subsimilis*
striatus (*Scheloribates*) *Ham.*, 58
striatus (*Scheloribates*) *Ham.*, 58
striatus (*Scheloribates*) C.-R., 80 (=multirepetitus)
striatus (*Sellnickochthonius*) (=immaculatus)
striatus (*Trichoribates*)
striatus (*Trichoribates*)
striatus (*Unguizetes*)
strictior (*Eobrachychthonius*) (=latior)
strictus (*Notophthiracarus*)
striculus (*Atropacarus*)
striculus (*Atropacarus*)
striculus (*Atropacarus*)
striculus (*Atropacarus*)
striganae (*Asperemaeus*)
striganae (*Fissicepheus*)
strigatus (*Trichoribates*)
strigosa [H. (*Phyllhermannia*)]
strigosus [N. (*Protophthiracarus*)]
strigulata (*Pergalumna*)
strinatii (*Oribatella*)
strinatii [R. (*Rectoppia*)]
strinatii (*Sphaerochthonius*)
strinovichi (*Galumna*)
strinovichi [C. (*Klapperiches*)]
strinovichi [C. (*Klapperiches*)]
strinovichi (*Magyaria*)
strinovichi (*Setoppia*)
striolatus (*Notophthiracarus*)
striolatus (*Scheloribates*)
struthio [O. (*Oxyoppiella*)]
stunkardi (*Nasozetes*)
stunkardi (*Nasozetes*)
stupenda (*Vaghia*)
sturmi (*Anderemaeus*)
sturmi (*Neoamerioppia*)
sturmi (*Pseudotocepheus*)
sturmi (*Truncozetes*)
stylesi (*Eutegaeus*)
stylosanthes (*Haplochthonius*)
styosetosus (*Arborichthonius*)
styosetosus (*Arborichthonius*)
styosetosus (*Arborichthonius*)
stypheles (*Rhacaplacarus*)
styriaca (*Epilohmannia*)
subaequalis (*Eurhynchoribates*)
subaequalis (*Pergalumna*) (=myrmophila)
subalpinus (*Carabodes*) *sp. inq.*
subalpinus (*Gymnodamaeus*)
subantarctica [O. (*Zygoribatula*)]
subaquila (*Ceratozetes*)
subarcticus (*Carabodes*)
subareolata (*Galumnella*)
subborealis (*Propelops*) (=monticolus)
subcarinatus (*Carabodes*)
subcedrus (*Euphthiracarus*)
subciliata (*Hoplophorella*)
subclavatus (*Fissicepheus*)
subcomplexa (*Parasuctobelba*)
subcomplexa (*Parasuctobelba*)
subcorniger (*Scapheremaeus*)
subcornigera (*Suctobelbella*)
subcornigera (*Suctobelbella*)
subcornigera (*Suctobelbella*)
subcornigera (*Suctobelbella*)

- subericoides* (*Brachychthonius*) (=impressus)
 subdolos (*Phthiracarus*)
 subexutus (*Eupelops*)
subfallax [*O. (Moritzoppiella)*]
 subglaber (*Micreremus*)
subglaber (*Pilizetes*)
subglaber (*Scapheremaeus*)
 subglabra [H. (*Heterohermannia*)]
subglabra [H. (*Heterohermannia*)]
subglobosus (*Phthiracarus*) (=globosus)
 subglobulus (*Chamobates*)
subiasi (*Africoribates*)
 subiasi [P. (*Archiphthiracarus*)]
subiasi (*Dolicheremaeus*)
 subiasi [D. (*Epidamaeus*)]
 subiasi (*Epimerella*)
 subiasi [S. (*Lalmoppia*)]
 subiasi (*Liacarus*)
 subiasi (*Phyllozetes*)
 subiasi (*Tainsculptoppia*)
subiasi (*Tripiloppia*)
subinconspicuus (*Ceratozetes*)
 subintectus (*Sphaerozetes*) *sp. inq.*
subita (*Hoplophorella*)
 sublanatus (*Cosmochthonius*)
 sublestus (*Mixacarus*)
 submolesta (*Oribotritia*)
subniger (*Sadocephus*)
subniger (*Tegoribates*)
subnigra (*Hermanniella*)
subnigra (*Hermanniella*)
subnitida [L. (*Antennoppia*)] *sp. inq.*
 subnitidus (*Ovobates*)
 subnuda (*Trichogalumna*)
subnudus (*Gymnobodes*)
subnudus (*Xenillus*)
 subpectinata (*Rhinoppia*)
subpectinata (*Rhinoppia*)
subpectinata (*Rhinoppia*)
 subrasus [T. (*Cristonothrus*)]
subsellata (*Hoplophorella*)
subseminulum (*Ceratozetella*) (?=maxima)
subsimilis (*Dolicheremaeus*)
subsimilis (*Pilizetes*)
 subsimilis (*Pseudotectoribates*)
subsimilis (*Pseudotectoribates*)
subsimilis (*Schelorbates*) Mih., 56 (=barbatulus)
subsimilis (*Schelorbates*) Bal., 62 (=caprai)
 subspinipes (*Scutovertex*)
substriata [*O. (Zygoribatula)*] *connexa*
 substrictus (*Atropacarus*)
 subterraneus (*Liacarus*)
subterraneus (*Liacarus*)
 subtilis [M. (*Parplophora*)]
subtilis [M. (*Parplophora*)]
subtilis [M. (*Parplophora*)]
subtilis (*Pseudotocephus*)
subtilis [P. (*Tectodamaeus*)] *sp. inq.*
subtilisfinem [P. (*Tectodamaeus*)]
 subtrigona [S. (*Flagrosuctobelba*)]
subtrigona [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 subtrigona [S. (*Flagrosuctobelba*)]
subtrigona [S. (*Flagrosuctobelba*)]
 subtropica (*Taiwanoppia*)
subtropicus [S. (*Perschelorbates*)]
subula (*Pedrocortesella*)
 subulatus (*Eupelops*) *sp. inq.*
- subuliger (*Eupelops*)
subuligera (*Lasiobelba*)
subverticillipes [D. (*Spatiodamaeus*)] (=verticillipes)
succincta (*Oribotritia*)
succinctus (*Rhacaplacarus*)
 suchetae (*Lasiobelba*)
suciui [R. (*Insculptoppia*)]
suctobelboides (*Suctobelbila*)
suctorius (*Suctoribates*)
sudafricanus [P. (*Archiphthiracarus*)]
sudafricanus (*Schelorbates*)
sudamericana [R. (*Rectoppia*)] *fasciata*
sudamericanus [P. (*Archiphthiracarus*)]
sudamericanus [E. (*Pocsia*)]
sudetica (*Oromurcia*) (=bicuspidata)
 suecicus (*Sellnickochthonius*)
suecicus (*Sellnickochthonius*)
suecicus (*Sellnickochthonius*)
sufflata [H. (*Varioppia*)]
sufflexa (*Belba*) (=corynopus)
 suiyangensis (*Sacculogalumna*)
 suiyangensis (*Sacculogalumna*)
sulcatomarginata (*Pergalumna*)
sulcatus (*Afronothrus*) (=incisivus)
 sulcatus (*Dolicheremaeus*)
 sulcatus (*Eupelops*)
sulcatus (*Eupelops*)
sulcatus (*Hammerabates*)
sulcatus (*Notophthiracarus*)
 sultan (*Sacculobates*)
sumatrana (*Hypochthoniella*)
 sumatrana (*Hypochthoniella*)
 sumatranus (*Dolicheremaeus*)
 sumatranus (*Notophthiracarus*)
 sumatrensis (*Achipteria*)
 sumatrensis [F. (*Cosmogalumna*)]
 sumatrensis (*Nasozetes*)
sumatrensis (*Oppiella*) (=nova)
 summersi (*Notophthiracarus*)
 sumonyii (*Oripoda*)
 sundaicus [M. (*Trimalaconothrus*)] *foveolatus*
sundarbanensis (*Hoplophorella*) (=singularis)
 sundensis (*Graptoppia*)
 sundensis (*Meristacarus*)
 sungai (*Microzetes*)
 sungohi (*Gymnodampia*)
 suoxiensis (*Mixacarus*)
superba (*Camisia*) (=spinifer)
 superbula [O. (*Bioribatella*)]
 superbula [O. (*Bioribatella*)]
superbus (*Gibbicepheus*)
superbus (*Xenillus*)
superporosa (*Allogalumna*)
 supertrichus (*Heptacarus*)
supertrichus (*Heptacarus*)
 sputincus (*Euphthiracarus*)
sura (*Pergalumna*)
suramericana (*Multoribula*)
 suramericana [O. (*Oxyoppiella*)]
suramericana [O. (*Oxyoppiella*)]
suramericana [O. (*Oxyoppiella*)]
suramericanus (*Benoibates*)
suramericanus (*Cosmochthonius*) *plumatus*
suramericanus (*Cosmochthonius*) *plumatus*
suramericanus (*Cosmochthonius*) *plumatus*
suramericanus (*Eupelops*)

suramericanus (Eupelops)
suramericanus (Hemileius)
suramericanus (Hemileius)
suramericanus (Nothrus)
surigaoensis [O. (Acrotocepheus)]
surigaoensis [S. (Perscheloribates)]
 suzukii (Sphaerochthonius)
suzukii (Sphaerochthonius)
 svetlanae (Anachipteria)
swezevi (Galumna)
swezevi (Neoliodes) sp. inq.
swiftae [S. (Lucioppia)]
swiftae (Phthiracarus)
sylicola (Scheloribates) (=lanceoliger)
 symmetrica (Basilobelba) retiaria
 symmetrica (Machadobelba)
 symmetrica (Machadobelba)
symmetrica (Malacoangelia) (=remigera)
 synlamellata (Beckiaella)
 szabadosi Neoribates
 szaboi [O. (Monoribatella)]
 szaboi (Setoppia)
szanisloi (Epilohmannia) (=cylindrica)
 szemesi (Oribatella)
szemmelveisi (Liochthonius)
szentirmayi (Cycloppia)
 szentivanyi (Austrocarabodes)
 szentivanyi (Austrocarabodes)
szentivanyi (Cultroribula) (=bicultrata)
szentivanvi (Dolicheremaeus)
 szentivanyi (Szentivanyella)
szentivanvorum (Galumna)
szentivanvorum (Pseudotocepheus)
szeptvckii (Hoplophorella)
szeptvckii (Notophthiracarus)
szeptvckii (Rhacaplacarus)
 szerediae (Acaroceras)
 szirakii (Peloribates)
 szunyoghyi (Oribatella)
taberlyi (Solenoppia)
 tablasota (Oribatula) sp. inq.
 tabuencai (Plesiodamaeus)
 tabulatus [T. (Laminizetes)]
 tabulatus (Paradolicheremaeus)
tadrosi [O. (Zygoribatula)] (=undulata)
 taeda [E. (Neopilohmannia)]
 taedaceus (Gymnodamaeus) sp. inq.
taeniata (Trichogalumna)
 taeniophorus (Amnemochthonius)
taeniophorus (Amnemochthonius)
 taftensis [O. (Acrotocepheus)]
tahitiana (Austrotritia) lebronneci
tahitiensis (Eupelops)
tahitiensis [S. (Flagrosuctobelba)] semiplumosa
 tahitiensis [S. (Flagrosuctobelba)] semiplumosa
tahitiensis [S. (Flagrosuctobelba)] semiplumosa
tahitiensis (Ozacus)
tahitiensis (Pergalumna)
 taibaiensis (Mixacarus)
 taidinchani (Dolicheremaeus)
 taidinchani (Perxylobates)
 taigagica [F. (Mexicoppia)]
 taira (Protoribates)
 taisetsuensis (Nothrus)
 taisetsuensis (Trhypochthoniellus)
 taishanensis (Cryptoribatula)
 taiwanensis (Humerobates)

taiwanica (Brassiella)
 taiwanica (Dometorina)
 taiwanica (Epilohmannia)
 taiwanica (Fortuynia)
 taiwanus (Dolicheremaeus) infrequens
 taiwanus (Dolicheremaeus) infrequens
 tajikistanica (Pyroppia)
tajikistanica (Pyroppia)
 takahashii (Euphthiracarus)
 takahashii (Euphthiracarus)
 takara (Fissicepheus) mitis
 takara (Fissicepheus) mitis
 takasago (Cepheus)
 takenouchiensis (Fissicepheus)
 takensis (Protoplophora)
 talacrensis [L. (Baioippia)]
talaitae [M. (Trimalaconothrus)]
talarica (Siculobata)
 talis [O. (Zygoribatula)]
talischica [A. (Conchogneta)] (=willmanni)
 talpae (Oribatella)
tamaki [N. (Besuchetacarus)]
 tamarae (Hydrozetes)
 tamayura (Banksinoma)
 tamdao (Multioppia)
tamdaensis (Xenillus)
 tameya [O. (Zygoribatula)]
taminae (Ramusella) (=clavipectinata)
 tamlaensis (Nippobodes)
 tamlaensis (Nippobodes)
 tamurai (Dolicheremaeus)
 tamurai [K. (Niosuctobelba)]
 tana (Sceletoppia)
 tanaitica (Graptoppia)
 tanana (Melanozetes)
 tanganyikensis (Metabelba)
tanjili [H. (Phyllhermannia)]
tanngardenensis (Maudheimia)
tantilla (Trichogalumna) (=curva)
 tanythrix (Euphthiracarus)
 tanytrichosus (Peloptulus)
 tanzanica (Galumnella)
 tanzanica (Pergalumna)
 tanzanica (Taeniogalumna)
 tanzanicus (Liochthonius)
 tanzanicus (Topobates)
 tanzica (Machadobelba)
 tanzicus (Liacarus)
 tanzicus [M. (Megazetes)]
 tanzicus (Rhacaplacarus)
 taprobanae (Tenuelamellarea)
 taprobanae (Pergalumna)
 taprobanicus (Machadocepheus)
 tarandus (Austrocarabodes)
 tarbae [C. (Flexa)]
 tardus (Eupelops)
tardus (Phthiracarus) (=longulus)
 tardus [M. (Trimalaconothrus)]
 tardus [M. (Trimalaconothrus)]
 targionii (Heminothrus)
 targionii (Heminothrus)
 targionii (Heminothrus)
targionii (Heminothrus)
 tarmani (Minunthozetes)
tarraswahlbergi (Tripiloppia)
 tarsipennata (Galumna)
 tarsipennata (Galumna)

- tasdemiri [R. (Paramedioppia)]
 tasetata (Ramusella)
tasetata (Ramusella)
 tashkentae (Oribotritia)
tasmaniana (Crotonia)
tasmanica (Crotonia)
tasmanica [L. (Lancelalmoppia)]
 tatarica [S. (Flagrosuctobelba)]
 tattrica (Camisia)
 tatricus [D. (Epidamaeus)]
tatricus [D. (Epidamaeus)]
 tatricus (Fuscozetes)
 tatyanae (Peloribates)
taungensis (Zetorchella)
 tauricus (Damaeus)
 tauricus (Phyllozetes)
taurina (Camisia) (=spinifer)
taurus (Acaroceras)
taurus (Congocephus)
 taurus (Cosmochthonius)
taurus [O. (Dzarogneta)]
 taurus (Scapheremaes)
taurus (Scapheremaes)
 tavruei (Phauloppia)
tawhai [N. (Phthirarica)]
taylori (Tyrphonothrus)
 teberdaensis (Oribotritia)
 tecticola [D. (Kunstidamaeus)]
 tectopedacutus (Trichoribates) *sp. inq.*
tectopediosa [S. (Dyobelba)]
 tectoria (Joshuella)
 tectorum (Trhypochthonius)
tectorum (Trhypochthonius)
tectorum (Trhypochthonius)
tectorum (Trhypochthonius)
tectorum (Trhypochthonius)
 tectus (Ophidiotrichus)
 tectus (Podopterotegaeus)
tectus (Podopterotegaeus)
tectus (Podopterotegaeus)
 tegeocranus (Xenillus)
tegeocranus (Xenillus)
 tegularum (Gymnodampia)
tegulatus (Scapheremaes)
 teldanicus (Scheloribates)
 temperata (Pedrocortesella)
temperata (Pedrocortesella)
templadoi (Rhinoppia) (=media)
 tenareae (Haloribatula)
 tenareae (Haloribatula)
 tenasserimensis [M. (Phyllohermannia)]
tenella (Oribatula) (=pannonica)
tenensis [F. (Cosmogalumna)]
 tenerifensis [C. (Klapperiches)]
 tenerifensis (Oribatella)
 tenerifensis (Steganacarus)
tenorioae (Scriptoripoda)
 tentaculus (Protoribates) *capucinus sp. inq.*
 tenue (Multioppia)
tenuelamellata [O. (Zygoribatula)] (=frisiae)
 tenuiclava (Pilogalumna)
tenuiclava (Pilogalumna)
tenuiclava [H. (Platynothrus)]
tenuicoma (Brachioppiella)
tenuicoma (Nanhermannia)
 tenuifusus [L. (Incabates)]
 tenuilamellatus [L. (Dorycranosus)]
- tenuipectinata (Lauropia)
 tenuipes [D. (Kunstidamaeus)]
tenuipes [D. (Kunstidamaeus)]
tenuis (Arthrodamaeus) (?=rosarius)
 tenuis (Berniniella)
 tenuis (Carabodes)
tenuis [D. (Cylindropia)]
tenuis (Eremulus)
 tenuis (Hemileius)
 tenuis (Kuklosuctobelba)
 tenuis (Liebstadia)
 tenuis [O. (Monoribatella)]
tenuis [S. (Perscheloribates)]
tenuis (Phthiracarus) (=boresetosus)
tenuis (Protoribates)
tenuis (Tectocephus) (=velatus)
tenuisensillatus (Eueremaes) (=quadrilamellatus)
 tenuiseta [N. (Confinoppia)] *confinis*
tenuiseta (Mimoppia)
tenuiseta [N. (Steganacarellus)]
tenuiseta [H. (Phyllhermannia)]
tenuiseta (Pseudotocephus)
 tenuiseta (Scheloribates) *praeincisus*
tenuiseta (Scheloribates) praeincisus
 tenuiseta [O. (Zygoribatula)]
 tenuiseta [O. (Zygoribatula)]
 tenuisetiger (Eremaeus)
 tenuisetosa (Belba)
 tenuisetosa (Hermannia)
tenuisetosa (Nanhermannia)
 tenuisetosus [D. (Epidamaeus)]
tenuisetosus (Thalassozetes)
 tenuisetus (Cosmochthonius)
tenuisetus (Dolicheremaes)
tenuissimus [D. (Epidamaeus)]
 tenuitibialis [D. (Epidamaeus)]
tepetlensis [T. (Latilamellobates)]
tepoztecus (Trhypochthonius)
tequila (Berniniella)
 teraja (Arcoppia)
terebrantis (Orthogalumna)
terebrantis (Orthogalumna)
teretis (Oribotritia)
terminalis (Eupelops)
terminalis (Nothrus) (=monodactylus)
termitophila [P. (Ausoribula)]
 terrae (Epilohmannoides)
terrae (Epilohmannoides)
 terrae (Epilohmannoides)
terrae (Epilohmannoides)
terrapiene (Atropacarus)
terrestris (Hydrozetes) (=confervae)
 terrestris (Neoliodes)
terrestris (Neoliodes)
 terrestris (Neoliodes)
terrestris (Neoliodes)
 terricola (Hypogeoppia)
terricola (Hypogeoppia)
terricola (Hypogeoppia)
 terricola [R. (Insculptoppia)]
terricola [O. (Zygoribatula)] (=connexa)
tesselatus (Euphthiracarus)
tessellata (Ferolocella)
 tessellata (Galumna) *sp. inq.*
testacea (Mesotritia) (=flagelliformis)
testudineus (Phthiracarus) (?=italicus)
tetradis (Indotritia)

tetraporosa (*Galumna*)
tetrasetosus (**Protoribates**)
tetrasklerosis (*Zachvatkinibates*)
tetrosus (*Eueremaeus*)
teuri (**Galumna**)
texana (*Galumna*)
texana (**Hoplophorella**)
texana (*Lohmannia*)
texana (*Mochloribatula*)
texana (*Oribatella*)
thabazimbiensis (**Eupelops**) **sulcatus**
thaiensis [P. (**Archiphthiracarus**)]
thaiensis (**Fissicepheus**)
thaiensis (**Nanhermannia**)
thailandica (*Nothrolohmannia*)
thalassophila [O. (*Zygoribatula*)]
thaleri (*Carabodes*)
thamdrupi [**L. (Hamoppia)**]
thanhoaensis (**Perxylobates**)
thani (*Hermanniella*)
theleproctus (*Neoliodes*)
theleproctus (*Neoliodes*)
theleproctus (**Neoliodes**)
theleproctus (*Neoliodes*)
theliis (*Gymnodamaeus*)
thermophilus (*Scheloribates*)
thermophilus (**Scheloribates**)
thermophilus (**Tutorozetes**)
thienemanni (*Ceratozetella*)
thienemanni (*Ceratozetella*)
thienemanni (*Ceratozetella*)
thienemanni (*Hydrozetes*)
thienemanni (*Hydrozetes*)
thienemanni [H. (*Monoschelobates*)]
thienemanni [**H. (Monoschelobates)**]
thoreau (*Rhacaplacarus*)
thori [H. (*Capillonothus*)]
thori [H. (*Capillonothus*)]
thori [H. (*Capillonothus*)]
thori [**L. (Lancelalmoppia)**]
thorntonensis [P. (**Archiphthiracarus**)]
thujae (*Hemileius*)
thysanura (*Psammogalumna*)
tianmuensis (**Mixacarus**)
tianmuensis (*Sabahtritia*)
tianshanensis [P. (*Montizetes*)]
tianshanensis (*Trichoribates*)
tianshanicus (*Megalotocepheus*)
tianshanicus (*Pantelozetes*)
tianshanicus [H. (*Simkinia*)]
tibetensis (*Acrotritia*)
tibialis (**Bipassalozetes**) (?=**perforatus**)
tibialis (*Eupelops*)
tibialis (*Oribatula*)
tibialis (*Oribatula*)
tibialis (*Oribatula*)
tibialis (*Oribatula*)
tichomirovae (*Berniniella*)
tichomirovi (*Pallidacarus*)
tichonravovi (*Metabelbella*)
tidbinbilla [**M. (Trimalaconothrus)**]
tierradelfuegoensis [P. (*Oribellopsis*)]
tierradelfuegoensis (**Zeasuctobelba**)
tillandsiae (*Scapheremaeus*)
tillandsiophilus (*Scapheremaeus*)
tillandsius (*Peloribates*) (=hubbardi)
timah (*Bukitritia*)
timah (*Bukitritia*)
tinctus (**Notophthiracarus**)
titanius (**Tectocephus**) (=velatus)
tiunovi (*Galumnella*)
tiwi (**Oribotritia**)
tjanshanicus (*Trichoribates*)
tjibodensis (*Spinotocepheus*)
tobaicus (*Hydrozetes*)
tobiasi [**R. (Insculptoppia)**]
todori (*Hermanniella*)
toelgyesii (*Suctobelbella*)
toeroeki (**Setoppia**)
tofinoensis (*Ceratoppia*)
tohivea (*Notophthiracarus*)
tohivea (**Notophthiracarus**)
tohokuensis (*Protoribates*)
tohokuensis (*Sadocepheus*)
tohokuensis (*Suctobelbella*)
tokara (*Allosuctobelba*) *tricuspidata*
tokara (*Nanhermannia*)
tokaraensis (*Nippobodes*)
tokukoae (*Oribotritia*)
tokyoensis (*Galumna*)
tokyoensis (*Ramusella*) *sengbuschi*
tolanaro (**Pseudotocepheus**)
toletana (**Serratoppia**) (?=**intermedia**)
tolstikovi (*Lopholiodes*)
tolstikovi (*Neogalumna*)
tonatiuh (*Scapheremaeus*)
tongaensis (**Neotrichocephus**)
tongaensis (**Pilogalumna**)
tongatapuensis (**Nesopelops**)
tonkini [**M. (Trimalaconothrus)**]
toolangiensis (**Hoplophthiracarus**)
topali (*Phauloppia*)
topali [**L. (Undulozetes)**]
torii (*Punctoribates*)
torosus [P. (*Archiphthiracarus*)]
torquatus [S. (*Perscheloribates*)] *clavatus*
torquatus [S. (*Perscheloribates*)] *clavatus*
torquisetosus (*Damaeus*)
torrijosi (*Oribatula*)
tortile (**Lanceoppia**)
tortilis [O. (*Zygoribatula*)]
tortilis [O. (*Zygoribatula*)]
tortuosa (*Acanthobelba*)
torulosus (*Eupelops*)
torulosus (**Eupelops**)
torvus [D. (*Spatiodamaeus*)] (?=**verticillipes**)
tosaensis (*Scapheremaeus*)
totus [P. (*Archiphthiracarus*)]
totus [P. (*Archiphthiracarus*)]
toxotes (**Setoppia**)
traegardhi (*Acaronychus*)
traegardhi (*Acaronychus*)
traegardhi (*Acaronychus*)
traegardhi (*Acaronychus*)
traegardhi [A. (*Conchogneta*)]
traegardhi [A. (*Conchogneta*)]
traegardhi [D. (*Epidamaeus*)] (=fortispinosus)
traegardhi (*Magellozetes*) *antarcticus* ssp.inq.
traegardhi [**N. (Phthirarica)**]
traegardhi (**Tripiloppia**)
transcripta (*Novoribatella*)
transitans (*Oribatula*) sp. inq.
transitans (*Oribatula*) sp. inq.
transitans (*Steganacarus*) (=magnus)

- transitoria Fenestrobilba
transitoria (*Mahunkella*)
transitoria (*Neosuctobelba*)
transitoria (*Parapyropia*) sp. inq.
transitus (Joshuella)
transitus (Joshuella)
translamellaris [M. (*Hammeroppia*)]
translamellaris (*Scheloribates*) (=sandvicensis)
translamellaris (*Tectocephus*) (=velatus)
translamellata (*Acroppia*)
translamellata (Ceratozetella)
translamellata (Ctenobelba)
translamellata [*O. (Moritzoppiella)*] (=neerlandica)
translamellata (Ramusella)
translamellata (*Teratoppia*)
translamellatus (*Allozetes*)
translamellatus (*Allozetes*)
translamellatus (*Allozetes*)
translamellatus (Anellozetes) Shald., 71
***translamellatus* (*Anellozetes*) Shald., 71**
translamellatus (*Anellozetes*) Mah., 85 (=neonominatus)
translamellatus [*T. (Cristonothrus)*]
translamellatus [*T. (Cristonothrus)*]
translamellatus (*Eremaeus*)
translamellatus (*Eremaeus*)
translamellatus (*Eremaeus*)
translamellatus (*Eremulus*)
translamellatus (*Euscheloribates*)
translamellatus (*Hemileius*)
translamellatus (*Hypozetes*)
translamellatus (*Hypozetes*)
translamellatus [*C. (Klapperiches)*] similis
translamellatus (*Liacarus*) (=xylariae)
translamellatus [*S. (Perscheloribates)*]
translamellatus (*Tectocephus*) (=velatus)
translamellatus (*Tenuialoides*) (=fusiformis)
translineata (*Oribatula*)
translineata (*Oribatula*)
translucens (*Lanceoppia*)
translucens (*Lanceoppia*)
transplicatus (*Scheloribates*)
transrugosa (*Suctobelbilla*)
transrugosa (*Suctobelbilla*)
transstriata (*Oribatella*)
transvaalensis [*H. (Phyllhermannia)*]
transvaalensis (*Zetorchestes*)
transvaalensis (*Zetorchestes*)
transvectus (*Orbiculobates*)
transversa (*Allogalumna*) (=integer)
transversalis (*Cepheus*) sp. inq.
transversalis (*Coartobelba*)
transversalis (*Hypovortex*)
transversalis (*Hypovortex*)
transversalis (*Pseudotocephus*) (=amonstruosus)
transversaria (*Nanhermannia*)
transversarius (*Carabodes*)
transversus (*Nesopelops*)
transversus (*Pheroliodes*)
transversus (*Sphaerochthonius*)
transversus (*Sphaerochthonius*)
transversus (*Sphaerochthonius*)
transylvanica (*Gustavia*)
transylvanicus (*Cepheus*)
trapezoida (*Lauropia*)
trapezoidea [*Q. (Coronoquadroppia)*]
trapezoides [*L. (Baippia)*]
trapezoides (*Notophthiracarus*)
travei (*Austrocarabodes*)
travei (*Eueremaeus*)
travei (*Licnodamaeolus*)
travei [*E. (Neoatrichosus)*]
travei (*Niphocephus*)
travei (*Provertex*)
travei (*Solenoppia*)
travei [*C. (Triachipteria)*]
travei (*Tricheremaeus*)
travei [*S. (Tropacarus)*]
travei [*O. (Zygoribatula)*] (=thalassophila)
traversus [*H. (Capillonothrus)*]
tredecemsetosus (*Peloribates*)
trembleyi [*M. (Hammeroppia)*]
tremellae (*Liacarus*) (?=subterraneus)
tremicta [*H. (Phyllhermannia)*]
trentus [*E. (Pocsia)*]
tricantha (*Ramusella*)
triangula (*Nanhermannia*)
triangularibus (*Prototritia*)
triangularis (*Chamobates*) (?=confusus)
triangularis (*Dolicheremaeus*)
triangularis (*Protoribates*)
triangularis (*Protoribates*)
triangulata (*Allogalumna*)
triangulata (*Galumna*)
triangulata (*Lohmannia*)
triangulata (*Oribatella*)
triangulata (*Suctobelbella*)
triangulatus (*Licnodamaeus*)
triangulum (*Trhypochthonius*)
triapicini [*L. (Dorycranosus)*]
triarcuatus (*Pasocephus*)
tribuliformis (*Striatoppia*)
tricarinata (*Dissorhina*) (=ornata)
tricarinata (*Indotritia*)
tricarinatoides (*Dissorhina*)
tricarinatus [*N. (Besuchetacarus)*]
tricarinatus (*Papillonotus*)
tricarinatus (*Scapheremaeus*)
tricarinus (*Scheloribates*)
trichionus (*Liacarus*)
trichoptera (*Oribatella*)
trichosa (*Neoamerioppia*)
trichosa (*Neohermannia*)
trichosa (*Suctobelbella*) (?=pilosetoseta)
trichosa [*O. (Zygoribatula)*] (=connexa)
trichoseta [*L. (Antennoppia)*]
trichosoides (*Neoamerioppia*)
trichosus (*Aleurodamaeus*)
trichosus (*Atropacarus*) (=striculus)
trichosus (*Hemileius*)
trichosus (*Notophthiracarus*)
trichosus (*Trhypochthoniellus*) (=longisetus)
trichosus [*A. (Uluguroides)*]
trichotos [*T. (Paragloboppia)*]
triconica (*Berniniella*) (=bicarinata)
tricornis (*Mahunkaia*)
tricornuta (*Furcoppia*)
tricornuta (*Parasuctobelba*)
tricornutus (*Dolicheremaeus*)
tricostatus (*Mycobates*)
tricuspidata (*Allosuctobelba*)
tricuspidata (*Amazoppia*)
tricuspidata (*Galumna*)
tricuspidata (*Metrioppia*)

- tricuspidata (Metrioppia)
tricuspidatus (Chamobates) (=birulai)
tricuspidatus (Liacarus) (=olivaceus)
 tricuspidatus (Sphaerozetes)
 tridactyla (Oribatella)
tridactylus (Anderemaeus) sp. inq.
 tridactylus [M. (Calyptozetes)]
 tridactylus [M. (Calyptozetes)]
 tridactylus [M. (Calyptozetes)]
tridactylus (Cosmopirnodus)
 tridactylus (Hydrozetes)
 tridactylus (Sphodrocephus)
 tridactylus (Sphodrocephus)
tridactylus (H. (Tuberemaeus))
 tridentata (Cultroribula) sp. inq.
 tridentata (Furcoribula)
 tridentata (Lauropia)
tridentata (Oppia) (=neonominata)
 tridentata (Rhinoppia)
tridentatus (Birsteinus) (=neonominatus)
 tridentatus (Mycobates)
tridentatus (Neomycobates)
tridentatus (Neomycobates)
 tridentifera (Pyropia)
trifasciata (Suctobelbilla)
 trifolius (Lepidozetes)
 trifolius (Lepidozetes)
 trifolius (Lepidozetes)
triforata (Paraphauloppia)
trifoveolatus (Carinozetes)
trifurcata (Cultroribula) (=bicultrata)
trifurcata (Schalleria)
 trifurcus (Eremaeozetes)
triglavensis (Eueremaeus) (=quadrilamellatus)
triglochis (Brachioppia)
 trigona (Suctobelba)
 trigona (Suctobelba)
 trigonalis [D. (Epidamaeus)]
 trigonella [O. (Zygoribatula)]
 trigonosternum (Cavernocarabodes)
triheterodactylis (Acrotritia) (=americana)
 trilabiata (Oripoda)
trilabiata (Oripoda)
 trilobata (Rhinoppia)
 trilobus (Edwardzetes) sp. inq.
trimaculata (Oromurcia) (=lucens)
trimaculatus (Trichoribates) (?=berlesei)
trimorphus (Rostrozetes) (=ovulum)
 trimucronata (Wallworkoppia)
 trimucronatus (Birsteinus)
 trimucronatus (Dolicheremaeus)
 trimucronatus (Leptotocepheus)
trinacriae (Peloptulus) (=reticulatus)
 trinebulosa (Hermannia) sp. inq.
trinidadensis (Plenotocepheus)
trinodosa (Zeasuctobelba)
 trionus (Eueremaeus)
 trionus (Medioxyoppia)
 triops (Galumna)
 tripartita (Arcoppia)
 tripartita (Arcoppia)
 tripartita (Hoplophorella)
 tripartita (Indotritia)
 tripartita (Suctobelbilla)
tripartitus [N. (Besuchetacarus)]
 tripartitus [S. (Makischelorbates)]
- triplicatulus (Unguizetes) (=sphaerula)
 triplicornutus [O. (Acrotocepheus)]
 tripuraensis (Arcoppia)
 tripuraensis (Peloribates)
 tripurensis (Striatoppia)
 tripurensis (Trimalaconthrus)
 triquetra (Apoplophora)
 triquetra (Galumna)
triquetra (Galumna)
 triramosa (Arcoppia)
triramosa (Brachioppia) sp. inq.
triramosa (Brachioppiella)
trirostrata [O. (Zygoribatula)]
 trirugis (Scapheremaeus)
 trirugis (Scapheremaeus)
triseta (Apoplophora) (=marcuardi)
triseta [H. (Tanzoppia)]
trisetosa (Oribotritia)
trisetosus (Austrodamaeus) (=elegantulus)
 trisetosus [E. (Cerostocepheus)]
 trisetosus (Hammerabates)
trisetosus (Hammerabates)
 tristani (Stomacarus)
tristani (Stomacarus)
 tristis (Phthiracarus)
 tristius (Pedrocortesella)
 trisulca (Hoplophorella)
tritici [O. (Zygoribatula)] (=sayedi)
trituberculatus (Zetorchestes) sp. inq.
 tritylos [D. (Epidamaeus)]
 tritylos [D. (Epidamaeus)]
 triangulata (Magyaria)
 triangulatus [I. (Haplozetes)]
 trivandricus (Annectacarus)
trivestigius (Notophthiracarus)
trivialis (Cosmochthonius) (=reticulatus)
 troisi (Amerus)
trojani (Hoplophthiracarus)
trojani [N. (Steganacarellus)]
 tropica (Cultroribula)
 tropica (Dometorina)
tropica (Indotritia) (=krakatauensis)
 tropica (Microtritia)
 tropica (Microtritia)
 tropica (Microtritia)
tropica (Microtritia)
 tropica (Microtritia)
tropica (Pseudantarctica)
tropicalis (Brachioppia)
tropicus (Hoplophthiracarus) (=concinuus)
 tropicus (Sellnickochthonius)
 trowella (Trichogalumna)
 truncata (Berlesiella)
 truncata (Eremobelba)
truncata (Macrogena)
truncata (Membranoppia)
truncata (Notogalumna) sp. inq.
truncata (Pedrocortesella)
 truncata [H. (Phyllhermannia)]
 truncata (Rhinoppia)
 truncata [C. (Triachipteria)]
 truncata [O. (Zygoribatula)]
 truncata [O. (Zygoribatula)]
truncatum (Adoristes) (=ovatus)
 truncatus (Bunabodes)
 truncatus (Eremulus)
truncatus (Eremulus)

truncatus (*Eremulus*)
truncatus (*Euphthiracarus*)
truncatus (*Nothrus*)
truncatus (*Oxyamerus*)
truncatus [U. (*Parauracrobates*)]
truncatus (*Scapheremaeus*)
truncicola (*Suctobelbata*)
trupchumi (*Melanozetes*) *sp. inq.*
tryjanowskii (*Crotonia*)
tryphosa (*Camisia*)
tryssos [*P. (Archiphthiracarus)*]
tsavoensis (*Eremaeozetes*)
tsavoensis (*Pergalumna*)
tschabovskiy (*Suctobelbella*)
tschernovi (*Punctoribates*)
tsengi (*Galumna*)
tsengi (*Peloribates*)
tshendsureni (*Xenillus*)
tsitsikamaensis (*Notophthiracarus*)
tsurusakii (*Pergalumna*)
tsurutomiensis (*Eremulus*)
tsushimaensis (*Carabodes*)
tuberculata [*P. (Baloghates)*]
tuberculata (*Carinabella*)
tuberculata (*Crotonia*)
tuberculata (*Ctenobelba*) (=pilosella)
tuberculata (*Cyrthermannia*)
tuberculata (*Cyrthermannia*)
tuberculata (*Dometorina*)
tuberculata (*Dometorina*)
tuberculata (*Eremobelba*)
tuberculata (*Galumna*)
tuberculata (*Jacotella*) (=ornata)
tuberculata (*Kuklosuctobelba*)
tuberculata (*Machadobelba*)
tuberculata [*H. (Phyllhermannia)*]
tuberculata [*H. (Phyllhermannia)*]
tuberculata (*Ramusella*) (=tokyoensis)
tuberculata (*Rhinoppia*) (=subpectinata)
tuberculata (*Suctobelbilla*)
tuberculata (*Suctobelbilla*)
tuberculata (*Triteremella*) (?=kazabi)
tuberculatus (*Archegozetes*) (=magnus)
tuberculatus (*Belbodamaeus*)
tuberculatus (*Bulleremaeus*)
tuberculatus (*Cryptacarus*)
tuberculatus (*Eremaeozetes*)
tuberculatus (*Eremaeozetes*)
tuberculatus (*Eremaeozetes*)
tuberculatus (*Exochocephus*)
tuberculatus (*Gibbicephus*)
tuberculatus (*Gibbicephus*)
tuberculatus (*Gymnodamaeus*)
tuberculatus (*Liochthonius*)
tuberculatus (*Liochthonius*)
tuberculatus (*Microzetes*)
tuberculatus (*Neoribates*)
tuberculatus (*Notophthiracarus*)
tuberculatus (*Ocellotocephus*)
tuberculatus (*Papillocephus*)
tuberculatus (*Pilizetes*)
tuberculatus (*Schelorbates*)
tuberculatus (*Sphodrocephus*)
tuberculatus (*Sphodrocephus*)
tuberculatus (*Striatobates*)
tuberculatus [*H. (Tuberemaeus)*]
tuberculatus [*H. (Tuberemaeus)*]

tuberculatus [*T. (Viracochiella)*]
tuberculatus (*Xenillus*)
tuberculosissima [*H. (Kakophthiracarus)*]
tuberculosis (*Ametroproctus*)
tuberculosis (*Cepheus*)
tuberculosis (*Machadocephus*)
tuberculosis (*Scapheremaeus*)
tuberculus (*Notophthiracarus*)
tuberosa (*Hoplophorella*) (=praeoccupata)
tuberosa (*Jugatala*)
tuberosa (*Jugatala*)
tuberosa [*H. (Kakophthiracarus)*] (=tuberculosissima)
tuberosa (*Lineoppia*)
tuberosa (*Phauloppia*) (=saxicola)
tuberosa (*Setoppia*)
tuberosa (*Suctobelbella*) (=duplex)
tuberosa [*S. (Ussuribata)*]
tuberosa (*Wallworkoppia*)
tuberosus (*Charassobates*)
tuberosus (*Eremaeus*)
tubifer (*Liacarus*)
tubuaiensis (*Schelorbates*)
tubuaiensis (*Schelorbates*)
tubulifera (*Monstroripoda*)
tubulifera (*Monstroripoda*)
tubulus [*P. (Archiphthiracarus)*]
tubulus [*P. (Archiphthiracarus)*]
tuloyus (*Meristacarus*)
tumenensis (*Indotritia*)
tumescitus (*Suctotegeus*)
tumida (*Microtritia*)
tumida (*Suctobelbella*)
tumida (*Suctobelbilla*)
tumidisetosus (*Ocesobates*)
tumidus (*Euphthiracarus*)
tumidus (*Liochthonius*)
tumidus [*S. (Rafacarus)*]
tumidus (*Scapheremaeus*)
tumulata (*Suctobelba*)
tumulosus (*Liochthonius*)
tunicatus (*Cosmobates*)
tunicatus (*Loferemaeus*) *sp. inq.*
tunicatus (*Tegeozetes*)
tunicatus (*Tegeozetes*)
tunicatus (*Tegeozetes*)
tunicatus (*Tegeozetes*)
tunisica (*Dissorhina*) *ornata*
tunisiensis (*Peloribates*)
tupasae [*O. (Acrotocephus)*]
tupi (*Dampfiella*)
turanicus [*H. (Simkinia)*]
turbulentus (*Ramsayellus*)
turcica [*Q. (Coronoquadroppia)*] *michaeli*
turcica (*Enisella*)
turcica (*Machuella*)
turcica (*Moritzoppia*)
turcica (*Multioppia*)
turcica (*Oribotritia*)
turcica (*Perlohmannia*)
turcica [*O. (Perspicuoppia)*]
turcmenica (*Lohmannia*)
turcmenica (*Lohmannia*)
turcmenica (*Lohmannia*)
turcmenicus (*Ghilarovus*)
turcmensis (*Schelorbates*)
turgidus [*P. (Archiphthiracarus)*]

turgidus (Peloribates)
 turgidus (*Podoribates*)
 turgiseta (*Karenella*)
turalbaiensis (*Mixacarus*)
 turianiensis (*Hoplophorella*)
 turkeyensis (*Allogalumna*)
turki [L. (*Hamoppia*)]
 tuxeni (*Liochthonius*) Fors., 57
tuxeni (*Liochthonius*) Chin., 74 (=moritzi)
 tuxeni (*Membranoppia*)
tuxeni (*Membranoppia*)
tuxeni (*Pantelozetes*) (=paolii)
 tuxtlasensis (*Allonothrus*)
 tyrrhenica (*Bursoplophora*)
 tyrrhenica (*Oribatella*)
 tyrrhenicus (*Carabodes*)
 tyrrhenicus (*Liochthonius*)
tzanoudakisi [P. (*Archiphthiracarus*)] (=bryobius)
 tzitzikamaensis [S. (*Perscheloribates*)]
uapoui (*Pergalumna*) **bryani**
uapoui (*Schelorbates*) **mumfordi**
 ubali (*Edwardzetes*)
uberabensis (*Hydrozetes*)
 ucrainica [O. (*Zygoribatula*)] connexa
 uenoi (*Campachipteria*)
 uenoi [D. (*Epidamaeus*)]
 ugamaensis (*Cosmochthonius*)
ugraseni (*Thalassozetes*)
uherkovichi (*Moritzoppia*) (=keilbachi)
 uliginosa (*Oppiella*) nova
 ulneungensis (*Pyroppia*)
ultraciliata [L. (*Antennoppia*)]
ultraforaminosus (*Topobates*)
 uludagensis (*Dissorhina*)
uluguruensis (*Notophthiracarus*)
uluguruensis [E. (*Pocsia*)]
uluguruensis (*Schelorbates*)
 ulykpani [I. (*Haplozetes*)]
 umaetluisorum (*Oribatella*)
 umbellatus (*Lepidozetes*)
 umbraili (*Topobates*)
 umbraticus (*Gymnodamaeus*) sp. inq.
 umbratilis (*Camisia*) sp. inq.
 uncinata [O. (*Dzarogneta*)]
uncinatus (*Notophthiracarus*)
 uncinatus (*Scapheremaeus*)
uncinulus (*Notophthiracarus*)
 unguis (*Pseudobates*)
 undatus (*Phthiracarus*) sp. inq.
undatus (*Plenotocephalus*)
 undirostratus (*Papillacarus*)
 undosa [N. (*Leptosuctobelba*)]
 undulata [G. (*Indogalumna*)]
 undulata (*Indotritia*)
 undulata (*Indotritia*)
 undulata (*Oribatella*)
 undulata (*Rhinoppia*)
 undulata (*Suctobelbida*)
 undulata [O. (*Zygoribatula*)] Berl., 16
 undulata [O. (*Zygoribatula*)] Berl., 16
undulata [O. (*Zygoribatula*)] Berl., 16
 undulata [O. (*Zygoribatula*)] Berl., 16
undulata [O. (*Zygoribatula*)] Berl., 16
undulata [O. (*Zygoribatula*)] Bal., 66 (=baloghi)
undulatus (*Afroleius*)
 undulatus [M. (*Archegotoccephus*)]
undulatus (*Cavernocephus*)
 undulatus (*Eremaeozetes*)
undulatus (*Eremaeozetes*)
 undulatus (*Licnodamaeus*)
 undulatus (*Licnodamaeus*)
 undulatus (*Microtegeus*)
undulatus (*Microtegeus*)
 undulatus (*Nothrus*)
undulatus [Z. (*Protozetomimus*)]
 undulatus (*Sadocephus*)
 undulatus (*Sadocephus*)
 undulatus (*Tereticephus*)
 undulatus [T. (*Tyrphonothrus*)]
 undulatus (*Unduloribates*)
undulatus (*Unduloribates*)
unguifera (*Crotonia*)
unica (*Galumna*)
unica (*Kunstogalumna*)
unica (*Oribatula*) (=tibialis)
 unicarinata (*Austrotritia*)
unicarinata (*Austrotritia*)
 unicarinata (*Moritzoppia*)
 unicarinata (*Moritzoppia*)
 unicarinata (*Moritzoppia*)
 unicarinatoides (*Moritzoppia*) unicarinata
unicarinatus [N. (*Steganacarellus*)]
 unicomulatus (*Zetorchestes*) micronychus ssp. inq.
 unicomis (*Belba*)
 unilateralis (*Annectacarus*)
unilateralis (*Annectacarus*)
 unilateralis (*Annectacarus*)
 unilateralis (*Liochthonius*)
 unimaculatus (*Diapterobates*)
 uniporosa (*Vaghia*)
unisetosus (*Schelorbates*)
 unispinata (*Oribatella*)
 unispinata (*Oribatella*)
 unitjumenienses (*Pantelozetes*)
 universitatum (*Tectocephus*) velatus
 unjangensis (*Liacarus*)
 unqus (*Hoplophorella*)
 unsui (*Lohmannia*)
 upelbensis (*Basiceramerus*)
 upicentenarius (*Dolicheremaeus*)
 upoluensis (*Allogalumna*)
upoluensis (*Allogalumna*)
uracasensis (*Peloribates*)
 uraceus (*Eupelops*)
 uraceus (*Eupelops*)
 urbanlus [P. (*Triaunguis*)]
 urenicus (*Schelorbates*)
 urhani [C. (*Caucasiobelba*)]
 uropygium (*Dicatozetes*)
ursina (*Subbelba*) (=montana)
ursulae (*Eremaeozetes*)
 urticinus (*Gehypochthonius*)
 urticinus (*Gehypochthonius*)
 uruguayensis (*Pheroliodes*)
 uruguayensis (*Sphaerochthonius*)
usambarensis (*Indotritia*) (=nuda)
usheri [B. (*Gressitoppia*)]
usitatus (*Notophthiracarus*)
 usnea (*Domatorina*)
 uspiensis (*Teratoppia*)
ussurica (*Nanhermannia*) (=comitalis)
 ussuricus (*Ophidiotrichus*)
utricularia (*Crotonia*)
 uttarkashii (*Galumna*) crenata

- vacua* (*Aeroppia*)
vaesterbottensis (*Palaeacarus*) (=kamenskii)
vagorum (Papuacepheus)
valbehanae [L. (*Incabates*)]
valdemoricus (*Cryptacarus*) (=promecus)
valdivia (*Crotonia*)
valdiviaensis [N. (*Protophthiracarus*)]
valentianus [H. (*Platynothrus*)] (=punctatus)
valerieae (*Afroleius*)
valerieae (*Camisia*)
valerieae (*Ceratoppia*)
valerieae [M. (*Cristonothrus*)] sp. inq.
valerieae [O. (*Monoribatella*)]
valerieae [S. (*Rafacarus*)]
valida (*Anachipteria*)
valida (*Galumna*)
validus (*Phthiracarus*) (=sarahae)
valkanovi (*Eueremaes*) (=oblongus)
vallei (*Phauloppia*)
vanalinear (*Dampfiella*)
vanderhameni (*Hoplophthiracarus*) (=illinoisensis)
vanderhameni (*Lanceoppia*)
vanderhameni (*Zetorchestes*)
vaneki [L. (*Lancelalmoppia*)]
vanga (*Setoppia*)
vanharteni (*Ethiovertex*)
vanharteni (*Lohmannia*)
vanharteni [H. (*Tuberemaes*)]
vanharteni [O. (*Zygoribatula*)]
vanhonggui (*Mixacarus*)
vanuatuensis (*Mixacarus*)
vanzwaluwenburgi (*Schelorbates*)
varablancus [P. (*Archiphthiracarus*)]
vargai (*Zetorchella*)
varia (*Arcoppia*)
varia (*Arcoppia*)
varia (*Galumna*)
varia (*Hoplophorella*)
varia (*Oribotritia*)
varia [O. (*Zygoribatula*)] (=propinqua)
variabilis [P. (*Archiphthiracarus*)] (=peristomaticus)
variabilis [N. (*Confinoppia*)]
variabilis (*Diapterobates*)
variabilis (*Diapterobates*)
variabilis [D. (*Epidamaeus*)]
variabilis (*Gittella*)
variabilis (*Haplochthonius*)
variabilis [C. (*Klapperiches*)]
variabilis (*Liebstadia*) (=pannonica)
variabilis (*Microtegeus*)
variabilis [C. (*Paraceratorchestes*)]
variabilis (*Paraphauloppia*)
variabilis (*Pilogalumna*)
variabilis (*Pilogalumna*)
variabilis (*Schelorbates*)
variabilis (*Sellnickochthonius*)
variabilis (*Suctobelbella*)
variabilis (*Truncopes*) moderatus
variabilis (*Truncopes*) moderatus
variabilis (*Xenillus*)
variabilis [O. (*Zygoribatula*)] (=frisiae)
varians (*Hoplophorella*)
varians [R. (*Insculptoppiella*)]
varians [R. (*Insculptoppiella*)]
variaporosa (*Oribatula*)
variatepictus (*Bipassalozetes*) (=intermedius)
variatus (*Eupelops*)
variatus [M. (*Phyllohmannia*)]
variesetosus (*Sphaerochthonius*)
variolatus (*Dolicheremaes*)
variobatus (*Dolicheremaes*)
variologa (*Cultroribula*)
variolosus (*Eupelops*) (=torulosus)
variolosus (*Notophthiracarus*)
variolosus (*Xenillus*) sp. inq.
variopectinata (*Ctenoppia*)
variopectinata [R. (*Paramedioppia*)]
variosculpturata (*Pergalumna*)
variosetosa (*Fusuloppia*)
variosetosa [S. (*Ussuribata*)]
variosetosa [S. (*Ussuribata*)]
variosetosa [S. (*Ussuribata*)]
variosetosa [S. (*Ussuribata*)]
variosetosa [S. (*Ussuribata*)]
variosetosus [T. (*Cristonothrus*)]
variosetosus [T. (*Cristonothrus*)]
varisculptus (*Pelorbates*)
varisculptus [P. (*Triaunguis*)]
varisetiger (*Protoribates*)
varius (*Humerobates*)
vartismithi (*Chamobates*) sp. inq.
vasiliorum [A. (*Conchogneta*)]
vasiliui (*Topobates*)
vastus (*Liacarus*) (=major)
vastus (*Protoribates*) (=dentatus)
vaucheri (*Austrocarabodes*)
vaucheri (*Austrocarabodes*)
vegeta [O. (*Zygoribatula*)]
velata (*Geminoppia*)
velata (*Topalia*)
velatus [C. (*Fernandezbodes*)]
velatus (*Kaszabozetes*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
velatus (*Tectocephus*)
venetiolana (*Crotonia*)
venetiolanus (*Holonothrus*)
venezolanus [C. (*Klapperiches*)]
venezolanus (*Notophthiracarus*)
venezuelanus (*Xenillus*)
venosus (*Platylodes*) (?=doderleini)
ventosus [N. (*Protophthiracarus*)]
ventosus [N. (*Protophthiracarus*)]
ventralis (*Pergalumna*)
ventralis (*Pergalumna*)
ventralis (*Pergalumna*)
ventralis (*Pergalumna*)
ventricosa (*Camisia*) (=segnis)
ventricosus (*Hypochthonius*) sp. inq.
ventrisetosa (*Machuella*)
ventrisetosa (*Machuella*)
ventrisetosa (*Machuella*)
ventrisetosa (*Machuella*)
ventroacutus (*Maculobates*)
ventrolaminata [M. (*Pravoppia*)]
ventronodosa [S. (*Lalmoppia*)] (=maculata)
ventrosquamosa (*Neoamerioppia*)
ventrosquamosa (*Neoamerioppia*)
ventrosquamosa (*Neoamerioppia*)
ventrostriatus (*Austrocarabodes*)

- venusta (Ceratozetella)
venusta (Oribatula) (=tibialis)
 venusta (Hoplophorella)
 venustus (Circellobates)
vera (Oribatula) (=caliptera)
 vera (Rhinoppia)
 vera (Suctobelbella) subcornigera
veracruzensis (Archegozetes) (=magnus)
 verai (Eremaozetes)
 veriornatus (Gymnodamaeus)
 vermicula [H. (Phyllhermannia)]
 vermicularis (Eohypochthonius)
vermicularis (Pheroliodes)
vermiculatus (Carabodes) (=labyrinthicus)
 vermiculatus (Cosmozetes)
 vermiculatus (Neoliodes)
 vermiculatus [H. (Tuberemaeus)]
vermiculatus [H. (Tuberemaeus)]
 vermiseta (Perxylobates)
 vermiseta (Perxylobates)
vermiseta (Perxylobates)
 vermiseta (Perxylobates)
 verna (Nanhermannia)
 vernaculus (Steganacarus)
 vernoncrookensis (Austrocarabodes)
vernoncrookensis (Globoppia)
 vernonensis (Notophthiracarus)
 verrucatus (Austrocarabodes)
 verrucatus (Cubabodes)
 verrucatus [D. (Epidamaeus)]
 verrucosa (Achipteria)
verrucosa (Belba) (=compta)
verrucosa (Epilohmannia) (=cylindrica)
 verrucosa [S. (Flagrosuctobelba)]
verrucosa [H. (Kakophthiracarus)] (=tuberculosissima)
 verrucosa (Setoppia)
 verrucosus [O. (Acrotocepheus)]
 verrucosus (Cepheus)
 verrucosus (Plenotocepheus)
 verrucosus (Plenotocepheus)
 verticillatus (Hymenozetes)
 verticillipes [D. (Spatiodamaeus)]
 verticillipes [D. (Spatiodamaeus)]
 vesca (Mesoplophora)
 vesiculus (Euphthiracarus)
 vestigia (Indotritia)
vestigijs [P. (Neophthiracarus)]
 vestita (Acrotritia)
 vestita (Acrotritia)
 vestita (Acrotritia)
 vestita (Acrotritia)
vestita (Acrotritia)
 vestita (Acrotritia)
 vestita (Eremella)
 vestita (Lyrifissisella)
 vestitus (Steganacarus)
 veteratorius (Notophthiracarus)
vetula (Dissorhina) (=ornata)
 vibrissa (Wallworkoppia)
 vicarius (Hydrozetes) *sp. inq.*
vicarius (Pseudotocepheus)
vicarius (Tectocephus) (=velatus)
 vicina (Neoamerioppia)
vicina (Neoamerioppia)
 vicina [E. (Neoepilohmannia)]
 vicina (Oribatella)
 vicina (Oribotritia)
- vicina (Sternoppia)*
 vicina [O. (Zygoribatula)]
 vicinicornuta (Cyrthermannia)
 vicinicornuta (Cyrthermannia)
 vicinus (Aleurodamaeus)
vicinus (Bipassalozetes) (=bidactylus)
 vicinus [N. (Calyptophthiracarus)] pavidus
 vicinus (Euphthiracarus)
 vicinus (Fissicepheus)
vicinus (Hoplophthiracarus)
victoriae (Crotonia)
 victoriae (Joshuella)
 videor (Hydrozetes)
 viedmai (Microzetes)
 vietnamensis (Allosuctobelba)
 vietnamensis (Granuloppia)
 vietnamensis (Liacarus)
 vietnamensis (Perxylobates)
 vietnamese (Paulianacarus)
 vietnamica (Lasiobelba)
 vietnamica [N. (Leptosuctobelba)]
vietnamica (Multipulchroppia) (=pectinata)
 vietnamica (Neoamerioppia)
 vietnamica (Pedrocortesella)
 vietnamica (Ramuseloppia)
 vietnamica (Roynortonia)
 vietnamica (Schalleriella)
 vietnamica (Trichogalumna)
 vietnamicus [O. (Acrotocepheus)]
 vietnamicus (Adrodamaeus)
 vietnamicus (Euphthiracarus)
 vietsi [M. (Trimalaconothrus)]
 viguerasis (Scheloribates)
 vilagiorum (Rugoppia)
 vilhenarum [T. (Cristonothrus)] *sp. inq.*
 vilhenarum (Dolicheremaeus)
 vilhenarum (Eohypochthonius)
 vilhenarum (Eohypochthonius)
 villiersensis (Dimidiogalumna)
villosa (Archoplophora) (=rostralis)
villosa [M. (Parplophora)] (=polita)
 villosus (Odontocephus)
 villosus [N. (Protophthiracarus)]
 vinalesensis (Annectacarus)
 vinalesensis (Hoplophthiracarus)
 vindobonensis [I. (Haplozetes)]
 vindobonensis [I. (Haplozetes)]
 vindobonensis [I. (Haplozetes)]
 vindobonensis [I. (Haplozetes)]
 vindobonensis (Ophidiotrichus)
 violabilis (Ceratooppia)
 viperea (Arcoppia)
 viperea (Arcoppia)
 viperea (Arcoppia)
 virga (Pergalumna)
 virgatus (Euphthiracarus)
 virginalis (Hydrozetes) *dimorphus*
virginalis (Quadroppia) (=quadricarinata)
 virginiana [A. (Hoffmanacarus)]
 virginicus (Ceratozetes)
 virginiensis (Galumna)
 virginiensis (Galumna)
 virginiensis (Mesotritia)
 virgulata (Oribotritia)
 virungensis (Holonothrus)
 visayasensis (Dolicheremaeus)
 visayasensis (Philippotocepheus)

viscaensis (Dolicheremaeus)
 visnyai (Hungarobelba)
vitiosa (Beckiella)
 vitis (Papillacarus)
vitraeus (Dolicheremaeus)
 vitrea (Oppia)
 vitrina (Hoplophorella)
vitrina (Hoplophorella)
vitrina (Hoplophorella)
vitrina (Hoplophorella)
vitrina (Hoplophorella)
vitrina (Rhinoppia) (=obsoleta)
vittata (Arcoppia)
viviparus (Totobates)
vladopesici [F. (Cosmogalumna)]
vohimana (Hermannella)
vohimana (Parasuctobelba)
 voigtsi [C. (Xiphobates)]
vojnitsi (Allogalumna)
volcanensis [O. (Moritzoppiella)]
volcanensis (Scheloribates)
volcanicus (Scapheremaeus)
 volgini (Ceratozetes)
 volgini (Zachvatkinibates)
vombi (Liacarus) (=coracinus)
 voskresenskii (Stomacarus)
 vtorovi [F. (Mexicoppia)]
 vtorovi [F. (Mexicoppia)]
 vtorovi [O. (Oxyoppiella)]
vulcania (Lohmannia)
 vulgaris [N. (Leptosuctobelba)]
vulgaris (Maculobates)
vulgaris (Pheroliodes)
vulgaris (Scheloribates)
vulgaris (Scheloribates)
vulgaris [P. (Trianguis)]
vulgaris (Xenillus) (=tegeocranus)
 vulgaris [O. (Zygoribatula)]
vulpes (Arthrophophora)
 vulpes (Arthrophophora)
wachteli [S. (Bischeloribates)]
 wadatsumi (Peloptulus)
waitere (Notophthiracarus)
wakensis (Neoliodes)
walbranensis (Metrioppia)
 walkeri (Apotritia)
walkeri (Brachioppiella)
wallacei [O. (Acrotocephus)]
wallacei (Dolicheremaeus)
wallworki (Acrotritia)
 wallworki (Annectacarus)
wallworki [P. (Archiphthiracarus)] (=bryobius)
wallworki (Beloppia)
wallworki (Cosmochthonius) (=lanatus)
wallworki (Crotonia)
wallworki (Dolicheremaeus)
 wallworki (Epilohmannoides)
wallworki (Pergalumna) (=obvia)
wallworki [P. (Neophthiracarus)]
wallworki [M. (Pravoppia)]
wallworki (Sphaerochthonius) (=gemma)
 wallworki (Steganacarus)
 wallworki (Tyrphonothrus)
 walteri (Eremaeus)
walteri (Novazelandiella)
walteri (Rhacaplacarus)

walteri (Scapheremaeus)
walteri (Tegoribates)
 wandae (Atropacarus)
 wangi (Dolicheremaeus)
 waray (Dolicheremaeus)
warburtonensis [N. (Protophthiracarus)]
washburni (Oppiella) (=nova)
 watanabei (Banksinoma)
 waterhousei (Arcoppia)
waterhousei (Arcoppia)
waterhousei (Gibbicepheus)
waterhousei (Suctobelbila)
 watertonensis (Ceratozetes)
 watsoni (Stomacarus)
weberi (Pergalumna)
wehncke (Pheroliodes)
weigmanni [P. (Archiphthiracarus)]
 weigmanni [A. (Conchogneta)]
 weigmanni (Corynoppia)
 weigmanni [D. (Epidamaeus)]
 weigmanni [P. (Minguezetes)]
 weigmanni (Porobelba)
 weigmanni [C. (Triachipteria)]
weigmanni [M. (Trimalaconothrus)]
weiri (Crotonia)
weldboroughensis [N. (Protophthiracarus)]
 weni (Galumna)
weneri (Basilobelba)
weneri (Steganacarus)
 wettsteini (Carabodes)
whakau [N. (Steganacarellus)]
 whartoni (Jacotella)
whitteni (Scheloribates) fimbriatus
whitteni [P. (Vepracarus)]
widagdoi (Rhynchoppia)
williamsae (Anakingia)
 willmanni [A. (Conchogneta)]
 willmanni [C. (Klapperiches)]
 willmanni [C. (Klapperiches)]
willmanni (Lanceoppia)
willmanni (Liacarus) (=subterraneus)
willmanni (Liebstadia) (=pannonica)
 willmanni (Mucronothrus)
 willmanni (Nothrus)
willmanni (Oppia) (=denticulata)
 willmanni (Oribatella)
 willmanni (Pergalumna)
willmanni [N. (Protophthiracarus)]
willmanni (Scheloribates)
willmanni [C. (Triachipteria)] (=fanzagoi)
 wilsoni [M. (Hammeroppia)]
 wilsoni [M. (Hammeroppia)]
wilsoni [M. (Hammeroppia)]
wilsoni [M. (Hammeroppia)]
 wilsoni (Maudheimia)
 winchesteri (Sphaerozetes)
windsori (Sphaerochthonius)
winkleri (Arcoppia) cronus
 witfonteinensis (Rhopalozetes)
 wittmeri (Eremobelba)
wittmeri (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
 woasii (Aleurodamaeus)
 woasi [H. (Heterohermannia)]
woelkei (Eremaezetes)
wojciechniedbalai (Eurostocephus)
wojciechniedbalai (Galumna)

wolwekransensis (Bipassalozetes)
womersleyi [S. (Ussuribata)]
womerslevi [S. (Ussuribata)]
wonalancetanus (Carabodes)
wongi [M. (Megazetes)]
woodringi (Lanceoppia)
woolleyi (Eueremaeus)
woollevi (Neoamerioppia)
woollevi (Protoripoda)
woonhahi (Adrodamaeus)
woschitzi (Galumnella)
wulongensis [P. (Tectodamaeus)]
wuyanensis [T. (Tyrphonostrus)]
wynadensis (Meristacarus)
xanthoparmeliae (Phylloribatula)
xarifae (Gehypochthonius)
xavieri (Haplacarus)
xena (Arthrovertex)
xena (Epilohmannoides)
xena (Epilohmannoides)
xena (Epilohmannoides)
xena [N. (Leptosuctobelba)]
xena (Orthogalumna)
xena (Pilobatella)
xenus (Pseudocarabodes)
xerophilus [H. (Simkinia)] (=ovalis)
xilofila (Microtritia) (=minima)
xinjiangensis (Ceratozetes)
xinjiangensis (Multioppia)
xinjiangensis (Phauloppia)
xishuangbanna (Pergalumna) magnipora
xizangensis (Eupterotegaeus)
xuansoni (Aokiella)
xylariae (Liacarus)
xylariae (Liacarus)
xylobatoides (Schelorbates)
yachidairaensis [M. (Trimalaconothrus)]
yaginumi (Calipteremaeus)
yakuensis (Sadocephus)
yamaeensis (Schelorbates)
yamamotoi [T. (Cristonothrus)]
yamasakii [H. (Capillonostrus)]
yamasakii [H. (Capillonostrus)]
yamashitai (Scapheremaeus)
yamatogracilis [M. (Hammeroppia)]
yamizoensis (Kuklosuctobelba)
yanoi (Nehypochthonius)
yaoi (Gymnodampia)
yaoi [P. (Tectodamaeus)]
yarovenkoi (Atropacarus)
yasumai (Hermanniella)
yatsushiroensis (Pelorbates)
yayeyamensis (Liacarus)
ybarrai (Xenillus)
yeatesi (Crotonia)
yemeniticus (Unguizetes)
yepesensis [O. (Dzarogneta)]
yezoensis (Ceratozetella)
yezoensis (Costeremus)
yezoensis (Diapterobates) variabilis
yezoensis [L. (Dorycranosus)]
yezoensis (Pelorbates)
yezoensis (Protorbates)
yezoensis (Schelorbates)
yezoensis (Suctobelbella)
yichunensis (Furcoribula)
yinae (Leobodes)
yinae (Malaconothrus)
yinae [M. (Phyllolohmannia)]
yodai (Lasiobelba) (=kuehnelti)
yonaguniensis [F. (Cosmogalumna)]
yorubaensis (Schelorbates)
yoshidai (Truncopes)
yoshii [L. (Antennoppia)]
yoshii [P. (Aokibates)]
yoshii [P. (Aokibates)]
yoshii (Dolicheremaeus)
yoshii (Hoplophthiracarus) (=kugohi)
youngai (Longocephus)
yozeensis (Moritzoppia) uncarinata
ypsilon (Hymenobelba)
ypsilon (Hymenobelba)
ypsilon signata (Suctobelbata)
yukiguni (Symbiorbates)
yukonensis (Eueremaeus)
yukonensis (Mycobates)
yukonensis (Oribatella)
yunkeri (Fortuynia)
yunnanensis [P. (Archiphthiracarus)]
yunnanensis (Dolicheremaeus)
yunnanensis [D. (Epidamaeus)]
yunnanensis (Eremobelba)
yunnanensis (Gymnodampia)
yunnanensis (Lasiobelba)
yunnanensis (Pelorbates)
yunnanensis [T. (Tyrphonostrus)]
yurtaevi (Pergalumna)
yurtaevi (Pergalumna)
yushuensis [D. (Spatiodamaeus)]
yuwana (Medioxyoppia)
yuwanensis (Nippobodes)
zaballosi (Odontocephus)
zaballosi (Rhinoppia)
zachvatkini [P. (Apolohmannia)]
zachvatkini (Arthrophlophora)
zachvatkini (Beklemishevia)
zachvatkini [L. (Dorycranosus)]
zachvatkini (Galumna)
zachvatkini (Metabelbella)
zachvatkini (Rhinoppia)
zachvatkini [P. (Semipunctorbates)]
zaherii (Schelorbates) (=praeincisus)
zangherii (Camisia) sp. inq.
zangherii (Indotritia)
zanini (Cosmochthonius)
zarae (Plasmobates)
zealandica (Miropia)
zealandicus [T. (Cristonothrus)]
zealandicus (Neophysobates)
zealandicus (Schelorbates)
zealandicus (Schelorbates)
zebra (Notophthiracarus)
zehntneri (Machuella) ventrisetosa
zehntneri (Machuella) ventrisetosa
zelawaiensis (Sellnickochthonius)
zelawaiensis (Sellnickochthonius)
zellwegeri (Dampfiella)
zephyrus (Scapheremaeus)
zeteki (Ceratozetes) (=enodis)
zeucta [G. (Erogalumna)]
zeuctos (Notophthiracarus)
zeugus (Compactozetes)
zeyensis [S. (Lalmoppia)]
zhangii (Oribatula)

zhengi (Hermanniella)
zhengi (Hermanniella)
 zhuzhikovi (Mixacarus)
 zicmani (Phthiracarus)
zicsica [L. (Lancelalmoppia)]
zicsii (*Cultroribula*)
zicsii (*Eremobelba*)
zicsii (Rhacaplacarus)
zicsii [*O. (Zygoribatula)*] (=exilis)
zigzag (Microtegeus)
zikani (*Heterobelba*) sp. inq.
zikani (*Teleoliodes*)
 zimmermani (Neoliodes)
zimmermani (Neoliodes)
 zingerlei (Trichoribates)
 zlotini (Metrioppia)
zryanini (Gigantoppia)
zsilavii (Oribatella)
zsuzsankae [*O. (Aciculoppia)*]
zululandensis (Notophthiracarus)
zumpti (Humerobates)
 zushi [N. (Confinoppia)]
zwarti [*E. (Neoepilohmannia)*]